LINNEAN
QK97
.C117
1768
t.1
pt.1

CAROLI A LINNÉ

SYSTEMA NATURAE.

TOM. I. PARS II.

MISSOURI
BOTANICAL
GARDEN.

III. ANSERES.

Roſtrum obtuſiuſculum, epidermide tectum, ſub baſi gibbum, apice auctum. Faux denticulata.
Lingua carnoſa.
Pedes palmati natatorii.

67. ANAS. *Roſtrum* lamelloſo-dentatum, convexum, obtuſum. *Lingua* ciliata, obtuſa.

* *roſtro baſi gibbo.*

Cygnus. 1. A. roſtro ſemicylindrico atro, cera flava, corpore albo. *Fn. ſuec.* 107. *It. weſtgoth.* 143. *Scop. ann.* 1. *n.* 66. *Brünn. orn. n.* 44. *Kramer el. p.* 338. *Georg. it. p.* 165. Cygnus ferus. *Briſſ. av.* 6. *p.* 292. *n.* 12. *t.* 28. *Bell. av.* 30. a. *Geſn. av.* 371. *t.* 372. *Aldrov. orn.* 3. *p.* 10. *t.* 8. *Raj. av. p.* 136. A. 2. *Marſ. dan.* 5. *p.* 98.
Cygne ſauvage. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 3. *pl. enlum. n.* 913.
Elk Hooper, or wild, or whiſtling Swan. *Brit. zool.* 2. *n.* 264. *Arct. zool.* 2. *p.* 541 *n.* 469. *Will. orn. p.* 356. *t.* 69. *Alb. av.* 3. *p.* 91. *t.* 96. *Edw. av. t.* 150. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 433. *n.* 1.
Habitat in Europa *et ſeptentrionali* America *atque* Aſia, *in* mari *quoque* Caſpio *et* Ponto euxino, Natolia *et* Aegypto *gregaria, volando potiſſimum alta voce clamans, poëtarum emblema, velociſſime currens, collo erecto natans, 4 ova parit, cum carne juniorum eſculenta; ab incolis Islandiae et Camtſchatcae canum ope capta, qui pennis etiam ornamenti loco, et, prouti Americae ſeptentrionalis incolae, ipſa pelle ad veſtimenta, peras etc. utuntur.*
Longitudo *vix* 5 *pedum;* palpebrae *nudae flavae;* pedes *nigri;* coſtae 11; trachea, *paulo poſtquam pectoris cavum intravit, reflexa, inſtar buccini, demum altera vice intrat, et in binos ramos diviſa per pulmones diſtribuitur.*

Olor. 47. A. roſtro ſemicylindrico atro, cera nigra, corpore albo. Cygnus. *Geſn. av.* 371. *t.* 372. *Bell. av.* 30. *Aldr. orn.* 3. *p.* 1.

3. *p.* 1. *Besl. muſ. t.* 20. *Marſ. danab.* 5. *t.* 47. *Briſſ. av.* 6. *p.* 288. *n.* 11.
Cygnus manſuetus. *Raj. av. p.* 136. A. 1.
Cygne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 3. *t.* 1. *planch. enlum. n.* 913.
Tame Swan. *Brit. zool.* 2. *n.* 265. *t.* 60. *Will. orn. p.* 355. *t.* 69. *Albin. av.* 3. *t.* 96. *Edw. av. t.* 150.
Mute Swan. *Arct. zool.* 2. *p.* 543. *n.* 470. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 436. *n.* 2.
Zahmer Schwan. *Friſch av. t.* 152.
Habitat in Ruſſia, Sibiria, Perſico *etiam littore* maris caſpii, *hoſpitatur per omnem* Europam, *cygno multo major, inflexo collo natans, mutus, robuſtus, grandaevus, piſcibus herbisque victitans, in nido gramineo ad aquas poſito ova pariens, prima Februario, alternis diebus* 6 – 8, *quibus per* 6 *ſeptimanas incubat; juniorum caro olim magni aeſtimata.*

Roſtrum *baſi rubrum*; trachea *recta via pulmones intrans*; coſtae 12.

nigricollis. 48. A. roſtro ſemicylindrico rubro, collo nigro, corpore albo, pedibus incarnatis.
Blacknecked Swan. *Boug. it. p.* 59. *Pernett. it.* 2. *p.* 26. *c.* 9. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 438. *n.* 3.
Habitat in inſulis Falkland, *ad fluvium* Plata, *et in freto* Magellanico.

melanocephala. 49. A. roſtro ſemicylindrico rubro, capite nigro, corpore albo. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 207.
Habitat in Chili, *olori aequalis;* femina 6 *ova parit, victumque quaerens, pullos in dorſo ſecum portare fertur.*

hybrida. 50. A. roſtro ſemicylindrico, cera rubra, cauda acutiuſcula. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 213.
Habitat in mari inſulis Chilae *interjecto, anſeri aequalis, collo tamen breviore, alis pedibusque longioribus, non gregatim, ſed per paria; femina in fovea arenae littoreae* 8 *ova parit.*
Mas *totus albus, ſolis pedibus roſtroque flavis*; femina *nigra, pennis nonnullis albo-marginatis, roſtro pedibusque rubris.*

cygnoides. 2. A. roſtro ſemicylindrico: cera gibboſa, palpebris tumidis. *Fn. ſuec.* 108.
Anſer guineenſis. *Briſſ. av.* 6. *p.* 280. *n.* 7.

Anſer

Anſer hiſpanicus. *Marſ. danub.* 5. *p.* 104. *t.* 50.
Oie de Guinée. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 72. *t.* 3. *planch. enlum. n.* 374.
Spaniſh Gooſe. *Albin. av.* 1. *t.* 91.
Swan Gooſe. *Raj. av. p.* 138. *n.* 8. *Will. orn. p.* 360. *t.* 71.
Chineſe Gooſe. *Arct. zool.* 2. *p.* 571. E. *Brown. jam. p.* 480. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 447. *n.* 12.
Chineſiſche Gans. *Friſch av. t.* 153. 154.

orientalis. β. Anſer roſtro ſemicylindrico atro baſi gibbo minor.
Anſer moſcoviticus. *Briſſ. av. p.* 277. *n.* 6.
Muſcovy Gander. *Alb. av.* 2. *p.* 83. *t.* 91. 92.
Habitat frequens ad Sibiriae, *potiſſimum orientalis* Chinae*que flumina et lacus majores, ad* mare *quoque* Caſpium, 3 *circiter pedes longa, facile cicuranda, cum anſere coiens, et fertiles pullos gignens.*
Roſtrum *nigrum, verſus frontem rugoſum, adſcendens et biangulatum, ad baſin linea ex ferrugineo alba cinctum;* gulae *ſtruma nulla;* vertex *et* faſcia *longitudinalis per cervicem et nucham albam teſtacea;* dorſum *et* hypochondria *ex cinereo fuſca, pennarum marginibus ex griſeo albidis;* pedes *ex coccineo rubri, unguibus nigris;* corpus *ſubtus albidum,* criſſum *album.* Pallas.

gambenſis. 3. A. roſtro ſemicylindrico, cera gibboſa, humeris ſpinoſis.
Anſer Gambenſis. *Briſſ. av.* 6. *p.* 283. *n.* 8.
Oie armée. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 76?
Gambo-gooſe. *Raj. av. p.* 138. *n.* 9. *Will. orn. p.* 360.
Spar-winged Goole. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 452. *n.* 15. *t.* CII.
Habitat in Gambia *aliisque* Africae *partibus, anſeris magnitudine.*
Roſtrum *rubrum;* genae, mentum, tectrices *alarum exteriores et* corpus *ſubtus album, ſupra nigrum;* pedes *ſpadicei;* ſpinae *alarum corneae.*

Coſcoroba. 51. A. roſtro extremo dilatato rotundato, corpore albo. *Mol. hiſt. nat. Chil. p.* 207.
Habitat in Chili, *facillime cicuranda, magna,* roſtro pedibus*que rubris,* oculis *nigerrimis.*

melanotos. 52. A. candida roſtro carunculaque ad ejus baſin nigris, capite colloque nigro maculatis, dorſo, cauda cuneata, alisque nigris: remigum primariarum apicibus ſpeculo viridi. *Ind. zool. p.* 21. *t.* 11.
Oie bronzée. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9 *p.* 77.
Oie de la côte de Coromandel. *Buff. pl. enlum. n.* 937.

Habitat in Coromandel, *insulisque* Zeylon *et* Madagascar, *anſere minor, 2 pedes et 9 pollices longa.*

grandis. 53. A. roſtro nigro, baſi melino, corpore obſcuro ſubtus albo, pedibus coccineis.

Great goose. *Act. zool.* 2. *p.* 570. A.

Habitat numeroſiſſima in Sibiria *orientali ad* Camtſchatcam *usque, maxima, ut* 30 *libras roſſicas pondere nonnunquam aequet; interdiu in ſegetibus et pratis, noctu in lacubus.*

hyperborea. 54. A. roſtro coccineo, corpore (ſenioribus toto) niveo, fronte nebuloſa, occipite, cervice alarumque baſi ex rubiginoſo luteſcentibus, remigibus primariis ultra medium nigris.

Anſer hyperboreus. *Pall. ſpicil.* 6. *p.* 25.

Anſer niveus. *Briſſ. av,* 6. *p.* 288. *n.* 10. *Forſter act. angl.* 62. *p.* 413.

White Brant. *Lawſ. Carol. p.* 147.

Snow Gooſe. *Act. zool.* 2. *p.* 549. *n.* 477. *Latham ſyn.* III. 2. *p.* 445. *n.* 10.

Schneegans. *Schwenckf. Sileſ. p.* 213.

Habitat in America *et* Aſia *ſeptentrionali, vere adoleſcente gregibus numeroſiſſimis verſus mare glaciale migrans, rarius per plagas magis occidentales et auſtrales* v. g. Sileſiam *vagans, ſtultiſſima, Sibiriae orientalis incolarum frequentiſſima eſca,* $2\frac{1}{2}$ *pedes circiter longa.*

Unguis *maxillae ſuperioris, oris anguli et maxillae inferioris margo in juniori ave nigri, in ſeniore albidi;* irides *in viva ex fuſco luteae;* remiges 11 *primariae baſi albae; ſecundariae apicibus cineraſcentes, harumque* tectrices *cinereae, baſi fuſceſcentes;* rectrices *breves ſubaequales;* pedes *ſaturatiſſime rubri, digitis ipſis nigris.*

picta. 55. A. alba, roſtro, remigibus primariis caudaque nigris, jugulo et pectore nigro-lineatis, dorſo ſuperiore pallide griſeo nigro-lineato, inferiore obſcure cinereo.

Painted Duck. *Cook it.* 1. *p.* 96.

Painted Gooſe. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 443. *n.* 9.

Habitat in Staatenland, 28 *pollices longa.*

Irides *cinereae;* occiput *cineraſcens;* remiges *ſecundariae obſcurae, margine pallidiores;* pedes *nigri.*

magellanica. 56. A. ferrugineo et nigro lineata, roſtro nigro, capite colloque ex ferrugineo fuſcis, dorſo inferiore, cauda remigibusque obſcuris, ſecundariis apice albis.
Oie des terres magellaniques. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 68. *pl. enlum. n.* 1006.
Magellanic Gooſe. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 443. *n.* 8.
Habitat in freto Magellanico, 24 *pollices longa.*
Criſſum *griſeum;* tectrices *alarum albae;* pedes *flavi;* ungues *nigri.*

antarctica. 57. A. nivea, roſtro nigro, pedibus flavis, tuberculo obtuſo ad flexuram alarum.
Antarctic Gooſe. *Forſt. it. p.* 495. 518. *Pern. it.* 2. *p.* 13. *Cook it.* 2. *p.* 186. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 442. *n.* 7.
Habitat in terra del Fuogo, *anſere minor*, 16 *libras pondere aequans.*
Feminae *roſtrum carneum;* caput, collum *et* truncus *nigra, lineis transverſis albis;* dorſi *medium* remigesque *majores nigra;* alarum *ſpeculum viride, exteriore margine albo;* criſſum *ex vireſcente album.*

variegata. 58. A. ſupra fuſca, albo maculata, ſubtus ſpadicea nigro et albo maculata, roſtro, cauda remigibusque primariis nigris, ſecundariis viridibus, tectricibus alarum albis, uropygio criſſoque ferrugineis.
Variegated Gooſe. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 441. *n.* 6.
Habitat in nova Seelandia, *anatis majoris magnitudine.*
Caput collumque *ſupra dimidio album;* pedes *nigri.*

leucoptera. 59. A. alba, roſtro, rectricibus 2 intermediis, remigibus primariis et tectricibus alarum majoribus nigris, nucha et dorſo ſuperiore lineis numeroſiſſimis nigris.
Oie des isles malouines. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 69.
Outarde. *du Prez Louiſian.* 2. *p.* 113?
Sea Gooſe. *Act. angl.* 66. *p.* 104.
White-winged antarctic Gooſe. *Brown ill. t.* 40.
Bouſtard Gooſe. *Bong. it. p.* 59. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 440. *n.* 5.
Habitat in inſulis Falkland, *alte facileque currens et volans, vix glocitans,* 32–40 *pollices longa,* 6 *ova pariens;* caro *ſapida.*
Alae *ad flexuram tubere obtuſo,* ſpeculo *obſcure viridi;* tectrices *majores apice albae;* remiges *ſecundariae altera parte nigrae, altera albae;* pedes *nigri.*

cinerea. 60. A. cinerea, ſubtus obſcura, criſſo albo, remigibus caudaque acuta brevibus nigris, roſtro, iridibus, tuberculo alarum et pedibus flavis.

Oiſcaux griſes ou Oies de plein. *Pernett. it.* 2. *c.* 19. *p.* 21.

Race horſe Duck. *Pernett. diar. p.* 213. 214.

Loggerhead. *Act. angl.* 66. *p.* 104. *Paur. Falkl. isl. p.* 35. *Forſter it.* 2. *p.* 492.

Loggerhead Gooſe. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 439. *n.* 4.

Habitat in inſulis Falkland, Staatenland *etc. utplurimum per paria*, 32 *pollices longa, alis ad natandum utens, carne rancida.*

Roſtri *apex niger*; remigum *ſecundariarum margo exterior albus*; abdomen *poſterius ex cinereo caeruleſcens*; ungues *nigri*, *membrana digitos connectens obſcura.*

Tadorna. 4. A. roſtro ſimo, fronte compreſſa, capite nigro-vireſcente, corpore albo variegato. *Fn. ſuec.* 112. *Bloch Schr. der berl. naturf. Fr.* III. *p.* 373. *t.* 7. *f.* 3. 4.

Anas albo-variegata, pectoris lateribus ferrugineis, abdomine longitudinaliter cinereo-maculato. *Fn. ſuec.* 1. *n.* 93.

Anas Tadorna dicta. *It. ſcan.* 212. *it. wgoth.* 214.

Anas cornuta. *S. G. Gmelin it.* 2. *p.* 185. *t.* 19.

Anas maritima. *Geſn. av.* 803. *Aldr. orn.* 3. *p.* 196. *t.* 195.

Tadorna. *Bell. av.* 36. *Aldr. orn.* 3. *p.* 236. *t.* 237. *Briſſ. av.* 6. *p.* 344. *n.* 9. *t.* 33. *f.* 2.

Vulpanſer. *Geſn. av.* 161. *Aldr. orn.* 3. *p.* 159.

Tadorne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 205. *t.* 14. *pl. enlum. n.* 53.

Sheldrake or Burrough Duck. *Brit. zool.* 2. *n.* 278. *t.* O. *Arct. zool.* 2. *p.* 572. D. *Hayes brit. birds t.* 28. *Raj. av. p.* 140. A. 1. *Will. orn. p.* 363. *t.* 70. 71. *Albin. av.* 1. *t.* 94. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 504. *n.* 51.

Brandgans. *Cluſ. exot.* 368. *Friſch av. t.* 166.

Habitat in Europae *et* Aſiae *maritimis*, *maris* caſpii *et lacuum ſalſorum orientalis* Sibiriae *littore, piſcibus, inſectis, teſtaceis herbisque victitans, in foveis cuniculorum, aliquando propriis, ova pariens ſubrotunda, alba, edulia* 15-16, *quibus, lanugine propria tectis, per* 30 *circiter dies incubat mater provida et ſollicita*; caro *rancida.*

Longitudo 2 *pedum*; roſtrum *rubrum*; caput collum*que violaceum*; collum *medium albo annulatum*; dorſum *album*; pectus *brunneum*; abdomen *album, linea carinali nigra*; remiges *primores primae nigrae*; *proximae violaceae*; *interio-*

teriores ferrugineae; ultimae albae; ſpeculum *violaceum;* cauda *alba apice nigra;* pedes *rubri.* Femina *coloribus minus vividis.*

Receptaculam *aëris duplex, alterum majus dextrum, alterum ſiniſtrum infra connexum per medium tranſeunte trachea.*

ſpectabilis. 5. A. roſtro baſi compreſſo: carina pennacea nigra, capite canescente. *Muſ. Ad. Fr.* 2. *p.* 25. *Fn. ſuec.* 112.

Anas freti Hudſonis. *Briſſ. av.* 6. *p.* 365. *n.* 15.

Canard à tête griſe. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 253.

Grey-headed Duck. *Edw. av. t.* 154.

King Duck. *Arct. zool.* 2. *p.* 554. *n.* 481. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 473. *n.* 30.

Habitat in ſeptentrionali America, Europa *et* Aſia, *nidificans in terra ſicca, ova* 4–6 *alba pariens, vermibus et gramine victitans, carne ſapidiſſima, pelle in veſtimentis adhibita,* 2 *fere pedes longa.*

Roſtrum pedesque *rubri;* caput *et* cervix *dilute griſea, ſerie macularum nigrarum circumſcripta;* genae *et* nucha *virent;* gula, jugulum *et* pectus *albent;* dorſum, abdomen *et* cauda *nigricant;* tectrices *alarum minores* remigesque *primariae fuſcae, ſecundariae nigrae, purpureo nitentes.* Femina *plurimam partem alba et fuſca, abdomine obſcuro.*

fuſca. 6. A. nigricans, palpebra inferiore, ſpeculoque alarum albis. *Fn. ſuec.* 109. *Scop. ann.* 1. *n.* 68. *Brünn. orn. n.* 48. *Jacquin Beytr. p.* 20. *t.* 6. *Georgi it. p.* 166. *Oedman nov. act. Stockh.* 1785. 3. *n.* 6. *p.* 188.

Anas corpore obſcuro, macula alba pone oculos, lineaque alba. *Fn. ſuec.* 1. *p.* 106. *It. gotl.* 215. 271.

Anas fera fuſca. *Jonſt. av. t.* 44. *Brünn. act. nidroſ.* 1. *t.* 5.

Anas nigra, roſtro nigro rubro luteo. *Aldr. orn.* 3. *p.* 234. *t.* 235.

Anas nigra major. *Briſſ. av.* 6. *p.* 366. *n.* 29. *Friſch av. t.* 165.

Turpan. *Nov. comm. Petrop.* 4. *p.* 420.

Double Macreuſe. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 242.

Grande Macreuſe. *Buff. pl. enlum. n.* 956.

Great black Duck. *Raj. av. p.* 141. A. 4. *Will. orn. p.* 363. *t.* 70.

Velvet Duck, *Brit. zool.* 2. *n.* 272. *t.* 96. *Arct. zool.* 2. *p.* 555. *n.* 482. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 482. *n.* 37.

Habitat in Oceano *boreali, hieme in australiores paulo plagas discedens, victitans fucis et testaceis; ex gramine etiam nidum struit, ova* 4–6–8–10 *alba pariens, ultra* 20 *pollices longa.*

Rostrum *medio nigrum, ad latera flavum, apice rubrum, in* femina *prominentia ad basin nulla;* corpus *aterrimum, feminae fuscum;* falcia *alarum, et area utrinque pone oculos alba;* pedes *rubicundi, membrana connectente unguibusque nigris.*

nigra. 7. A. corpore toto nigro. *Fn. suec.* 110.
Anas nigra. *Briss. av.* 6. *p.* 420. *n.* 28. *t.* 38. *f.* 2.
Macreuse. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *t.* 234. *f.* 16. *pl. enl. n.* 978.
Scoter or Black Diver. *Brit. zool.* 2. *n.* 273. *Arct. zool.* 2. *p.* 556. *n.* 484. *Raj. av. p.* 141. A. 5. *Will. orn. p.* 366. *t.* 74. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 480. *n.* 36.
Habitat in septentrionali America, Europa *et* Asia, *ad* Galliam *et* oceanum indicum *usque aliquando vagans, fusca minor,* 22 *pollices circiter longa, gramine et testaceis victitans, quorum testas brevi comminutas evomit;* caro *rancida.*
Tota fere avis nigra, rostri tamen medio flavo, capiti colloque adspersa purpura; cauda *subcuneiformis.* Feminae *ad basin rostri caruncula nulla, color potius in fuscum vergens.*

regia. 61. A. caruncula compressa, corpore caeruleo subtus fusco, torque albo. *Molin. hist. nat. Chil. p.* 206.
Habitat in Chili, *boschade multo major.*

nilotica. 62. A. albida, pectore et abdomine ex albido fuscis obscure lineatis, cauda longa rotundata, callo rostri marginali et caruncula purpureis. *Hasselq. it. p.* 365. *n.* 36.
Nilotic Duck. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 488. *n.* 42.
Habitat ad Nilum Aegypti *superioris, facile cicuranda.*
Rostri *apex pruinosus;* irides *flavae;* pedes *rubri;* ungues *nigri.*

Beringii. 63. A. alba, alis nigris, cervice caerulescente, caruncula ad basin rostri flava in medio pennis caerulescentibus radiata.
Bering Duck. *Arct. zool.* 2. *p.* 548. *n.* 475. *Latham syn.* III. 2. *p.* 465. *n.* 24.
Habitat in insula Beringii, *anseris magnitudine.*
Circa aures *area ex virescente alba;* oculi *nigri, orbitis flavis, radiis nigris.*

64. A.

albifrons. 64. A. fuſca ſubtus alba nigro maculata, fronte uropygioque albis, roſtro pedibusque flammeis.

Anas erythropus. *Fn. ſuec. n.* 116. *Brünn. orn. n.* 53. *Kram. el. p.* 339. *n.* 6. *Georgi it. p.* 166.

Anſer ſeptentrionalis ſylveſtris. *Briſſ. av.* 6. *p.* 269. *n.* 3.

Oye rieuſe. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 81.

Laughing Gooſe. *Edw. av. t.* 153.

White fronted Gooſe. *Brit. zool.* 2. *n.* 268. *t.* 94. *f.* 1. *Arct. zool.* 2. *p.* 548. *n.* 476. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 463. *n.* 22.

Habitat in ſeptentrionali Aſia, Europa *et* America, *hieme in partes paulo magis auſtrales migrans*, 2 *pedes* 4 *pollices longa.*

Pectus *cinereum*; cauda *obſcura margine albo.*

* * *laeves, roſtro baſi aequali.*

Marila. 8. A. nigra, humeris cinereo-undulatis, abdomine ſpeculoque alari albis. *Act. angl.* 62. *p.* 413. *Fn. ſuec.* III. *Brünn. orn. n.* 50. 51. *Georg. it. p.* 166.

Anas (ſubterranea) fuſca ſubtus alba. *Scop. ann.* 1. *n.* 83.

Anas toto corpore fuſca, macula alarum alba. *Kram. el. p.* 342.

Anas nigra ultima nova. *Ström ſöndm.* 230.

Glaucium minus ſtriatum. *Briſſ. av.* 6. *p.* 416. *n.* 26. A.

Fuligula forte Geſneri. *Raj. av. p.* 142.

Milloninan. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 229. *planch. enlum. n.* 1002.

Moderente. *Friſch av. t.* 170.

Bergente. *Bloch Beſch. der berl. naturf. Fr.* 4. *p.* 602. *n.* 12. *t.* 17. *f.* 3. 4.

Scaup Duck. *Brit. zool.* 2. *p.* 275. *t.* 100. *Arct. zool.* 2. *p.* 565. *n.* 498. *Raj. av. p.* 142. A. 6. *Will. orn. p.* 365. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 500. *n.* 49.

Habitat in borealibus Americae, Europae, *et* Aſiae, *Octobri gregatim auſtrum verſus migrans, et in cryptis ſubterraneis non raro degens, teſtaceis victitans,* 16½ *pollices longa.*

Roſtrum *latum, complanatum, ex caeruleſcente cinereum*; irides *flavae*; caput collum*que nigrum, nitore viridi*; dorſum *et* tectrices *alarum nigro- et cinereo-undulati*; pedes remiges*que primariae obſcurae, ſecundariae albae, apice nigrae*; cauda *cum tectricibus criſſoque nigra.* Femina *paulo major.*

Anſer. 9. A. roſtro ſemicylindrico, corpore ſupra cinereo ſubtus pallidiore, collo ſtriato. *Fn. ſuec.* 114. *Brünn. orn. n.* 55. *Kram. el. p.* 338. 4. *α.* *Georg. it. p.* 166.
Anſer ferus. *Geſn. av.* 158. *Aldr. orn.* 3. *p.* 147. *t.* 150. 151. *Marſ. dan.* 5. *p.* 100. *t.* 48.
Anſer ſylveſtris. *Briſſ. av.* 6. *p.* 265. *n.* 2.
Anſer ferus flandricus *et* Anſer ferus tertius. *Aldr. orn.* 3. *p.* 155. *t.* 152. 153.
Anſer paluſtris noſtras. *Raj. av. p.* 138.
Oye ſauvage. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 30. *t.* 2. *planch. enlum. n.* 985.
Wild Gooſe. *Alb. av.* 1. *t.* 95. *Raj. av. p.* 136. A. 4. *Will. orn. p.* 358. *n.* 2. *t.* 69.
Grey-lag-gooſe. *Brit. zool.* 2. *n.* 266. *Arct. zool.* 2. *p.* 546. *n.* 473. *Raj. av. p.* 138. A. 3. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 459. *n.* 21.
Wilde Gans. *Friſch av. t.* 155.
β. Anſer domeſticus. *Scop. ann.* 1. *n.* 69. *Geſn. av.* 141. *Aldr. orn.* 3. *p.* 99. *t.* 102. *Briſſ. av.* 6. *p.* 262. *n.* 1.
Tame Gooſe. *Raj. av. p.* 136. A. 3. *Will. orn. p.* 358. *n.* 1. *t.* 75.
Zahme Gans. *Friſch av. t.* 157.
Habitat, utplurimum gregarius, in borealis potiſſimum Europae, Americae *et* Aſiae *lacubus fluviisque gratitans, hieme tamen auſtraliora petens, ut in* Japonia, Ruſſia *auſtrali*, Arabia, Africa *omnique* Europa *vulgatiſſimus ſit, longaevus, gratitans, ova numeroſa pariens, quibus per* 30 *circiter dies incubat, pennis, plumis, carne, jecore utilis*, 2 *pedes et* 9 *pollices circiter longus, filo arcetur.*
Roſtrum *incarnatum, apice album*; uropygium criſſum*que alba*; pedes *incarnati*, unguibus *nigris*; *ſpeculum* alarum *nullum.*

montana. 65. A. remigibus et capite ex ſplendide rubro viridi-nitentibus.
Berggans. *Kolbe Vorg.* 2. *p.* 139.
Mountain Gooſe. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 458. *n.* 20.
Habitat in collibus prope promontorium bonae ſpei, *gramine victitans, domeſtico anſere major.*

cana. 66. A. ferruginea, lunulis obſcurioribus, capite colloque canis, cauda remigibusque primariis nigris, ſecundariis viridibus, tectricibus alarum genisque albis, criſſo fulvo nigro-lineato.

Oie

Oie ſauvage à tête griſe de la côte de Coromandel. *Sonner. it.* 2. *p.* 220.

Grey-headed Duck. *Brown ill. t.* 41. 42. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 458. *n.* 19.

Habitat ad caput bonae ſpei, *et in* Coromandel, *bernicla minor.*

Roſtrum *obſcurum*; pedes *nigri*; feminae *candor genarum nullus.*

ruficollis. 67. A. nigra, ſubtus alba, roſtro parvo conico, collo ſaturatiſſime rufo, macula inter roſtrum et oculos alba. *Pall. ſpic.* 6. *p.* 21. *t.* 4. *it.* 3. *p.* 701.

Red-breaſted Goose. *Arct. zool.* 2. *p.* 571. C. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 455. *n.* 17.

Habitat in borealibus Sibiriae, *autumno verſus* mare caſpium *migrans*, *hiemem in* Perſia *agens*, *in* Anglia *quoque inventa*, *canadenſis magnitudine*, *carne ſapidiſſima.*

Roſtrum *fuſcum*, *ungue nigerrimo*; irides *ex luteo fuſcae*; *pennarum* frontis genarum*que limbus albus*; faſcia *a vertice per cervicem longitudinalis aterrima*; gula *nigra*, *albo interrupta*; tempora *pone oculum alba*, *unde linea alba procedit*, *faſciae illi ſocia*; pectus *albo-nigroque ſquamatum*; cauda *rotundata brevis*, *tectricibus albis*, *rectricibus fuſcis*; lanugo *longa*, *molliſſima*, *cinerea*; pedes *nigerrimi.*

Caſarca. 46. A. rufa, remigibus rectricibusque nigris, ſpeculo alari albo. *Syſt. nat.* XII. 3. *app. p.* 224.

Anas rutila. *Pall. nov. comm. Petrop.* 14. 1. *p.* 579. *t.* 22. *f.* 1. *Lepech. it.* 1. *p.* 180. *Georg. it. p.* 167.

Collared Duck. *Gentlem. Magaz.* 42. *p.* 161.

Ruddy Duck. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 456. *n.* 18.

Habitat in Ruſſiae *et* Sibiriae *auſtralioribus*, *hiemem in* Perſia *et* India *transigens*, *boſchadis magnitudine*, *pedem et* 10 *pollices longa*, *in rupium fiſſuris et antris*, *rarius foveis a ſe ipſa effoſſis aut arborum cavis*, *alba*, *laevia ova pariens*, *circiter* 9, *majora*, *quam boſchas*, *non timida*; *inceſſus elegans expeditus*; *volatus levis*, *ſine ſtrepitu*; *vox volantis ſingularis*, *quaſi cornuum muſicorum*; caro *ſapidiſſima.*

Roſtrum *ſemicylindricum*, pedes*que nigri*; caput *cum initio* cervicis *album*; torquis (*mari*) *atra*; uropygium *nigrum.*

aegyptiaca. 10. A. roſtro ſubcylindrico, corpore undulato, vertice albo, ſpeculo alari candido faſcia nigra.

Anſer aegyptiacus. *Briſſ. av.* 6. *p.* 284. *n.* 9. *t.* 27.

Oye d'Egypte. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 79. *t.* 4. *planch. enlum. n.* 379. 982. 983.

Gambo Gooſe. *Will. orn. t.* 71.

Ganſer. *Albin. av.* 2. *t.* 93.

β. Oie ſauvage du cap de bonne eſperance. *Sonner. it.* 2. *p.* 220.

Habitat in Aegypto, *aliisque* Africae *partibus*, *hoſpitatur in* Anglia, *anſeris magnitudine*, 2 *pedes et* 3 *polli.es longa.*

Roſtrum *rubeſcens*, *apice nigrum*; corpus *e fuſco et ferrugineo undulatum*; tempora, area oculorum *et* pectoris *macula caſtanea*; dorſum, uropygium, remiges *et* cauda *nigra*; ſpeculum *alarum ingens*; abdomen *album*; pedes *rubri*, *unguibus obſcuris.*

ſegetum. 68. A. cinerea, ſubtus ſordide alba, roſtro baſi compreſſo, tectricibus caudae albis, pedibus croceis.

Bean Goole. *Brit. zool.* 2. *n.* 267. *Arct. zool.* 2. *p.* 546. *n.* 472. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 464. *n.* 23.

Habitat in ſinu Hudſonis, *et inſulis* Hebridibus, *autumno gregatim in* Angliam *migrans*, $2\frac{1}{2}-3$ *pedes longa*, *ſegetibus infeſta.*

Roſtrum *exile*, *medio rubeſcens*, *baſi et apice nigrum*; capiti colloque *ferrugineus color interſperſus*; remigum *margo niger*, caudae *albus*; ungues *albi.*

borealis. 69. A. roſtro anguſto, capite viridi, pectore et abdomine albis.

Gulaund Duck. *Arct. zool.* 2. *p.* 572. E. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 465. *n.* 25.

Habitat in Islandiae *uliginibus*, *magnitudine inter anſerem et boſchadem* media, *rarior*, 7–9 *ova pariens.*

erythropus. 11. A. cinerea, fronte alba. *Fn. ſuec.* 116. *Friſch av. t.* 189.

Anas Kałarka. *S. G. Gmelin it.* 2. *p.* 177. *t.* 13.

Anſer helſingicus. *Cluſ. exot.* 368.

Bernicla. *Briſſ. av.* 6. *p.* 300. *n.* 14. *Bell. av.* 34. *Aldr. orn.* 3. *p.* 166. *t.* 168.

Bernacle. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 93. *t.* 5. *pl. enlum.* 855.

Bernacle or Clakis. *Act. angl.* 2. *p.* 853. *Brit. zool.* 2. *n.* 269. *Arct. zool.* 2. *p.* 552. *n* 479. *Raj. av. p.* 137. A. 5. *Will. orn. p.* 359. *Gerard Herb. p.* 1587. *Lath. ſyn.* III. 2.

III. 2. *p.* 466. *n.* 26. *Cluſ. exot.* 368. *Geſn. av.* 112. *Aldr. orn.* 3. *p.* 166. *t.* 169. 170. *Hayes brit. Birds, t.* 24.
Habitat in ſinu Hudſonis, *et* Europa *boreali*, *hieme in* Anglia *degens*, 2 *pedes et paulo ultra longa.*
Genae *albae*; lora *obſcura*; *reliquum* caput *cum* collo *et parte* pectoris, cauda *et* pedes *nigra*; abdomen criſſumque *alba.*

caeruleſcens. 12. A. fuſca, ſubtus alba, tectricibus alarum dorſoque poſtico caeruleſcentibus.
Anſer ſilveſtris freti Hudſonis. *Briſſ. av.* 6. *p.* 275. *n.* 5.
Oie des Eſquimaux. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 80.
Blue-winged Goose. *Arct. zool.* 2. *p.* 547. *n.* 474. *Edw. av. t.* 152. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 469. *n.* 28.
Habitat in America *boreali*, *potiſſimum circa* ſinum Hudſonis, *anſere paulo minor.*
Roſtrum pedes*que rubri*; vertex *flavicans*; *reliquum caput cum collo album*; humeri *et* cauda *albo griſeoque undulata.*

Bernicla. 13. A. fuſca, capite, collo pectoreque nigris, collari albo. *Fn. ſuec.* 115. *Fn. groenl. n.* 41. *Scop. ann.* 1. *n.* 84. *Brünn. n.* 52.
Brenta. *Briſſ. av.* 6. *p.* 304. *n.* 16. *t.* 31.
Branta ſ. Bernicla. *Geſn. av.* 109. *t.* 110. *Aldrov. orn.* 3. *p.* 165. *t.* 167.
Anas torquata. *Aldr. orn.* 3. *p.* 213. *t.* 214.
Anſer arboreus. *Geſn. av.* 112. *t.* 111. *Bell. av.* 31.
Cravant. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 87. *pl. enlum. n.* 342.
Brent Goose. *Brit. zool.* 2. *n.* 270. *Arct. zool.* 2. *p.* 551. *n.* 478. *Raj. av. p.* 137. A. 6. *Will. orn. p.* 360. *t.* 69. *Albin. av. t.* 93. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 467. *n.* 27. *Hayes brit. Birds, t.* 25.
Baumgans. *Friſch av. t.* 156.
Habitat in maritimis borealibus Americae, Aſiae *et* Europae, *cohortibus cuneatis magno cum clamore autumno auſtrum verſus migrans, polygono viviparo, empetro nigro, aliis plantis, praeſertim aquaticis, baccis, vermibus marinis victitans, facile cicuranda, carne tum ſapida, erythropi magnitudine, Blenectae* Friderici II, *Berthlathes* Vincentii, *Barbates* Alberti M.
Roſtrum, cauda, remiges, pedes*que nigra*; *macula ad utrumque* colli *latus*, tectrices *caudae*, *et* criſſum *alba*, abdomen, humeri *et* tectrices *alarum cinerea.*

torquata. 70. A. nigra, temporibus; fascia oculari, suboculari et torque albis, lateribus colli castaneis. *S. G. Gmelin it.* 2. *p.* 181. *t.* 14.
Habitat in littore maris Caspii.

canadensis. 14. A. cinerea, capite colloque nigris, genis gulaque albis. *Act. angl.* 62. *p.* 412.
Anser canadensis sylvestris. *Briss. av.* 6. *p.* 272. *n.* 4. *t.* 26.
Oye sauvage de Canada. *Buff. pl. enl. n.* 346.
Oie à cravate. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 82.
Canada Goose. *Arct. zool.* 2. *p.* 544. *n.* 471. *Raj. av. p.* 139. *n.* 10. *p.* 191. *n.* 9. *Will. orn. p.* 361. *t.* 70. *Catesb. carol.* 1. *t.* 92. *Sloan. jam.* 2. *p.* 323. *n.* 6. *Edw. av. t.* 151. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 450. *n.* 14.
Habitat numerosissimis gregibus in septentrionali America, *autumno ad* Carolinam *usque migrans*, 6–7 *ova pariens, junior facile cicuranda, carne sapida, plumisque utilis, anscre major*, 3 *pedes*, 6 *pollices longa.*
Rostrum, cauda, uropygium remigesque *primariae nigra; macula triangularis ab occipite ad gulam procedens*, nucha, tectrices *caudae, crissum, et* abdomen *inferius alba, superius cum* pectore, dorso *et* alis *fuscum*; pedes *plumbei.*

mollissima. 15. A. rostro cylindrico, cera postice bifida rugosa. *Fn. suec.* 117. *Brünn. orn. n.* 66. *monogr. Hafn.* 1763. *t.* 1. 2.
Anser lanuginosus, sive Eider. *Briss. av.* 6. *p.* 494. *n.* 13. *t.* 19. 20.
Anas plumis mollissimis. *Barth. act.* 1. *p.* 90. *Worm. mus.* 310.
Oye à duvet ou Eider. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 103. *t.* 6. *pl. enlum. n.* 208. 209.
Great black and white Duck. *Edw. av. t.* 98.
Eider or Cuthbert Duck. *Brit. zool.* 2. *n.* 271. *t.* 95. *Arct. zool.* 2. *p.* 553. *n.* 480. *Tour in Scotl. p.* 35. *Raj. av. p.* 141. A. 3. *Will. orn. p.* 362. *t.* 76. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 470. *n.* 29.
Eidergans. *Wallbaum monogr. Lubec.* 1778.
β. Mas biennis Helsinge. *Sparrmann mus. Carlson. fasc.* I. *t.* 6.
Habitat in extremo littore borealis Americae, Europae *et* Asiae, *testaceis victitans, ova* 5 *pariens viridescentia, nitentia, quae in plumis mollissimis, sibi ipsi e pectore evulsis condere fertur; his plumis pretiosissimis, lectorum materie mollissima, pellibus, in vestimenti genus adhibitis,*

tis, carne ovisque esculentis utilissima avis, anſere minor, pedem et 10 *pollices longa, quarto demum anno conſtantem formam aſſumens.*

Roſtrum pedes*que*, frons, faſcia ocularis, pectus, dorſum inferius *et* abdomen *nigra*; capitis *medium*, dorſum *ſuperius*, humeri *et* tectrices *alarum alba; infra occiput area viridis.* Femina *fere tota obſolete ferruginea, nigro lineata*, cauda remigibus*que primariis obſcuris.*

moſchata. 16. A. facie nuda papilloſa. *Fn. ſuec.* 118. *Scop. ann.* 1. *n.* 85.

Anas moſchata. *Raj. av. p.* 150. *Marſ. dan.* 5. *p.* 116. *Briſſ. av.* 6. *p.* 313. *n.* 3.

Anas indica. *Geſn. av.* 122. *Aldr. orn.* 3. *p.* 192. *t.* 193.

Anas indica alia. *Geſn. av.* 803. *Aldr. orn.* 3. *p.* 192. *t.* 194. 195.

Anas cairina. *Aldr. orn.* 3. *p.* 199. *t.* 200. 201.

Anas libyca. *Aldr orn.* 3. *p.* 196. *t.* 197. 198.

Anas ſylveſtris braſilienſis. *Raj. av. p.* 148. *n.* 1.

Ipeca-guacu. *Marcgr. braſ.* 213. *Raj. av. p.* 149. *n.* 3. *Will. orn. p.* 383. *t.* 62.

Mulcovy Duck, Cairo Duck, Guinea Duck, Indian Duck. *Will. orn. p.* 381. 382. *Albin. av.* 3. *t.* 97. 98. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 476. *n.* 31.

Indiſche Ente. *Friſch av. t.* 180.

Türkiſche Ente. *Bloch Schr. der berl. naturf. Fr.* 3. *p.* 372. *t.* 7. *f.* 1.

Habitat in Braſilia, *hoſpitatur per* Europam, *ferox, in arborum truncis nidificans, facile cicuranda, ova pariens, quam boſchas, magis rotunda, cum boſchade coiens, carne ſapida,* 2 *pedes longa,* femina *minore.*

Pedes, orbitae *nudae, et* roſtrum *rubra; bujus apex cum narium peripheria niger*; vertex *niger*; tempora, gula *et* jugulum *alba, nigro varia*; pectus *et* abdomen *inferius, intermiſto albo, fuſca*; dorſum *et* uropygium *fuſcum, nitore viridi-aureo*; abdomen *ſuperius album*; remiges 3 *primae albae, reliquae fuſcae*; rectrices 20, *extimae albae, reliquae viridi-aureae.*

rufa. 71. A. cinerea capite colloque rufis, pectore nigro, dorſo fuſco-lineato, alis ex cinereo fuſcis.

Anas ruficollis. *Scopol. ann.* 1. *p.* 66. *n.* 81.

An vere diverſa a ferina?

leucocephala. 72. A. roſtro lato, rectricibus rigidis acuminatis canaliculatis, intermediis longioribus. *Scop. ann.* I. *p* 65. *n.* 79.
White headed Duck. *Shaw it. p.* 254. *Latham ſyn.* III. 2. *p.* 478. *n.* 33.
Boſchade minor; caput *album*, vertice *nigro*; roſtrum *caeruleſcens*; collare *nigrum*; pectus *caſtaneum*, *lituris nigris transverſis*; abdomen *griſeum*, *maculis parvis nigris*; dorſum *rufum*; alae *rufeſcentes*, *punctis lineisque fuſcis variae.*

monacha. 73. A. albo nigroque varia, roſtro flaveſcente apice nigro, ſpeculo alarum viridi-violaceo. *Scop. ann.* I. *p.* 65. *n.* 80.
Boſchade paulo major; lora *griſea*; caput, roſtrum, pectusque *ſuperius nigro-maculatum*; remiges *primae*, rectricesque *albae*, *apice fuſcae.*

melanura. 74. A. cinerea roſtro pedibusque teſtaceis, remigibus rectricibusque nigris. *Scop. ann.* I. *p.* 66. *n.* 82.
Vertex dorſumque *rufa*; uropygium *nigrum*, *maculis albis*; *boſchade paulo minor.*

torrida. 75. A. capite albo, collo ſupra nigro, ſubtus caſtaneo.
Branta torrida. *Scop. ann.* I. *p.* 68. *n.* 86.
Statura *fuligulae.*

albicans. 76. A. fronte et ſubtus albicans, ſupra fuſca, capite colloque ex fuſco rufis.
Branta albifrons. *Scop. ann.* I. *p.* 69. *n.* 87.
Statura *galli*; *pennae* pectoris *ſuperioris cinereae*, *limbo pallide ferrugineo*, *faſcia ſub apice rufo*; remiges *intus et apice albae.*

georgica. 77. A. ex rubicundo cinerea macula, ſpeculo alarum vireſcente albo-marginato, remigibus caudaque obſcuris.
Georgia Duck. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 478. *n.* 34.
Habitat in Georgia *auſtrali* Americae, 20 *pollices longa, carne ſapida.*
Roſtrum *flavum*, *apice nigro ſurſum paulisper flexo*; irides *ſpadiceae*; tectrices *alarum pallide cinereae*; pedes *ex vireſcente cinerei.*

bahamenſis. 17. A. griſea, roſtro plumbeo: macula laterali fulva, alarum macula viridi luteaque.
Anas bahamenſis. *Briſſ. av.* 6. *p.* 358. *n.* 12.
Mareca prima. *Marcgr. braſ.* 214. *Raj. av. p.* 149. *n.* 4. *Will. orn. p.* 379. §. 11.

Marec.

Marec. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 256.
Ilathera Duek. *Arct. zool.* 2. *p.* 564 *n.* 495. *Catesb. Carol.* 1. *t.* 93. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 507. *n.* 53.
Habitat in Braſilia *et inſulis* Bahamenſibus, *non ulterius migrans verſus ſeptentrionem, in arboribus degens*, 17 *pollices longa.*
Vertex *ex rufo cinereus*; cervix, dorſum, humeri *et* uropygium *ex rufo fuſca*; genae *et* guttur *alba*; pectus *et* abdomen *ex rufo griſea, nigro-maculata*; remiges *primariae*, tectrices*que alarum minores obſcurae*; *majores virides apice nigrae*; remiges *ſecundariae flavae*; pedes *plumbei.*

braſilienſis. 78. A. fuſca, ſubtus cinereo-nitens, macula inter roſtrum et oculos ochroleuca, mento albo, cauda cuneiformi nigra.
Anas braſilienſis. *Briſſ. av.* 6. *p.* 360. *n.* 13.
Mareca. *Buff. hiſt. nat des oiſ.* 6. *p.* 256.
Mareca ſecunda. *Marcgr. braſ.* 214. *Raj. av. p.* 149. *n.* 5. *Will. orn. p.* 379. §. 12.
Mareca Duck. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 508. *n.* 54.
Habitat in Braſilia.
Roſtrum *nigrum*, *lucidum*; tectrices *alarum ſuperiores fuſcae, cum nitore viridi, majores margine ex caeruleo virides, apice nigrae*; remiges *apice albae*; pedes *rubri.*

erythrorhyncha. 79. A. fuſca ſubtus alba, temporibus et alarum faſcia transverſa albis, altera luteſcente, cauda nigra.
Crimſon-billed Duck. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 507. *n.* 52.
Habitat ad caput bonae ſpei, 15 *pollices longa.*
Irides *et* roſtrum *rubra*; *hoc apice paulisper ſurſum flexum*; pedes *nigri.*

Albeola. 18. A. alba, dorſo remigibusque nigris, capite caeruleſcente, occipite albo.
Querquedula ludoviciana. *Briſſ. av.* 6. *p.* 461. *n.* 38. *t.* 41. *f.* 1.
Sarcelle blanche et noire ou la Religieuſe. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 284. *pl. enl. n.* 948.
Little black and white Duck. *Edw. av. t.* 100.
Spirit. *Arct. zool.* 2. *p.* 558. *n.* 487.
Habitat in Americae *a ſinu* Hudſonis *ad* Carolinam *ſilvis ad aquas, in arboribus nidificans, penelopes magnitudine.*
Roſtrum *nigrum*, vertex fron*sque ſplendide nigra, viridi et purpureo varia*; genae *albae*; remigum *ſecundariarum baſis cum tectricibus incumbentibus alba*; pedes *aurantii.*

Feminae *caput collumque ſuperius obſcurum, pone oculos utrinque litura oblonga alba*; tectrices *alarum majores* remiges*que ſecundariae albae.*

Praeter caput minus tumidum bucephalae ſatis ſimilis; an forte eadem ſpecies?

Stelleri. 80. A. alba, occipite ſubcriſtata, macula nuchae transverſa et utrinque ad roſtrum viridi, cauda fuſca, remigibus 10 primariis ex fuſco nigricantibus, reliquis ex atro caeruleis. *Pall. ſpicil.* 6. *p.* 35. *t.* 5.

Weſtern Duck. *Arct. zool.* 2. *p.* 564. *n.* 497. *t.* 23. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 532. *n.* 74.

Habitat in Camtſchatcae *et* Americae *occidentalis maritimis, gregatim volans, inter ſcopulos inacceſſos nidificans, fuligulae magnitudine.*

Roſtrum *et* pedes *nigri*; orbitae, *lunula, ad baſin* cervicis, faſcia *intus alas per dorſum decurrens, macula ante axillas transverſa atrae.*

clypeata, 19. A. roſtri extremo dilatato rotundato, ungue incurvo. *Fn. ſuec.* 119. *It. gotl.* 167. *Scop. ann.* 1. *n.* 70. *Brünn. n.* 77. 78. *Kram. el. p.* 342. *n.* 15. *Georg. it. p.* 166.

Anas clypeata. *Briſſ. av.* 6. *p.* 329. *n.* 6. *t.* 32. *f.* 1.

Anas platyrhynchos erythropus, *et* Anas platyrhynchos pedibus luteis. *Aldr. orn.* 3. *p.* 230. *t.* 231. 232.

Anas vireſcens. *Marſ. dan.* 5. *p.* 120. *t.* 58.

Anas latiroſtra major, *et* Anas platyrhynchos altera. *Geſn. av.* 119. 120. *Aldr. orn.* 3. *p.* 224. 227. *t.* 226. 230.

Souchet. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 191. *planch. enlum. n.* 971. 972.

Shoveler. *Brit. zool.* 2. *n.* 280. *Arct. zool.* 2. *p.* 557. *n.* 485. *Raj. av. p.* 143. A. 9. *p.* 144. *n.* 13. *Will. orn. p.* 370. *n.* 15. *p.* 371. *n.* 16. 17. *Albin. av.* 1. *t.* 97. 98. *Catesb. Carol.* 1. *t.* 96. *Hayes brit. Birds, t.* 27. *Latham ſyn.* III. 2. *p.* 509. *n.* 55.

Groſe breitſchnabeliche Ente. *Friſch av. t.* 161. 163.

Loeffelente. *Bloch Schr. der berl. naturf. Fr.* 3. *p.* 373. *n.* 17. *t.* 7. *f.* 2.

β. A. platyrhynchos macula alari purpurea utrinque nigra albaque, pectore rufeſcente. *Syſt. nat.* X. 1. *p.* 125. *Fn. ſuec.* 120.

Anas muſcaria. *Geſn. av.* 118. *Aldr. orn.* 3. *p.* 223. *Will. orn.* 287. *Raj. av. p.* 146. *Friſch av. t.* 162.

Anas clypeata ventre candido. *Briſſ. av.* 6. *p.* 337. *A.*

γ. Anas

♀. Anas fera sive Boschas mexicana. *Briss. av.* 6. *p.* 327. *n.* 5.
Tempatlahoac. *Raj. av. p.* 176.
Broadbilled Bird or Tempatlahoac. *Will. orn. p.* 387.
Habitat in omni Europa, *septentrionali* America *ad* Carolinam *usque*, *et* Asia *ad* Volgam *quoque et mare* Caspium, 21 *pollices longa, muscis aliisque insectis, potissimum aquaticis victitans*, 10–12 *ova rufa pariens, colore multum varians.*
Rostrum *nigrum*; irides *flavae*; caput collum*que viridi-nitentia, in violaceum colorem vergentia*; pectus *album, lunulatum*; dorsum, remiges, cauda*que cuneiformis fusca*; abdomen *castaneum*; crissum *nigrum*; tectrices *alarum primae secundaeque pallide caeruleae, majores fuscae, apice albae*; rectrices *extimae albae, reliquarum margo albus*; pedes *fulvi.*

mexicana. 81. A. fulva, supra nigro alboque lineata, remigibus fuscis, tectricibus alarum minoribus albis, majoribus corpori proximis viridi-aureis.
Anas clypeata mexicana. *Briss. av.* 6. *p.* 337. *n.* 7.
Yacapatlahoac. *Raj. av. p.* 176.
Mexican Shoveler. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 511. *n.* 56.
Habitat in nova Hispania, *domestica minor.*
Rostrum *ex fuscescente rubrum*; tectrices *alarum majores a corpore remotiores fuscae*; pedes *rubescentes.*

rubens. 82. A. fusca, gula et pectore spadiceis, alarum apice griseo, speculo purpureo albo-marginato, cauda brevi alba.
Red-breasted Shoveler. *Brit. zool.* 2. *n.* 281. *Latham syn.* III. 2. *p.* 512. *n.* 57.
Habitat in Lincoln Angliae, *domesticae magnitudine.*
Rostrum *latum, ex fuscescente flavum*; caput *magnum*; oculi *parvi*; irides *flavae*; pedes *breves, graciles, spadicei.*

jamaicensis. 83. A. obscure et ex ferrugineo crocco striata, supra fusca vertice nigro, mento gulaque albis nigro-maculatis, crisso uropygioque obscuro et rufescente striatis.
Jamaica Shoveler. *Latham syn.* III. 2. *p.* 513. *n.* 58.
Habitat in Jamaica, *bicephalae magnitudine*, 16 *pollices longa.*
Rostrum *latum, apice paulisper sursum flexum*; *mandibula superior caerulea, lateribus tamen, et narium peripheria cum inferiore et* pedibus *aurantia*; irides *fuscae*; nucha *et* abdominis *pars inferior striatae*; tectrices *caudae inferiores*

riores ſordide albae; dorſum *maculis paucis ſagittatis flavicantibus minutis varium*; cauda *cuneiformis.*

marſa. 84. A. cinereo atque luteſcente nebuloſa, fuſcoque pulverata, ſubtus fuſca griſeo-contpurcata, gutture ex fuſco luteo nigro-undulato, cauda longa nigra cuneiformi. *Pall. it.* 2. *p.* 713. *n.* 29. *t.* H. *Falck it.* 3. *t.* 23.
Ural Duck. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 514. *n.* 59.
Habitat in lacubus majoribus, inter montes Uralenſes *fluviosque* Irtim *et* Ob *interpoſitis, incedere neſcia, tanto expeditius natans, cauda ad uropygium usque aquae immerſa tanquam gubernaculo utens, nidum ſtruens ex arundine fluitantem, anatis hyemalis voce, querquedula major.*
Roſtrum *magnum, latum, cyaneum, baſi ſupra nares tumidiſſima, didyma*; caput *album*, verticis *tamen area palpebrisque nigris*; collum *atrum*; alae *parvulae, fuſcae, ſpeculo nullo*; rectrices 18 *anguſtiſſimae*; pedes *fere colymbi, fuſci.* Junioribus *et* feminis *roſtrum totum cum capite fuſcum, gula alba.*

ſcandiaca. 85. A. caſtanea, dorſo, alis, caudaque nigris, abdomine albo, infimo cinereo.
Anas latiroſtra. *Brünn. orn. n.* 91.
Anas Skoora. *Müller zool. dan. n.* 130.
Lapmark Duck. *Arct. zool.* 2. *p.* 576. M. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 515. *n.* 60.
Habitat in Daniae *et* Norwegiae *maritimis et aquis dulcibus, boſchadis magnitudine.*
Roſtrum *latum*, pedes*que nigri*; remiges *ſecundariae albae, apice nigrae*, hypochondria *ferruginea.*

ſtrepera. 20. A. ſpeculo alarum rufo nigro albo. *Fn. ſuec.* 121. *Brünn. orn. n.* 91. *Müller zool. dan.* 118. *Georgi it. p.* 166.
Anas ſtrepera. *Geſn. av.* 121. *Aldr. orn.* 3. *p.* 234. *Briſſ. av.* 6. *p.* 338. *n.* 8. *t.* 33. *f.* 1.
Anas ſubulata (fem.) *et* Anas cinerea (mas). *S. G. Gmelin it.* 1. *t.* 1. *et* 2. *t.* 17.
Anas platyrhynchos, roſtro nigro plano. *Aldr. orn.* 3. *p.* 230. *t.* 233. *Raj. av. p.* 145. *n.* 2.
Chipeau. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 187. *t.* 12. *pl. enlum. n.* 958.
Gadwall or Gray. *Brit. zool.* 2. *n.* 288. *Arct. zool.* 2. *p.* 575. L. *Raj. av.* 1. *p.* 145. *A.* 2. *Will. orn. p.* 374. *t.* 72. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 515. *n.* 61.
Schnarrente. *Friſch av. t.* 168.

Habi-

Habitat in Europae, *aestate quoque in septentrionalis* Asiae *aquis dulcibus, penelopes magnitudine,* 19 *pollices longa, inter arundines interdiu abscondita, mane tantum et vespere pascens, voce boschadis, magis tamen sonora, celerrime se submergit;* caro *sapida.*

Rostrum *planum nigrum;* caput *et superius* collum *rubescens, maculis nigris;* pectus, humeri *et* dorsum *superius lineis nigris et albis;* venter *sordide albus;* cauda *cinerea;* pedes *fulvi.* Feminae *pectus spadiceum, maculis nigris.*

falcaria. 86. A. ex cano et fusco variegata cristata, speculo alarum chalybeo albo-marginato, remigibus 5 interioribus elongatis deorsum falcatis violaceo alboque virgatis. *Pall. it.* 3. *p.* 301. *n.* 34. *Georg it. p.* 168.

Falcated Duck. *Arct. zool. p.* 574. I. *t.* 23. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 516. *n.* 62.

β. Sarcelle de Java. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 275. *pl. enl. n.* 930.

Habitat in Sibiriae *orientalis*, *β. in* Javae *aquis, penelopes magnitudine.*

Caput *viridi-nitens, macula frontis minuta alba, vertice longitudinaliter testaceo;* crista *a capite per cervicem producta, argute compressa;* gula *alba;* torquis *ex virescente atra. In β.* crista *minor,* remiges *falcatae nullae,* dorsum crissum*que fuscum;* femora *alba.*

bucephala. 21. A. albida, dorso remigibusque nigris, capite supra infraque tumido sericeo-nitente.

Anas hyberna. *Briss. av.* 6. *p.* 349. *n.* 10.

Petit canard à grosse tête. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 249.

Buffel-headed Duck. *Arct. zool.* 2. *p.* 559. *n.* 489. *Catesb. Carol.* 1. *t.* 95. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 533. *n.* 75.

Habitat in Americae *septentrionalis aquis dulcibus a sinu* Hudsonis *ad* Carolinam *usque; an eadem cum Albeola?*

Rostrum *breve caeruleum aut fuscum;* caput *nigrum, nitore viridi aut purpureo;* collum pectorisque *pars superior alba, inferior cum* abdomine *fusce scente-nebulosa;* alarum *area alba;* cauda *cinerea;* pedes *fulvi.*

dominica. 22. A. rufa, capite anteriore fuliginoso, speculo alarum candido, rectricum scapis aterrimis.

Querquedula dominicensis. *Briss. av.* 6. *p.* 472. *n.* 42. *t.* 41. *f.* 2.

Sarcelle rousse à longue queue. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 283.

Sarcelle de la Guadaloupe. *Buff. pl. enlum. n.* 968.
Chilcanauhtli *et* Colcanauhtli. *Hernand. mex.* 21. 44. *Raj. av. p.* 176. 177.
S. Domingo Teal. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 554. *n.* 91.
Habitat in insulis S. Dominici *et* aquarum Lupiarum, 12 *pollices longa.*
Rostrum *nigrum*; pectus *et* abdomen *ex griseo fusca, albo mixta*; tectrices *alarum majores nonnullae albae*; remiges *fuscae*; cauda *cuneiformis*; rectrices *acuminatae*; pedes *fusci.*

spinosa. 87. A. fusca, vertice nigro, rectricibus mucronatis.
Sarcelle à queue épineuse. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 282. *pl. enl. n.* 967.
Spinous tailed Teal. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 555. *n.* 92.
Habitat in Cayenna *et* Gujana, 11–12 *pollices longa.*
Rostrum *caeruleum*; fascia *ocularis triplex, medio alba, utrinque nigra*; tectricibus *alarum exterioribus adspersus candor*; cauda *brevis*; pedes *incarnati.*

africana. 88. A. ex rufo fusca, dorso, alis caudaque nigris, pectoris macula, alarumque fascia transversa albis.
Sarcelle d'Egypte. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 273. *pl. enl. n.* 1000.
African Teal. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 555. *n.* 93.
Habitat in Aegypto, *querquedula vix major*, 16 *pollices longa.*
Color *nitens, feminae minus, cui etiam pectoris macula fusco undulata*; rostrum *longius et crassius, quam querquedulae.*

madagascariensis. 89. A. obscure viridis subtus alba, pileo, fronte gulaque albis, occipite et cervice virescente-atris, jugulo et pectore pallide ferrugineis undulatis.
Sarcelle mâle de Madagascar. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 274. *pl. enlum. n.* 770.
Madagascar Teal. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 556. *n.* 94.
Habitat in Madagascar, 12 *circiter pollices longa.*
Rostrum *flavum, apice nigrum*; irides *flavae*; *infra aures litura ovalis pallide virens*; pedes *et* remiges *obscurae*; alarum *stria alba.*

coromandeliana. 90. A. supra fusco-nitens, subtus alba, vertice nigro, reliquo capite colloque albis nigro maculatis.

Sar-

Sarcelle de Coromandel. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 274. *pl. enl. n.* 949. 950.
Coromandel Teal. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 556. *n.* 95.
Habitat in Coromandel, *querquedula quarta parte minor.*
Roſtrum *obſcurum*; colli *pars inferior ſtriis nigris decuſſantibus varia*, criſſi *latera ferruginea*; pedes *nigri*. Femina *ſubtus ex albo griſeoque varia.*

manilenſis. 91. A. capite gulaque albis, collo, pectore et tectricibus alarum ſpadiceis, remigibus caudaque colore ardeſiac.
Sarcelle de l'isle de Luçon. *Sonn. it. p.* 91. *t.* 54.
Manilla Teal. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 557. *n.* 96.
Habitat in inſula Manilla, *querquedula minor.*
Roſtrum *nigrum*; dorſi pennae *flavae*, *margine nigrae*; abdominis *pennae albae*, *margine nigrae*; pedes *nigricantes.*

formoſa. 92. A. fuſca, vertice nigro albo-marginato, gula rufeſcente nigro-maculata, alarum ſpeculo nigro, teſtaceo-marginato, anterius macula obliqua viridi-nitente inſignito. *Georg. it.* 1. *p.* 168.
Baikal Teal. *Latham ſyn.* III. 2. *p.* 557. *n.* 97.
Habitat circa lacum Baikal, *querquedulae magnitudine*, 15 *pollices longa.*
Ab oculo ad gulam utrinque linea curva nigra, quam excipit poſterius pallida, et altera viridis; nucha collique *latera undulata*; alae *ſpuriae ferrugineo, albo nigroque ſtriatae, exteriori margine undulatae*; criſſum *nigrum, utrinque macula ferruginea, taeniaque transverſa alba*; cauda *fuſca, ſubacuta, rectricibus intermediis albicantibus*; pedes *rubri*; ungues *griſei.*

Hina. 93. A. regione oculorum viridi. *Osb. it.* 2. *p.* 33.
Hina Teal. *Latham ſyn.* III. 2. *p.* 558. *n.* 98.
Habitat in Sina.
Roſtrum *molle ex nigricante griſeum*; caput *cum* mento *fuſcum, linea ſubocculari alba, area ſupraoculari viridi*; collum, pectus, abdomen, dorſum*que ſuperius alba, nigro-maculata; inferius cum* uropygio pedibus*que cinereum.*

Clangula. 23. A. nigro alboque varia, capite tumido violaceo: ſinu oris macula alba. *Fn. ſuec.* 192. *It. oel.* 49. *Scop. ann.* I. *n.* 71. *Kram. el. p.* 341. *n.* 13. *Georg. it. p.* 166. *Fn. groenl. n.* 43.

Clangula. *Gesn. av.* 119. *Aldr. orn.* 3. *p.* 224. *Briss. av.* 6. *p.* 416. *n.* 27. *t.* 37. *f.* 2.
Anas platyrhynchos mas. *Aldr. orn.* 3. *p.* 22. *t.* 225. *Marsd.* 5. *p.* 114. *t.* 55.
Garrot. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 222. *pl. enl. n.* 802.
Smaller reddish-headed Duck. *Will. orn. p.* 369. *Raj. av. p.* 143. *n.* 11.
Golden-eye. *Brit. zool.* 2. *n.* 276. *Arct. zool.* 2. *p.* 557. *n.* 486. *Raj. av. p.* 142. A. 8. *Will. orn. p.* 368. *t.* 73. *Alb.* 1. *t.* 96. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 535. *n.* 76.
Kobelente. *Frisch av. t.* 181. 182.
Quakerente. *Bloch Besch. der berl. naturf. Fr.* 4. *p.* 599. *n.* 9. *t* 17. *f.* 1. 2.
Habitat in Europa, *in* America *septentrionali a* Noveboraco *ad sinum* Hudsonis, *ad mare* Caspium, *saepius maritima, urinatur egregie, quaesitura cochleas, mures etiam, pisces, ranasque comedit vorax, in arboribus saepe nidum struit ex gramine, et* 7–10 *ova alba parit*; caro *sapida.*
Longitudo 19 *circiter pedum*; rostrum *nigrum*; irides *aureae*; colli *pars inferior*, pectus *et* abdomen *alba*; dorsum, uropygium, remiges*que plurimae nigrae*, 16–21 *albae*; speculum *alarum album subtus fuscum*; cauda *subbifurca*; pedes *fulvi*; trachea *in medio ventricosa, intra thoracem receptaculo, infundibuli inversi forma, munita, tribus tympanis expansis gaudente, parte dextra ossea, altera membranacea,* 2 *arcubus instructa.* Feminae *caput spadiceum*, collum *griseum*; pectus, abdomen, *et* remiges *mediae alba*; humeri *cinerei*; cauda *cum reliquo corpore nigra*; pedes *obscuri.*

rustica. 24. A. fusco-cinerea, macula aurium alarumque alba.
Querquedula carolinensis. *Briss. av.* 6. *p.* 464. *n.* 39.
Sarcelle de la Caroline. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 286.
Little brown Duck. *Catesb. Carol.* 1. *t.* 98.
Habitat in America *septentrionali*, 14 *pollices longa, an albeolae femina?*
Rostrum pedes*que nigri*; irides *corylinae*; cauda *fusca.*

perspicillata. 25. A. nigra, vertice nuchaque albis, macula nigra rostri pone nares.
Anas nigra major freti Hudsonis. *Briss. av.* 6. *p.* 425. *n.* 30.
Macreuse à large bec. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 244.
Canard du nord appellé le Marchand. *Buff. pl. enl. n.* 995.

Great

Great black Duck from Hudſon's Bay. *Edw. av. t.* 155.
Black Duck. *Arct. zool.* 2. *p.* 556. *n.* 483. *Latham ſyn.* III. 2. *p.* 479. *n.* 35.
Habitat in America *ſeptentrionali*, *aeſtate circa ſinum* Hudſonis, *autumno ad* Carolinam *auſtralem usque migrans, gramine victitans, ex quo etiam et plumis nidum ſtruit ad ripas*, 4–6 *alba ova pariens, fuſcae magnitudine*, 21 *pollices longa.*
Roſtrum *ad latera nigra compreſſum, fulvum, apice rubrum, ad baſin mandibulae ſuperioris tuberculo flavicante: macula utrinque nigra*; pedes *rubri, membrana connectente obſcura.* Femina *minor, fuliginoſa, nucha nigra, genarum macula utrinque gemina alba.*

Glaucion. 26. A. corpore nigricante, pectore nebuloſo, ſpeculo alarum albo lineari. *Scop. ann.* I. *n.* 72.
Anas peregrina. *S. G. Gmelin it.* 2. *p.* 183. *t.* 16.
Anas iridibus flavis, capite griſeo, collari albo. *Fn. ſuec.* 123.
Anas platyrhynchos *et* Anas platyrhynchos minor. *Geſn. av.* 118. *Aldr. orn.* 3. *p.* 223. 227. *t.* 229.
Glaucion. *Bell. av.* 336. *Geſn. av.* 108. *Aldrov. orn.* 3. *p.* 215. *t.* 216. *Briſſ. av.* 6. *p.* 406. *n.* 25. *t.* 26. *f.* 1. 2.
Glaucium or Morillon. *Brit. zool.* 2. *n.* 277. *Arct. zool.* 2. *p.* 573. F. *Raj. av. p.* 144. *Will. orn. p.* 368. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 537. *n.* 77.
Grey-headed Duck. *Brit. zool. ed.* 2. *vol.* 2. *p.* 470.
Habitat in Europae *et* Aſiae *ſeptentrionalis potiſſimum maritimis, clangula paulo minor.*
Caput *ferrugineum*; irides *aureae*; torquis *alba, et alia latior griſea*; dorſum *et* tectrices *alarum obſcurae paucis ſtriis, majores maculis albis majoribus inſignitae*; cauda remigesque *primariae nigrae*; *ſecundariae, cum pectore et abdomine albae*; pedes *flavi.*

novae Hiſpaniae. 94. A. alba, nigro-maculata, capite fulvo nigricante et cyaneo intermixto, tectricibus alarum caeruleis: faſcia transverſa alba, remigibus caudaque nigris.
Querquedula mexicana. *Briſſ. av.* 6. *p.* 458. *n.* 37.
Sarcelle du Mexique. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 285.
Sarcelle. *Fermin Surin.* 2. *p.* 158.
Toltecoloctli ſeu Metzcanahachtli. *Raj. av. p.* 175.
Mexican Duck. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 539. *n.* 78.
Habitat in novae Hiſpaniae *et* Surinami *lacubus, vermibus, inſectis,*

insectis, piscibus mortuis victitans, 3 ova magna pariens, carne sapida.

Magnitudo *querquedulae*; mandibula *superior caerulea, inferior nigra; inter hanc et oculos litura utrinque magna alba*; remiges *mediae nonnullae exteriori margine viridis, apice fulvae, proximae corpori albae nigro-maculatae*; rectricum *margo albus*; pedes *rubescentes.*

Femina *capite et corpore supra nigra, subtus ex albo et nigro varia, pedibus cinereis.*

malacorhynchos. 95. A. ex caerulescente plumbea, rostri apice membranaceo, vertice ex virescente cinereo, alarum macula transversa alba.

Blue grey Duck with a soft bill. *Cook it.* I. *p.* 72. 97. *Forster it.* I. *p.* 157.

Soft billed Duck. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 522. *n.* 67.

Habitat in nova Seelandia, *refluente mari vermes ex limo quaesitura, penelopes magnitudine*, 18 *pollices longa.*

Rostrum *pallide cinereum, apice nigrum; pectori adspersus color ferrugineus*; pedes *obscure plumbei.*

glocitans. 96. A. capite albo nigroque fasciato: area utrinque falcata viridi-fericea nuchaque violacea. *Pall. act. Stockh.* 1779. *v.* 40. *p.* 33. *t.* 1.

Bimaculated Duck. *Brit. zool.* 2. *n.* 287. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 521. *n.* 66.

Habitat in Anglia *et* Sibiria *orientali glocitans*, 20 *pollices longa.*

Rostrum *plumbeum, ungue nigro*; irides *et* vertex *fuscus*; occiput *subcristatum*; gula *purpurea*; pectus *ferrugineum, nigro-maculatum*; cervix dorsum*que fusca nigro-undulata*; humeri, tectrices *alarum*, remiges*que primariae cinereae, secundariae virides margine albae*; abdomen *obscurum, granulatum*; tectrices *caudae virides*; rectrices 12 *fuscae, margine albae*, 2 *intermediae nigrae*; pedes *flavi.*

americana. 97. A. pallide ferruginea nigro-undulata, vertice et fronte ochroleucis, alarum area magna alba, remigibus caudaque fuscis.

Canard Jensen, *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 174. *pl. enlum. n.* 955.

American Wigeon. *Arct. zool.* 2. *p.* 567. *n.* 502.

Habitat in America *a* Cayenna *insulisque vicini* Oceani *ad sinum* Hudsonis *usque, sibilans, penelopes magnitudine, grega-*

gregaria, ſtatutis excubiis interdiu in umbra degit, oryzae pluvio praeſertim tempore multum infeſta, vermibus muſcisque victitans, 6–8 ova pariens, carne ſapidiſſima.
Roſtrum *plumbeum, apice nigrum;* occiput *et* cervix *ex albo et nigro varia; pone oculos macula nigra;* criſſum *nigrum;* pedes *obſcuri.*

capenſis. 98. A. cineraſcens, dorſo ſpadiceo, alarum ſpeculo ex pallido vireſcente caerulco albo-marginato.
Cape Wigeon. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 519. *n.* 64.
Habitat ad caput bonae ſpei, *penelopes magnitudine,* 15 *pollices longa.*
Roſtrum *rubrum, baſi nigrum;* caput *minutim maculatum;* pedes *rubeſcentes;* ungues *nigri.*

Penelope. 27. A. cauda acutiuſcula, criſſo nigro, capite brunneo, fronte alba, dorſo cinereo undulato. *Fn. ſuec.* 124. *Brünn. n.* 72. *Kram. el. p.* 342. *n.* 16. *Georg. it. p.* 166.
Anas fiſtularis. *Geſn. av.* 121. *Aldr. orn.* 3. *p.* 234. *Briſſ. av.* 6. *p.* 391. *n.* 21. *t.* 35. *f.* 2.
Penelope. *Geſn. av.* 108. *Aldr. orn.* 3. *p.* 217. *t.* 219. 220. *Jonſt. av.* 39.
Canard ſiffleur. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 169. *t.* 10. 11. *pl. enl. n.* 825.
Wigeon, Whewer or Whim. *Brit. zool.* 2. *n.* 286. *Arct. zool.* 2. *p.* 574. K. *Raj. av. p.* 146. A. 3. *Will. orn. p.* 375. *t.* 72. *Albin. av.* 2. *t.* 99. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 518. *n.* 63.
Pfeifente. *Bloch Beſch. der berl. Naturf.* 4. *p.* 601. *t.* 18. *f.* 5.
Blaſsente. *Friſch av. t.* 164.

Kagolca. *β.* Anas. *S. G. Gmelin n. comm. Petrop.* XV. *p.* 468. *t.* 21.
Anas gutture cinereo-undulato, alarum ſpeculo argenteo. *Beſeke Schr. der berl. naturf. Geſ.* 7. *p.* 458.
Habitat in Europae, Aſiae *et* Aegypti *maritimis et paludibus,* 20 *pollices longa, fiſtulans, carne ſapida.*
Occiput *et* pectus *vinaceum;* roſtrum pedesque *plumbei;* ſpeculum *alarum ex caeruleo viride, anterius et poſterius nigrum. Ad dextrum tracheae, uti etiam in boſchade, domeſtica et acuta, receptaculum aëris oſſeum, digitalis forma et magnitudine, ab eo latere cum trachea et bronchiis communicans; ante diviſionem oſſeſcit trachea, ſeptoque oſſeo intus munitur.* Femina *plurimam partem fuſca, abdomine tamen, uti mas, albo.*

acuta. 28. A. cauda acuminata elongata subtus nigra, occipite utrinque linea alba, dorso cinereo undulato. *Fn. suec.* 126. *Scop. ann.* 1. *n.* 73. *Georg. it. p.* 166.
Anas cauda forcipata pedibus longiore, macula alarum cupreo-fusca. *Kram. el. p.* 340.
Anas longicauda. *Briss. av.* 6. *p.* 369. *n.* 16. *t.* 34. *f.* 1. 2.
Anas fera marina. *Gesn. av.* 120.
Anas Seevogel. *Aldr. orn.* 3. *p.* 229.
Anas cauda aucta. *Gesn. av.* 121. *Aldr. orn.* 3. *p.* 234.
Canard à longue queue. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 199. *t.* 13. *pl. enlum. n.* 954.
Sea-Pheasant or Cracker. *Raj. av. p.* 147. A. 5. *Will. orn. p.* 376. *Alb. av.* 2. *t.* 94. 95.
Pin-tail. *Brit. zool.* 2. *n.* 282. *Arct. zool.* 2. *p.* 566. *n.* 500. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 526. *n.* 72.
Falanente *et* (*fem.*) graue Mittelente. *Frisch av. t.* 160. 168.
Pfeifente. *Bloch Besch. der berl. naturf. Fr.* 4. *p.* 601. *t.* 18. *f.* 5.
Habitat in America, Europa *et* Asia *septentrionali*, *hieme gregatim versus austrum ad* Noveboracum, Italiam, mare Caspium *usque migrans*, *boschadis magnitudine*, 28 *pollices longa*, *carne tenera sapidissima.*
Rostrum *nigrum*, *ad latera caerulescens*; caput *ex ferrugineo et purpureo fuscum*; guttur *album*, *paulisper maculatum*; corpus *subtus album*; alae *fuscae*; speculum *violaceum*, *anterius ferrugineum*, *posterius nigrum albumque*; crissum *nigrum*; rectrices *fuscae*, *margine albae*, 2 *intermediae nigrae*, 3 *pollicibus reliquis longiores.* Femina *minor*, *speculo pallide stramineo*, *albo marginato.*
β. Anas nigricans flavescente leviter tincta, subtus sordide flavescens, pedibus caerulescentibus. *Beseke Schr. der berl. naturf. Ges.* 7. *p.* 459.

ferruginea. 99. A. spadicea, rostro dilatato et apice rotundato pedibusque caerulescentibus.
Anas rutila. *Fn. suec. n.* 134.
Ferruginous Duck. *Brit. zool. n.* 285. *t.* 99. *Arct. zool.* 2. *p.* 576. N. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 526. *n.* 71.
Habitat in Lincoln Angliae, Suecia, Dania, 20 *uncias pondere aequans.*
Rostrum *longum*, *mandibularum margine serrato*; corpus *subtus pallidius*; membrana *digitos connectens obscura.*

hyemalis. 29. A. cauda cuneata: rectricibus intermediis longis, corpore albo, temporibus, pectore, dorso alisque nigris. *Fn. suec.* 225. *Fn. groenl. n.* 45. *Falck it.* 3. *t.* 22. *Act. Nidros.* 5. *p.* 589. *t.* 8. *f.* 1.

Anas roſtri faſcia rubra, rectricibus 2 intermediis longiſſimis, ſpeculo alarum nullo. *Oedman act. Stockh. nov.* 4. *p.* 305.

Anas longicauda islandica. *Briſſ. av.* 6. *p.* 379. *n.* 17.

Anas islandica Havelda. *Worm. muſ.* 302. *Raj. av. p.* 145. *n.* 14.

Sharptailed Duck called Havelda. *Will. orn. p.* 364. §. 5.

Longtailed Duck. *Edw. av. t.* 156.

β. Querquedula Ferroenſis. *Briſſ. av.* 6. *p.* 460. *n.* 40. *t.* 40. *f.* 2.

Sarcelle de Ferroe. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 278. *planch. enlum. n.* 999.

Habitat in Europa, Aſia *et* America *boreali, hieme auſtraliora petens, egregie natans et urinans, velociter et breviter volans, robuſta, teſtaceis minoribus victitans, alte vociferans, ad mare inter gramina ova* 5 *ex caeruleſcente alba, gallinaceis aequalia pariens, lanuginem molliſſimae ſimilem ex pectore evellens; penelopes magnitudine,* 22 *pollices circiter longa.*

Roſtrum *nigrum, faſcia in medio fulva;* irides *rubrae;* genae *albae;* occiput *cinereum, reliquum* caput *nigrum;* humeri *caſtanei;* tectrices *caudae ſuperiores ad latera albae, medio nigrae;* rectrices *albae, intermediae* 2 *longiſſimae nigrae.*

glacialis. 30. A. cauda acuminata elongata, corpore nigro, ſubtus albo. *Forſter act. angl.* 62. *p.* 418. *Scop. ann.* 1. *n.* 74. *Brünn. orn. n.* 75. 76.

Anas longicauda ex inſula terrae novae. *Briſſ. av.* 6. *p.* 382. *n.* 18.

Canard à longue queue de terre neuve. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 202.

Canard de Miclon. *Buff. pl. enlum. n.* 1008.

Swallow-tailed Sheldrake. *Raj. av. p.* 145. *A.* 14. *Will. orn. p.* 364. §. 6.

Longtailed Duck. *Brit. zool.* 2. *n.* 283. *Arct. zool.* 2. *p.* 566. *n.* 501. *Edw. glean. t.* 280. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 528. *n.* 72.

Habitat iisdem cum priore locis, migratione quoque, moribus, ipſa voce et facie ſimillima, an mas vel varietas hyemalis?

Frons

Frons *et* genae *ex rubescente cinereae; area utrinque ad collum ovalis nigra; reliquum* collum, occiput, pectus, humeri, abdomen *inferius, et* crissum *alba;* pectus *inferius et* abdomen *superius obscura;* rectrices *albae*, 4 *intermediae nigrae*, 2 *angustiores, et* $3\frac{1}{2}$ *pollicibus reliquis longiores;* pedes *rubri;* ungues *nigri.*

fulva. 100. A. fulva, dorso, humeris, alis et uropygio fulvo et fusco transversim striatis, cauda ex albo et nigro varia.
Penelope mexicana. *Briss. av.* 6. *p.* 390. *n.* 20.
Quapachnauhtli. *Raj. av. p.* 177.
Mexican Pochard. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 524. *n.* 68.
Habitat in nova Hispania.
Rostrum *et* pedes *obscure cinerei;* oculi *et* ungues *nigri.*

ferina. 31. A. cinereo-undulata, capite brunneo, fascia pectorali, crisso uropygioque nigro. *Fn. suec.* 127. *Brünn. orn. n.* 80.
Anas erythrocephala. *S. G. Gmelin it.* 1. *p.* 70. *nov. comm. Petr.* 15. *p.* 465. *n.* 14. *t.* 20.
Penelope. *Briss. av.* 6. *p.* 384. *n.* 19. *t.* 35. *f.* 1.
Anas fera fusca. *Gesn. av.* 116. *Aldrov. orn.* 3. *p.* 221. *t.* 552.
Millouin. *Buff. hist. nat. desois.* 9. *p.* 216. *pl. enl. n.* 803.
Pochard, Poker or great red-headed Wigeon. *Brit. zool.* 2. *n.* 284. *Arct. zool.* 2. *p.* 560. *n.* 491. *Raj. av. p.* 143. A. 10. *Will. orn. p.* 367. *t.* 72. *Alb. av.* 2. *p.* 87. *t.* 98.
Reiherente et Strausente. *Frisch av. t.* 171.
Rothhals. *Bloch Besch. der berl. naturf. Fr.* 4. *p.* 603. *t.* 17. *f.* 5. 6. *Schr. der berl. naturf. Fr.* 3. *p.* 374. *t.* 8. *f.* 1.
β. Penelope nigra. *Briss. av.* 6. *p.* 389. A.
γ. Penelope capite fusco. *Briss. av.* 6. *p.* 389. B.
Habitat in America, Asia *et* Europa *septentrionali, hieme gregatim australiora petens, et in* Aegyptum *usque perveniens; penelopes magnitudine,* 19 *pollices longa, sibilans, velocissime volans, piscibus minoribus et testaceis victitans, carne sapidissima.*
Rostrum *latius, quam penelopae, obscure caeruleum, apice nigrum;* irides *fulvae;* caput collumque *badium* (*feminae pallide spadiceum*), *hujus pars inferior cum* pectore (*feminae pariter spadiceo*) dorsoque *superiore nigra;* humeri *et* tectrices *alarum corpori proximae ex caerulescente albae, nigro-striatae; exteriores cum* remigibus *fuscae;* abdomen *obscure album* (*feminae cinereum*); cauda *obscure cinerea;* pedes *plumbei.*

Lingua

Lingua *brevis, obtusa, margine dentata*; trachea *feminae, uti in congeneribus, recta, aequalis; maris, paulo antequam cavum pectoris intrat, ad ortum bronchiorum usque, superne tamen magis dilatata; initio sui trachea ampla, anterius membranacea, terminatur tubis duobus ventricosis osseis annulatis, ex quibus prodeunt bronchia, inter quae fovea ossea; ad sinistrum latus adsidet arcus angustus osseus, cum superextenso tympano, et reti osseo, ad dextrum arcus osseus cum simili reti.*

lurida. 101. A. nigra, capite spadiceo, pectore lineis rubris transversis picto. *S. G. Gmelin it.* 1. *p.* 70. 2. *p.* 182. *t.* 16.
Habitat in mari Caspio *et reliqua* Russia *australi, Crecca major et crassior.*
Sinus *oris macula alba*; abdomen *albidum nigricante-maculatum, ad latera cum* crisso *niveum*; remiges 1–4 *extus nigrae, intus cinereae*, 5–10 *utrinque cinereae*, 11–19 *albae*, 20 *anterius partim alba, partim nigricans, posterius cinerea, omnes apice nigrae*, 21–25 *cum* tectricibus *totae nigrae*; rectrices 12 *nigrae.*

Kekuschka. 102. A. ochracea subtus nivea, dorso cinereo, uropygio caudaque nigerrimis, remigibus 15–19 apice albis. *S. G. Gmelin it.* 3. *p.* 249. *t.* 26. 27.
Habitat ad mare caspium, *ultra pedem et 7 pollices longa, carne rancida.*

Querquedula. 32. A. macula alarum viridi, linea alba supra oculos. *Fn. suec.* 128. *Scop. ann.* 1. *n.* 75. *Brünn. orn. n.* 81. *Kram. el. p.* 343. *n.* 18.
Querquedula. *Briss. av.* 6. *p.* 427. *n.* 31. *t.* 39. *f.* 1. 2.
Querquedula prima. *Aldr. orn.* 3. *p.* 209. *t.* 549.
Kernell. *Gesn. av.* 107. *Aldr. orn.* 3. *p.* 210.
Boschas Bellonii. *Gesn. av.* 104. *Aldrov. orn.* 3. *p.* 208. *t.* 548.
Phaschas forte Gesnero. *Raj. av. p.* 147. (femina).
Sarcelle. *Bell. av.* 37. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 260. *pl. enlum. n.* 946.
Garganey. *Brit. zool.* 2. *n.* 289. *t.* 101. *Arct. zool.* 2. *p.* 576. O. *Raj. av. p.* 148. *n.* 8. *Will. orn. p.* 377. §. 7. *t.* 74. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 550. *n.* 87.
Winterhalbente. *Frisch av. t.* 175. (fem.), 176. *Bloch Besch. der berl. naturf. Fr.* 4. *p.* 600. *t.* 18. *f.* 6.
Habitat in Asiae *et* Europae *septentrionalis aquis dulcibus, hiemem in regionibus magis australibus degens, crecca paulo major, 17 pollices longa.*

Vertex *obſcurus*, *longitudinaliter ſtriatus*; genae *et* collum *purpuraſcentia albo-ſtriata*; mentum *nigrum*; pectus *fuſceſcens*, *lunulis nigris*; pennae *ſcapulares longae*, *anguſtae*, *pendulae*, albo, cinereo *et* nigro *faſciatae*; cauda *obſcura*; ſpeculum, *teſte* Blochio, *in femina quoque adultiore conſpicuum*, *margine anteriore et poſteriore nigrum*; pedes *et* roſtrum *nigricantia*; *ad tracheam ante dichotomiam receptaculum aëris oſſeum*; *piſi majoris magnitudine*. Feminae *ſupra oculos macula alba*, *color ex fuſceſcente cinereus*.

Crecca. 33. A. ſpeculo alarum viridi, linea alba ſupra infraque oculos.
Fn. ſuec. 129. *Strom. ſondm.* 200. *n.* 3. *Brünn. orn. n.* 82. 83. *Kram. el. p.* 343. *n.* 19. *Georg. it. p.* 166. *Nozem. nederl. Vogel*, *t.* 75. 76.
Anas fera XVI. *Raj. av. p.* 148. *n.* 9.
Phaſcas. *Geſn. av.* 104. *Aldr. orn.* 3. *p.* 207.
Querquedula. *Geſn. av.* 105.
Querquedula ſecunda. *Aldr. orn.* 3. *p.* 209. *t.* 550.
Querquedula minor. *Briſſ. av.* 6. *p.* 436. *n.* 32. *t.* 40. *f.* 1.
Petite ſarcelle. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 265. *t.* 17. 18. *pl. enlum. n.* 947.
Common Teal. *Raj. av. p.* 147. A. 6. *Will. orn. p.* 377. §. 6. *t.* 74. *Alb. av.* 1. *t.* 100. 2. *t.* 102. *Latham ſyn.* III. 2. *p.* 551. *n.* 88.
European Teal. *Brit. zool.* 2. *n.* 290.
Teal. *Hayes brit. birds t.* 29. *Arct. zool.* 2. *p.* 577. P.
Krikente. *Friſch av. t.* 174. *Bloch Beſch. der berl. naturf. Fr.* 4. *p.* 600.

β. Crecca taenia falciformi viridi-aurea ab oculis ad nucham producta. *Beſeke Schr. der berl. naturf. Geſ.* 7. *p.* 456.

Habitat in Europa, *ad* Islandiam *usque*, *in mari* Caſpio, *et* Sina, *gramine ſtagnorum*, *ſemine juncorum piſcibusque minutis victitans*, *parva*, 14 *pollices longa*, *nidum in angulis ſtagnorum inter arundines ex culmis harum tenerioribus et plumis in aqua ipſa ſtruens*, *et ova ſordide alba maculis exilibus fuſcis notata*, *columbinis aequalia*, *in ipſa* Islandia 13–17 *pariens*, *carne ſapidiſſima*; *trachene ſtructura*, *pennisque ſcapularibus querquedulae ſimilis*.

Roſtrum *nigrum*; irides *fuſceſcentes*; caput collum*que ex rubeſcente badia*; tempora *viridia*, *ſubtus linea alba circumſcripta*; nucha, dorſum, humeri, hypochondria *alba*, *transverſim nigro-ſtriata*, jugulum *et* pectus *ſordide alba*,

ba, nigro-guttata; abdomen *album*; criſſi *medium nigrum*; tectrices *alarum fuſcae*; remiges *obſcurae*; ſpeculum *anterius album, ſupra infraque nigrum, margine albo*; caudae *cuneiformis fuſcae margo albus*; pedes *fuſci*; feminae *caput et collum ex obſcure albo et fuſco varium; criſſum totum album.*

Circia. 34. A. ſpeculo alarum varii coloris, linea alba ſuperciliari, roſtro pedibusque cinereis. *Fn. ſuec.* 129. *Brünn. orn. n.* 83. *Scop. ann.* I. *n.* 76.

Anas circia. *Geſn. av.* 106. *Aldr. orn.* 3. *p.* 209.
Querquedula aeſtiva. *Briſſ. av.* 6. *p.* 445. *n.* 33.
Sarcelle d' été. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 268.
Summer Teal. *Raj. av. p.* 148. *n.* 7. *Will. orn. p.* 378. *t.* 76. *Albin. av.* 2. *t.* 103. 104. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 552. *n.* 89.
Sommerhalbente. *Bloch Beſch. der berl. naturf. Fr.* 4. *p.* 604. *t.* 18. *f.* 4.

Habitat in Europae *lacubus fluviisque, et in mari* Caſpio, $13\frac{1}{2}$ *pollices longa, non migrans, ex juncis et gramine nidum tectum ſtruens, foramine auſtrali, et ova pariens* 10–14 *ſordide alba, quibus per* 30–33 *dies incubat, querquedulae ſimilis, an varietas aut femina?*

Pennae *ſupra ex griſeo fuſcae*, dorſi *margine albae*; genarum *et* gulae *badiae*; juguli *rufae, margine fuſcae, infra ex rufo albae, nigro-maculatae*; alarum *faſcia transverſa alba*; tectrices *cinereae*, remiges *fuſcae*; ſpeculum *ex nigro virens, ſupra infraque nigrum, margine anteriore et poſteriore album*; cauda *fuſca*; trachea *initio ampla, tum anguſtior, demum dilatatur, in hac media ſui regione appoſitum eſt receptaculum aëris oſſeum, cujus major pars dextrum, minor ſiniſtrum occupat.*

Femina *minor, pennarum dorſi margine rufo; pennis ſcapularibus alarumque tectricibus ex griſeo fuſcis, margine rufis; in ſpeculo nigri nihil.*

carolinenſis. 103. A. nigro et albo undulata, capite colloque ſuperiore caſtaneis, jugulo et pectore nigro-maculatis, ſpeculo viridi, linea infraoculari arcuque humerali albis.

American Teal. *Arct. zool.* 2. *p.* 569. *n.* 504. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 554. *n.* 90.

Habitat in Americae, *a* Carolina *ad ſinum* Hudſonis, *ſtagnis ſilvaticis*, 5–7 *ova pariens, circiae valde affinis.*

Ab oculis ad occiput utrinque taenia viridis; tectrices *alarum fuſcae*; pedes *obſcuri.* Femina *ex rubeſcente cinereo fuſca nigro-maculata.*

histrioni- 35. A. fusca albo caeruleoque varia, auribus, temporibus li-
ca. nea gemina, collari fasciaque pectorali albis. *Fabricius Fn. Groenl. n.* 46. *Brünn. orn. n.* 84. 85. *Georg. it. p.* 166. *Frisch av. t.* 157.
Anas torquata ex insula terrae novae. *Briss. av.* 6. *p.* 362. *n.* 14.
Canard à collier de terre neuve. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 250. *pl. enlum. n.* 798.
Brimond. *Olaff. Isl.* 2. *t.* 34.
Stone Duck. *Krascheninicik Kamtschatk. p.* 160.
Dusky and spotted Duck. *Edw. av. t.* 99.
Harlequin Duck. *Arct. zool.* 2. *p.* 560. *n.* 490. *Lath. syn.* III. 4. *p.* 484. *n.* 37.
Habitat in America, Europa *et* Asia *maxime boreali, ad ripas in dumetis nidificans, sonora, egregie natans et urinans, velocissime et altissime volans, testaceis, piscium ovis, culicumque larvis victitans, hieme pelagus petens, penelopes magnitudine.*
Rostrum *parvum*, pedes, genae, mentum, collum, uropygium *et* vertex *nigra; hic linea ferruginea circumscriptus;* pectus, dorsum, *et pars* abdominis *amoeno ardesiae colore;* alae caudaque *obscure cinereae;* speculum *caeruleum, linea transversa alba.* Femina *fere tota obscura, macula utrinque alba, altera ad basin rostri, altera pone aures.*

minuta. 36. A. fusca, auribus albis, remigibus primoribus nigricantibus. *Fabric. Faun. groenl. n.* 46. *Brünn. orn. n.* 86.
Querquedula freti Hudsonis. *Briss. av.* 6. *p.* 469. *n.* 41.
Canard brun *et* Canard brun et blanc. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 252. 287. *pl. enlum. n.* 1007. 799.
Little brown and white Duck. *Edw. av. t.* 157. *Catesb. car.* 1. *t.* 98.
Habitat cum histrionica iisdem in locis, moribus, vitae genere, victu, facie affinis, an femina?
Longitudo $13\frac{1}{2}$ *pollicum;* rostrum *nigrum basi album;* irides *nucis colore;* facies *alba;* pectus *inferius et* abdomen *rufescente et albo striatum*, tectrices *alarum exteriores majores nonnullae nigricantes;* remiges, cauda, pedesque *obscuri.*

fuscescens. 104. A. fuscescens, alis cinereis: speculo caeruleo apice albo, cauda obscura.
Brown Duck. *Arct. zool.* 2. *p.* 565. *n.* 499. *Latham syn.* III. 2. *p.* 486. *n.* 39.

Habi-

Habitat in insula novae Terrae, 16 *pollices longa.*
Rostrum *magnum, basi crassum, caeruleſcens, apice nigrum; pennae* pectoris *margine ferrugineae*; pedes *obscuri.*

poekilorhyncha. 105. A. nigra, genis cum parte juguli cinereis, alarum speculo viridi supra albo, subtus albo nigroque cincto, remigibus secundariis candidis. *Ind. zool. p.* 23. *t.* 13. *f.* 1.
Spotted-billed Duck. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 487. *n.* 40.
Habitat in Zeylon *frequens.*
Rostrum *longum nigrum, basi utrinque macula rubra notatum, apice album*; fascia *ocularis nigra*; pennarum *margo cinereus*; crissum *nigrum*; pedes *lutei.*

Damiatica. 106. A. alba, capite, collo superiore, humeris caudaeque apice nigris, nuchae lunula ferruginea, remigibus ex virescente atris.
Anas damiatica, rostro apice plano lato rotundo. *Hasselq. it. p.* 264.
Blak-headed Duck. *Shaw it. p.* 254.
Damiatta-Duck. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 487. *n.* 41.
Habitat in Africa *septentrionali, potissimum ad* Aegypti *littora, boschade paulo major*; unguis *posterior valde obtusus.*

dispar. 107. A. crista occipitali abbreviata smaragdina, remigibus aliquot secundariis caeruleis antrorsum falcatis apice albis. *Sparrm. mus. Carls. t.* 7. 8.
Inventa in flumine Ostrogothiae.
Mas *niger*, fronte *prasina, capite reliquo colloque niveis*; torques *ex cyaneo virescens*; pectus *et* hypochondria *ex ferrugineo et miniato rubicunda*; speculum alarum *sapphirinum, taeniaeque dorsales longitudinales albae acutae*; cauda *brevis subtus plumbea.*
Femina *tota ex ferrugineo et fusco scolopacina*; remigibus *omnibus rectis nigricantibus*, alarum *maculis duabus parvis albis.*

discors. 37. A. tectricibus alarum caeruleis, remigibus secundariis extus viridibus, fascia frontali alba.
Anas subfusca minor, remigibus extimis caeruleis, fascia alba in fronte. *Brown jam.* 481.
Querquedula americana. *Briss. av.* 6. *p.* 452. *n.* 35.
Sarcelle Soucrourou. *Buff. hist. nat. desois.* 9. *p.* 279. *pl. enlum. n.* 966.

White-faced Teal. *Arct. zool.* 2. *p.* 568. *n.* 503. *Catesb. Car.* I. *t.* 100.
White faced Duck. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 502. *n.* 50.

β. Querquedula virginiana (*fem.*). *Briss. av.* 6. *p.* 455. *n.* 36.
Sarcelle Soucrourette. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 280.
Sarcelle de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n.* 403.
Blue-winged Teal. *Catesb. car.* I. *t.* 99.

γ. A. remigibus secundariis extus albis, iridibus, pectore, pedibus crissoque caeruleis.

Habitat in America *a* Cayenna *et* Gujana *ad* Noveboracum, *oryza avenaque victitans, carne delicioſa,* γ. *circa ſinum* Hudſonis *in cavis arborum truncis ad ſtagna poſitis, quorum herbis etiam victitat,* 10 *ova alba parva pariens,* 14–15 *pollices longa.*

Roſtrum *et* vertex *nigra;* caput *et* collum *viridi-nitens, in violaceum vergens, feminae fuſcum;* dorſum *fuſcum cinereo undulatum;* jugulum, pectus *et* abdomen *rufeſcentia;* criſſum *nigrum;* alarum *faſcia alba;* ſpeculum *viride;* remiges *cum* cauda *fuſcae;* pedes *lutei.*

viduata. 38. A. fuſca, capite antico albo, pedibus caeruleis. *Jacq. Beytr.* I. *p.* 3. *t.* 1.
Canard à face blanche. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 255.
Canard du Maragnon. *Buff. pl. enlum. n.* 808.
Spaniſh Duck. *Gen. of Birds, p.* 65. *t.* 13. *Latham ſyn.* III. 2. *p.* 525. *n.* 69.
Habitat Carthagenae *in* America *in paludibus, autumnali paulo minor,* Viudita *hiſpanis dicta, fiſtulans.*
Roſtrum, oculi (*juniori totum caput*), *et ſtria longitudinalis a gula per medium pectus et abdomen nigra;* gula *alba;* collum *rufum;* ventris *pennae ex cinereo albae, ad marginem nigro-maculatae;* dorſum *et* alae *ex atro caeruleae;* femora *nigricantia.*

Jacquini. 108. A. ſpadicea, dorſo nigricante, roſtro pedibusque nigris. *Jacquin Beytr.* I. *p.* 5. *n.* 3.
Habitat in inſula S. Dominici, *viduatae magnitudine, voce acutiſſima, incolis* Succé *dicta.*

dominicana. 109. A. cinerea, facie gulaque albis, faſcia oculari, occipite, collo et pectore nigris.
Canard Dominiquain du cap de bonne eſperance. *Sonner. it.* 2. *p.* 22.
Dominican Duck. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 525. *n.* 70.

Habi-

Habitat ad caput bonae ſpei, *boſchadis magnitudine.*
Roſtrum pedes*que nigri*; corpus *ſubtus pallidius.*

autumnalis. 39. A. griſea, remigibus, cauda ventreque nigris, ſpeculo alarum fulvo, alboque. *Jacquin Beytr.* I. *p.* 6. *n.* 4.
Anas fiſtularis americana. *Briſſ. av.* 6. *p.* 400. *n.* 23. *t.* 38. *f.* 1.
Siffleur à bec rouge et narines jaunes. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 183. *pl. enlum. n.* 826.
Red-billed whiſtling Duck. *Edw. av. t.* 194. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 498. *n.* 47.
Habitat in America *meridionali inſulisque* oceani *alluentis, pugnax, in arboribus conſidere geſtiens, frequenter cicurata, penelopes magnitudine,* 21 *pollices longa.*
Roſtrum *rubrum, apice nigrum*; irides *nucis colore*; vertex nuchae*que ſtriae*, dorſum humeri*que caſtanea*; tempora *et* gula *exalbida*; pectus *et* axillae *ex flavo cinerea*; tectrices *alarum cinereae*; dorſum *inferius et* uropygium *nigra*; tectrices *caudae inferiores ex albo et nigro variae*; pedes *flavi*; ungues *nigri: poſterior praelongus.*

labradoria. 110. A. fuſca, capite colloque ex rufo albis, torque et faſcia pectorali nigris, pennis ſcapularibus remigibusque ſecundariis albis.
Pied Duck. *Arct. zool.* 2. *p.* 599. *n.* 488. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 497. *n.* 46.
Habitat gregaria in America *boreali, boſchadis magnitudine,* 19 *pollices longa.*
Roſtrum *baſi aurantium, mandibula inferiore obſcura; a vertice ad* nucham *ſtria nigra*; remiges majores *obſcurae*; pedes *flavi, membrana connectente fuſca:* Femina *ſubtus ſordide alba, alarum macula alba, pedibus nigris diſtincta.*

ſuperciliosa. 111. A. griſea, ſupercilliis albis, mento et gutture ſordide albis, alarum ſpeculo ex caeruleſcente viridi, lineae nigrae incluſo.
Supercilious Duck. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 497. *n.* 45.
Habitat in nova Seelandia, *boſchadis magnitudine,* 21 *pollices longa.*
Roſtrum *plumbeum, apice nigrum*; faſcia *infra oculos alba*; pedes *obſcure cinerei.*

curvirostra. 112. A. atra, rectricibus intermediis (maris) recurvatis, gulae macula ovali alba, roſtro incurvato. *Pallas ſpicil.* 6. *p.* 33.

Curve-billed Duck. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 496. *n.* 44.
Capta in Belgio, *boschade paulo major.*
Irides *fulvae*; caput, collum *et* uropygium *splendore levi obscure viridi conspicua*; remiges 5 *extimae albae*; alarum *speculum atrum caeruleo-nitens.*

adunca. 41. A. versicolor, rectricibus intermediis (maris) recurvatis, rostro incurvato.
Anas rostro incurvo. *Briss. av.* 6. *p.* 311. *n.* 2.
Hookbilled Duck. *Raj. av. p.* 150. *n.* 2. *Will. orn. p.* 381. *t.* 75. *Alb. av.* 2. *t.* 96. 97. 3. *t.* 100. Frisch t. 179.
Habitat in Europa, *domesticae procul dubio varietas, eadem etiam colorum variatione ludens.*

domestica. 113. A. versicolor, rectricibus intermediis (maris) recurvatis, rostro recto.
Anas domestica. *Jonst. av.* 141. *t.* 49. *Aldr. orn.* 3. *p.* 198. *Gesn. av.* 96. *Briss. av.* 6. *p.* 308. *n.* 1.
Common tame Duck. *Raj. av. p.* 150. *n.* 1. *p.* 191. *n.* 10. *Will. orn. p.* 380. *t.* 75. *Brown jam. p.* 480. *Sloan. jam. p.* 323. *n.* 7. *Alb. av.* 3. *t.* 99.
Habitat in Europa, Asia *et* America, *innumera colorum varietate ludens, tracheae structura eadem, quae penelopes, ut tamen receptaculum aëris minus sit, quam in boschade.*

Boschas. 40. A. cinerea, rectricibus intermediis (maris) recurvatis, rostro recto, torque alba. *Fn. suec.* 131. *Scop. ann.* 1. *n.* 77. *Brünn. orn. n.* 87. *Kram. el. p.* 341. *n.* 11. *Fabric. Fn. groenl. n.* 47. *Forsk. Fn. arab. p.* 3. *n.* 9. *Georg. it. p.* 166.
Anas fera. *Briss. av.* 6. *p.* 318. *n.* 4.
Anas fera torquata minor. *Gesn. av.* 113. *t.* 114. *Aldr. orn.* 3. *p.* 202. 211. *t.* 212.
Canard sauvage. *Ferm. Surin.* 2. *p.* 156. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 115. *t.* 7. 8. *pl. enlum. n.* 776. 777.
Wild Duck. *Brit. zool.* 2. *p.* 279. *t.* 97. *Raj. av. p.* 145. *n.* A. 1. *p.* 150. *n.* 1. *Will. orn. p.* 308. *t.* 72. 75. *Alb. av.* 1. *t.* 99. 2. *t.* 10.
Mallard. *Arct. zool.* 2. *p.* 563. *n.* 494. *Latham syn.* III. 2. *p.* 489. *n.* 43.
Wilde Ente. *Frisch av. t.* 158. 159. *Günther Nest. u. Eyer, t.* 37.

cirrhata. β. A. supra grisea, subtus alba, crista cinerea.
persica. γ. A. capite colloque superiori cinereo, subtus flavescens.

δ. A.

major. δ. A. dorso fuliginoso, $2\frac{1}{2}$ pedes longa.
grisea. ε. A. tota cinerea, rostro pedibusque nigris.
naevia. ζ. A. dorso nigro: maculis flavescentibus.
nigra. η. A. capite colloque nigris.

Habitat in Europae, Asiae *et* Americae *potissimum septentrionalis aquis stagnantibus*, 23 *circiter pollices ad* 2 *pedes longa*, *ranis*, *limacibus*, *culicibus*, *lemna*, *sordibus victitans*, *nidum non semper prope aquas aliquando in altis arboribus struens*, 10–16 *ova pariens*, *vere coiens*.

Rostrum *ex virescente flavum*; caput collum*que viridi-nitentia*; torques *alba*; pennae *scapulares albae fusco-undulatae*; pectus *badium*; abdomen *cinereum*, *striatum*; dorsum *fuscum*; uropygium *nigrum*, *nitore viridi*; tectrices *alarum striis duabus transversis*, *altera alba*, *altera nigra*; *infra hanc* speculum *ex violaceo viride*; rectrices 20 *acuminatae*, *ex cinereo fuscae*, *margine albae*, *intermediae ex virescente atrae*.

Femina *spadicea*, *nigro-maculata*.

galericulata. **42.** A. crista dependente dorsoque postico utrinque penna recurvata compressa elevata.

Querquedula sinensis. *Briss. av.* 6. *p.* 450. *n.* 34.
Kin mod suis. *Kaempf. jap.* 129. *t.* 10.
Sarcelle de la Chine. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 276. *t.* 19. *pl. enlum. n.* 805. 806.
Chinese Teal. *Edw. av. t.* 102.
Chinese Duck. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 548. *n.* 86.

Habitat in Sina *et* Japonia, *pulchritudinis causa in domibus culta*, *penelope paulo minor*.

Rostrum *rubrum*; irides *avellanae colore*; crista *occipitis viridis et rubra*; vertex *ex virescente ater*; area *pone oculos alba*; *pennae* colli *longae*, *acuminatae*, *fulvae*; collum *inferius* pectus*que superius badium*; pennae *scapulares nigrae*, *margine albae*; dorsum *et* uropygium *fuscum*, *nitore ex caeruleo viridi*; speculum *ex caeruleo viride*, *inferiore margine album*; remiges *fuscae*, *intima clausis alis altero margine erigitur supra dorsum*, *rufa antrorsum falcata*; abdomen *album*; cauda *acuta*, *fusca*, *margine ex caeruleo viridis*; pedes *fulvi*. Femina *feminae sponsae similis*, *alarum tamen strigis duabus*, *pectoris magis ex fusco nebulosi maculis rotundis distincta*.

sponsa. **43.** A. crista dependente duplici viridi caeruleo alboque varia.

Anas fusca cristata, ad gulam alba, iride flammea. *Brown jam.* 481.

Anas aeſtiva. *Briſſ. av.* 6. *p.* 351. *n.* 11. *t.* 32. *f.* 2.
Avis non conſiſtens. *Nieremb. nat.* 215.
Avis varii capitis. *Fern. mex.* 28. *Raj. av.* 176.
Yztactzon Yayauhqui. *Raj. av. p.* 176. *Will. orn. p.* 387.
Beau Canard huppé. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 245. *pl. enlum. n.* 980. 981.
Summer Duck. *Arct. zool.* 2. *p.* 562. *n.* 493. *Catesb. Car.* 1. *t.* 97. *Edw. av. t.* 101. *Latham ſyn.* III. 2. *p.* 546. *n.* 85.
Habitat in America *a* Noveboraco *ad* Antillas *inſulas et* novam Hiſpaniam, *aeſtate borealia petens, penelopes magnitudine,* 19 *pollices longa, in cavis arborum, aliquando a pico relictis, aut in bifurcationibus ramorum nidificans, facile cicuranda; caro incolis magni aeſtimata, collumque in fiſtulis pacis inſignibus adhibitum.*
Criſta *ſtriata*; occiput *nigrum; reliquum caput viridi-nitens; linea ſuperciliaris*, mentum *et* gula *alba; reliquum collum cum* pectore *vinaceum; hoc maculis triquetris albis notatum*; abdomen *album*; dorſum *fuſco-nitens*; roſtrum *rubrum*; pedes *fulvi.* Femina *minor, pectoris maculis magis obſoletis.*

arborea. 44. A. fuſca, capite ſubcriſtato, abdomine albo nigroque maculato.

Anas fiſtularis jamaicenſis. *Briſſ. av.* 6. *p.* 403. *n.* 24.
Canard ſiffleur de la Jamaique. *Buff. pl. enlum. n.* 804.
Siffleur à bec noir. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 185.
Black-billed whiſtling Duck. *Arct. zool.* 2. *p.* 561. *n.* 492. *Raj. av. p.* 192. *n.* 12. *Sloan jam. p.* 324. *t.* 272. *Brown jam. p.* 480. *Edw. av. t.* 193. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 499. *n.* 48.
Habitat in Gujana, Jamaica, Carolina, *boſchade minor, ſibilans, ferox, in arboribus nidificans.*
Roſtrum *nigrum*; vertex *obſcurus*; occiput, dorſum *et* humeri *fuſca*; tempora *et* gula *albæ*; jugulum *album*, pectusque *rufum nigro-maculatum*; cauda remigesque *obſcurae*; pedes *plumbei*; ungues *nigri.*

criſtata. 114. A. criſtata cinerea, gutture pallide ſtramineo maculato, alarum ſpeculo caeruleo infra albo-marginato, remigibus caudaque acuta nigris.

Creſted Duck. *Latham ſyn.* III. 2. *p.* 543. *n.* 81.
Habitat in Statenland, *boſchadis magnitudine, 28 pollices longa.*
Roſtrum *nigrum*; irides *rubrae*; vertex *obſcurus.*

115. A.

obſcura. 115. A. fuſca, ſubtus flavo marginata, ſpeculi caerulei faſcia transverſa nigra, cauda cuneiformi obſcura margine alba.
Dusky Duck. *Arct. zool.* 2. *p.* 564. *n.* 496. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 545. *n.* 84.
Habitat in Noveboraco, 2 *pedes longa.*
Roſtrum, vertex, remiges primariae, pedes*que obſcuri*; collum *fuſceſcens.*

islandica. 116. A. criſtata nigra, jugulo, pectore et abdomine albis, pedibus croceis.
Hrafn-ond. *Arct. zool.* 2. *p.* 574. H. *Müller zool. p.* 16. *n.* 131.
Iceland Duck. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 545. *n.* 83.
Habitat in Islandia.

novae Seelandiae. 117. A. nigra ſubtus cineraſcens, remigibus cinereis, ſecundariis faſcia alba, cauda ſordide viridi.
New-Zealand Duck. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 543. *n.* 80.
Habitat in nova Seelandia, *fuligulae affinis, creccae magnitudine*, 15 *pollices longa.*
Roſtrum *ex caeruleſcente album*, unguis *apice nigro*; capiti collo*que nitor purpureus*, alis corpori*que ſuperiori viridis*; pedes *cineraſcentes.*

rufina. 118. A. atra, capite colloque ſuperiore teſtaceo, vertice rufeſcente (maris) criſtato, alis ſubtus et margine albis, cauda fuſca.
Anas fiſtularis criſtata. *Briſſ. av.* 6. *p.* 398. *n.* 22.
Anas capite rufo major. *Raj. av. p.* 140. *n.* 2.
Canard ſiffleur huppé. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 182. *pl. enlum. n.* 928.
Barbary Shoveler. *Shaw it. p.* 254?
Great red-headed Duck. *Will. orn. p.* 364.
Red-creſted Duck. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 544. *n.* 82.
Habitat ſolitaria in mari Caſpio *et magnis lacubus deſerti* Tatarii, *inventa quoque in* Italia *et* Barbaria, 2 *pedes longa.*
Roſtrum *miniatum*; irides *fuſcae*; criſta *globoſa, majuscula*; hypochondria *alba, anterius undulata*; axillae *ex griſeo fuſcae*; alae *ſpuriae dilutiores, baſi luna alba*; alae *extus ex fuſco nigricantes, ſpeculo albo nigro incluſo*; rectrices *breves, margine albicantes*; pedes *fuſci, anterius rubeſcentes.* Femina *fuſca, decolor.*

119. A.

Nyraca. 119. A. ex atro olivacea, capite, gutture, pectore et hypochondriis castaneis, abdomine albido, uropygio atro, crisso niveo. *Güldenstedt nov. Comment. Petrop.* XIV. 1. *p.* 403.

Habitat ad Tanain, 16 *pollices et ultra longa, vegetabilibus et seminibus, rarius piscibus victitans, migratoria, monogama,* 6–8 *albida, immaculata pariens ova in fossula excavata loci elevati inundatorum, quibus femina sola incubat; caro sapida, sat tenera.*

Multum fuligulae affinis, differt tamen ab hac, si marem spectes, capite non cristato, capite et pectore castaneis, iride albicante, abdominis plumis basin versus ex fusco et albido variis, hypochondriis castaneis, ani regione fusca, crisso niveo; femina *a femina fuligulae differt cristae ne minimo quidem vestigio, iridibus albidis, crisso niveo, a mare, dorso rufescente, capite, gutture, pectore fordide ferrugineis, abdomine nebuloso, ani regione dilutius fusca.*

arabica. 120. A. griseo-maculata, subtus et uropygio albida maculis cinereis, alarum speculo nigricante, anterius et posterius albo. *Forsk. Fn. arab. p.* 3.

Habitat in Arabia.

Rostrum *medio nigrum, lateribus et subtus flavum;* pedes *ex cinereo flavicantes, membrana digitos nectente fusca.*

alexandrina. 121. A. rostro et uropygio nigro, collo cinereo semicirculis albis, abdomine albido immaculato. *Forsk. Fn. arab. p.* 3.

Habitat Alexandriae *in* Aegypto.

Rostrum *totum nigrum;* pedes *ex cinereo flavi, membrana digitos nectente fusca.*

Gattair. 122. A. fusca, alis supra nigris subtus albis margine fuscis, remigibus 4–20 medio albis. *Forsk. Fn. arab. p.* 3.

Habitat Alexandriae *in* Aegypto.

Rostrum *subtus nigrum;* mentum, tectrices *caudae et* abdominis *medium alba;* cauda *brevis subcuneata supra fusca subtus pallidior, rectricibus auctis;* pedes *ex caeruleo cinerei.*

Sirsair. 123. A. rostro subtus flavo, speculo alarum oblique dimidiato supra sericeo-viridi, subtus nigro, antice et postice albo. *Forsk. Fn. arab. p.* 3.

Habitat in Arabia.

Vertex *fuscus;* gula *albida;* dorsum *fuscum, plumarum margine*

gine albido; pedes *griſei*, *membrana digitos nectente fuſca*; alae ſupra *fuſcae*, remiges *ſecundariae apice albae*; cauda *brevis ſubcuneata*, *fuſca*, *rectricibus margine albidis*; abdomen *albidum*.

Balbul. 124. A. roſtro nigro, ſpeculo alarum ſupra oblique viridi, ſubtus oblique nigro. *Forsk. Fn. arab. p.* 4.
Habitat Cahirae *frequens*, *gallina minor*, *Sirſair ſimilis*.
Corpus *cinereum*, *ſupra albo undulatum*; caput (*maris*) *fuſcum*, temporum *macula magna ex viridi rubente*; ſpeculum *alarum anterius et poſterius album*; uropygium *ex atro vireſcens*; cauda *cuneata*; pedes *cinerei*.

Fuligula. 45. A. criſta dependente, corpore nigro, abdomine ſpeculoque alarum albis. *Fn. ſuec.* 132. *Scop. ann.* I. *n.* 78. *Kram. el. p.* 341. *n.* 12. *Georg. it. p.* 167.
Anas Fuligula. *Geſn. av.* 107. *Aldr. orn.* 3. *p.* 221.
Anas criſtata. *Raj. av.* 142.
Anas cirrhata. *Geſn. av.* 120. *Aldr. orn.* 3. *p.* 229.
Anas platyrhynchos minor prior, *et* Querquedula criſtata ſ. colymbis. *Aldrov. orn.* 3. *p.* 227. *t.* 228. *p.* 210.
Glaucium minus. *Briſſ. av.* 6. *p.* 411. *n.* 26. *t.* 37. *f.* 1.
Morillon. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 227. 231. *t.* 15. *pl. enlum. n.* 1001.
Tufted Duck. *Brit. zool.* 2. *n.* 274. *Arct. zool.* 2. *p.* 573. G. *Raj. av. p.* 142. A. 7. *Will. orn. p.* 365. *t.* 73. *Alb. av.* 1. *t.* 95. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 540. *n.* 79. *Hayes brit. birds*, *t.* 26.
† Strausente. † *Geſn. av.* 107. † *Friſch av. t.* 171.
Europaeiſche Haubenente. *Bloch Beſch. der berl. Naturf.* 4. *p.* 603.
β. A. fuſca, capite, roſtro pedibusque nigris.
γ. A. nigra, dorſo fuſco, capite collique initio rufis.
δ. A. ſubtus alba, capite colloque rufis.
Habitat in Europae *et ſeptentrionalis* Aſiae *maritimis*, 16 *pollices longa*.
Roſtrum *latum*, *lividum*, *apice nigrum*; capiti *virens nitor*; humeri *ex nigricante fuſci*, *maculis minutis pallide ſtramineis*; alae *obſcure fuſcae*, *ſpeculo parvo albo*; abdomen *album*; pedes *plumbei*, *membrana digitos connectens nigra*. Femina *magis fuſca*, *quam nigra*, *criſta detrita*.

68. MERGUS. *Roſtrum* denticulatum ſubulato-cylindricum, apice adunco.

cucullatus. 1. M. criſta globoſa utrinque alba, corpore ſupra fuſco, ſubtus albo.

Merganſer virginianus. *Briſſ. av.* 6. *p.* 258. *n.* 8.
Ecatototl, ſ. avis venti, *et* avis venti altera. *Hern. mex.* 24. 33. *Will. orn.* 301. *Raj. av. p.* 175.
Harle couronné. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 280.
Harle hupé de Virginie. *Buff. pl. enl. n.* 935. 936.
Wind-bird. *Will. orn. p.* 389.
Round-creſted Duck. *Catesb. car.* 1. *t.* 49. *Edw. glean. t.* 360.
Hooded Merganſer. *Arct. zool.* 2. *p.* 538. *n.* 467. *Latham ſyn.* III. 2. *p.* 426. *n.* 4. *t.* CI.
Habitat in America *ſeptentrionali, penelopes magnitudine,* 17½ *pollices longa, ad lacus nidum ex gramine et lanugine a pectore avulſa ſtruit,* 4–6 *ova alba parit, ex quibus exeuntes poſt* 2 *menſes pulli flaveſcunt.*
Roſtrum *cum* pedibus *nigrum;* irides *aureae;* caput, collum, dorſum, remiges *ex atro fuſca;* criſta *ad latera complanata, medio et ambitu nigra, ceterum alba;* cauda *obſcura;* jugulum *et* pectoris *latera nigro-undulata;* tectrices *alarum obſcure fuſcae, minores faſcia alba:* Feminae *criſta brevis ferruginea,* caput collum*que obſcure cinereum, nigro-maculatum; dorſum, alae et cauda obſcura.*

Merganſer. 2. M. criſta longitudinali erectiuſcula, pectore albido immaculato, rectricibus cinereis, ſcapo nigricante. *Fn. ſuec.* 135. *Brünn. n.* 92. *Kram. el. p.* 343. *n.* 1. *Georg. it. p.* 169. *Fabr. faun. groenl. n.* 49. *Pall. Beſch. der berl. naturf. Geſ.* 2. *p.* 551. *Otto ibid.* 3. *p.* 457. *Oedman nov. act. Stockh.* 1785. 4. *n.* 5. *p.* 287.
Mergus aethiops. *Scop. ann.* 1. *n.* 90.
Mergus Serrator. *Beckmann Beſch. der berl. naturf. Geſ.* 1. 170.
Anas raucedula, *et* Mergus ſerratus ſ. longiroſter major. *Geſn. av.* 133. 134. *Aldrov. orn.* 3. *p.* 281. 283.
Merganſer. *Geſn. av.* 134. *Aldrov. orn.* 3. *p.* 285. *Marſ. danub.* 78. *t.* 37. *Briſſ. av.* 6. *p.* 231. *t.* 22.
Harle. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 267. *t.* 23. *planch. enlum. n.* 951.
Merganſer or Gooſander. *Brit. zool. n.* 260. *t.* 92. *f.* 1. *Arct. zool.* 2. *p.* 537. *n.* 465. *Raj. av. p.* 134. A. 1. *Will. orn. p.* 333. *t.* 64. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 418. *n.* 1.

Seera.

Seerache. *Frisch av. t.* ~~101.~~ *190.*

Tauchergans. *Bloch Besch. der berl. naturf. Ges.* 4. *p.* 594. *t.* 18. *f.* 3.

Castor. *β.* M. capite cristato cinereo subtus ferrugineo, gula alba, rostro pedibusque nigricantibus. *Syst. nat.* XII. 1. *p.* 209. *n.* 4.

Mergus Merganser femina. *Fn. suec.* 48. *Kram. el. p.* 343. *n.* 2.

Mergus Gulo. *Scop. ann.* 1. *n.* 88.

Merganser cinereus. *Briss. av.* 6. *p.* 225. *n.* 7. *t.* 25.

Castor f. Fiber. *Bell. av.* 33. *Aldr. orn.* 3. *p.* 285. *t.* 284.

Harle femelle. *Buff. hist. nat. desois.* 8. *p.* 272. *pl. enlum. n.* 953.

Dun diver or Sperling-Fowl. *Brit. zool.* 2. *p.* 557. *t.* 92. *f.* 2. *Raj. av. p.* 134. A. 2. *Will. orn. p.* 333. *t.* 64. *Alb. av.* 1. *t.* 87. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 420. *n.* 2.

Seerache mit dem rothen Kopf. *Frisch av. t.* ~~102.~~ *191.*

Haubentaucher. *Bloch Schr. der berl. naturf. Ges.* 3. *p.* 374. *t.* 7. *f.* 5.

rubricapillus. *γ.* M. *Brünnich orn. bor. p.* 22. *n.* 93.

Habitat in America, Europa *et* Asia, *potissimum septentrionalibus*, 28 *β.* 26 *pollices longa., alias in arboribus, alias inter lapides nidificans, marte infestatur, ad ova* 14 *pariens, piscibus victitans, carne rancida, vix esculenta, pelle magis aestimata.*

Rostrum *et* irides *rubrae;* caput *vix cristatum cum initio colli nitens ex virescente atrum;* collum *reliquum*, pectus *et* abdomen *album obscure undulatum;* dorsum *cinereum vel nigrum, pennis scapularibus a dorso remotioribus albis;* dorsum *inferius*, uropygium *et* cauda *ex fuscescente cinerea;* tectrices *alarum minores albae, reliquarum plurimae cinereae;* 12 remigum *primariarum nigrae; secundariarum plurimae albae;* rectrices 18; pedes *fulvi.* Femina *cinerea, capite cristato rufescente, gula alba, speculo alarum albo, linea nigra diviso, pectore et abdomine flavescente, pedibus pallidis.*

In β., cujus mascula etiam inventa exempla, forte juniora, crista *longior*, caput collum*que superius ferrugineum*, mentum, guttur, pectus, abdomini*sque medium alba;* dorsum, tectrices *alarum*, cauda *et* hypochondria *cinerea;* remiges *majores nigrae, secundariae cinereae*, 6 *circiter apice albae;* pedes *fulvi;* lingua *acuta.*

Trachea *paulo post sui initium dilatata, iterum angustatur, denuo dilatatur, antequam pectoris cavum ingreditur,*

tur, rursus angustior, annulis robustis laminis minutis cartilagineis interpositis; huic tracheae in thorace appositum receptaculum aëris magnum, cujus altera pars ossea, ex infundibulo quasi inverso, et arcubus duobus composita, inter quae duo membrana alba pellucida expanditur, quales tres in hoc receptaculo occurrunt.

In β. trachea medio dilatata ad finem appositum habet magnum aëris receptaculum osseum, cujus altera pars tota ossea cylindrica per tracheam transeuntem quasi perforatur, altera latior ex duobus arcubus osseis totidemque expansis super eos membranis constat.

Serrator. 3. M. crista dependente, pectore rufescente variegato, collari albo, rectricibus fuscis cinereo-variegatis. *Brünn. orn. n.* 96. *Georg. it. p.* 169.

Mergus cristatus. *Brünn. orn. p.* 23. *n.* 94. 95.
Mergus albellus. *Scop. ann.* 1. *n.* 89.
Merganser cristatus. *Briss. av.* 6. *p.* 237. *n.* 2. *t.* 23.
Marle. *Aldrov. orn.* 3. *p.* 236.
Anas longirostra. *Gesn. av.* 133. *Aldr. orn.* 3. *p.* 281. *t.* 283.
Harle huppé. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 273. *planch. enl.* 207.
Red-breasted Goosander. *Edw. av. t.* 95. *Albin. av.* 2. *t.* 101.
Red-breasted Merganser. *Brit. zool.* 2. *n.* 261. *t.* 93. *Arct. zool.* 2. *p.* 537. *n.* 466. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 423. *n.* 3.

mas. a) Mergus crista dependente, capite nigro-caerulescente, collari albo. *It. gotl.* 166. *It. oel. n.* 49. *Fn. suec.* 135.

femina. b) Mergus crista dependente, capite nigro, maculis ferrugineis. *It. gotl.* 271. *Fn. suec.* 136.
Mergus cristatus capite castaneo. *Kram. el. p.* 343. *n.* 2.
Mergus cirrhatus fuscus. *Raj. av. p.* 135. A. 4.
Mergus cirrhatus minor. *Will. orn. p.* 336. *t.* 64.

serratus. β. Mergus vertice cristaque fuscis. *Brünn. orn. p.* 23. *n.* 96.

niger. γ. Mergus superne niger, collo spadiceo, alarum taenia transversa candida. *Briss. av.* 6. *p.* 251. *n.* 5.

leucomelas. δ. M. supra niger, tectricibus alarum plurimis et remigibus minoribus albis, rectricibus fuscis. *Briss. av.* 6. *p.* 250. *n.* 4.
Harle à manteau noir. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 250.

Habitat in Germania, *et reliquis magis septentrionalibus* Europae *et* Asiae *terris, pedem circiter et* 9 *pollices longus, gregarius, egregie urinans, in terra sicca ex gramine marcido et lanugine a pectore avulsa nidum struens, et* 8–13 *ova alba, anatinis aequalia pariens.*

Rostri

Roſtri *mandibula ſuperior obſcura, inferior rubra*; irides *purpuraſcentes*; capitis *nitor viridis*; pedes *fulvi*; ungues *nigri.*

imperialis. 4. M. ex nigro, fuſco et griſeo varius, capite laevi, remigibus primoribus nigris, ſpeculo nullo, roſtro pedibusque ex rufeſcente albis. *Cetti ucc. di Sard. p.* 326.
Habitat in Sardinia, *anſeris magnitudine et forma.*
Lingua *ciliata.*

Albellus. 5. M. criſta dependente, occipite nigro, corpore albo, dorſo temporibusque nigris, alis variegatis. *Fn. ſuec.* 137. *Brünn. orn. n.* 97. *Kramer elench. p.* 344. *n.* 3. *Oedmann act. Stockh. nov. ann.* 1780. 3. *n.* 8. *p.* 224.
Mergus albulus. *Scop. ann.* I. *n.* 91.
Mergus major cirrhatus. *Raj. av.* 135.
Mergus rhenanus. *Geſn. av.* 131. *Aldr. orn.* 3. *p.* 274. *t.* 275. *Will. orn.* 225. *Raj. av.* 135.
Mergus varius. *Geſn. av.* 132.
Smew. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 418. *n.* 5.
Weiſſe Nonne. *Bloch Beſch. der berl. naturf. Fr.* 4. *p.* 496. *t.* 18. *f.* 7.
Kreuzente. *Friſch av. t.* 172.

mas. a. Merganſer criſtatus minor ſ. Albellus. *Briſſ. av.* 6. *p.* 243. *n.* 5. *t.* 24. *f.* 1.
Albellus aquaticus *et* Albellus alter. *Aldrov. orn.* 3. *p.* 276. *t.* 277.
Petit harle huppé ou Piette. *Buffon hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 275. *t.* 24. *Pl. enlum. n.* 449.
White Nun. *Raj. av. p.* 135. A. 3. *Will. orn. p.* 337. *t.* 64.
Smew. *Brit. zool.* 2. *n.* 262. *Arct. zool.* 2. *p.* 539. *n.* 468. *Alb. av.* I. *t.* 89.

femina. b. Merganſer ſtellatus. *Briſſ. av.* 6. *p.* 252. *n.* 6.
Mergus ſtellatus. *Brünn. orn. n.* 98.
Weeſel Coot. *Alb. av.* I. *t.* 88.
Red-headed Smew. *Brit. zool.* 2. *n.* 263.
Habitat in America *et* Europa *ab* Islandia *ad* Carnioliam *et* Galliam *usque*, 16 - 17 *pollices longus*, *migrans.*
Roſtrum *nigrum*; criſtae *pars inferior nigra*; area *oculorum*, *ſtriae* 2 *curvae ad utrumque colli latus*, axillae remigesque *majores nigrae*; cauda *cinerea*; pedes *ex caeruleſcente cinerei.* Trachea *initio ad* 2 *pollices anguſta, poſtea amplior, annulis media parte latis altera anguſtis ita diſpoſitis, ut latior cum anguſtiore alternare videatur;*

tur; terminata receptaculo aëris osseo lato oblongo, cui ad sinistram arcus osseus, tympanis quasi duobus superexpansis. Feminae *crista minor*; rostrum *plumbeum*; caput *ferrugineum*; genae, mentum et gula *alba*; dorsum *obscure*, pedes *dilute cinerei*; *receptaculum aëris nullum.*

minutus. 6. M. capite laevi griseo: fascia oculari nigra, macula subocculari alba. *Fn. suec.* 138. *Kram. elench. p.* 344. *n.* 4.
Mergus tinus. *Hasselq. it. p.* 269. *n.* 37.
Mergus pannonicus. *Scop. ann.* I. *n.* 92.
Mergus glacialis. *Aldr. orn.* 3. *p.* 279. *t.* 80. *Will. orn.* 254. *Raj. av.* 135. *Brünn. orn. n.* 99.
Mergus albus. *Gesn. av.* 133. *Aldr. orn.* 3. *p.* 282.
Mergus varius alter. *Gesn. av.* 132.
Merganser cristatus minor femina. *Briss. av.* 6. *p.* 243. *n.* 3. *t.* 24. *f.* 2.
Harle étoilé. *Buff. hist. nat. desois.* 8. *p.* 278. *Pl. enl. n.* 450.
Longh Diver. *Brit. zool.* 2. *p.* 560. *Artt. zool.* 2. *p.* 540. A. *Raj. av. p.* 135. *Will. orn. p.* 338.
Minute Merganser. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 429. *n.* 6.
Pfeilschwanz. *Bloch Besch. der berl. Naturf.* 4. *p.* 597. *t.* 18. *f.* 7.

asiaticus. *β*) Mergus capite laevi, dorso nigro, abdomine albo, rostro pedibusque sanguineis, remigibus primoribus nigris, cauda cinerea. *S. G. Gmelin it.* 2. *p.* 188. *t.* 20.

Habitat in Europa *ad* Archipelagum *usque*, *β*) *in* Astracania, $14\frac{1}{2}$ *pollices longus*, *tracheae fabrica*, *rostri partiumque inferiorum colore albello similis*; *at cristae tum in* mare, *tum in* femina *vestigio vix ullo*, capitis *parte superiore et lateribus obscure ferrugineis*, jugulo *et* pectore *obscure et candide maculato*, alarum *area alba*, *et speculo nigro anterius et posterius albo*, pedibus *obscuris discernendus*, *certissime non solo sexu ab albello distinctus*, *an aetate?*

furcifer. 7. M. niger capite laevi, occipite, collo, ano, abdomine et rectricibus lateralibus albis, fronte genisque dilute fuscis, cauda furcata. *Beseke Schr. der berl. naturf. Ges.* 7. *p.* 458.

Habitat in Curonia.

Rostrum *nigrum*, *medio lateritium*; *ab* auribus *utrinque per latera* colli *ad* pectus *taenia nigra.*

69. ALCA. *Roſtrum* edentulum, breve, compreſſum, convexum, ſulcatum ſaepius transverſe: mandibula inferior ante baſin gibba.

Nares pone roſtrum.

Pedes (plerisque) tridactyli.

arctica. 4. A. roſtro compreſſo ancipiti ſulcato ſulcis quatuor, oculorum orbita temporibusque albis, palpebra ſuperiore mucronata. *Fn. ſuec.* 141. *Pall. ſpic.* 5. *p.* 1. *Brünnich orn. n.* 103.

Anas arctica. *Cluſ. exot.* 104. *Raj. av.* 120. *Worm. muſ* 302. *Olear. muſ. t.* 15. *f.* 5. *Will. orn.* 244. *t.* 65. *Alb. av.* 2. *p.* 73. *t.* 78. 79. *Sibb. ſcot.* 2. *p.* 20. *t.* 16. *f.* 1.

Lunda. *Geſn. av.* 725. *Oelig. muſ.* 2. *ſ.* 11. *t.* 11. *f.* 21. *Cluſ. exot.* 367.

Pica marina. *Aldr. orn.* 3. *p.* 215.

Pſittacus marinus. *Martens it. p.* 64. *t.* K. *lit.* c. *Anderſ. isl.* 2. *p.* 55. *t.* 1.

Fratercula. *Briſſ. av.* 6. *p.* 81. *n.* 1. *t.* 6. *f.* 2.

Puffinus anglicus. *Geſn. av.* 113.

Ipatka. *Kraſchenn. camtſchatc. p.* 153.

Macareux. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 358. *t.* 26. *Pl. enlum. n.* 275.

Puffin. *Brit. zool.* 2. *n.* 232. *Arct. zool.* 2. *p.* 511. *n.* 427. *Tour in Wales t.* 20. *Colw. av. t.* 358. *f.* 1. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 314. *n.* 3.

β. A. vertice cinereo, gula ſupraque niger, ſubtus albus.

Habitat numeroſiſſimis gregibus in Americae, Europae, Aſiaeque *borealis oceano, querquedulae magnitudine,* 12 *pollices longa, compes, ſprattis, cancris minoribus, ſucis victitans, cuniculorum foveas occupans, quotannis ovum album magnum, oblongum, grave, ſapidiſſimum, vitello aurantio pariens, cui mas etiam incubat.* Caro *rancida, juniorum tamen condita, eſculenta;* Kurilium *aliarumque inter eas et* Americam *poſitarum inſularum incolae roſtra loco ornamenti,* Aonolaſchcae *pelles loco veſtimenti portant.*

Avis *nigra, macula in ſinu oris, genis, pectore, abdomine albis;* palpebra *ſuperior apice acuto carnoſo;* roſtrum *rubrum, baſi nigrum, pro aetate forma ſua varium, ampliſſimum, cathetoplateum, fere ſemiovale, ſulcis profundis, in junioribus unico, in adultioribus* 2, 3, 4 *exaratum.* Genae *aliquando canae.*

labradorica. 6. A. roſtro carinato: mandibula inferiore angulata, naribus linearibus membrana obſcura tectis.

Labrador Auk. *Arct. zool.* 2. *p.* 512. *n.* 428. *Latham ſyn.* III. 1. *p.* 318. *n.* 4.

Habitat in terra Labrador, *arcticae magnitudine,* 12 *fere pollices longa.*

Roſtrum *anguſtum: mandibula ſuperiore obſcure rubra, inferiore albida nigro-maculata;* tempora *obſcure alba;* gula, alae *et* cauda *brevis obſcurae;* pedes *rubri.*

impennis. 3. A. roſtro compreſſo ancipiti ſulcato, macula ovata utrinque ante oculos. *Fn. ſuec. n.* 140. *Brünn. orn. n.* 105. *Fabric. Fn. groenl. n.* 52. *Pall. ſpic.* 5. *p.* 2.

Alca major. *Briſſ. av.* 6. *p.* 85. *n.* 1. *t.* 7.

Chenalopex. *Moehring gen. av.* 68.

Mergus americanus. *Cluſ. exot. p.* 103.

Goirfugel. *Cluſ. auct. p.* 367.

Penguin. *Worm. muſ. p.* 300. *t.* 301. *Will. orn. p.* 244. *t.* 65. *Raj. av. p.* 118. *n.* 1. *Edw. av. t.* 147.

Grand Pingouin. *Buffon hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 393. *t.* 29. *Pl. enl. n.* 367.

Great Auk. *Brit. zool.* 2. *n.* 229. *t.* 81. *Arct. zool.* 2. *p.* 509. *n.* 424. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 311. *n.* 1.

Habitat in Europae *et* Americae *arcticae alto mari, anſeris magnitudine,* 3 *pedes longa, aptenodytae perquam affinis, timida, volare et fere etiam incedere neſcia, tanto melius urinans, cycloptero ſimilibusque piſcibus, radice rhodiolae roſeae etc. victitans, ovum* 1 *grande, album purpuraſcente-maculatum, ſex pollices longum pariens.*

Ala-

Alcae *maris potiſſimum arctici incolae, ſtolidae, in cuniculis, proprio ſaepe marte excavatis, interque cavernas et fiſſuras ſcopulorum nidulantur, noctuque latent, ovum pariunt unicum pro avis mole maximum, colore tinguntur ſat uniformi, ſupra nigro, infra albo; forma corporis anatina, pedes pone aequilibrium poſiti; roſtrum ſat magnum utcunque conoideum, curvis lineis et ſuperficiebus in apicem acutum tendens. In mediam terram continentem, auſtralem Germaniam aliquando exſpatiari exemplum habet Sander Naturf.* XIII. *p.* 179.

Alarum *rudimenta pinnarum forma*; remiges *secundariae apice albae*; pedes *nigri*; nares *pone roſtrum*; roſtrum *ipſum nigrum*, *ſulcis* 8 - 10 *in mare profundioribus*, *cui praeter reliquos ſulcos ſulcus etiam conditus*, *roſtrum magis robuſtum*, *et macula ad roſtrum ovalis*, *alba ſuppetit*.

Pica. 2. A. roſtro laevi compreſſo, corpore toto ſubtus apicibusque remigum poſticarum albis, pedibus rubris. *Fabr. Fn. groenl. n.* 51.

Alca uniſulcata. *Brünn. orn. n.* 102.

Alca minor. *Briſſ. av.* 6. *p.* 92. *n.* 3. *t.* 8. *f.* 2. *Ström. ſondm. n.* 3.

Mergus. *Bell. av.* 37. *Aldr. av.* 3. *p.* 240. *t.* 241. *Will. orn.* 243. *t.* 54. *Raj. av.* 119. *n.* 2.

Petit Pingouin. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 396.

Blackbilled Auk. *Brit. zool.* 2. *n.* 231. *Arct. zool.* 2. *p.* 510. *n.* 426. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 320. *n.* 6.

baltica. β) A. cauda alisque nigris. *Brünn. orn. p.* 28. *n.* 115.

Habitat in Europa, *potiſſimum boreali*, *in* Candia *tamen pariter obvia*, $15\frac{1}{2}$ *pollices alta*, *cancro pedato aliisque inſectis vermibusque marinis victitans*, *gregaria*, *hieme ad litora victum quaerens*, *noctu mare repetens*, *Groenlandis utiliſſima*, *cum inteſtinis appoſita tota avis*, *caro ſemiputrida in deliciis habita*, *pinguedo cruda cibo*, *pellis veſtimento inſervit*.

Roſtri *nigri ſulcus unicus*.

Torda. 1. A. roſtro ſulcis quatuor, linea utrinque alba a roſtro ad oculos. *It. gotl.* 286. *Fn. ſuec.* 139. *Scop. ann.* 1. *n.* 94. *Brünn. orn. n.* 100. *Pall. ſpic.* 5. *p.* 3.

Alca. *Cluſ. exot.* 367. *Worm. muſ.* 363. *Ström. ſondm.* 219. *n.* 2. *Briſſ. av.* 6. *p.* 89. *n.* 2. *t.* 8. *f.* 1.

Plautus tonſor. *Klein hiſt. av. p.* 147. *n.* 5. *ſtemmat. t.* 38.

Pingouin. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 390. *t.* 27. *Pl. enl. n.* 1003. 1004.

Razor-bill, Auk or Murre. *Brit. zool.* 2. *n.* 230. *t.* 82. *Arct. zool.* 2. *p.* 509. *n.* 425. *Raj. av. p.* 119. A. 3. *Will. orn. p.* 323. *t.* 64. *Albin. av.* 3. *t.* 95. *Edw. glean. t.* 353. *f.* 2. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 319. *n.* 5.

β. A. roſtri minoris ſulco nullo, lineola in fronte utrinque alba obliqua, loro nullo. *Pall. ſpic.* 5. *p.* 4.

Habitat in Europae, Aſiae, Americae *borealis oceano*, 18 *pollices longa. Plures ova ſolitaria ſimul in antro rupium pariunt, conjunctis viribus alternatim excludunt, unica excubias agente; erectae incedunt.*

Nares *pone roſtrum; hoc craſſum, apice curvatum, ſulcorum maximo albo, utramque mandibulam exarante;* remiges *ſecundariae apice albae;* pedes *nigri.*

criſtatella. 7. A. roſtro ſubadſcendente conoideo coccineo apice albo, mandibulae inferioris ſulco utrinque a gula procurrente, fronte criſtata. *Pall. ſpic.* 5. *p.* 20. *t.* 3. *et* 5. *f.* 7-9.

Schwarzer Starik. *Kraſchennik. camtſchatc. p.*193.

Creſted Auk. *Arct. zool.* 2. *p.* 515. *n.* 434. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 323. *n.* 7. *t.* 95. *f.* 4.

Habitat in inſulis Japoniae *vicinis, etiam in* Birdisland *ſive avium inſula inter* Americam Aſiamque *ſeptentrionalem ſita, magnitudine fere turdi viſcivori,* 12 *pollices longa, interdiu in mari circumnatans, noctu in cuniculis littoris, rupiumque fiſſuris latens.*

Mandibula *ſuperior dorſo convexa, aciebus quoque a ſinu apicis incurvi convexis, verſus caput ſenſim magis patulis;* mandibula *inferior magis compreſſa, oblique truncata, ſupra oris angulos callus coccineus horizontalis ſemicordatus, ſubtus planiuſculus;* alae *narium planiuſculae triangulares;* nares *ex oblongo lineares, poſterius patulae;* lingua *craſſiuſcula, integra;* criſta *pennis reflexis minoribus pluribus,* 6 *mediis longiſſimis revolutis;* dorſum *lituris latis ex ferrugineo fuſcis varium;* corpus *ſubtus longitudinaliter ex fuſco caneſcens;* uropygium *canum;* lanugo *cinerea;* pedes *lividi.*

tetraculа. 8. A. roſtro adſcendente conoideo ex fuſco luteſcente, mandibula inferiore triquetra, fronte ſubcriſtata. *Pall. ſpic.* 5. *p.* 24. *t.* 4. *et* 5. *f.* 10-12.

Dusky Auk. *Arct. zool.* 2. *p.* 515. *n.* 435. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 324. *n.* 8. *t.* 95. *f.* 3.

Habitat in mari Camtſchatcam *circumfluente,* 11 *pollices longa, interdiu in mari vagans, noctu in inſularum ſcrobibus et ſpeluncis deſertis, in cuniculis et fiſſuris rupium maritimarum latens et nidificans, aegre volans, aegerrime*

me pedibus insistens, erecta incedens, velocissime natans et aquas subiens, pediculis infestata, carne exsucca, durissima.

Multum affinis cristatellae, sed rostrum *minus torosum, dorso carinaque argutius compressum;* lingua *apice tenuissima;* litura *pone oculos alba descendens;* crista *brevior, quasi in duplicem mucronem eminens;* membrana *digitos connectens aterrima.*

Psittacula. 9. A. rostro subovato compresso coccineo, sulco in utraque mandibula uno, macula palpebrae superioris media et infraoculari alba. *Pall. spic.* 5. *p.* 15. *t.* 2. *et* 5. *f.* 4 - 6.

Starik. *Krascheun. Camtschatc.* 1. *p.* 192.

Perroquet Auk. *Arct. zool.* 2. *p.* 514. *n.* 433. *Latham syn.* III. 1. *p.* 325. *n.* 9. *t.* 95. *f.* 2.

Habitat in mari inter Asiam *septentrionalem et* Americam *intermedio, naufragii aliquando imminentis aut terrae propinquae nuncia, alce paulo major, magis ventricosa; interdiu gregatim in mari natans, noctu in insulis vel scopulis latens, circa idus Junii unicum ovum sapidum satis magnum, sordide album, punctis fuscis vel brunneis pictum, aut flavescens in nuda rupe aut littoris arena ponens, carne praedura.*

Rostri *cera nulla, sed ejus loco ruga coriacea exilis; mandibula superior forma feminis cucurbitini, sulco profundiore; inferior sursum falcata;* narium *alae latae plagae saturatissime rubrae;* lingua *subulata, incurva, subtriquetra, supra canaliculata;* cauda *brevissima;* pedes *sordide flavi, membrana digitos connectente fusca.*

cirrhata. 10. A. tota nigra, rostri sulcis quatuor, capitis lateribus, area oculorum, anguloque gulae albis, cirrho a superciliis ad nucham longitudinali flavescente. *Pall. spic.* 5. *p.* 7. *t.* 1. *et* 5. *f.* 1 - 3.

Macareux de Kamtschatka. *Buffon hist. nat. des ois.* 9. *p.* 368. *Pl. enl. n.* 761.

Tufted Auk. *Arct. zool.* 2. *p.* 513. *n.* 432. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 313. *n.* 2. *t.* 95. *f.* 1.

Habitat in mari inter Camtschatcam, *insulas* Kuriles *et* Americam *intermedio, arcticae moribus et facie affinis, paulo tamen major, ultra pedem et* 6 *pollices longa, per integros dies in mari circumnatans, egregie urinans, celeriter volans, non tamen longe a scopulis insulisque discedens,*

cedens, squillis aliisque cancris et testaceis victitans, quae rostro, hostium manus atrociter feriente, veluti cuneo diffindit, noctu in cuniculis ulnam saepe profundis ad praerupta littora degens, et plumis algaque instratis ovum pariens esculentum monogama; rostrum, potissimum mandibula inferior, insularum aleuticarum incolis ornamenti et amuleti loco inservit, pellis ad vestimenta adhibetur.

Pedes *et* roltrum *coccinea; hoc basi ex corneo flavescens, ad basin crista crassa prominente ex luteo virescente, cera cartilaginea incrustata munitum*; lingua *acutissima*; irides *ex fusco luteae*; cirrhi *plumae tenerae*; alarum *crepido humeralis alba.*

Alcae. 5. A. rostro laevi conico, abdomine toto subtus remigumque posticarum apicibus albis, pedibus nigris. *Fn. suec.* 142. *Brünn. orn. n.* 106. *Fabric. Fn. groenl. n.* 54. *Act. nidros.* 1. *p.* 261. *t.* 6. *Martens spitzb.* 26. *p.* 61. *t. M. c.*

Uria minor. *Briss. av.* 6. *p.* 73. *n.* 2.

Arctica. *Moehring gen. av.* 69.

Mergulus melanoleucus, rostro acuto brevi. *Raj. av. p.* 135. A. 5.

Petit guillemot. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 354.

Small black and white Diver. *Will. orn. p.* 343. *t.* 59. *Edw. av. t.* 91.

Greenland Dove or Sea Turtle. *Alb. av.* 1. *t.* 85.

Little Auk. *Brit. zool.* 2. *n.* 233. *t.* 82. *Arct. zool.* 2. *p.* 512. *n.* 429. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 327. *n.* 11.

β) Alca candida. *Brünn. orn. p.* 26. *n.* 107.

γ) Alca pectore rufo.

Habitat in Americae *et* Europae, *praesertim arcticae pelago, nonnunquam inter glaciei fragmenta,* 9 *pollices longa, pedum situ, nido, victu moribusque congeneribus similis, melius tamen in terra incedens, et ova* 2 *ex caerulescente alba, columbinis majora pariens, celeriter volans, egregie urinans, tempore procelloso pinguescens.*

Rostrum *breve, nigrum, crassum*; genae *albae*; humeri *longitudinaliter striati*; mari jugulum *nigrum.*

antiqua. 11. A. rostro nigro, basi albo plumis tecto, crista ad utrumque capitis latus parva albida, aliaque cervicis longa alba.

Antient Auk. *Arct. zool.* 2. *p.* 512. *n.* 430. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 326. *n.* 10.

Habitat in mari inter Camtschatcam, *insulas* Kuriles *et* Americam *intermedio, Alces magnitudine,* 11 *fere pollices longa.*

Ver-

Vertex *et* gula *nigra*; crista *cervicalis pennis laxis angustissimis*; dorsum, alae *et* cauda *fuliginosa*.

pygmaea. 12. A. rostro nigro, vertice, cervice, dorso, alis, cauda pedibusque obscuris, jugulo et pectore glaucis, abdomine fordide albo.

Pygmy Auk. *Arct. zool.* 2. *p.* 513. *n.* 431. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 328. *n.* 12.

Habitat circa insulam avium, *inter* Asiam *septentrionalem et* Americam, *numerosis gregibus, alce minor, 7 pollices longa.*

Rostrum *in dorso sulcatum, ad utrumque sulci latus depressum, apice leviter curvatum*; nares *angulo mandibulae superioris parallelae.*

APTENODYTES.

Rostrum rectum laeve compressiusculum subcultratum: mandibula superiore longitudinaliter oblique sulcata, inferiore apice truncata.

Pedes compedes palmati.

Alae pinniformes: remigibus nullis.

chrysocome. 1. Apt. rostro rufo-fusco, pedibus flavescentibus, crista frontali atra erecta, auriculari deflexa sulphurea. *Forster comm. Goett.* 3. *p.* 133. *t.* 1.

Manchot sauteur. *Bongaino it. p.* 69. *Buff. hist. nat. des oif.* 9. *p.* 409.

Manchot huppé de Sibirie. *Buff. pl. enlum. n.* 984.

Crested Pinguin. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 561. *n.* 1.

 Habi-

Aptenodytae *colore, victu, habitu, stoliditate, pedibus pone aequilibrium positis, erecto ingressu, ovis, nido, alcis similes, differunt tamen, quod non nisi in maribus australibus ab aequatore ultra circulum antarcticum occurrant; ad volandum prorsus ineptae, alarum pennis brevissimis, quasi squamis; pedes tetradactyli; pennarum fabrica diversa, mollior, ingressurae aquae diutius resistens; pinguedo multa contra frigus muniens; velocissime et dexterrime natant; in terra erectae per cohortes aliquando satis insignes incedunt; stantes incubant; clangunt anserum instar, voce tamen magis rauca: Nares lineares obliteratae in sulco rostri; palatum et lingua obsita ordinibus aliquot villorum conicorum retroflexorum; corpus torosum; alae tectae membrana dilatata valida; cauda cuneiformis brevis, rectricibus rigidissimis.*

Habitat in insulis Falkland, *et* novae Hollandiae *parte australi, torda paulo major, 23 pollices longa, congeneribus paulo agilior; irata cristas erigit, inter pelicanorum nidos in fovea in terra effossa nuda deponit ova, utplurimum solitaria, alba, anatinis majora; inter natandum subsultim ex aqua prosilit, iterumque mergitur.*

Palatum *obsitum 7 ordinibus villorum;* pedes *flavescentes, digitis omnibus anteriora versus directis;* cristarum *pennae angustissimae, laxae;* corpus *supra ex caeruleo atrum, subtus albo-fericeum;* alae *supra nigrae, subtus albae.*

patachonica. 2. Apt. rostro pedibusque nigris, macula ad aures aurea. *Forster comm. Goett.* 3. *p.* 137. *t.* 2. *Miller Illustr. t.* 23.
Grand Manchot. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 399. *t.* 30.
Manchot des isles Malouines. *Buff. pl. enl. n.* 975.
Manchot de la nouvelle Guinée. *Sonner. it. p.* 179. *t.* 113.
Pingouin prémier. *Bongaino it. p.* 69.
Patagonian Pinguin. *Gentl. Mag. t. p.* 489. *Penn. act. angl.* 58. *p.* 91. *t.* 5. *Gen. of birds p.* 66. *t.* 14. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 563. *n.* 2.

Habitat ad littus terrarum Magellanicarum, *insularum* Falkland, Georgiae *australis et* novae Guineae, *gregibus aliquando numerosissimis, congenerum pinguissima et maxima, ut longitudine* 4 *pedes et* 3 *pollices, altitudine* 3 *pedes aequet; piscibus, testaceis, molluscis, cancris victitans; caro nigerrima, non tamen ingrata.*

Rostri *mandibula inferior basi fulva;* lingua *brevis, conica,* 5 *villorum retroflexorum ordinibus consita;* palatum *ordinibus* 7; irides *avellanae colore;* caput *et* gula *nigra; sub hac linea crocea;* cervix dorsum*que superius ex caeruleo nigrum, inferius cum uropygio nigrum;* pectus, abdomen *et* crissum *fericeo-candidum;* alae *supra ex caeruleo canae, subtus candidae, apicis macula oblonga, nigra.*

Papua. 3. Apt. rostro pedibusque rubicundis, macula occipitali alba. *Forster comm. Goett.* 3. *p.* 140. *t.* 3.
Manchon Papou. *Sonner. it. p.* 181. *t.* 115.
Papuan Pinguin. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 565. *n.* 3.

Habitat in insulis Falkland *et* nova Guinea, *statura et magnitudine inter congeneres patachonicae proxima, huic non raro intermista,* $2\frac{1}{2}$ *pedes longa.*

Mandibula *superior apice nigra, inferior crocea;* irides *flavae;* pedes *validi breves.* Caput *et* collum *ex fusco nigrum;* dorsum *et* cauda *atra;* pectus, abdomen *et* crissum

sum *fericeo-candida*; alae *supra atrae, subtus candidae, macula in apice falcata atra.*

antarctica. 4. Apt. roſtro atro, pedibus rubicundis, linea gulari nigra. *Forſt. comm. Goett.* 3. *p.* 141. *t.* 4.
Antarctic Pinguin. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 565. *n.* 4.
Habitat numeroſa in maris auſtralis *a gradu* 48 *in circulum usque* antarcticum *montibus inſulisque glacialibus, in inſula quoque* deſolationis, 25 *pollices longa.*
Roſtrum *ſubconicum laeve, capite brevius*; irides *flaveſcentes*; pedum *planta nigra*; corpus *ſupra atrum, ſubtus candido-ſericeum*; alae *ſupra ex nigro caeruleae, ſubtus candidae, apice nigrae.*

magellanica. 5. Apt. roſtro nigro, pedibus rubicundis, faſciis duabus albis, una includente oculos, altera pectorali. *Forſter comm. Goett.* 3. *p.* 143. *t.* 5. *Miller illuſtr. t.* 34.
Pingouin. *Pernett. it. p.* 243. *t.* XV.
Magellanic Pinguin. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 569. *n.* 6.
Habitat in mari terris magellanicis, *del* Fuego, *inſulis* Falkland, Statuum, novi anni *vicino, numeroſiſſima, antarcticae magnitudine, piſcibus victitat, inter ceſpites dactylidis glomeratae victitans, dormiens et nidificans, mordens hoſtem inſequentem; caro elixa et aſſata non ingrata.*
Roſtri *faſcia transverſa ex purpureo fuſca*; lingua 5, palatum 6 *villorum ordinibus conſita*; irides *ex rubro fuſcae*; pedes *maculis hinc inde nigris notati.*

demerſa. 6. Apt. roſtro pedibusque nigris, ſuperciliis faſciaque pectorali albis. *Forſter comm. Goett.* 3. *p.* 144. *n.* 6.
Diomedea (demerſa) alis impennibus, pedibus compedibus tetradactylis: digitis omnibus connexis. *Syſt. Nat.* XII. 1. *p.* 214. *n.* 2.
Spheniſcus. *Briſſ. av.* 6. *p.* 97. *n.* 1.
Anſer magellanicus. *Cluſ. exot.* 101.
Manchot du cap de bonne eſperance. *Buff. pl. enl. n.* 382.
Pinguin. *Laët amer.* 511. *Will. orn.* 242. *Kolb. cap.* 2. *p.* 144.
Leſſer Pinguin. *Brunn. act. angl.* 58. *p.* 57.
Cape Pinguin. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 566. *n.* 5.
β) Spheniſcus naevius. *Briſſ. av.* 6. *p.* 99. *n.* 2. *t.* 9.
Manchot à bec tronqué. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 411. *t.* 31. *Pl. enl. n.* 1005.
Black footed Pinguin. *Edw. av. t.* 94.
γ) Aptenodyta mento nigro.

Habitat

Habitat in mari atlantico *et* antarctico, *potissimum circa* caput bonae spei, *magnitudine anatis majoris*, 21 *pollices longa*, *egregie natans*, *in sicca terra vacillante gressu incedens*, *alisque pedum instar utens*, *clangens*, *nidificans in scopulis et* 2 *anatinis aequalia sapidissima ova pariens.*

Rostrum *nigricans*, *fascia prope apicem transversa flavicante*, *mandibula superiore adunca*; corpus *supra nigrum* (*in β.*) *nigricante-maculatum*) *subtus album*; tempora *et* gula *sordide cinerea*, *in β*) *ex nigricante fusca*, *maculis exiguis sordide albis*; alae *supra nigrae*, *inferiori margine albae*, *subtus ex albo et nigro variae*; cauda *brevis*, *cuneiformis*; pedes *toti nigri*; *in β*) stria *ocularis alba*; *in β*) *et γ*) arcus *ex nigricante fuscus*, *a pectore ad crura usque productus.*

Catarractes. 7. Apt. rostro pedibusque rubris, capite fusco. *Forst. comm. Goett.* 3. *p.* 145. *n.* 7.

Catarractes. *Briss. av.* 6. *p.* 102. *n.* 1.

Phaëton (demersus) alis impennibus, pedibus compedibus: digito postico distincto. *Syst. nat.* XII. 1. *p.* 219. *n.* 2.

Red-footed Pinguin. *Edw. av. t.* 49. *Penn. act. angl.* 58. *p.* 98. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 572. *n.* 8.

Habitat in Oceano australi *ultra tropicos*, *anseris magnitudine.*

Mandibula *utraque acuta*, *superior apice paululum flexa*; occiput, cervix *et* corpus *supra sordide purpurea*, *subtus alba*; alae *fuscae*, *albo fimbriatae*; cauda *brevis nigra*; ungues *fusci.*

torquata. 8. Apt. rostro pedibusque nigris, areis oculorum nudis sanguineis, semitorque albo. *Forster comm. Goett.* 3. *p.* 146.

Manchot à collier de la nouvelle Guinée. *Sonner. it. p.* 181. *t.* 114.

Collared Pinguin. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 571. *n.* 7.

Habitat in oceano Georgiae *australi*, *terrae* Kerguelen *et* novae Guineae *vicino*, *papua vix minor*, 18 *pollices longa.*

Rostrum, irides pedes*que nigra*; area *oculorum ovalis*; corpus *supra nigrum*, *subtus album.*

minor. 9. Apt. rostro nigro, pedibus albidis. *Forst. comm. Goett.* 3. *p.* 147. *n.* 9.

Small Penguin. *Cook ult. it.* 1. *p.* 151.

Little Pinguin. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 572. *n.* 9. *t.* 103.

Habitat inter novae Seelandiae *australis rupes*, *cuniculos profundos agens*, *in quibus ova deponit*, *carne excoriata incolis grata*; *colore et magnitudine varians*, *utplurimum tamen*

samen querquedulae magnitudine, et 15 *circiter pollices longa.*

Roſtrum *obſcurum, mandibulae inferioris baſi glauca;* corpus *ſupra ex cinereo caeruleum, pennarum baſi ex fuſco atra, ſubtus album;* area *oculorum ex fuſceſcente cinerea;* alae *ſupra obſcurae, ſubtus albae;* rectrices 16 *rigidae breves;* ungues *nigri.*

chiloenſis. 10. Apt. corpore cinereo.

Diomedea alis impennibus, pedibus compedibus tetradactylis palmatis, corpore lanuginoſo cinereo. *Molina hiſt. nat. Chil. p.* 210.

Habitat in archipelago Chiloenſi, *cujus incolae plumas ejus molliſſimas nent, anatis magnitudine.*

Plumae *denſae, longae, criſpae.*

chilenſis. 11. Apt. ex cinereo et caeruleo varia, ſubtus alba, pedibus tridactylis.

Diomedea alis impennibus, pedibus compedibus tridactylis, digitis omnibus connexis. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 210.

Habitat in Chili, *anatis magnitudine, egregie quidem natans, at mari tempeſtuoſo non reſiſtens, ut aliquando mortuus ad littus ejiciatur; in arena ova* 6-7 *nigro-punctata pariens; pelle denſa et facile a carne ſeparanda, carne ſapida, recta incedens.*

Caput *parvum, compreſſum;* roſtrum *parvum.*

70. PROCELLARIA.

Roſtrum edentulum, ſubcompreſſum: mandibulis aequalibus; ſuperiore apice adunca, inferiore apice compreſſo-canaliculata.

Nares cylindro ſupra baſin roſtri decumbente truncato.

Pedes palmati: ungue poſtico ſeſſili absque digito.

obſcura. 7. Pr. nigra, ſubtus alba, membrana digitos connectente fulva. Dusky Petrel. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 416. *n.* 23.

Habitat

Procellariae *aves pelagicae omnibus procellis expoſitae ad littora vix conſpicuae; pedibus ſupra genua pauliſper nudis incedunt.*

Habitat in insula nativitatis Christi, 13 *pollices longa.*
Rostrum *nigrum*, *ad latera corneum*, *apice aduncum*; *loco* narium *foramina* 2 *exilia*; *latera* colli *ex fusco alboque varia*; tectricum *alarum mediarum margo albicans*; digiti 2 *interiores flavicantes*; ungues *nigri.*

pacifica. 8. Pr. nigra, subtus obscura, pedibus nigro-maculatis.
Pacific Petrel. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 416. *n.* 22.
Habitat numerosissimis gregibus, subito nonnunquam submersis iterumque emergentibus circa insulam Euopoa *aliasque maris pacifici*, 22 *pollices longa.*
Rostrum *plumbeum*, *apice aduncum*; nares *obliquae*, *ovales*, *parumper elevatae*; pedes *pallidi.*

caerulea. 9. Pr. ex caeruleo cinerea subtus alba, rostro pedibusque caeruleis.
Blue Petrel. *Forst. it.* 1. *p.* 91. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 415. *n.* 21.
Other blue Peteril. *Cook it.* 1. *p.* 32.
Habitat gregatim in oceano australi, 12 *pollices longa.*
Rostrum *apice nigrum*; *infra oculos area*, *ad* pectus taenia *obscura*; remiges *majores reliquis obscuriores*; rectrices *extimae totae*, *proximae intus albae*, *reliquae apice*; fascia *obscura per corpus et alas transversa.*

vittata. 10. Pr. ex caerulescente cinerea subtus alba, pedibus nigris.
Petrel bleu. *Buff. hist. nat. desois.* 9. *p.* 316.
Blue Peteril. *Cook it.* 1. *p.* 29.
Vittated Petrel. *Forst. it.* 1. *p.* 153. *Observ. p.* 199.
Broad-billed Petrel. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 414. *n.* 20.
Habitat in omni hemisphaerio australi, *gregibus saepe numerosissimis*, *in arboribus*, *foveis subterraneis*, *infra arborum radices aut rupium fissuras*, *voce ranarum*, *columbae minoris magnitudine*, 12 *pollices longa.*
Rostrum *ex caeruleo griseum*, *basi pollicem latum*, *mandibulae utriusque apice adunco et margine serrato*; lingua *latissima*, *carnosa*; tempora *alba*; stria *infraocularis nigra*; remiges *et* rectricum 6 *intermediarum apices nigricantes.*

urinatrix. 11. Pr. ex atro fusca, subtus alba, rostro mentoque nigris, pedibus ex caeruleo viridibus, tridactylis.
Diving Petrel. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 413. *n.* 19.
Habitat gregibus numerosis circa novam Seelandiam, $8\frac{1}{2}$ *pollices longa*, *alces magnitudine*, *egregie urinans.*
Mandibula *inferior ad media latera alba*; irides *obscure caeruleae*; menti gulaeque *pellis laxa.*

1. Pr.

pelagica. 1. Pr. nigra, uropygio albo. *Fn. ſuec.* 143. *Act. ſtockh.* 1745. *p.* 93. *Amoen. acad.* 4. *p.* 587. *Scop. ann.* 1. *n.* 95.
Procellaria. *Briſſ. av.* 6. *p.* 140. *n.* 1. *t.* 13. *f.* 1.
Oiſeau de tempête. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 327. *t.* 23. *Pl. enlum. n.* 993.
Peterel. *Cluſ. exot.* 368. *Damp. it.* 3. *p.* 97.
Stormfinch or little Pitterel. *Brit. zool.* 2. *n.* 259. *t.* 91. *Catesb. Carol. app. t.* 14. *Edw. av. t.* 90. *Borlaſ. Cornw. p.* 247. *t.* 29. *Alb. av.* 3. *t.* 92. *Will. orn. p.* 395.
Stormy Petrel. *Arct. zool.* 2. *p.* 536. *n.* 464. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 411. *n.* 18.
β) Pr. nigra, capite lateribusque corporis ſubcaeruleis, cervice viridi.
Habitat in alto Oceano, *potiſſimum* boreali *et* atlantico, *hirundinis magnitudine*, 6 *pollices longa*, *littora fugiens*, *ſuper undas maris currens*, *inſtante procella gregatim et arcte naves ſequens*, *unde praeſagia nautarum*, *egregie urinans*, *interdiu tranquilla*, *noctu vociferans*, *piſcibus exilibus victitans*; *per anum et os trahitur ellychnium*, *quod accenſum alitur pinguedine corporis*, *et loco candelae inſervit Ferroenſibus.* *Brünn.* 117.
Corpus *ſubtus fuliginoſum*; remigum *ſecundariarum apex*, criſſum, rectrices 4 *extimae intus alba*; *in β*) alae *ſupra et* uropygium *nigra maculis albis.*

Fregata. 2. Pr. nigra, ſubtus alba, pedibus nigris.
Fregata marina apus, ſubtus alba, ſuperne nigra. *Barr. av.* 73.
Hirundo americana. *Rochef. it.* 134. *t.* 135.
Frigate Petrel. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 410. *n.* 17.
Habitat in latitudine 37° *auſtrali*, *pelagica minor*, $8\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Vertex *et* cervix *ex caeruleſcente cinerea*; dorſum *cum* tectricibus *alarum fuſca*, uropygium *caeruleſcens*; tempora *alba*; area *infraocularis ex caeruleſcente cinerea.*

furcata. 12. Pr. ex argenteo obſcure cinerea, uropygio albo, cauda furcata, pedibus nigris.
Fork-tail Petrel. *Arct. zool.* 2. *p.* 535. *n.* 463. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 410. *n.* 16.
Habitat in glacie maris, Americam *et* Aſiam *interfluentis*, 10 *pollices longa.*
Roſtrum *nigrum*, *mandibulae ſuperioris apice valde adunco*; fronti *et* vertici *fuſcus color adſperſus*; alarum *flexura interior nigra*; rectrices *exteriores extrinſecus albae.*

13. Pr.

fuligi-nosa. 13. Pr. ex atro et fusco mista, capite colloque fuliginosis, cauda furcata, remigibus, rostro pedibusque nigris.
Sooty Petrel. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 409. *n.* 15.
Habitat in Tahiti, 11 *pollices longa.*
Irides *pallide cinereae*; pedes *graciles.*

desolata. 14. Pr. ex virescente cinerea, subtus alba, remigibus caudaque rotundata obscuris, hac apice fusca.
Brown-banded Petrel. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 409. *n.* 14.
Habitat in insula desolationis, 11 *pollices longa.*
Rostrum *nigrum*, *apice flavicans*; tempora oculorum*que area alba*; *summitas* alarum *fere nigra*; pedes *fusci*; membrana *digitos connectens flava*; ungues *nigri*; alis *expansis fascia obscura per omne corpus ab apice ad apicem.*

nivea. 15. Pr. nivea, scapis pennarum rostroque nigris, pedibus obscure caeruleis.
Petrel blanc ou Petrel de neige. *Buff. hist. nat. desois.* 9. *p.* 314.
Snowy Petrel. *Forster it.* 1. *p.* 96. *Cook it.* 1. *p.* 33. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 408. *n.* 13.
Habitat in frigidioribus maris australis, *circa* Georgiam *australem*, *terram* del Fuego, *potissimum et gregibus numerosissimis in vicinia et in montibus insulisque glacialibus ipsis*, *pedem longa*, *capensis magnitudine.*
Rostrum *basi caerulescens*, *apice valde aduncum*; alae *cauda longiores*; membrana *digitos connectens pallida*; ungues *longi uncinati.*

melano-pus. 16. Pr. nigra subtus cana, pedibus pallidis, capistro, mento gulaque pallide argenteis minutim maculatis.
Blacktoad Petrel. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 408. *n.* 12.
Habitat circa Americam *septentrionalem*, 13 *pollices longa.*
Vertex, cauda *rotundata*, *et* alae *totae obscure nigrae*; dorsum *ex atro paulisper canescens*; membrana *digitos connectens parte sui ulteriore*, *digitorumque articuli nigri.*

glacialis, 3. Pr. albicans dorso canescente. *Fn. suec.* 144. *Mart. act. Stockh.* 1759. *Gunner act. nidr.* 1. *p.* 182. *t.* 1. *Ström. sondm.* 231. *Brünn. orn. n.* 118. *Fabric. Fn. groenl. n.* 55.
Procellaria cinerea. *Briss. av.* 6. *p.* 143. *n.* 1. *t.* 12. *f.* 2.
Larus marinus maximus groenlandicus. *Anderf. isl.* 173. *n.* 10.
Wagellus Cornubiensium, Burgemaster of Groenland. *Raj. av. p.* 130. *A.* 13.

Equus

Equus marinus. *Cluſ. auct.* 368.
Fulmar ou Petrel Puffin gris blanc. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 302. *t.* 22. *pl. enl. n.* 59.
Haffhert or Seahorſe. *Will. orn. p.* 395.
Fulmar. *Brit. zool.* 2. *n.* 257. *t.* 91. *Arct. zool.* 2. *p.* 534. *n.* 461. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 403. *n.* 9.
Malle mucke. *Martens Spitzberg.* 68. *t.* N. F. C.

β) Procellaria alis nigris, dorſo inter alas cinereo.

Habitat in maribus ſeptentrionalibus *et* auſtralibus *ad circulos* arcticum *et* antarcticum *usque*, β) *in mari ſolum* antarctico, 17 *pollices longa, ſtupida et audaciſſima, homines vix metuens, pinguiſſima, victitans piſcibus, balaenis, praeſertim mortuis aliisque cadaveribus et quisquiliis, quorum cauſa naves aliquando diu ſequitur; nidificat in* Groenlandia, Spitzbergen, *inſula* S. Kilda, *in qua Novembri advenit, unumque magnum album ovum parit;* caro *rancida, Kurilibus et Groenlandis cruda, ſiccata et cocta cibo, pinguedo expreſſa et cruda cibo et lampadibus, ſaccus gularis ſuffulciendis telis inſervit.*

Roſtrum *pallide cinereum, apice flavicans;* narium *tubus unicus fuſcus bilocularis;* corpus *album cum tinctura ex caneſcente ſubincarnata;* cauda *nonnunquam pallide cinerea;* pedes *ex cineraſcente flavi, in* β) *obſcuri.*

cinerea. 17. Pr. cinerea ſubtus alba, cauda nigra, roſtro flavicante, pedibus caeruleſcentibus.

Cinereous Fulmar. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 405. *n.* 10.

Habitat intra circulum Antarcticum, *glacialis magnitudine,* $20\frac{1}{4}$ *pollices longa; victus multifarius, praeſertim ſepia.*

Roſtri *ſuturae nigrae;* irides *cinereae, rarius totius color pallide caeruleus;* vertex *et* frons *reliquo capite pallidior;* pectus *et* abdomen *interdum nigra;* cauda *rotundata;* membrana *digitos connectens flaveſcens;* digiti *et* ungues *pallidi.*

gigantea. 18. Pr. fuſceſcens albo maculata, ſubtus alba, humeris, alis caudaque fuſcis, roſtro pedibusque flavis.

Quebrantahueſſos. *Bonguino it. p.* 63. *Cook it.* 2. *p.* 205. *Forſt. it.* 2. *p.* 516. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 319.
Quebrantahueſſos or Oſprey Petrel. *Forſter obſerv. p.* 202.
Quebrantahueſſos Mouton. *Pernett. it.* 1. *p.* 15. *t.* 8. *f.* 3.
Oſſifraga. *Ulloa it.* 2. *p.* 214.
Giant Petrel. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 396. *t.* 100.

Habitat in oceano, *potiſſimum* auſtrali, *circa* Staatenland, Terra del Fuego, inſulam deſolationis *etc. anſere major,*

4c *pollices longa, agilis, numerosa, instante praesertim procella, conspicua, victitans piscibus, phocarum aviumque cadaveribus; carne sapida.*

Narium *tubus* $2\frac{1}{2}$ *pollices longus; in angulo oris membrana nuda, rugosa, flava;* vertex *obscurus;* tempora *alba;* pedum *digiti* 5, *membrana connectente, unguibusque obscuris.*

brasiliana. 19. Pr. nigricans, gutture flavo.
Puffinus brasiliensis. *Briss. av.* 6. *p.* 138. *n.* 4.
Puffin de Brésil. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 337.
Majague. *Raj. av. p.* 133. *n.* 3. *Will. orn. p.* 334. *t.* 62.
Brasilian Petrel. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 398. *n.* 2.
Habitat in ostiis fluviorum Brasiliae, *in littore nidificans, agilissima, egregie natans et urinans, anseris magnitudine, carne sapida.*
Caput *rotundum, tumidum;* collum *longum.*

aequinoctialis. 4. Pr. fusca immaculata, rostro flavo, pedibus fuscis.
Sterna major fusca humile volitans. *Brown jam.* 482.
Puffinus capitis bonae spei. *Briss. av.* 6. *p.* 137. *n.* 3.
Avis diomedea. *Redi dissert. Amst.* 1674.
Petrel-Puffin brun. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 326.
Great black Petrel. *Edw. av. t.* 89.
Black Petrel. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 398. *n.* 3.
β) Pr. corpore pedibusque fuliginosis. *Pall. spic.* 5. *p.* 28.
Habitat circa caput bonae spei, *et* novam Seelandiam, β) *circa* Camtschatcam *insulasque* Kuriles, *coracis magnitudine,* 23 *pollices longa,* β) *dimidio major.*
Rostrum 3, narium *tubi* $\frac{1}{2}$ *pollicem longi, bi duplices;* ungues *nigri.*

grisea. 20. Pr. fuliginosa, tectricibus alarum inferioribus albis, rostro fusco, pedibus anterius ex virescente cinereis.
Dark Grey Petrel. *Cook it.* 1. *p.* 258.
Grey Petrel. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 399. *n.* 4.
Habitat in hemisphaerio australi, *inter* 35° *et* 50°, 14-15 *pollices longa.*
Alae *cauda paulo longiores;* tectricum *inferiorum scapi nigri.*

gelida. 21. Pr. nigra, vertice, facie, cervice, humeris et abdomine cinereis, mento, gutture et pectore albis, rostro flavo, pedibus caeruleis.
Glacial Petrel. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 399. *n.* 5.

Habitat

Habitat intra circulum Antarcticum, *potissimum inter glaciem*, 19 *pollices longa.*

Narium *tubus*, *margo utriusque mandibulae*, *dorsum superioris*, *apexque inferioris nigra*; digiti *subtus albi*; ungues *nigri.*

alba. 22. Pr. ex fusco nigra, gulae area, pectore, abdomine et crisso albis, tectricibus caudae inferioribus ex cinereo et albo mistis.

White-breasted Petrel. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 400. *n.* 6.

Habitat in insulis Turturum *et* nativitatis Christi, 16 *pollices longa.*

Rostrum *nigrum*; cauda *rotundata*; pedes *ex atro fusci*; digiti *anteriore dimidia sui parte cum membrana connectente nigri.*

antarctica. 23. Pr. fusca, subtus ex caerulescente alba, cauda alba apice nigra, pedibus plumbeis.

Petrel antarctique ou Damier brun. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 311.

Petrel brun et blanc. *Bongaino it.* 1. *p.* 42.

Antarctic Petrel. *Forster it.* 1. *p.* 108. *Cook it.* 1. *p.* 257. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 400. *n.* 7.

Habitat intra circulum Antarcticum, *latitudine* 36°-61°, 16 *pollices longa.*

Rostrum *fuscum*, *apice nigrum*; irides *avellanae colore*; remiges *obscure fuscae*, *secundariae albae*, *apice obscure fuscae*; uropygium *album.*

capensis. 5. Pr. albo fuscoque varia. *Amoenit. acad.* 4. *p.* 240. *Osb. it.* 76.

Procellaria naevia. *Briss. av.* 6. *p.* 146. *n.* 3.

Anas alia indica. *Gesn. av.* 803. *t.* 804. *f.* 2.

Petrel tâcheté ou Damier. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 304. *t.* 21. *Pl. enlum. n.* 964. *Pernett. it.* 2. *p.* 72. *Feuill. per.* 211.

Pardela. *Ulloa it.* 2. *p.* 304.

White and black spotted Peteril. *Edw. av. t.* 90.

Pintado. *Damp. it.* 3. *t. in pag.* 96. *f.* 1. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 401. *n.* 8.

β) Procellaria pallidissime stramineo fuscoque varia.

Habitat in hemisphaerio australi, *frequentissima et gregibus aliquando numerosissimis circa* caput bonae spei, β) *in insula* desolationis, 14 *pollices longa*, *piscibus*, *balaenarumque cadaveribus victitans*, *ovum gallinacei magnitudine Decembri pariens*, *captiva psittaci instar vociferans.*

Roſtrum pedes*que nigri*; corpus *ſubtus albicans*, *maculis ex atro fuſcis*; caput, cervix, remiges *et* cauda *ex nigro fusca*; tempora *ex albo nigroque varia.*

Puffinus. 6. Pr. corpore ſupra nigro, ſubtus albo, pedibus rufis. *Brünn. orn. n.* 119. *Fabric. Fn. groenl. n.* 56.
Puffinus. *Briſſ. av.* 6. *p.* 131. *n.* 1.
Sterna dorſo fuſco, ventre, uropygio fronteque albidis. *Brown jam.* 482.
Diomedea avis. *Geſn. av.* 381. *Aldr. orn.* 3. *p.* 57. *t.* 59. *Raj. av. p.* 133. *n.* 1. *Will. orn. p.* 132. *Scop. orn.* 1. *n.* 96.
Manns Puffin. *Raj. av. p.* 134. A. 4. *Will. orn. p.* 333. *Edw. glean. t.* 379.
Puffin. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 321. *Pl. enl. n.* 962.
Shearwater. *Brit. zool.* 2. *n.* 208. *Arct. zool.* 2. *p.* 535. *n.* 462. *Raj. av. p.* 133. A. 2. *Will. orn. p.* 334. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 406. *n.* 11.
β) Puffinus cinereus. *Briſſ. av.* 6. *p.* 134. *n.* 2. *t.* 12. *f.* 1.
Petrel cendré. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 302. *t.* 20.
Habitat in Oceano, *inprimis ſeptentrionali, ut tamen etiam in* mari atlantico *et* auſtrali *occurrat*, 15 *pollices longa, columbae magnitudine, toto die piſcans, neque ante veſperam ad pullos rediens; in cuniculorum praeſertim foveis nidificans, unum ovum album pariens, cui dorſo incubat; junior ſalita cibo inſervit.*
Roſtrum *flavum apice nigrum*; pedes *debiles: In* β) roſtrum *nigrum*; occiput *albicans*, *tinctu cinereo*; *reliquum* corpus *ſupra cinereum*, *ſubtus cum* fronte *niveum*; alae *ſpuriae nigro-maculatae*; remiges *extrinſecus nigrae*; cauda *alba*; pedes *ex cinereo fuſci.*

71. DIOMEDEA. *Roſtrum* rectum: maxilla ſuperiore apice adunca, inferiore truncata.

Nares ovatae patulae prominulae laterales.

Lingua minima.

Pedes tridactyli.

exulans. 1. D. alba, dorſo alisque nigro-lineatis, roſtro luteo, pedibus incarnatis, remigibus nigris, cauda plumbea rotundata.

Diome-

Diomedea alis pennatis, pedibus aequilibribus tridactylis. *Syst. nat.* XII. 1. *p.* 214. *n.* 1.
Diomedea Albatrus. *Pall. spic. zool.* 5. *p.* 28.
Tohaiki. *Steller hist. Camtschatc. p.* 154.
Albatros. *Edw. av. t.* 88. *Grew mus. t.* 6. *f.* 1. *Briss. av.* 6. *p.* 126. *n.* 1. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 339. *t.* 24. *Pl. enlum. n.* 237.
Man of War Bird. *Albin. av.* 3. *t.* 81.
Wandering Albatros. *Arct. zool.* 2. *p.* 506. *n.* 423. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 304. *n.* 1.

β) Diomedea fusca, supra in nigrum colorem vergens, rostro rubro apice nigricante, lanugine cinerea, versus caput albida.

γ) Diomedea alba, interscapulio, remigibus rectricibusque ex fusco nigricantibus, capite summoque collo intense stramineis, mandibula superiore alba vel rubicunda, inferioris rubrae carina alba.

Habitat in mari, *tum intra tum* extra tropicos, *frequens ad* caput bonae spei, *circa finem Julii in* Camtschatcae *littore marique hanc* Asiae *partem et* Americam *separante numerosissima, magnitudine inter cygnum anseremque media, frequentius cygno major, 2 pedes 9 pollices, 3 pedes 6 pollices ad 4 usque pedes longa, a falconibus et Catarrhacte perquam infestata, voracissima, salmonum turmis in fluviorum ostiis, triglis volitantibus, a coryphaena exagitatis, aliisque piscibus, quos maris accolis praenunciat, inhians, quos integros et immensa copia devorat, ut adscendere eorum pondere cohibeatur, quamvis alias altissime volet, molluscis etiam victitans; in* Americae *australis littore Septembris fine nidum in tellure ex terra struit rotundum, pedem 1-3 altum, ovaque ponit numerosa, edulia, albumine in calore non coeunte, anserinis majora, $4\frac{1}{2}$ pollices longa, alba, versus finem magis obtusum obsolete maculata; vox asini; rostro mordicus se defendit: Caro dura; Camtschadali intestini partem inflatam retibus suis appendunt, alarum ossa sugendo tabaci fumo, aciothecae, et carminando, quod lini vices iis supplet, gramini adaptant.*

Rostrum *sulcatum, sordide flavum, aciebus duabus palati arguti*ssimis, *cultriformibus, versus basin rostri longitudinalibus, in mandibulam inferiorem inciduis*; nares *a basi remotae, e sulco rostri emergentes, quasi tubuli compressi, brevissimi*; vertex *ex pallide cinereo fuscus*; dorsum *versus uropygium nigro-maculatum*; alae *longissimae angustissimae*; remiges *primariae 9 nigrae, scapis supra in-*

tenſe flavis, extima longiſſima, reliquis ſubito decreſcentibus; rectrices *breves*, 14; pedes *incarnati aut ſpadicei unguibus obtuſis, membrana connectente fuſca.*

ſpadicea. 2. D. ſpadicea, fronte, orbitis, mento, gula, tectricibus alarum inferioribus, abdomine pedibusque albis, roſtro ochroleuco.

Deeſt broun or Chocolate Albatroſs. *Cook it.* 2. *p.* 116. 150. *Forſter it.* 1. *p.* 258. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 308. *n.* 2.

Habitat in maris auſtralis *latitudine* 37°, *fuliginoſa major.* Irides *fuſcae*; *margo* alarum *ſuperior intus albus*; abdomen *albicans*; cauda *alis aequalis longitudine*; pedes *ex caeruleſcente albi*; ungues *albi.*

chlororhynchos. 3. D. alba, roſtro nigro, carina mandibulae ſuperioris baſique inferioris flava, capite griſeo, cenia, macula ſupra oculos caudaque obſcuris, dorſo, alis maculaque inter roſtrum et oculos nigris.

Yellow noſed Albatroſs. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 309. *n.* 3. *t.* 94.

Habitat ad caput bonae ſpei, *et in* mari auſtrali *extra* tropicos, 3 *pedes longa*, 5-6 *pedes ſupra aquae ſuperficiem volans.*

Irides *fuſcae*; nucha *et* uropygium *alba*; pedes *pallide ochroleuci, anterius cum membrana digitos connectente obſcuri.*

fuliginoſa. 4. D. fuſca, capite, roſtro, cauda, remigibus et unguibus ex fuſco atris, area ocularum alba.

Sooty or brown Albatroſs. *Forſter it.* 1. *p.* 91. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 309. *n.* 4.

Albatroſs with a white Eyebrow. *Cook it.* 1. *p.* 38.

Habitat in maris auſtralis *latitudine* 47°, *et omni* circulo antarctico, *anſeris magnitudine*, 3 *pene pedes longa.*

Irides *flaveſcentes*; remiges rectrices*que ſcapo albae*; *hae acuminatae*; pedes *ex fuſceſcente pallide plumbei.*

72. PELECANUS. *Roſtrum* rectum: apice adunco unguiculato.

Nares rima obliterata.

Facies nudiuſcula.

Pedes aequilibres: digitis omnibus quatuor ſimul palmatis.

* *Roſtro edentulo.*

Onocrotalus. 1. P. albus, gula ſaccata. *Haſſelq. it. p.* 288. S. G. *Gmelin nov. comm. Petrop.* 15. *p.* 471. *n.* 16. *Scop. ann.* 1. *n.* 97. *Georg. it. p.* 169. *Kram. el. p.* 345.

Onocrotalus. *Geſn. av.* 630. *Olear. muſ. t.* 13. *f.* 1. *Briſſ. av.* 6. *p.* 519. *n.* 1.

Pelecanus. *Bell. av.* 30.

Onocrotalus ſ. Pelecanus. *Aldr. orn.* 3. *p.* 42. *t.* 48. 49. *Marſ. Danub.* 6. *t.* 35. *Bont. jav.* 68. *Dodart. mem.* 3. *p.* 189. *t.* 26.

Pelican. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 282. *t.* 25. *Pl. enl. n.* 87. *Edw. av. t.* 92.

Pelecane. *Raj. av. p.* 121. *n.* 1. *Will. orn. p.* 327. *t.* 63.

Great Pelecan. *Gen. of birds p.* 67. *t.* 15. *Arct. zool.* 2. *p.* 578. *n.* 505. Frisch. t. 186.

White great Pelecan. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 575. *n.* 1.

β) Onocrotalus roſtro denticulato. *Briſſ. av.* 6. *p.* 523. A.

Pelican à bec dentelé. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 309.

Habitat in Africa, Aſia, (*ad lacum* Baical *usque*) *auſtraliore* America, (*ad* Carolinam *meridionalem usque*) Europa *ad* Danubium *et lacum* Acronicum *usque, hieme in* Aegyptum *migrans*, β) *in* nova Hiſpania, *cygno longe major, piſcibus victitat, quos, nonnunquam adjuvante carbone, ſubmergendo ſe capit, et in rupe remota deglutit; in locis deſertis ab aqua diſtantibus aliquando nidificans, tumque in gula aquam pullis apportans; frequentius nidum in uliginoſis incultisque lacuum inſulis ex caricibus ſtruens, profundum ſesquipedalis diametri, intus molli gramine fartum, 2 aut*

Aves *hujus generis eximiae piſcatrices, ut etiam ad piſcandum adaptari ab hominibus póſſint, maria plurimae habitant, aliquae tamen etiam in terra continente obviae; roſtro gaudent longo, in cujus ſulco laterali poſitae ſunt nares; voraciſſimae, gregariae; digiti medii unguis utplurimum ſerratus.*

plura ova alba, cygneis similia pariens, quae hoste persequente interdum in aqua abscondit; Osima *Imperat. Friderici* II, *et Vincentii*, Volmarus *et* Volinarus *Alberti* M. Cosani *Apulorum; hominem metuit, tarde incedit, gregatim volat, alias quoque aves in societatem sibi adsciscens.*

Rostrum *juniori totum flavum; adulto mandibula superior* 15-16 *pollices longa, depressa, lata, in dorso rubra, ceterum rubescens, versus apicem flava; inferior rubescens;* saccus *gularis ruber aut flavicans; membrana inter utrumque mandibulae superioris marginem media, flaccida, distensilis, ut plures libras aquae capiat, nuda;* rictus *amplus;* facies *incarnata nuda;* occiput *subcristatum;* corpus *album, cum tinctu quodam incarnato;* alae *spuriae* remiges*que primae nigrae;* pedes *plumbei;* ungues *cinerei.*

roseus. 9. P. roseus, gula saccata.

Pelican rose de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p.* 91. *t.* 54.

Rose-coloured Pelican. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 579. *n.* 2.

Habitat in insula Manilla, *anseris magnitudine.*

Rostrum pedes*que nigri;* area *oculorum nuda;* saccus*que gularis flavus.*

fuscus. 10. P. ex cinereo fuscus, remigibus primoribus nigris, gula saccata.

Pelecanus subfuscus, gula distensili. *Brown jam.* 480.

Onocrotalus fuscus. *Briss. av.* 6. *p.* 524. *n.* 2.

Onocrotalus pedibus caeruleis brevioribus, rostro cochleato. *Feuill. per.* 257.

Pelican brun. *Buff. hist. nat. desois.* 8. *p.* 306. *Pl. enlum. n.* 957.

Pelecane. *Raj. av. p.* 191. *n.* 3. *Will. orn. p.* 327. *Sloane jam. p.* 322. *n.* 1.

Pelican of America. *Ellis Hudson's b.* 1. *t.* 1. *Edw. av. t.* 93.

Dusky Pelican. *Artt. zool.* 2. *p.* 580. *n.* 506.

Brown Pelican. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 580. *n.* 3.

Habitat in America *a sinu* Hudsonis *ad* Carthagenam *usque migratorius, cygno vix aequalis, scopulis insidens, rostro pectori impositio, longaevus.*

Rostrum *rubrum, apice nigrum;* saccus *ad medium usque gutturis pendens;* area *oculorum nuda rubra;* caput *et* cervix *ex cinereo et albo varia, illud subcristatum;* pennae *superiores medio albidae;* rectrices 18 *fuscae;* pedes *plumbei;* ungues *nigri.*

manil-lenſis. 11. P. fuſcus gula ſaccata.
Pelican brun de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p.* 91. *t.* 53.
Manilla Pelican. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 583. *n.* 4.
Habitat in insula Manilla, *roſco quam proxime affinis, sti ille, in terra nidificans, carne rancida.*

philip-penſis. 12. P. albus, criſta occipitis ex albo et fuſco varia, gula ſaccata.
Onocrotalus philippenſis. *Briſſ. av.* 6. *p.* 527. *n.* 3. *t.* 46.
Habitat in insulis Philippinis, $4\frac{1}{4}$ *pedes longus; pectoris cutis ſuaveolens incolis amuleti instar ad asthma ſanandum adhibita.*
Roſtrum 14 *pollices longum*, areaque *oculorum nuda ex rubicundo alba; pennae* capitis collique *molles, ſericeae, albidae;* ſaccus *gularis perquam pallidus;* dorſum *ſuperius,* humeri *et* tectrices *alarum cinerea;* remiges *nigrae, ſecundariae multae baſi albae;* rectrices 18 *ex cinereo albae, ſcapis nigris;* pedes *rubri.*

rufeſcens. 13. P. rufeſcens capite criſtato colloque ex fuſceſcente albo, cauda obſcure cinerea, gula ſaccata.
Red-backed Pelican. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 584. *n.* 6.
Habitat in Africa *occidentali, cygni majoris magnitudine,* 5 *pedes longus.*
Roſtrum 13 *pollices longum*, area *oculorum*, ſaccusque *gularis ſordide flava;* criſta 4 *pollices longa;* humeri *ex pallido cinereo plumbei;* remiges *primores nigrae; pennae* pectoris *longae, angustae, acuminatae;* pedes *flavi.*

caroli-nenſis. 14. P. ſupra obſcurus, ſubtus albus, gula ſaccata.
Charlestown Pelican. *Arct. zool.* 2. *p.* 580. *n.* 507. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 585. *n.* 7.
β) P. ſubtus ex fuſceſcente albus.
γ) P. dorſo inferiore nigro et obſcure albo ſtriato.
Habitat in ſinu urbis Charlestown, *anatis canadenſis magnitudine;* ſaccus *gularis ampliſſimus.*

erythro-rhynchos. 15. P. criſtatus albus, gula ſaccata nigro-ſtriata.
Rough-billed Pelican. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 586. *n.* 8.
Habitat in America *ſeptentrionali,* 4 *pedes et* 6 *pollices longus, magnitudinem quod ſpectat inter cygnum anſeremque medius.*
Roſtrum 13 *pollices longum, ex rubicundo flavum, a medio verſus apicem multis ſtriis elevatis ſcabrum;* mandibula *inferior utrinque in medio macula nigra inſignita;* remiges *majores nigrae.*

Aquilus. 2. P. cauda forficata, corpore nigro, roſtro rubro, orbitis nigris. *Amoen. acad.* 4. *p.* 238. *Osb. it.* 292.
Fregata. *Raj. av. p.* 153. *Briſſ. av.* 6. *p.* 506. *n.* 6. *t.* 43. *f.* 2. A.
Alcyon major pulla, cauda longiore bifurca. *Brown jam.* 483.
Vultur marinus. *Feuillée peruv.* 107.
Cari pira. *Laët. amer.* 575.
Avis rabo focardo. *Petiv. gaz. t.* 54. *f.* 1. *Will. orn.* 395. *t.* 153. *Tetr. antill.* 2. *p.* 269. *t.* 246.
Rabi horcado. *Nieremb. natur.* 221. *Will. orn.* 306. *t.* 77. *Raj. av.* 192. *Ulloa it.* 2. *p.* 304.
Fregate. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 381. *Pern. it.* 1. *p.* 125. *Damp. it.* 1. *p.* 49. 3. 2. *tab. p.* 99.
Grande fregate de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 961.
Frigate. *Gen. of birds p.* 67. *t.* 16. *Albin. av.* 3. *t.* 80. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 587.
Habitat in Pelago, *praeſertim intra* tropicos, 3 *pedes longus, vitam agens Diomedeae exulis, cui ſimilis, longiſſime recedens alis ampliſſimis implexa ſaepe* 14 *pedum, unde placide volat, et adeo alte, ut ſaepe vix conſpiciatur, continue fere in aëre ſuſpenſus remotiſſimus a continente; piſces, praeſertim exocaetos velociſſime uno ictu ferit, aliisque piſcivoris animalibus non raro praedam eripit; in arboribus aut rupibus nidificant, ovumque* 1-2 *pariunt incarnata rubro-maculata, ex quibus prodeunt pulli caneſcente lanugine tecti.* Rictus [illegible] Roſtrum *gracile, mandibula utraque apice multum adunca;* facies *rubicunda;* faccus (mari) *gularis ſaturate ruber;* tectrices *alarum rufae;* feminae *abdomen album.*

minor. 16. P. cauda forficata; corpore ferrugineo, roſtro orbitisque rubris.
Fregata minor. *Briſſ. av.* 6. *p.* 509. *n.* 7.
Petite fregate. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *t.* 30.
Man of War Bird. *Edw. glean. t.* 309.
Leſſer Frigate. *Lath. ſyn.* III. *p.* 590. *n.* 10.
Multum aquilo affinis, gula etiam ſaccata, at minor, et 2 *pedes* 9 *pollices modo longus;* pedes *ſordide lutei.*

leucocephalos. 17. P. cauda forficata, corpore fuſco, capite, collo, pectore et abdomine albis, roſtro obſcuro.
White headed Frigate. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 591. *n.* 11.
Habitat in inſula Aſcenſionis, *anatis majoris magnitudine,* 3 *fere pedes longus, manſuetus, hominemque non metuens.*

Roſtrum

Roſtrum *apice pallidum*, *mandibula utraque valde aduncа*; tempora *pennis tecta*; pedes *fuſci*.

Palmerſtoni. 18. P. cauda forficata, corpore ex co viridi-nitente, ſubtus albo, gutture ex fuſco et albo vario, roſtro, uropygio pedibusque nigris.

Palmerſton Frigate. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 592. *n.* 12.

Habitat in inſula Palmerſton *maris auſtralis*, 3 *pedes et* 2 *pollices longus.*

Area *oculorum pennis tecta*; tectrices *alarum corpori proximae ex nitente atro virides.*

Carbo. 3. P. cauda rotundata, corpore nigro, capite ſubcriſtato. *Fn. ſuec.* 145. *Scop. ann.* 1. *n.* 98. *Brünn. orn. n.* 120. 122. *Georg. it. p.* 169. S. G. *Gmelin it.* 1. *p.* 163. *Fabricius Fn. groenl. n.* 57. *Nozem. nederl. Vogel t.* 98-99.

Phalacrocorax. *Geſn. av.* 683. *Aldrov. orn.* 3. *p.* 267. *t.* 269. *Briſſ. av.* 6. *p.* 511. *n.* 1. *t.* 45.

Morſex. *Geſn. av.* 136. *Aldr. orn.* 3. *p.* 286. *Bell. av.* 32.

Carbo aquaticus. *Geſn. av.* 136. *t.* 137.

Corvus aquaticus. *Geſn. av.* 350. *Aldr. orn.* 3. *p.* 261. *t.* 263. *Jonſt. av. t.* 47. *Marſ. danub.* 16. *t.* 36. *Beſl. muſ.* 29. *t.* 8.

Cormoran. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 310. *t.* 26. *Pl. enl.* 927.

Corvorant. *Brit. zool.* 2. *n.* 291. *Arct. zool.* 2. *p.* 581. *n.* 509. *Raj. av. p.* 122. A. 3. *Will. orn. p.* 329. *t.* 63. *Albin. av.* 2. *t.* 81. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 593. *n.* 13.

Waſſerrabe. *Friſch av. t.* 187.

Seerabe. *Walbaum Schr. der naturf. berl. Geſ.* 7. *n.* 22. *p.* 430.

Habitat per omne o[illegible]is noſtri hemiſphaerium ſeptentrionale, *anſeris magnitudine, ſed gracilior et* 3 *pedes ultraque longus, in altis arboribus nidificat, ova* 3 *aut plura virentia anſerinis aequalia pariens; poſt paſtum ſtupidiſſimus, a Sinenſibus, olim quoque ab Anglis ad piſcatum adhibitus; carne Groenlandis eſculenta, pelle veſtimenti, ſacco gulari perae loco inſerviente.*

Roſtrum *nigrum*; *mandibula inferior cerae ſpecie obducta ex flavicante viridi, ad mentum et gulam producta et ſacci ſpeciem mentiente*; irides *virides*; facies *non multum denudata*; gula *alba cincta arcu flaveſcente*; pennae *margine atrae, cum nitore viridi*; cauda *longior laxiorque, quam in reliquis aquaticis, rectricibus* 14; femorum *macula exterior alba nigro-punctata*; pedes *nigri.*

4. P.

Graculus. 4. P. cauda rotundata, corpore nigro subtus fusco, rectricibus duodecim. *Faun. suec.* 146. *Brünn. n.* 121.
Phalacrocorax minor. *Briss. av.* 6. *p.* 516. *n.* 2.
Graculus palmipes Aristotelis s. Corvus aquaticus minor. *Aldr. orn.* 3. *p.* 272. *t.* 273.
Corvus aquaticus. *Alb. av.* 2. *p.* 74. *t.* 81.
Cormoran. *Dodart. mém.* 3. *p.* 213. *t.* 31.
Petit Cormoran ou Nigaud. *Buff. hist. nat. des ois. p.* 319.
Shagge or Crane. *Raj. av. p.* 123. A. 4. *Will. orn. p.* 330. *t.* 63.
Shag. *Act. zool.* 2. *p.* 581. *n.* 508. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 598. *n.* 14.
Habitat in oceano Europae *septentrionalis ab* Islandia *ad* Belgium *usque*, 2 *pedes* 6 *pollices longus, in terra sicca stupidus, in aqua difficulter feriendus, erecto capite, corpore fere toto aquis immerso natans, et utprimum sclopeti ictum cominus animadvertit, totus submersus; ova longa alba parit, multum carboni affinis, ungue etiam medio serrato, at minor, occiput non cristatum, rostri apex minus aduncus, cauda brevior.*
Caput, collum, dorsum, cauda, tectricesque *alarum nigra, nitore sericeo viridi*; abdomen *obscurum, medio cinereum*; pedes *nigri.*

pygmaeus. 19. P. cauda cuneiformi: rectricibus 12, corpore atro hinc inde albo-punctato. *Pall. it.* 2. *p.* 712. *n.* 26. *t.* G.
Dwarf Shag. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 607. *n.* 24.
Habitat in mari Caspio, *congeneribus intermistus, tardius ex austro advolans, querquedulam vix aequans, forma, rostro pedibusque graculo similis.*
Collo pectorique *interfusus viror, adspersaque hinc inde puncta nivea, penicillis setulae tenuissimae insidentibus constantia; circa oculos puncta alba sparsa*; tectrices *alarum exsolete fuscae, limbo undique atro nitido*; cauda *longa, rigida*; femina *tota fusca, vel obsolete nigra, punctis nullis.*

punctatus. 20. P. cauda rotundata, capite cristato, alis cinereis nigro-punctatis. *Sparrmann mus. Carlson. t.* 10.
Habitat in nova Seelandia *ad fretum* Reginae Charlottae, *in arboribus nidificans.*
Capillitium, colli *pars maxima*, dorsum *et* uropygium *viridi-violaceo-nigroque nitentia; posteriora duo*, crissum *et* cervix *striis brevissimis albis notata*; tempora, capitis collique *latera alba*; pectus *et* abdomen *canescentia*; tectrices *alarum apice ex viridi nigrae.*

21. P.

criſtatus. **21. P. corpore viridi-nitente ſubtus obſcuro, roſtro pedibusque obſcuris, capite criſtato.**

Pelecanus criſtatus. *Fabric. fn. groenl. n.* 58. *Brünn. orn. n.* 123.

Creſted Shag. *Brit. zool.* 2. *p.* 292. *t.* 102. *Arct. zool.* 2. *p.* 583. A. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 600. *n.* 15.

Habitat in Magna Britannia, Norwegia, Islandia, Groenlandia, *graculo paulo minor*, 2 *pedes*, 3 *pollices longus.*

Roſtrum *anguſtum* 4 *pollices longum*; irides *virides*; caput *utrinque faſciculo pennarum obſcurarum longo ornatum*; rectrices 12, *obſcure virides.*

violaceus. **22. P. niger violaceo-nitens, capite criſtato.**

Violet Corvorant. *Arct. zool.* 2. *p.* 584. B.

Violet Shag. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 600. *n.* 16.

Habitat circa Camtſchatcam, *vicinasque inſulas.*

Urile. **23. P. viridi-nitens, gutture et orbitis albis, facie nuda ex caeruleſcente rubra, alis caudaque obſcuris, pedibus nigris.**

Red faced Corvorant. *Arct. zool.* 2. *p.* 584. C.

Red faced Shag. *Lath. ſyn* III. 2. *p.* 601. *n.* 17.

Urile. *Steller Camtſchatc. p.* 157.

Habitat in Camtſchatcae *rupeſtribus maritimis, in quibus nidificat Junio, ovaque parit, gallinaceis aequalia viridia, nauſeoſa, Camtſchadalis tamen cum carne dura toſta expetita; difficulter quidem in aërem elevatur, verum egregie et velociſſime volat; vox tubae muſicae ſimilis; carbone minor*, 2 *pedes et* 10 *pollices longus.*

Roſtrum *gracile, mandibula ſuperiore nigra, inferiore rubra*; hypochondriis humerisque *nitor purpureus*; rectrices 12; *ſupra femora utrinque faſciculus pennarum albarum.*

naevius. **24. P. niger, cauda rotundata, orbitis nudis obſcure rubris, fronte et occipite criſtatis, linea curva alba ab oculis ad alas producta, dorſi pennis apice nigro-guttatis.**

Creſted Shag. *Cook it. ult.* 1. *p.* 151.

Spotted Shag. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 602. *n.* 18. *t.* 104.

Habitat in nova Seelandia, *praeſertim in* ſinu Reginae Charlottae, *inter rupes nidificans, graculi magnitudine*; 2 *pedes et ultra longus.*

Roſtrum

Quae recenſentur a 20-29 *ſpecies, utrum roſtrum edentulum habeant, an mandibulas ſerratas, autores, qui eas deſcribunt, non memorant.*

Roſtrum *alias pallide plumbeum, alias flavum, alias rubeſcens*; mentum *nonnunquam album, et gula plumis tecta*; linea *colli lateralis interdum minus conſpicua*; alae dorſique *medium ex fuſceſcente cinerea*; *nigredini a medio dorſi ad caudae apicem, et a regione femorum ad criſſum nitor viridis*; pedes *obſcure fuſci aut atri.*

caruncu-latus. 25. P. niger ſubtus albus, facie nuda carunculata rubra, area oculorum cinerea, orbitis caeruleis, fronte tectricum alarum litura oblonga alba.

Carunculated Shag. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 603. *n.* 19.

Habitat in nova Seelandia *et* Staatenland, *naevii magnitudine, in collibus et quidem in ceſpitibus dactylidis glomeratae, rarius in urbibus nidificans.*

Roſtrum *obſcurum*; genae *nudae*; irides *albidae vel fuſceſcentes*; caput *pauliſper compreſſum*; pedes *incarnati aut fuſceſcentes.*

magellanicus. 26. P. niger ſubtus albus, temporibus mentoque nudis rubeſcentibus, capide tumido, temporum litura alba, cauda cuneiformi.

Magellanic Shag. *Lath. ſyn.* III. *p.* 604. *n.* 20.

Habitat in terra del Fuego, *et* Staatenland, 30 *pollices longus*; *nidificans in rupibus maritimis, quas nonnunquam excavat, ſclopeti ſono non territus.*

Roſtrum *nigrum*; menti *medium pauliſper lanuginoſum*; guttur, pectus *et* femora *nigra*; hypochondriorum *pennae albo-ſtriatae*; pedes *fuſceſcentes.*

varius. 27. P. fuſcus ſubtus albus, uropygio, remigibus, caudaque rotundata nigris, ſuperciliis pallidis, area oculorum nuda flava.

Pied Shag. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 605. *n.* 21.

Habitat in nova Seelandia, *frequentiſſimus circa* ſinum Reginae Charlottae, 2 *pedes* 6 *pollices longus*; *in arboribus nidificans, ovaque pariens gallinaceis minora ex pallido caeruleſcente alba.*

Roſtrum *graculi*, $4\frac{1}{2}$ *pollices longum, flavum, dorſo obſcurum*; *medium* dorſi *pallidius*; rectricum *ſcapi et margo exterior albi*; pedes *incarnati*; ungues *obſcuri.*

cirrhatus. 28. P. niger ſubtus albus, vertice criſtato, tectricum alarum litura oblonga alba, cauda rotundata, roſtro pedibusque luteis.

Tufted Shag. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 606. *n.* 22.

Habitat

Habitat in nova Seelandia *circa* finum Reginae Charlottae, 2 *pedes et* 10 *pollices longus.*
Area *oculorum nuda*; crilta *pauliſper antrorſum verſa*; rectrices 14.

africanus. 29. P. ſubtus ex albo et nigro varius, capite, collo, dorſi medio, uropygio, remigibus ſecundariis et rectricibus 4 utrinque exterioribus nigris, mento albo.
African Shag. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 606. *n.* 23.
Habitat in Africa, 20 *pollices longus.*
Area *oculorum nuda*; roſtrum *ex ſordido flavicante album, mandibula ſuperiore ex fuſco nigra*; humeri, tectrices*que alarum ex caeruleo cinereae; pennarum margine et apice nigro*; remiges *primae tres* rectrices*que* 4 *intermediae et duae extimae fuſceſcentes*; pedes *nigri.*

7 * * *Roſtro ſerrato.*

Thagus. 30. P. fuſcus, cauda rotundata, gula ſaccata pennis brevibus cinereis tecta. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 212.
Habitat in maris regnum Chili *alluentis ſcopulis, in quibus quoque nidificat, iners, ſcolopacis magnitudine, pullis plerumque* 5.
Roſtrum *circiter ſesquipedale, baſi* 5 *pollices craſſum, mandibulae utriusque apice adunco*; cauda *brevis*; remiges *calamis ſcripteriis aptiſſimae*; ſaccus *gularis praegrandis tabaco aſſervando et lucernis adhibetur ab incolis.*

Baſſanus. 5. P. cauda cuneiformi, corpore albo, roſtro remigibusque primoribus nigris, facie caerulea. *Fn. ſuec. n.* 147. *Brünn. orn. n.* 124. *Fabric. Fn. groenl. n.* 59.
Anſer Baſſanus ſ. ſcoticus. *Geſn. av.* 163. *Aldr. orn.* 3. *p.* 162. *Sibb. ſcot.* 2. *p.* 2. *t.* 9. *f.* 2.
Sula Baſſana. *Briſſ. av.* 6. *p.* 503. *n.* 5. *t.* 44. *Ström. ſondm.* 233.
Sula Hojeri. *Cluſ. exot.* 367. *Raj. av.* 123. *n.* 5.
Fou de Baſſan. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 376. *Pl. enlum. n.* 278.
Soland Gooſe. *Raj. av. p.* 122. A. 2. *Will. orn. p.* 328. *t.* 63. *Albin. av.* 1. *t.* 86.
Gannet. *Brit. zool.* 2. *n.* 293. *Arct. zool.* 2. *p.* 582. *n.* 510. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 608. *n.* 25.

β) Sula major. *Briſſ. av.* 6. *p.* 497. *n.* 2.
Grand Fou. *Buff. hiſt, nat. des oiſ.* 8. *p.* 372.
Great Booby. *Catesb. Car.* 1. *t.* 86.

Habitat

Habitat in pelago Americae *et* Europae ſeptentrionali, *victum quaeſiturus verſus* Carolinam, Lisboam, *fretumque* Gaditanum *migrans*, *anſeris magnitudine*, 3 *pedes longus*, καταῤῥάκτης Veterum, *vix appropinquans littori per* 2 *milliaria*, *clupeis et halecibus praeſertim inhians*, *quorum ideo adventum praenunciat*; *nidum ex gramine fucisque ſtruens*, *et ſemel unum ovum album anſerino vix majus*, *una cum carne junioris frequens incolarum inſularum Scotiae ferculum*, *parit*; *in inſula* Baſſe *adeo frequens menſe floreſcentiae*, *ut tota inſula nidis inſtrata*, *vix pedem ponere liceat*, *tantaque copia ſupervolitantium*, *ut nubium inſtar coelum auferat*, *tantusque clamor*, *ut alloquentes vix audiantur*. *Harv. exerc. an.* 11.

Roſtrum 6 *pollices longum*; faux, facies*que nuda caerulea*; irides *flavicantes*; gula *calva nigra*, *pelle valde dilatabili*, *ut* 5-6 *haleces comprehendat*; linea *pone oris angulos nigra nuda*; vertex *et* cervix *luteſcentes*; alae *ſpuriae*, tectrices*que alarum minores nigrae*; rectrices 12; pedes *nigri*, *ungue medio pectinato*. Pulli *annotini fuſci*, *maculis albis trigonis*. *In β) verſus Floridae littora frequenti*, cauda, remiges, *et* roſtrum *fuſcum*; corpus *quoque reliquum fuſcum*, *at albo maculatum*, *ſubtus ſordide album*.

Piſcator. 6. P. cauda cuneiformi, corpore albo, remigibus omnibus nigris, facie rubra. *Amoen. acad.* 4. *p.* 239. *n.* 8. *β. Osb. it.* 1. *p.* 127.

Sula candida. *Briſſ. av.* 6. *p.* 501. *n.* 4.

Fou blanc. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 371.

Leſſer Gannet. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 611. *n.* 26.

Habitat in Oceano, Chinam, Indiam, Americam, *et* Europam *alluente*, *anatis majoris magnitudine*, 2 *pedes* 7 *pollices longus*.

Roſtrum, facies pedes*que rubicunda*; gula *nuda*, *aterrima*; tectrices *alarum*, *pennarumque ſcapularium apices nigri*; rectrices 14, *baſi albae*, *ceterum nigrae*.

Sula. 7. P. cauda cuneiformi, corpore albido, remigibus primoribus apice nigricantibus, facie rubra.

Sula. *Briſſ. av.* 6. *p.* 495. *n.* 1.

Anethaeus major mellinus, ſubtus albidus, roſtro ſerrato. *Brown jam.* 481.

Anſeri baſſano congener fuſca avis. *Sloan. jam.* 2. *p.* 322. *t.* 271. *f.* 2. *Raj. av.* 290. *n.* 6.

Fou. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 368. *t.* 29.

Booby.

Booby. *Catesb. Car.* I. *t.* 87. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 612. *n.* 27.

Habitat in oceano indico, atlantico, septentrionali, *piscatori aequalis, 2 pedes 6 pollices longus, in locis arborum expertibus in terra nidificans; caro nigra, rancida.*

Rostrum $4\frac{1}{2}$ *pollices longum, griseum, basi fuscescens, mandibulae superioris apice valde adunco;* irides *pallide cinereae;* mentum *calvum, flavicans;* corpus *ex cinereo fuscum, subtus album;* cauda *apice fuscescens;* pedes *flavicantes, unguibus cinereis.*

Fiber. 8. P. cauda cuneiformi, corpore fuscescente, remigibus omnibus nigricantibus, facie rubra.

Sula fusca. *Briss. av.* 6. *p.* 499. *n.* 3. *t.* 43. *f.* 1.

Anseri bassano congener cinereo-albus. *Sloan. jam.* I. *p.* 31. *t.* 6. *f.* 1. *Raj. av.* 191. *n.* 5.

Fiber marinus, rostro acutissimo adunco serrato. *Feuill. per. p.* 98.

Petit fou brun. *Buff. hist. nat. desois.* 8. *p.* 374.

Fou brun de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n.* 974.

Brown Booby. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 613. *n.* 28.

Habitat in Oceano africano, americano, pacifico, *boschadis magnitudine, bipedalis et longior.*

Rostrum, pedes*que rubri;* corpus *ex cinereo fuscum, subtus pallidius;* uropygium *albidum;* remiges *majores obscure cinereae;* rectrices 14, *intermediae duae cinereae, reliquae in fuscum vergentes.*

parvus. 31. P. niger, subtus albus, facie plumosa.

Petit fou. *Buff. hist. nat. desois.* 8. *p.* 374.

Fou de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 973.

Lesser Booby. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 614. *n.* 29.

Habitat in Cayenna, *congenerum minimus,* 18 *pollices longus, rostro rectissimo.*

maculatus. 32. P. fuscus albo maculatus, subtus albus, fusco undulatus et maculatus, rostro, remigibus, cauda, pedibusque fuscis.

Fou tacheté. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 375. *Pl. enl. n.* 986.

Spotted Booby. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 614. *n.* 30.

Habitat in Cayenna.

Rostrum *apice flavicans; maculae in* capite *minores, in* dorso *et* alis *maximae;* alae *breves.*

73. PLOTUS. *Roſtrum* rectum, acuminatum, denticulatum.

*Facies mentum*que nuda.

Pedes breves palmati, omnibus digitis connexis.

Anhinga. 1. Pl. capite laevi, abdomine albo.

Anhinga. *Marcgr. braſ.* 218. *Will. orn. p.* 332. *t.* 72. *Raj. av. p.* 124. *n.* 7. *Briſſ. av.* 6. *p.* 476. *n.* 1. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 448.

White-bellied Darter. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 622. *n.* 1.

Habitat in Braſilia, *vix boſchadis magnitudine, et ob collum longiſſimum* 2 *pedes* 10 *pollices longus; carbonis inſtar in arboribus nidificat, partim in harum, ad aquas poſitarum, ſummis ramis, partim in aqua, rariſſime in terra conſpicuus; caro pinguis, at oleoſa et rancida.*

Roſtrum *cinereum, baſi flavicans*; irides *aureae*; caput *exiguum, plumis minutiſſimis veſtitum, cum cervice ex rufo cinereum*; guttur *cinereum*; corpus *ſupra nigrum, pennis ſcapularibus in medio macula alba notatis*; rectrices 12 *latae et longae*; pedes *ex flavicante cinerei.*

melanogaſter. 2. Pl. capite laevi, abdomine nigro.

Anhinga melanogaſter, et Blackbellied Anhinga. *Ind. zool. t.* 12.

Anhinga de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 959.

Blackbellied Darter. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 624. *n.* 2.

β) Plotus maculis ovalibus albis in nucha, hypochondriis, et tectricibus alarum ſeriatim diſpoſitis. *Lath. ſyn.* III. 2. *t.* 106.

Anhinga. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *t.* 35.

γ) Plotus niger, area oculorum gulaque albidis, tectricibus alarum ochroleucis, pennis ſcapularibus nonnullis albo ſtriatis, caudae apice rufo.

Anhinga noir de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 960.

δ) Plotus

Ploti *capite exiguo, collo graeili praelongo, naribus forma fiſſurae longae ad baſin roſtri poſitis facile diſcernendi, in meridionalibus et calidioribus potiſſimum obvii, piſcibus fere ſolis victitant, quos ejaculando roſtrum, dum ſerpentum more contrahunt collum, capiunt.*

δ) Plotus niger, capite, collo et tectricibus alarum rufo-fuſcoque ſtriatis.

Anhinga roux. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 453.
Anhinga du Sénégal. *Buff. pl. enlum. n.* 107.

Habitat in inſulis Zeylon *et* Java, γ) *in* Cayenna, δ) *in* Africa, *anatis magnitudine*, 3 *circiter pedes longus*, *fruticibus ſupra aquam pendentibus inſidens.*

Roſtrum *ſupra caeruleſcens ſubtus rubicundum*; oculi *vividiſſimi*; caput, collum, pectorisque *ſuperior pars pallidiſſime fuſca*, *illa linea laterali lata candida*; dorſum, humeri, tectricesque *alarum lineis albis nigrisque notata*; remiges, venter, femora *et* cauda *anguſta et longa atra*; pedes *pallide vireſcentes.*

furinamenſis. 3. Pl. capite criſtato, abdomine albo.

Grèbe-foulque. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 248. *Pl. enl. n.* 893.
Oiſeau de ſoleil. *Ferm. ſurin.* 2. *p.* 192.
Surinam Tern. *Brown illuſtr. p.* 90. *t.* 39.
Surinam Darter. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 626. *n.* 3.

Habitat in Surinam, *querquedulae magnitudine*, 13 *pollices longus*, *inſectis etiam*, *praeſertim muſcis victitans*, *quas mirifica dexteritate capit*, *agiliſſimus*, *in patria ſaepe cicuratus.*

Roſtrum *pallidum*; irides *rubrae*; vertex *niger*, *criſtatus*; genae *caſtaneae*; *ab* oculis *utrinque linea alba*; cervix *lineis longitudinalibus albis et nigris notata*; alae *magnae*; dorſum *et* cauda *obſcure fuſca*; haec *cuneiformis apice alba*; tectrices *caudae ſuperiores praelongae*; pectus *album*; digiti *nigro-ſtriati.*

74. PHAËTON. *Roſtrum* cultratum, rectum, acuminatum, fauce pone roſtrum hiante.

Nares oblongae.

Digitus poſticus antrorſum verſus.

aethereus. 1. Ph. albus, dorſo, uropygio, et tectricibus alarum minoribus nigro ſtriatis, rectricibus 2 intermediis baſi nigris, roſtro rubro.

Phaëton rectricibus duabus longissimis, rostro serrato, pedibus aequilibribus: digito postico connexo. *Syst. nat.* XII. 1. *p.* 219. *n.* 1.
Lepturus. *Briss. av.* 6. *p.* 480. *n.* 1. *t.* 24. *f.* 1.
Larus leucomelanus, cauda longissima bipenni. *Feuill. per.* 116.
Avis tropicorum. *Sloan. jam.* 1. *p.* 22. *Kalm. it.* 2. *p.* 149. *Osb. it.* 291. *Tetr. antill.* 2. *p.* 276. *t.* 246.
Avis Rabos forcados. *Aldr. orn. l.* 20. *p.* 544.
Rabijuncos. *Ulloa it.* 2. *p.* 305.
Paille en cul. *Pernett. it.* 2. *p.* 75.
Grand paille en cul. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 348. *t.* 28.
Paille en cul de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 998.
Tropic Bird. *Raj. av. p.* 123. *n.* 6. *p.* 191. *n.* 4. *Will. orn. p.* 331. *t.* 75.
Common Tropic Bird. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 615. *n.* 1.

β) Lepturus candidus. *Briss. av.* 6. *p.* 485. *n.* 2. *t.* 42. *f.* 2.
Petit paille en cul. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 355.
Paille en queue de l'isle de France. *Buff. pl. enl. n.* 369.
Tropic Bird. *Catesb. Carol. app. t.* 14. *Brown. jam. p.* 482. *Edw. av. t.* 149. *f.* 2.

γ) Lepturus fulvus. *Briss. av.* 6. *p.* 489. *n.* 3.
Habitat potissimum inter tropicos, *ut tamen, quamvis rarior, ad* $47\frac{1}{2}^{\circ}$ *latitudinis usque occurrat, fallax ideo Indiae propinquae terraeve proximae praesagium, penelopes magnitudine,* 2 *pedes* 10 *pollices longus, altissime et remotissime a terra continente volans, squalis, delphinis, scombris victitans, in terra arbores inhabitat, et in silvarum solo nidificat;* caro *parum sapida;* rectrices *longae ornamenti loco inserviunt.*
Supercilia *nigra;* remiges *majores nigrae, margine albae;* rectrices 14 *albae,* $5\frac{1}{2}$ *pollices longae, extrorsum adhuc breviores; intermediae* 2 *acuminatae,* 20 *pollices et ultra longae, quarta sui parte nigrae;* pedes *obscure flavi;* ungues *nigri.*

melanorhynchos. 2. Ph. albo nigroque striatus subtus albus, rostro nigro, remigum apice albo, rectricum nigro.
Black-billed Tropic Bird. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 619. *n.* 2.
Habi-

Phaëtontis *species in maribus australibus praesertim inter tropicos obviae, rostro compresso paulisper deorsum flexo, mandibula inferiore angulata, pedibus tetradactylis palmatis, cauda cuneiformi, rectricibus duabus intermediis longissimis distinguuntur.*

Habitat in insulis maris australis Turtle *et* Palmerston, *minor aethereo*, 19½ *pollices longus.*
Ante et pone oculos *stria nigra*; frons *alba*; pedes *nigri.*

phoenicu-ros. 3. Ph. pallidissime roseus, rostro rectricibusque duabus intermediis rubris.
Paille en queue à brins rouges. *Buff. hist. nat. desois.* 8. *p.* 357.
Paille en queue de l'isle de France. *Buff. pl. enl. n.* 979.
Red-tailed Tropic Bird. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 619. *n.* 3. *t.* 105.
Habitat in mari indico *et* australi, *non nisi partus et incubationis tempore in terra sicca, sub arboribus in foveis subterraneis nidificans, ovaque* 2 *ochroleuca et rufo-maculata pariens, pedes* 2 *pollicesque* 10 *longus.*
Rostrum 3½ *pollices longum*; arcus *superciliaris niger abruptus*; pennarum *scapularium apex* pedesque *nigri*; rectrices *intermediae* 9 *pollices ultra pedem longae, scapis basique nigrae.*

75. COLYMBUS. *Rostrum* edentulum, subulatum, rectum, acuminatum.

Faux dentata.
Nares lineares ad basin rostri.
Pedes compedes.

* *pedibus tridactylis*, Uriae *vel* Cepphi.

marmoratus. 12. C. supra brunneo-castaneo-fuscoque striatus, subtus obscuro-alboque undalatus, pedibus digitisque fulvis, rostro, cauda, remigibus et unguibus nigris.
Marbled Guillemot. *Arct. zool.* 2. *p.* 517. *n.* 438. *t.* 22. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 336. *n.* 5. *t.* 96.
Habitat in America *occidentali et* Camtschatca, *alce major*, 10 *pollices longus.*
Rostrum *subcompressum*; vertex *obscurus*; tectrices *alarum obscurae, majores nonnullae margine albae*; mentum *et* gula *obscura, lituris albis.*

lacteolus. 13. C. niveus, rostro pedibusque ex carneo fuscescentibus.
Cepphus lacteolus. *Pall. spicil.* 5. *p.* 33.

White Guillemot. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 335. *n.* 4.

β) Colymbus macula nigra utrinque pone oculos, interscapuliis et areis alarum nigris, mandibula superiore nigra, inferiore flavescente. *Sander Naturf.* 13. *p.* 192.

Habitat in occidentali Belgii *littore*, β) *ad Rhenum*, *querquedulae magnitudine.*

Os *intus albidum*; lingua *triquetra*, *supra canaliculata*, *apice integra*; irides *fuscae*; dorsum, alae, caudae*que basis superne dilutissime grisea*; remiges 27 *albidae*, *ad rhachin ex griseo fuscescentes*, *extima longissima*; rectrices 12 *subattenuatae*; ungues *nigricantes.*

Grylle. 1. C. corpore atro, tectricibus alarum albis. *Fn. suec.* 148. *Brünn. orn. n.* 113. *Gunn. act. nidros.* 1. *p.* 258. *t.* 4.
Uria minor nigra. *Briss. av.* 6. *p.* 76. *n.* 3.
Uria Grylla. *Oedman nov. act. Stockh.* 1781. 3. *n.* 4. *p.* 224.
Kajaver or Cajor. *Kraschenn. Camtschatc. p.* 157.
Petit guillemot noir. *Buff. hist. nat. des ois.* 9. *p.* 354. *Pl. enl. n.* 917.
Groenland Dove or Sea turtle. *Raj. av. p.* 121. *n.* 6. *Will. orn. p.* 326. *t.* 78. *Alb. av.* 2. *t.* 80.
Black Guillemot. *Brit. zool. n.* 236. *Arct. zool.* 2. *p.* 516. *n.* 437. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 332. *n.* 3.
Groenlaendische Taube. *Frisch av. t.* 185. *Anders. Groenl.* 2. *p.* 54. *t.* 1. *Martens Spitzb.* 56. *t.* L. *f.* B.

β) Colymbus fuliginosus, alarum macula oblonga transversa alba.

γ) Uria

Colymbi *nequeunt incedere, at citissime supra aquam currunt et egregie natant atque urinantur, cute gaudent tenaci et cauda brevi; species primae sectionis maris potissimum incolae, linguam habent gracilem rostri magnitudine, rostri compressi basin plumis brevibus tectam, mandibulam superiorem apice paulisper flexam, carnem tenacem ovaque nauseosa, Groenlandorum tamen et Camtschadalorum palato non detestata, quibus etiam cutis in vestimentum cadit, nuda in rupibus deponunt, gregatim vivunt, in scopulis paulisper incedunt, velociter volando ascendunt; aves secundae sectionis borealium regionum lacus quoque adeunt, rostro robusto, minus acuto, cylindrico, mandibularum margine introflexo, superiore mandibula longiore, naribus supra membranula intermedia divisis, lingua longa, acuta, ad basin utrinque serrata, pedibus tenuibus, complanatis, fascia nigra inter femora, rectricibus 20 distinctae, monogamae, ova in cespite ponunt, difficile volant, incubationis tempore in aquis dulcibus degunt. Aves 3 sectionis cauda carent; rostrum iis est robustum, lora calva, lingua apice leviter fissa, corpus depressum, plumis mollibus nitentibus dense tectum, alae breves, pedes compressi; hae in aquis dulcibus Europae australioris frequentiores, pro sexus, crebrius pro aetate annive tempore, colore diversae.*

γ) Uria minor ſtriata. *Briſſ. av.* 6. *p.* 78. *n.* 4.
Spotted Greenland Dove. *Edw. av. t.* 50.
δ) Uria balthica. *Brünn. orn. n.* 116.
ε) Colymbus ſubtus albus nigro-lineatus, cervice cineraſcente.
ζ) Uria grylloides. *Brünn. orn. n.* 114. *Gunn. act. nidr.* 1. *p.* 258.
Spotted Guillemot. *Brit. zool.* 2. *t.* 83. *f.* 2.
Taiſte. *Ström. ſondm. p.* 258.
Bunte Haubentaeucher. *Wallbaum monogr. Lub.* 1778. 8.
Habitat in Americae, Europae, Aſiae *borealis mari, et intra ipſum circulum* arcticum, *varietate pro ſexu, aetate, anni tempore, climate multiplici, ut aliquando totus ſit niveus*, 13-14 *pollices longus, ſibilans, non alte, utplurimum per paria volans, piſcibus victitans, ſub terra nidificans, ovum cinereum, aut bina albida gallinaceis aequalia, cinereo et nigro maculata pariens.*
Roſtrum *nigrum*; faux pedesque *rubri*; ungues *nigri*; feminae *abdomen album*; pullus *annotinus adſperſus maculis albis et nigris*; hieme *caneſcit avis capite, collo et dorſo anteriore.*

minor. 14. C. niger, alarum faſcia anguſta, genis ſubtusque albus.
Kinguia. *Brünn. orn. n.* 110. 111. *Scop. ann.* 1. *n.* 103.
Leſſer Guillemot. *Brit. zool. n.* 235. *t.* 83. *f.* 1.
Habitat rarior Troile, hujus forſan pullus, ad littora magnae Britanniae, *gregibus numeroſiſſimis ſprattos perſequens, Troile minor*, 16 *pollices longus.*

Troile. 2. C. corpore nigro, pectore abdomineque niveo, remigibus ſecundariis apice albis. *Faun. ſuec.* 149. *Brünn. orn. n.* 108.
Uria. *Briſſ. av.* 6. *p.* 70. *n.* 1. *t.* 6. *f.* 1.
Lomvia. *Cluſ. exot.* 367. *Will. orn.* 244. *t.* 65. *Raj. av.* 120.
Guillemot or Sea-hen. *Alb. av.* 1. *t.* 84. *Edw. glean. t.* 359. *f.* 1. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 9. *p.* 350. *t.* 25. *Pl. enlum. n.* 903.
Fooliſh Guillemot. *Brit. zool. n.* 234. *Arct. zool.* 2. *p.* 516. *n.* 436. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 329. *n.* 1.
Lumme. *Martens Spitzb.* 57. t. M. *f.* A. *Friſch av. t.* 185.
Habitat in gelido mari Americae, Europae *et* Aſiae *borealis, gregatim non raro in* Angliam *et* Italiam *migrans*, 17 *pollices longus, ovum magnum tres pollices longum ex caeruleſcente album, vel pallide marinum, inaequaliter nigro-maculatum ſtriatumque pariens.*

Roſtrum *nigrum*; faux *flava*; caput, collum, dorſum, alae *et* cauda *ex atro murina*; remigum *majorum apices albi*; pedes *obſcuri*.

** *pedibus tetradactylis palmatis*, Mergi.

ſinenſis. 15. C. ex obſcuro vireſcente fuſcus, mento, pectore et abdomine rufeſcente, alis caudaque fuſcis.
Chineſe Diver. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 345. *n.* 7. *t.* 97.
Habitat in Sina? *inter eas forte aves, quas Sinenſes piſcatui adhibent.*
Roſtrum *obſcurum*; irides pedes*que cinerei*; pennae *medio obſcuriores, gutturis pallidiores.*

ſtriatus. 16. C. ſubtus albus, capite colloque dilute cinereis nigro-ſtriatis, dorſo, remigibus primariis, cauda, pedibusque obſcuris.
Striped Diver. *Arct. zool.* 2. *p.* 519. *n.* 442. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 345. *n.* 6.
Habitat in lacubus circa ſinum Hudſonis, 2-3 *libras pondere aequans, clamoroſus, alte, retrorſum et antrorſum volans, Junio* 2 *ova pariens, incolis deteſtatus.*
Roſtrum *robuſtum, nigrum*; genae *albae.*

ſeptentrionalis. 3. C. collo ſubtus macula ſcutiformi ferruginea.
Colymbus (Lumme) corpore ſupra nigricante ſubtus albo, collo antice ferrugineo. *Brünn. orn.* 132.
Colymbus arcticus collo rufo. *Gunner act. Nidroſ.* I. *p.* 244. *t.* 2. *f.* 2.
Colymbus arcticus. *Ström. ſöndm.* I. *p.* 243.
Mergus gutture rubro. *Briſſ. av.* 6. *p.* 111. *n.* 3. *t.* 11. *f.* 1.
Plongeon à gorge rouge. *Buff. pl. enl. n.* 308.
Petit plongeon du mer de Nord. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 261.
Red-throated Loon. *Edw. av. t.* 97.
Red-throated Diver. *Brit. zool. n.* 240. *t.* 85. *f.* 1. *Arct. zool.* 2. *p.* 520. *n.* 443. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 344. *n.* 5.
Habitat in Americae, Europae, Aſiae *borealis, non niſi gelidiſſima hieme, magis auſtralis lacubus, crebrius hos frequentans, quam mare, victitans vermibus marinis, cancris, piſcibus minoribus, quos in ipſis retibus concluſos aufert, cum praeda non raro captus; nidum ad aquas in medio gramine ex muſcis et gramine ſtruit, nonnunquam lanugine propria farcit, et ova* 2 *cinerea nigromaculata, gallinaceis longiora et graciliora parit; natat veloci-*

velociter, egregie volat, et volitando miſere clamans tempeſtates praeſagire fertur, duo pedes, 5 pollices longus.
Roſtrum *nigrum*; caput *et* mentum *cinereum, fuſco-maculatum*; colli *latera et* gula *cinerea*; cervix *lineolis albidis et fuſcis*; jugulum *ſpadiceum*; corpus *ſupra obſcurum albo-maculatum, ſubtus album*; pedes *obſcuri.*

arcticus. 4. C. capite cano, collo ſubtus atro-violaceo: faſcia alba interrupta.

Colymbus arcticus. *Fn. ſuec.* 150. *It. gotl.* 341. *Jacquin Beytr. t.* 7.

Colymbus (arcticus) capite colloque cinereis, gutture nigro-violaceo, dorſo nigro maculis quadrangularibus albis. *Brünn. orn.* 133.

Colymbus arcticus Lumme. *Will. orn.* 259. *t.* 62. *Raj. av.* 125. *n.* 7.

Colymbus arcticus Hymber. *Gunner act. Nidroſ.* 1. *p.* 140. *t.* 2. *f.* 1.

Mergus gutture nigro. *Briſſ. av.* 6. *p.* 115. *n.* 4.

Hirundinis aquaticae ſpecies exotica. *Besl. muſ.* 31. *t.* 17.

Lumme. *Worm. muſ.* 304. *t.* Q. Q. *Muſ. Hafn.* 1. *ſ.* 2. *n.* 2. *t.* 1. *n.* 2.

Lumme ou petit plongeon de la mer du Nord. *Buff. hiſt. nat des oiſ.* 8. *p.* 261.

Wormius's northern Ducker. *Will. orn. p.* 343. *t.* 62.

Speckled Loon. *Edw. av. t.* 146.

Black throated Diver. *Brit. zool.* 2. *n.* 241. *t.* 85. *f.* 2. *Arct. zool.* 2. *p.* 520. *n.* 444. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 343. *n.* 4.

Habitat in Americae, Europae *et* Aſiae *borealis lacubus et mari*, 2 *pedes longus*, *imminente pluvia inquietus et clamoroſus, hinc Norwegis ſacer; Suecis pellis praeparata in varios uſus adhibetur.*

Roſtrum, pedes, frons, gula, cauda *et totum* corpus *ſupra nigrum, hoc ſubtus album*; occiput *et* cervix *cinerea*; *latera* colli *alba, nigro-maculata*; humeri tectricesque *alarum maculis albis, illi quadrangularibus, hae orbiculatis notatae*; remiges *obſcurae.*

ſtellatus. 17. C. ſubtus albus, occipite remigibusque obſcuris, jugulo pallide cinereo, dorſo, hypochondriis, uropygio et cauda albo maculatis.

Colymbus ſtellatus. *Brünn. orn. n.* 130.

Colymbus caudatus ſtellatus. *Nov. comm. Petrop.* 4. *p.* 424. *Will. orn. t.* 62.

Mergus minor. *Briſſ. av.* 6. *p.* 108. *n.* 2. *t.* 10. *f.* 2.
Petit plongeon. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 254. *t.* 21. *Pl. enl. n.* 992.
Greateſt tailed Diver or Loon. *Raj. av. p.* 125. A. 4. *Will. orn. p.* 341. *t.* 61.
Greateſt ſpeckled Loon. *Albin. av.* 1. *t.* 82.
Speckled Diver. *Brit. zool. n.* 239. *Arct. zool.* 2. *p.* 519. *n.* 441. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 341. *n.* 3.
Habitat in America, Aſia *et* Europa *ſeptentrionali ad* Thameſin Angliae *et piſcinas* Galliae *usque*, 27 *pollices longus, ſprattos venans gregatim, ad lacuum maritimorum ripas in gramine deponens ova* 2, *exacte ovalia, anſerinis aequalia, obſcura, pauliſper nigro-maculata.*

glacialis. 5. C. capite colloque nigro-violaceo, faſcia gulae cervicisque alba interrupta. *Fabr. fn. groenl. n.* 62.
Colymbus (torquatus) capite colloque nigro-virescentibus, medio colli torque ex albo nigroque, dorſo maculis quadratis albis. *Brünn. orn.* 134.
Colymbus maximus ferroenſis ſ. arcticus. *Cluſ. exot.* 102. *Worm. muſ.* 303. *Nieremb. nat.* 216.
Colymbus maximus caudatus. *Raj. av. p.* 125. A. 4.
Colymbus maximus ſtellatus. *Sibb. Scot.* 2. *p.* 20. *t.* 15. *f.* 1.
Mergus major naevius. *Briſſ. av.* 6. *p.* 120. *n.* 6. *t.* 11. *f.* 1.
Imbrim. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 258. *t.* 22. *Pl. enl. n.* 952.
Greateſt ſpeckled Diver or Loon. *Will. orn. p.* 341. *Albin. av.* 3. *t.* 93.
Northern Diver. *Brit. zool.* 2. *n.* 237. *t.* 84. *Arct. zool.* 2. *p.* 518. *n.* 439. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 337. *n.* 1.
b) Mergus naevius (*junior avis*). *Briſſ. av.* 6. *p.* 117. *n.* 5.
Habitat in mari boreali, *rarius ad littora, nec niſi gelidiſſima hieme in auſtralioribus conſpicuus, cum anni tempore migrans, congenerum maximus, et* 3 *pedes ſexque pollices longus, femina tamen minor,* 2 *magna ova fuſcescentia parit; egregie et altiſſime volat; dexterrime piſcatur; pellis a Barabintis in veſtimenti genus paratur.*
Corpus *ſupra, cum roſtro, cauda, pedibusque nigrum, ſubtus album;* dorſum *maculis albis quadratis in ſeries diſpoſitis;* litura *ſubmentalis*, colli pectorisque *latera alba nigro-ſtriata;* alae *breves.*

Immer. 6. C. corpore ſupra nigricante albo undulato, ſubtus toto albo. *Brünn. orn.* 129. *Gunner act. Nidroſ.* 1. *p.* 246. *t.* 13. *Ström. ſöndm.* 1. *p.* 236.

Colym-

Colymbus maximus Gesneri. *Raj. av. p.* 126. *n.* 8. *Will. orn. p.* 342.
Mergus major. *Briss. av.* 6. *p.* 105. *n.* 1. *t.* 10. *f.* 1.
Grand plongeon. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 251. *Pl. enl. n.* 914.
Embergoose. *Sibb. Scot. p.* 21. *Wallace Orkn. p.* 16. *Debes Ferroë Isles. p.* 138. *Pontopp. Dan.* 2. *p.* 80.
Imber. *Brit. zool. n.* 238. *t.* 84. *Arct. zool.* 2. *p.* 518. *n.* 440. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 340. *n.* 2.
Habitat in mari boreali, *migrans nonnunquam ad lacum* Acronium *usque*, *duobus pedibus longior*, *voce acuta*, *difficulter capiendus*, *inter carices et arundines nidificans in aqua ipsa.*
Color *praecipuus fuscus*, *subtus albus*; frons, capitis colli-*que latera*, *et* crissum *fusco-maculata*; dorsi *pennae*, remiges rectrices*que margine albae*; pedes *obscuri.*

* * * *pedibus tetradactylis lobatis*, Colymbi.

cristatus. 7. C. capite rufo, collari nigro, remigibus secundariis albis. *Fn. suec. n.* 151. *Scop. ann.* 1. *n.* 99. *Brünn. orn. n.* 55. *Nozem. nederl. Vogel t.* 87.
Colymbus major cristatus et cornutus. *Gesn. av.* 139. *Aldr. orn.* 3. *p.* 253. *t.* 255. *Raj. av. p.* 124. *Marsd. dan.* 80. *t.* 38.
Colymbus cristatus. *Briss. av.* 6. *p.* 38. *n.* 2. *t.* 4.
Colymbus major secundus. *Aldr. orn.* 3. *p.* 251.
Mergus alius in lacu Tigurino. *Gesn. av.* 138. *t.* 139.
Ardea exotica aurita. *Pet. gaz.* 68. *t.* 43. *f.* 2.
Avis cucullatae exoticae admiranda species. *Besl. mus.* 32. *t.* 8.
Grèbe huppé. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 233. *Pl. enl. n.* 944.
Greater crested and horned Ducker. *Will. orn. p.* 340. §. 4. 5. *t.* 61. *Plot Staffordsh. p.* 229. *t.* 22. *Alb. av.* 1. *t.* 81. 2. *t.* 75.
Great crested Grebe. *Brit. zool.* 2. *n.* 223. *Arct. zool.* 2. *p.* 498. A.
Crested Grebe. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 281. *n.* 1.
β) Colymbus cornutus. *Briss. av.* 6. *p.* 45. *n.* 4. *t.* 5. *f.* 1.
Grèbe cornu. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 235. *t.* 19. *Pl. enl. n.* 400.
γ) Colymbus rostro nigro, collo badio. *Beseke Schr. der berl. naturf. Ges.* 7. *p.* 460.

δ) Colymbus fuliginosus subtus fuscescens orbitis flavescentibus, gula alba, alis nigricantibus. *Beseke Schr. der. berl. naturf. Ges.* 7. *p.* 460.

Habitat in Europae *et* Sibiriae *lacubus, vix unquam in terra conspicuus, anatis domesticae magnitudine,* 23 *pollices longus, piscibus, interdum quoque vegetabilibus victitans, nidum fluitantem ex menganthe, nymphaea, Hottonia &c. struens, et ova* 4 *alba, columbinis aequalia pariens.*

Rostrum *incarnatum apice fuscum*; lora irides*que rubrae*, pedes *obscuri*; color *corporis pro aetate varius*; caput *nigrum tumidum, maris adhuc magis, quam feminae, pennis versus occiput elongatis, ut aurium speciem mentiantur, circulari tandem ambitu*; cervix, alae *et* corpus *supra fuscum, subtus cum temporibus* alarum *fascia obliqua et margine superiore argentei candoris.*

subcristatus. 18. C. crista capitis nigri brevissima truncata, taenia suboculari nivea. *Jacquin Beytr. p.* 37. *t.* 18.

Habitat in Austria *ad lacum* Lensee *prope* fanum D. Georgii, *anatis domesticae magnitudine.*

Rostrum *nigrum, basi utriusque mandibulae aurantia*; vertex *depressus*; irides *spadiceae*; genae, aurium *regio et* gula *cinereae*; collum *supra nigrum, subtus et ad latera badium*; dorsum *nigrum, pennarum margine obsolete fusco*; pectoris *et* abdominis *plumae sericeae ex argenteo cinereae*; crissum *album*; alae *subrotundae, supra nigrae, subtus albae*; pedes *breves nigri*; unguibus *brevibus, latiusculis, obtusis, cinereis.*

auritus. 8. C. capite nigro, auribus cristato-ferrugineis. *Fn. suec.* 152. *Scop. ann.* 1. *n.* 100. *Brünn. orn. n.* 136. 137.

Colymbus auritus. *Briss. av.* 6. *p.* 54. *n.* 6.

Merguli genus alterum. *Gesn. av.* 141.

Petit Grèbe huppé. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 235.

Eared Dobchick. *Edw. av. t.* 96. *f.* 2.

Eared Grebe. *Brit. zool.* 2. *n.* 224. *t.* 79. *Artt. zool.* 2. *p.* 499. B. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 285. *n.* 4.

β) Colymbus cornutus minor. *Briss. av.* 6. *p.* 50. *n.* 5. *t.* 3. *f.* 2.

Colymbus minor. *Aldr. orn.* 3. *p.* 256.

Colymbus nigricans. *Scop. ann.* 1. *n.* 101.

Colymbus seu podiceps minor. *Will. orn.* 258. *t.* 61. *Sloan. jam.* 2. *p.* 322. *t.* 271. *f.* 1. *Raj. av.* 125. *Marsh. dan.* 82. *t.* 39. *Albin. av.* 2. *t.* 67.

Ashcoloured Loon. *Raj. av. p.* 124. *Will. orn. p.* 340. *t.* 61.

Habitat

Habitat in Europae *borealis et* Sibiriae *lacubus, nidum natantem conficiens inter arundines, querquedulae magnitudine, 12 pollices longus.*

Irides *et* lora *rubra;* roſtrum pedes*que nigri, illius baſis rubicunda; pone oculum utrinque faſciculus magnus, feminae minor pennarum ferruginearum;* corpus *ſupra obſcurum aut nigrum, ſubtus album;* remiges *primariae obſcurae, ſecundariae albae.*

cornutus. 19. C. capite viridi-nitente, faſcia oculari flava poſterius in criſtae ſpeciem elongata.

Eared or horned Dobchick. *Edw. av. t.* 49.

Horned Grebe. *Arct. zool.* 2. *p.* 497. *n.* 417. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 287. *n.* 6. *t.* 91.

Habitat in America *ſeptentrionali, querquedulae magnitudine, pedem longus, 2-4 ova alba medias inter aquaticas plantas pariens.*

minor. 20. C. ſpadiceus, ſubtus albus maculatus, capite laevi.

Colymbus fluviatilis. *Briſſ. av.* 6. *p.* 59. *n.* 9.

Colymbus parvus. *Bell. av.* 38.

Colymbus minor Bellonii. *Aldr. orn.* 3. *p.* 257. *t.* 258.

Colymbus vel Urinatrix. *Geſn. av.* 128.

Mergus parvus fluviatilis. *Geſn. av.* 141.

Urinatricum tertium genus. *Aldr. orn.* 3. *p.* 257.

Grèbe de riviere ou Caſtagneux. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 244. *t.* 20. *Pl. enl. n.* 905.

Didapper, Dipper, Dobchick. *Raj. av. p.* 125. *n.* 3. *Will. orn. p.* 340. *t.* 61.

Little Grebe. *Brit. zool.* 2. *n.* 226. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 289. *n.* 10.

Kleiner Taucher. *Friſch av. t.* 184.

β) Caſtagneux des Philippines. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 246. *Pl. enl. n.* 945.

Habitat in Europae *et ſeptentrionalis* Americae, β) *in* Philippinarum *inſularum aquis dulcibus frequentiſſimus,* 10 *pollices longus, omnium dexterrime urinans, piſcibus, inſectis plantisque aquaticis victitans, nidum ex gramine ſtirpibusque aquaticis in media aqua ſtruens, perpetim humidum, magnum, pedem craſſum; ova* 5-6 *ochroleuca pariens;* mas *et* femina *ſimilis.*

Roſtrum *ſpadiceum;* irides *avellanae colore;* tempora, mentum *et* jugulum *ex flavicante griſea;* abdomen *maculis cinereis et rubris varium;* pedes *ſordide virides.*

21. C.

Parotis. 21. C. capite laevi nigro, gulae, aurium ac suboculari regionibus albis nigro-lineatis. *Sparrm. mus. Carls. t.* 9
Cervix *et* dorsum *nigra*; colli *latera, et* jugulum *ferruginea*; pectus, abdomen *et* alarum *macula bipollicaris alba.*

Ludovicianus. 22. C. capite laevi fusco, corpore fusco, lateribus ferrugineo, pectoris medio albo.
Grèbe de la Louisiane. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 240. *Pl. enl. n.* 943.
Louisiane Grebe. *Arct. zool.* 2. *p.* 498. *n.* 419. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 289. *n.* 9.
Habitat in Louisiana.
Corpus *subtus maculis transversis magnis nigris varium*; pedes *obscuri.*

thomensis. 23. C. capite laevi, macula inter rostrum et oculos alba, corpore supra fusco, subtus albo.
Colymbus insulae S. Thomae. *Briss. av.* 6. *p.* 58. *n.* 8.
Grèbe Duc-laart. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 240.
Blackbreasted Grebe. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 289. *n.* 8.
Habitat in insula S. Thomae.
Rostrum *nigrum*, *apice pallidum*; irides *albae*; pectoris *area magna*, *nigra*; abdomen *et* hypochondria *grisco-maculata*; tectrices *alarum rufescentes*; pedes *obscuri.*

rubricollis. 24. C. capite laevi, genis, gula, remigibus secundariis et abdomine albis, jugulo ferrugineo.
Grèbe à joues grises, ou Jougris. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 241. *Pl. enl. n.* 931.
Red-necked Grebe. *Arct. zool.* 2. *p.* 499. C. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 288. *n.* 7.
Habitat in Norwegia *et* Dania, *etiam ad* mare Caspium, *ad* 17 *pollices longus.*
Corpus *fuscum*; remiges *secundariae striis paucis fuscis*; pedes *obscuri.*

obscurus. 25. C. capite laevi, fronte, corpore subtus, et remigum secundariarum apice albis.
Colymbus minor. *Briss. av.* 6. *p.* 56. *n.* 7.
Petit Grèbe. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 232. *Pl. enl. n.* 942.
Black and white Dobchick. *Edw. av. t.* 96. *f.* 1.
Dusky Grebe. *Brit. zool.* 2. *n.* 225. *Arct. zool.* 2. *p.* 498. *n.* 420. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 286. *n.* 5.
Habitat in Anglia *et* Noveboraco, *creccae magnitudine*, 11 *pollices longus.*

Rostrum

Roſtrum *nigrum*, *ad latera rubrum*; irides *et* lora *rubra*; corpus *fuſcum*; alarum *margo ſuperior albus*; pedes *incarnati*, *purpura admixta*; collum *interdum cinereum*.

cayennenſis. 26. C. capite laevi, gutture rufo, pectore et abdomine albis.
Grand Grèbe. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 242.
Grèbe de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 404. *f.* 1.
Cayenne Grebe. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 284. *n.* 3.
Habitat in Cayenna, 19½ *pollices longus.*
Corpus *fuſcum*; pedes *et* roſtrum *obſcurum*; mandibula *inferior baſi flava.*

Urinator. 9. C. capite laevi, palpebra inferiore lutea, macula alarum alba. *Scop. ann.* 1. *n.* 102.
Colymbus. *Briſſ. av.* 6. *p.* 34. *n.* 1. *t.* 3. *f.* 1.
Colymbus major. *Raj. av. p.* 125. *n.* 6.
Grèbe. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 227. *Pl. enl. n.* 941.
Greater Loon or Arſefoot. *Will. orn. p.* 339.
Greater Dobchick. *Edw. glean. t.* 360. *f.* 2.
Tippet Grebe. *Brit. zool. n.* 222. *t.* 78. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 283. *n.* 2.
Habitat in Europa auſtrali, *praeſertim lacu* Genevenſi, *etiam in* Sibiriae *lacubus*, *rarior in* Anglia, *an vere diſtinctus ſpecie a criſtato?*
Corpus *ſupra nigrum*, *ſubtus album*; linea *nigra inter oculos et roſtrum*; colli *latera lineis anguſtis nigris et albis.*

caſpicus. 27. C. capite laevi, corpore ſupra ex fuſco nigricante, infra ex argenteo albo, roſtro plumbeo, gula genisque albis, tectricibus alarum fuſcis. *Habitat apud* S. G. *Gmelin it.* 4. *p.* 137. *et n. nord. Beytr.* 4. *p.* 9.
Habitat in mari Caſpio.

dominicus. 10. C. capite laevi, corpore ſubtus confertim maculato.
Colymbus fluviatilis dominicenſis. *Briſſ. av.* 6. *p.* 64. *n.* 11. *t.* 5. *f.* 2.
Plongeon. *Fermin ſurin.* 2. *p.* 155.
Caſtagneux de S. Domingue. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 248.
Twopenny Chick. *Hugh. Barbad. p.* 72.
White-winged Grebe. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 291. *n.* 11.
Habitat in inſula S. Dominici, Jamaica, Cayenna, Surinamo, *minoris magnitudine*, *vix* 8 *pollices longus*, *piſcibus victitans.*

Roſtrum

Roſtrum *nigrum*; corpus *obſcurum*; tempora, mentum, *et* guttur *obſcure cinerea*; pectus *et* abdomen *argenteum*, *maculis exiguis fuſcis*; remiges *ex cinereo albae*; pedes *fuſci*.

hebridicus. 28. C. capite laevi, mento nigro, gutture ferrugineo, abdomine cinereo et argenteo.
Black-chin Grebe. *Brit. zool.* 2. *n.* 227. *t.* 79. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 292. *n.* 12.
Habitat in inſula Tirée, *minore paulo major.*
Occipitis *tinctus obſcurus.*

Podiceps. 11. C. corpore fuſco, roſtro faſcia ſesquialtera.
Colymbus fluviatilis carolinenſis. *Briſſ. av.* 6. *p.* 63. *n.* 10.
Caſtagneux à bec cerclé. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 247.
Pied-bill Dobchick. *Catesb. Car.* 1. *t.* 91.
Pied-bill Grebe. *Arct. zool.* 2. *p.* 497. *n.* 418. *t.* 22. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 292. *n.* 13.
Habitat in America, *a* Noveboraco *ad* Carolinam *auſtralem usque*, 14 *pollices longus.*
Roſtrum *olivaceum*, *baſi obſcurum*, *faſcia* (maris) *transverſa media nigra*; nares *amplae*; irides *albae*; mentum *et* gula *nigra*, *albo limite circumſcripta* (feminae *obſcura*); cervix *et* dorſum *obſcura*; genae *et* nucha *fuſceſcentes*; alae *fuſcae*, remigum *ſecundariarum apice albo*; abdomen *et* pectus *argentea*; *hoc maculis cinereis varium.*

76. LARUS.

Roſtrum edentulum, rectum, cultratum, apice ſubadunco: Mandibula inferior infra apicem gibba.

Nares lineares, antice latiores, in medio roſtri ſitae.

Riga. 1. L. albus, dorſo cano, rectricibus albis totis, pedibus tridactylis. *Brünn. orn.* 140.

Kitti-

Lari *origine ſua borenles, corpore levi, alis longis, lingua pauliſper ſiſſa, roſtro robuſto, pedibus brevibus, ſupra genua denudatis, pollice exiguo, aequabiliori omnium partium proportione, facile, praeſertim a ſternis diſcernendi, piſcibus praeſertim victitant, mortuis quoque, agitati, evomunt vel explodunt ingeſtum cibum; pulli ad tertium interdum annum maculati; hinc ſpecierum limites tam difficulter definiendi, toties praeterviſi: Ova eſculenta, vix care.*

Kittiwake. *Brit. zool.* 2. *n.* 250. *t.* 89. *Arct. zool.* 2. *p.* 529. *n.* 456. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 393. *n.* 19.

Habitat in maribus borealibus Americae, Europae *et* Asiae, 14 *pollices longus; an sola aetate distinctus a tridactylo?*

Rostrum *flavum, viridi tinctu*; caput (*macula nonnunquam obscura pone aures*), collum, abdomen *et* cauda *nivea*; alae *canae*, remigis *primae margo exterior, et* 4-5 *proximarum apex albus*; pedes *obscuri; loco* digiti *posterioris gibbositas exigua.*

tridactylus. 2. **L.** albicans, dorso canescente, rectricum apicibus excepto extimo nigris, pedibus tridactylis. *Fn. suec.* 157.

Larus dorso canescente, digito postico mutico. *Oedmann nov. act. Stockh.* 1783. 2. *n.* 1. *p.* 110.

Larus cinereus. *Bell. av.* — *Raj. av. p.* 128. *n.* 4.

Gavia cinerea naevia. *Briss. av.* 6. *p.* 185. *n.* 11. *t.* 17. *f.* 2.

Mouette cendrée tachetée. *Buff. hist. nat. desois.* 8. *p.* 424. *Pl. enl. n.* 387.

Tarrock. *Brit. zool.* 2. *n.* 251. *Arct. zool.* 2. *p.* 533. D. *Raj. av. p.* 128. A. 4. *Will. orn. p.* 346. *t.* 68. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 392. *n.* 18.

β) Larus major, nucharum pennis apice fascia nigra, tectricibus alarum apice nigris.

Habitat in Europa *et* Asia septentrionali, 14, *β*) 19 *pollices longus, turturis magnitudine, egregie natans et volans, clamorosus, piscibus victitans, victumque quaesiturus balaenas et phocas concomitans, in rupibus sinuum maris nidificans, ovaque* 2 *pariens ex virescente cinerea, fusco maculata, Groenlandis cum carne avis ipsa valde expetita, qui etiam cutem vestimentis adhibent.*

Rostrum *nigrum, crassum, robustum*; caput, collum, pectus *et* abdomen *alba*; *pone* aures *utrinque macula, in* cervice *lunula nigra*; rectrices *intermediae* 10 *apice nigrae, reliquae totae albae*; femora *denudata virescentia*; pollex *obsoletus, muticus.*

minutus. 12. **L.** niveus, capite cum initio colli atro, dorso alisque leucophaeis, rostro e fusco rubro, pedibus coccineis. *Pall. it.* III. *p.* 702. *n.* 35. *Oedm. nov. act. Stockh.* 1783. 2. *n.* 1. *p.* 120.

Little Gull. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 391. *n.* 17.

Habitat in Russia, *frequentior in* Sibiria *australi, ad littora maris* Caspii *ripasque fluminum, in illud emanantium, aestate ad* Volgam *versus boream migrans, turdi viscivori magnitudine.*

Irides *caerulescentes.*

hyber-nus. 13. L. albus, vertice, occipite et colli lateribus maculatis, dorso cinereo, remigum prima nigra, cauda versus apicem fascia nigra.

Gavia hyberna. *Briss. av.* 6. *p.* 189. *n.* 12.
Mouette d'hyver. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 437.
Guaca-guacu. *Raj. av. p.* 130. *n.* 12. *Will. orn. p.* 352.
Winter-Mew or Coddy-Moddy. *Brit. zool.* 2. *n.* 248. *t.* 86. *Raj. av. p.* 130. A. 14. *Will. orn. p.* 350. *t.* 66. *Albin. av.* 2. *t.* 87.
Winter-Gull. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 384. *n.* 13.
Habitat in Angliae, *nonnunquam interioribus*; 18 *pollices longus, parum digestas vermium, ranarum, testudinum &c. reliquias gelatinosa quadam forma evomens, quae in* Anglia Star-shot, *aut* Star-jelly *audit.*
Rostrum *gracile, corneum, apice nigrum*; irides *colore avellanae*; *maculae* capitis *oblongae, obscurae*; remigum *prima nigra*, 6 *insequentes apice magis minusve nigrae, ceterae albae*; pedes *ex caerulescente sordide albi*; *an junior canus?*

eburneus. 14. L. totus albus, orbitis croceis, rostro pedibusque plumbeis. *Phipps it. p.* 187.

Larus niveus totus, rostro pedibusque plumbeis. *Oedm. act. nov. Stockh.* 1783. 2. *n.* 1. *p.* 99.
Larus candidus. *Fabr. Fn. groenl. n.* 67.
Mouette blanche. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 422. *Pl. enl. n.* 994.
Senateur. *Salern. orn. p.* 382.
Ivory Gull. *Act. zool.* 2. *p.* 529. *n.* 457. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 377. *n.* 7.
Rathsherr. *Martens Spitzb. p.* 77.
Habitat in maribus quam maxime borealibus, praesertim glaciali, vix in terra conspicuus, nisi incubationis tempore, tunique stupidus, 16 *pollices longus, voce debili, rosmari etiam cadavere vescitur.*
Alae *cauda pedibusque longiores*; ungues *nigri*; *trienni junior avis maculis oblongis nigris notata, rostro nigro.*

canus. 3. L. albus, dorso cano. *Fn. suec.* 153. *Hasselq. it. p.* 272. *n.* 39. *Scop. ann.* 1. *n.* 104. *Brünn. orn. n.* 141. *Georg. it. p.* 170.
Larus dorso cano, pedibus flavis. *Oedm. nov. act. Stockh.* 1783. 2. *n.* 1. *p.* 107.
Larus cinereus minor. *Aldr. orn.* 3. *p.* 73. *t.* 75. *Nozem. nederl. Vogel t.* 55. 56.

Gavia

Gavia cinerea. *Briſſ. av.* 6. *p.* 175. *n.* 8. *t.* 16. *f.* 1.
Common Sea-mall or Mew. *Raj. av. p.* 127. *A.* 3. *Will. orn. p.* 345. *t.* 76.
White web-footed Gull. *Alb. av.* 2. *t.* 84.
Common Gull. *Brit. zool.* 2. *n.* 249. *t.* 89. *f.* 2. *Arct. zool.* 2. *p.* 530. *n.* 458. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 378. *n.* 8.
β) Gavia cinerea major. *Briſſ. av.* 6. *p.* 182. *n.* 10. *t.* 16. *f.* 2.
Grande Mouette cendrée. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 428. *Pl. enl. n.* 977.
Habitat gregarius et frequentiſſimus ad Europae *et* Americae, *etiam maxime borealis flumina et lacus, ad ipſum mare* Caſpium, 16 *pollices longus, columbae magnitudine, continue et horrende clamans, vermibus, larvis inſectorum, piſcibus victitans, in rupibus ſcopulisque ova* 2, $2\frac{1}{2}$ *pollices longa, obſcure olivacea, ſpadiceo-maculata pariens, ſtupidus.*
Roſtrum *flavum*; remiges 4 *primae margine exteriore,* 5 *primae apice nigrae, quarta et quinta macula ad apicem alba; reliquae, tribus corpori proximis exceptis, apice albae;* pedes *ex vireſcente albi.*

cinerarius. 4. L. albus, dorſo cano, macula pone oculos fuſca.
Larus canus. *Scop. ann.* 1. *n.* 106.
Larus albus major. *Raj. av. p.* 129. *n.* 9.
Larus cinereus major. *Aldr. orn.* 3. *p.* 72. *t.* 74.
Larus marinus albus. *Geſn. av.* 589.
Gavia cinerea minor. *Briſſ. av.* 6. *p.* 178. *n.* 9. *t.* 17. *f.* 1.
Petite Mouette cendrée. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 431. *Pl. enlum. n.* 969.
Greater white Gull of Bellonius. *Brit. zool.* 2. *p.* 542. *var. Will. orn. p.* 348.
Red legged Gull. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 381. *n.* 10.
β) Gavia griſea minor. *Briſſ. av.* 6. *p.* 173. *n.* 7.
γ) Larus Dingla. *Forsk. deſcr. anim. p.* 8.
Habitat in Europa, 15 *pollices circiter longus, utrum diſtincta ſpecies, an, quod probabilius, a ridibundo aut tridactylo ſola aetate diverſus? a cano differt macula inter aures et oculos fuſca.*

erythropus. 15. L. capite gulaque murinis albo maculatis, dorſo cinereo, roſtro, pedibus palpebrisque rubris, collo, abdomine caudaque albis.
Red legged Gull. *Arct. zool.* 2. *p.* 533. E.
Brown-headed Gull. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 383. *n.* 11.

Habitat in Camtſchatca *et* Anglia, 14 *pollices longus.* Tectrices *alarum fuſcae, margine exalbidae,* remigum 4 *primarum latus exterius, cum parte interioris nigrum;* rectrices 10 *mediae apice nigrae.*

naevius. 5. L. albus, dorſo cinereo, rectricibus apice nigris.
Larus varius. *Brünn. orn. n.* 150.
Larus albo-cinereus, torque cinereo. *Aldr. orn.* 3. *p.* 73. *t.* 77.
Larus cinereus major. *Bell. av.* 35. *Marſ. danub.* 5. *p.* 86. *t.* 41.
Larus varius ſive Skua. *Briſſ. av.* 6. *p.* 167. *n.* 5. *t.* 15.
Goéland varié ou Griſard. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 413. *t.* 33. *Pl. enl. n.* 266.
Wagel, Burgomaſter of Groenland, Great Grey Gull. *Raj. av. p.* 130. A. 13. *Will. orn. p.* 349. *t.* 66.
Wagel. *Brit. zool.* 2. *n.* 247. A. *Act. zool.* 2. *p.* 528. *n.* 453. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 375. *n.* 6.
β) Gavia cinerea naevia. *Briſſ. av.* 6. *p.* 185. *n.* 11. *t.* 17. *f.* 2.
Larus maculatus. *Brünn. orn. n.* 146.
γ) Larus (maculatus) albus, dorſo cinereo, fronte et collo ſordide flavis griſeo-maculatis, pedibus flaveſcentibus, cauda aequali. *S. G. Gmelin it.* 2. *p.* 191. *t.* 22.
δ) Larus (lapponicus) major, corpore undulato fuſco-cinereo, remigibus exterioribus ſubtus albis. *Lidbeck act. Stockh.* 1764. 2. *n.* 6. *p.* 155.
Habitat in mari Europaeo, γ) *in* Caſpio, 2 *fere pedes longus, annon ſexu, vel ſola aetate minore a fuſco vel tridactyla diſtinctus?*
Roſtrum *nigrum;* irides *obſcurae;* color corporis *ex fuſco, cinereo et albo miſtus;* pennarum *ſingularum medium fuſcum;* remiges *nigrae;* pedes *olivacei, flaveſcentes, ſordide incarnati, aut albi.*

marinus. 6. L. albus, dorſo nigro. *It. gotl.* 214. *It. wgoth.* 156. *Fn. ſuec.* 155. *Brünn. orn.* 145.
Larus dorſo nigro, pedibus rubris. *Oedm. nov. act. Stockh.* 1783. 2. *n.* 1. *p.* 100.
Larus niger. *Briſſ. av.* 6. *p.* 158. *n.* 1.
Larus ingens marinus. *Cluſ. exot.* 104.
Goéland noir. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 405. *t.* 31. *Pl. enl. n.* 990.
Great black and white Gull. *Raj. av. p.* 127. A. 1. *Will. orn. p.* 344. *t.* 67. *Albin. av.* 3. *t.* 94.

Black

Black backed Gull. *Brit. zool.* 2. *n.* 242. *Arct. zool. p.* 527. *n.* 451. *Lightfoot Fl. scot.* 1. *t.* 5. *f.* 2. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 371. *n.* 2.

Habitat in Europa, Capite bonae spei, nova Hollandia, America *ad* Carolinam *australem usque*, *anseris magnitudine et voce*, 29 *pollices longus*, *anati mollissimae*, *ipsisque agnis infestus*, *piscibus victitans*, *in rupibus celsissimis ova* 3 *esculenta utrinque obtusa obscure olivacea*, *latiori fine nigra*, *ceterum rarioribus maculis obscuris consperſa pariens: Cutis a Groenlandis et Eskimos in vestimenta adhibita*, *junioris caro edulis*, *lanugo egregia.*

Rostrum *flavescens*; mandibula *inferior litura rubra*, *et in medio macula nigra notata*; irides *flavae*; canthi *oculorum fulvi*; dorsi *pars inferior alba*; remiges *nigrae*, *apice albae*; pedes *pallide incarnati.*

ichthyaetus. 16. L. niveus, capite toto ad medium colli atro, palpebris albis. *Pall. it.* 2. *p.* 713. *n.* 27.

Larus albus, rostri fulvi cingulo fusco. *Oedm. nov. act. Stockh.* 1783. 2. *n.* 1. *p.* 118.

Habitat in mari caspio, *Berniclae magnitudine aut major*; *vox coracis*, *inter volandum gravis*; *ova oblonga*, *guttis crebris obsolete fuscis consperſa in arena nuda pariens.*

Rostrum *basi ex livido flavum*, *tum coccineum*, *apice flavum*, *litura versus apicem transversa fusca*; os *intus rubrum*; irides *fuscae*; pedes *ex fusco rubri.*

fuscus. 17. L. albus, dorso fusco. *Fn. suec.* 154. *Scop.* 1. *n.* 107. *Brünn. orn. n.* 142. *Georg. it. p.* 171.

Larus dorso fusco, rostri angulo fulvo, pedibus flavis. *Oedm. n. act. Stockh.* 1783. 2. *n.* 1. *p.* 104.

Larus griseus. *Briss. av.* 6. *p.* 162. *n.* 3.

Larus cinereus maximus. *Marsi. danub.* 5. *p.* 84. *t.* 40.

Goéland à manteau gris-brun, ou le Bourgmeistre. *Buff. hist. nat. desois.* 8. *p.* 418.

Herring Gull. *Brit. zool.* 2. *n.* 246. *t.* 88. *Arct. zool. p.* 527. *n.* 452. *Raj. av. p.* 127. A. 2. *Will. orn. p.* 345. *Sloan. jam.* 2. *p.* 322. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 372. *n.* 3.

Grose Hafmoewe. *Frisch av. t.* 218.

Habitat in Europa *et septentrionali* America *et* Asia, *hieme versus austrum migrans*, *ut in mari* nigro *et* Caspio, *in* Jamaica *insulisque littori* Carolinae *australis obversis inveniatur*; 23 *pollices longus*, *piscibus victitans*, *haleces imprimis persequens*, *ut bonum piscatoribus omen praebeat*, *tam audax*, *ut coram iis praedam capiat*, *nidum ex foeno*

foeno ſtruens, ovaque 3 exalbida nigro-maculata, quam marinus, minora, pariens.

Roſtrum pedesque *adulti flavi;* irides *ſtramineae;* canthi *oculorum rubri;* remiges 5 *primae ſupra nigrae, macula nigra prope apicem notatae.*

glaucus. 17. albus, dorſo alisque canis, remigibus apice albis, roſtri flavi angulo croceo. *Oedm. nov. act. Stockh.* 1783. *n.* 1. *p.* 96. *n.* 1. *Brünn. orn. n.* 148. *Fabr. Fn. groenl. n.* 64.
Larus albus. *Olaff. isl. p.* 356. 572.
Larus hyperboreus. *Laem Finm. cum not. Gunner. p.* 283.
Larus cinereus. *Briſſ. av.* 6. *p.* 160. *n.* 2.
Goéland cendré. *Buff. pl. enl. n.* 253.
Goéland à manteau gris. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 406. *t.* 32.
Glaucous Gull. *Arct. zool.* 2. *p.* 532. B. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 374. *n.* 4.
Burgermeiſter. *Martens Spitzb. p.* 60. *t.* L. *f.* D.
Habitat in mari ſeptentrionali *et* auſtrali, *fuſco major, continue fere volans, ſonitu coracis, piſcibus, empetri baccis, balaenarum cadaveribus, roſmarorum excrementis, tordae pullis victitans, in alto collium nidificans.*
Roſtrum *apice valde aduncum, mandibula inferiore breviore;* alae *ſupra canae;* remiges *baſi griſeae, apice albae.*

argentatus. 18. L. albus, capite colloque cinereo-ſtriatis, remigibus primariis ſupra nigris, ſubtus griſeis apice albis. *Brünn. orn. n.* 149.
Silvery Gull. *Arct. zool.* 2. *p.* 533. C. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 375. *n.* 5.
Habitat in Norwegia, *fuſcae magnitudine.*
Roſtrum *flavum, macula fulva.*

Atricilla. 8. L. caneſcens capite nigricante, roſtro rubro, pedibus nigris. *Oedm. nov. act. Stockh.* 1783. 2. *n.* 1. *p.* 119. *n.* 8.
Gavia ridibunda. *Briſſ. av.* 6. *p.* 192. *n.* 13. *t.* 18. *f.* 1.
Larus cinereus major Baltneri. *Raj. av. p.* 129. *n.* 8.
Mouette rieuſe. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 433.
Baltner's great aſhcoloured Sea-Mew. *Will. orn. p.* 346. *t.* 67.
Laughing Gull. *Arct. zool. p.* 528. *n.* 454. *Catesb. Car.* 1. *t.* 89. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 383. *n.* 12.
Habitat in America *inſulisque* Bahamenſibus, *et* ad Tanain, *ridibundo major,* 18 *pollices longus, gregatim ad ripas volans, clamore cachinnante, piſcibus vermibusque victi-*

victitans, in pinubus nidificans et 4 ova plumbea pariens; nigredine pedum sola a ridibundo distinctus.

atricilloides. 19. L. ex rubicundo albus, capite, orbitis, colloque nigris, dorso alisque cinereis, pedibus coccineis. *Falck it.* 3. *p.* 355. *t.* 24.

Habitat in Sibiriae *australis lacubus salsis.*

ridibundus. 9. L. albidus, capite nigricante, rostro pedibusque rubris.

Oedm. nov. act. Stockh. 1783. 2. *n.* 1. *p.* 119. *n.* 9.

Larus. *Nozem. nederl. Vog. t.* 80.

Larus cinereus. *Scop. ann.* 1. *n.* 105. *Raj. av. p.* 128. *n.* 5.

Cephus Turneri. *Gesn. av.* 249.

Gavia ridibunda phoenicopus. *Briss. av.* 6. *p.* 196. *n.* 14.

Mouette rieuse à pattes rouges. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 433. *Pl. enl. n.* 970.

Brown-headed Gull. *Alb. av.* 2. *t.* 86.

Pewit Black-cap or Sea-Crow. *Raj. av. p.* 128. *n.* 5. *Will. orn. p.* 147. *t.* 66. *Lightf. flor. scot. t.* 5. *f.* 1.

Blackheaded Gull. *Brit. zool.* 2. *n.* 252. *Arct. zool.* 2. *p.* 529. *n.* 455. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 380. *n.* 9.

β) Larus albus, dorso cano, capite et rostro nigricante. *Nozem. nederl. Vog. t.* 79.

γ) Larus albus, pedibus et rostri basi caeruleis, apice flavo. *Mill. illustr. t.* 12.

Habitat in Asia, America *atque* Europa *septentrionali, frequens in* Anglia, 15 *pollices longus, voce cachinnante, ex juncis, gramine &c. nidum struens, et ova* 3 *ex virescente fusca, maculis spadiceis notata pariens; an varietas Atricillae aetate distincta? Junioris caro edulis.*

Palpebrae *rubrae, utrinque macula alba*; irides *avellanae colore*; caput *et* gula *obscure fusca, in adultiore nigra*; dorsum *et* alae *cinereae*; remiges 10 *primae albae, margine et apice nigrae, reliquae cinereae apice albae*; ungues *nigri.*

parasiticus. 10. L. rectricibus duabus intermediis longissimis. *Fn. suec.* 156.

Larus subfuscus major, vertice nigro, ventre albido, rectricibus intermediis longissimis. *Brown jam.* 482.

Sterna rectricibus maximis nigris. *It. wgoth.* 182. *Act. Stockh.* 1753. *p.* 291.

Catarracta parasitica. *Brünn. orn. n.* 127. 128. *Fabric. Fn. groenl. n.* 68.

Stercorarius et Stercorarius longicaudatus. *Briss. av.* 6. *p.* 150. 155. *n.* 1. *et* 3.

Avis norwegica Kyuffa. *Ol. muſ.* 1. *ſ.* 11. *n.* 20.
Truen ſ. Fur. *Barthol. act. Hafn.* 1. *p.* 91.
Labbe à longue queue. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 445. *Pl. enl. n.* 762.
Arctic Bird. *Edw. av. t.* 148. 149.
Arctic Gull. *Brit. zool.* 2. *n.* 245. *t.* 87. *Arct. zool.* 2. *p.* 530. *n.* 459. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 389. *n.* 16. *t.* 99.
Strunt-jagger. *Raj. av. p.* 127. *n.* 2. *Martens Spitzb. p.* 63. *t. L. f. D.*

Habitat in mari Europae, Americae *et* Aſiae *ſeptentrionali*, 21 *pollices longus*, *rarius natans tardeque volitans*, *niſi perſequendo alias aves*, *quibus*, *praecipue congeneribus*, *piſcaturae ipſe ineptus*, *din ſatis agitatis*, *piſces vomitu ejectos aut ore elapſos rapit*; *nidum in uliginoſis collis cujusdam ex gramine muſcisque ſtruens*, *et ova* 2 *cinerea nigro-maculata*, *gallinaceis aequalia pariens.*

Roſtrum *obſcurum*, *valde aduncum*, *baſi cera obductum*, *in qua nares*; corpus *ſupra*, vertex, alae, cauda, pedes *nigra*; tempora, frons, collum *et* corpus *ſubtus alba*, *pectoris faſcia obſcura*; remigum *baſis intus*, harum *et* rectricum *rachis*, *inprimis ſubtus alba*; rectrices 2 *intermediae* 4 *pollicibus reliquis longiores*, *feminae paulo breviores.*

crepidatus. 20. L. rectricibus duabus intermediis longioribus. *Hawksw. it.* 1. *p.* 15.
Catarracta Cepphus. *Brünn. orn. p.* 36. *n.* 126. *Forſt. act. angl.* 52. *p.* 135. *Raj. av. p.* 129. *n.* 11. *Will. orn. p.* 351. *t.* 67.
Stercorarius ſtriatus. *Briſſ. av.* 6. *p.* 152. *n.* 2. *t.* 13. *f.* 2.
Labbe ou Stercoraire. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 441. *t.* 34. *Pl. enl. n.* 991.
Blacktoed Gull. *Brit. zool.* 2. *p.* 244. *t.* 86. *Arct. zool.* 2. *p.* 531. *n.* 460. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 387. *n.* 15.
Habitat in mari Americae *et* Europae *ſeptentrionali*, *etiam* atlantico, *paraſitico paulo rarior*, 15 *pollices longus*, *nidum ex gramine ſtruens*, *et ova* 2 *pallide ferruginea*, *nigro-maculata pariens*, *ex eſu helicis janthinae excrementa rubra elidens.*

Roſtrum *catarractae*, *ſed gracilius et minus aduncum*; caput collumque *exalbida*; *latera hujus obſcure ſtriata*; pectus *et* abdomen *alba lineis numeroſis obſcuris et flavicantibus*; hypochondria *et* criſſum *transverſis nigris et albis*; dorſum, tectrices *alarum et* cauda *nigra*, *margine albo*

vel

vel fuscescente; rectrices *scapo albo*, *barba exteriore extimarum ferrugineo-maculata*, 2 *intermediae pollice reliquis longiores*; pedes *plumbei*; digitorum *pars inferior cum membrana connectente nigra.*

Catarrhactes. 11. L. grisescens, remigibus rectricibusque basi albis, cauda subaequali.

Catharacta Skua. *Brünn. orn.* 125.
Larus fuscus. *Briss. av.* 6. *p.* 165. *n.* 4.
Catarractes. *Gesn. av.* 246. *Aldr. orn.* 3. *p.* 84.
Catarractes noster. *Sibb. Scot.* 2. *p.* 20. *t.* 14. *f.* 2.
Skua Hoyeri. *Clus. exot.* 369. *Barth. act. Hafn.* 1. *p.* 91. *Raj. av.* 128.
Goéland brun. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 408.
Catarractes or Cornish Gannet. *Raj. av. p.* 128. *n.* 6. *Will. orn. p.* 348.
Catarracte of Aldrovand. *Raj. av. p.* 129. *n.* 7. *Will. orn. p.* 349. *t.* 67.
Brown Gull. *Alb. av.* 2. *t.* 85.
Arctic Bird. *Edw. av. t.* 149. *f.* 2.
Skua Gull. *Brit. zool.* 2. *n.* 243. *Arct. zool.* 2. *p.* 531. A.
Habitat in mari septentrionali, *rarior in* australioribus, *coracis magnitudine*, 2 *pedes longus*, *vorax*, *rapax*, *ferox*, *incubationis praesertim tempore*, *ut et congeneres aliasque aves aquaticas*, *pisces illis ablaturus*, *et ipsam diomedeam exulantem*, *dum volat*, *exagitet*, *et in insulis* Ferro *agnos adeo discerpere et in nidos suos deferre tradatur*, *quos in medio gramine sicco struit.*
Rostrum *nigrum*, *apice multum aduncum*, *a basi ad* ¾ *longitudinis cera nigra vestitum*; caput *et* collum *supra*, dorsum alae*que profunde fusca*, *pennarum margine ferrugineo*; frons mentum*que cinerascens*; pectus, abdomen *et* crissum *pallide ferruginea*; pedes *nigri*, *asperi*, *verrucosi*; ungues *valde uncinati*; digitus *posterior brevissimus*, *ungue acuto*, *quam maxime uncinato.*

7
77. STERNA. *Rostrum* edentulum, subulatum, subrectum, acutum, compressiusculum.

Nares lineares ad basin rostri sitae.

caspia. 8. St. leucophaea, subtus nivea, capite nigro, remigibus primariis tectricibusque alarum fuscis niveo rore quasi can-

dicantibus. *Pallas nov. comm. Petrop.* 14. *p.* 582. *n.* 5. *t.* 22. *f.* 2. *Oedm. nov. act. Stockh.* 1782. 3. *n.* 5. *p.* 221.
Sterna Tschegrava. *Lepechin nov. comm. Petrop.* 14. *p.* 500. *n.* 2. *t.* 13. *f.* 2.
Larus Atricilla. *S. G. Gmelin nov. comm. Petrop.* 15. *p.* 478. *t.* 22. *f.* 2.
Caspian Tern. *Arct. zool.* 2. *p.* 526. B. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 350. *n.* 1.

β) St. vertice temporibusque albo-maculatis, remigibus cinerascentibus, pedibus nigris.

γ) St. supra cinerea, rostro flavicante, pedibus nigris, vertice subcristato.

Habitat in mari Caspio, *praesertim ad ostium fluvii* Ural, *aliquando per fluvium* Ob *ad* mare glaciale *usque migrans*, β) *in* India *ad* Bombay, γ) *in* Sina, *insulis* amicis *et* Sandwich, *laro Atricilla major et altior*, 1 *pedem* 10½ *pollices longa*, *tum in mari*, *tum in fluviis*, *in aëre suspensa et teli instar devolando*, *aut hirundinis more undas stringendo piscans*; *laris intermista in rupibus insulisque desertis ova* 2 *majuscula*, *fusco-maculata pariens*, *moribus*, *genio*, *facie et colorum mixtione congeneribus similis.*

Rostrum *convexum*, *rubrum*, *naribus a basi remotis*, *totis perviis et nudis*; irides *obscurae*; capitis *plumae apice*, *praesertim in juniori ave*, *albicantes*; *anniculis avibus* cervix *lituris fuscis*, alae *spuriae notis sagittatis nigricantibus variae*; cauda *breviuscula forficata*; rectrices *ex fusce scente canae*, *interiori latere albae*; pedes *longiusculi*, *ex rubescente fusci*; digito *interiore breviore*, *posteriore brevissimo.*

Cayennensis. 9. St. supra cinerea, pennarum margine rufescente, subtus alba, occipite nigro.

Grande Hirondelle de mer de Cayenne. *Buff. hist. nat. desois.* 8. *p.* 346. *Pl. enl. n.* 988.
Cayenne Tern. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 352. *n.* 2.
Habitat in Cayenna, 16 *pollices longa.*

surinamensis. 10. St. rostro, capite, collo, pectore et unguibus nigris, dorso, alis caudaque cinereis, abdomine exalbido, pedibus rubris.

Suri-

Sternae, *maris potissimum incolae*, *piscibus praesertim victitantes*, *hominem non metuentes*, *cauda furcata*, *alis longissimis*, *digito posteriore parvo*, *et lingua gracili acuta distinguuntur.* Pulli *naevii.*

Surinam Tern. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 352. *n.* 3.
Habitat in Surinam, 200 *nonnunquam milliaria a littore, piscibus victitans, quos minoribus avibus saepius eripit.*

fuliginosa. 11. St. nigra, subtus, genis, fronte, remigum rectricumque scapis alba.
Hirondelle de mer à grande envergure. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 345.
Eggbird. *Forst. it.* 1. *p.* 113. *Cook it.* 1. *p.* 66. 275.
Noddy. *Hawkesw. it.* 3. *p.* 652.
Sooty Tern. *Arct. zool.* 2. *p.* 523. *n.* 447. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 352. *n.* 4.
Habitat in mari atlantico, americano, indico, australi, septentrionali, *stolidae magnitudine*, 16 *pollices longa, incerta terrae propinquae nuncia, voce acuta, rauca, hominem non metuens, ova* 1-3 *praegrandia flavicantia, maculis fuscis et pallide violaceis notata pariens.*
Cauda *obscura, rectricibus exterioribus albis.*

africana. 12. St. alba, rostro pedibusque nigris, vertice, alis, caudaeque apice maculatis.
African Tern. *Lath. syn.* III. 2. *p* 354. *n.* 5.
Habitat in Africa, *fuliginosae magnitudine.*
Verticis *maculae nigrae;* alarum, *in plumbeum colorem vergentium fuscae;* caudae *albae;* remiges *ex caerulescente cinereae.*

stolida. 1. St. corpore nigro, fronte albicante, superciliis atris. *Amoen. acad.* 4. *p.* 240.
Anaethetus minor fuscus, vertice cinereo, rostro glabro. *Brown jam.* 481.
Gavia fusca. *Briss. av.* 6. *p.* 199. *n.* 15. *t.* 18. *f.* 2.
Passer stultus. *Nieremb. nat.* 207. *Will. orn.* 297. *Raj. av.* 154.
Fou. *du Pratz Louis.* 2. *p.* 119.
Mouette brune. *Buff. pl. enl. n.* 997.
Noddy. *Arct. zool.* 2. *p.* 523. *n.* 446. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 461. *t.* 37. *Raj. av. p.* 132. *n.* 10. *p.* 190. *n.* 2. *Sloan. jam.* 1. *p.* 31. *t.* 6. *f.* 2. *Catesb. Car.* 1. *t.* 88. *Damp. it.* 3. 1. *t. p.* 123. *f.* 6. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 354. *n.* 6.
Habitat in pelago, *vix tamen extra* tropicos, *lari ridibundi magnitudine*, 15 *pollices longa, clamorosa, in rupibus nuda deponens ova, esculenta, fallax terrae vicinae praesagium.*

Rostrum

Roſtrum *et* pedes *nigri*; occiput *cinereum*; remiges *et* cauda *reliquo corpore magis obſcurae.*

ſimplex. 13. St. ſupra plumbea, ſubtus, vertice, tectricibus alarum majoribus mediisque alba, litura pone aures, remigibusque nigris.

Simple Tern. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 355. *n.* 7.

β) St. roſtro pedibusque nigris.

Habitat in Cayenna, *β*) *in mari inter* Maderam *et* Americam *interpoſito*, 15 *pollices longa.*

Roſtrum pedes*que rubri*; tectrices *alarum nonnullae margine exteriori fuſcae.*

nilotica. 14. St. ſupra cinerea, ſubtus alba, capite colloque nigro-maculatis, orbitis nigris albo-guttatis. *Haſſelq. it. p.* 273. *n.* 41.

Egyptian Tern. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 356. *n.* 8.

Habitat in Aegypto, *gregaria, frequens cum aliis, in limo, quem Nilus retrocedens relinquit, inſectis et piſcibus minoribus victitans, columbae magnitudine.*

Roſtrum *et* ungues *nigri*; pedes *incarnati.*

Cantiaca. 15. St. alba, roſtro, fronte, vertice, occipite, temporibus pedibusque nigris, dorſo alisque plumbeis.

Sandwich Tern. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 356. *n.* 9.

Habitat gregaria et frequens ad littora Cantii, *clamoreſa, Junio inter rupes nidificans*, 18 *pollices longa.*

Roſtrum *apice corneum, lingua duplo longius:* irides *avellanae colore*; remiges *pruinoſo-nigrae*; pedes *ſubtus obſcure rubri.*

Hirundo. 2. St. rectricibus duabus extimis albo nigroque dimidiatis. *Fn. ſuec.* 158. *Gislar act. Stockh.* 1753. *Haſſelq. it. p.* 272. *n.* 40. *Scop. ann.* I. *n.* 111. *Brünn. orn. n.* 151. 152. *Fabr. Fn. groenl. n.* 69.

Larus Hirundo. *Kramer El. p.* 345.

Larus albicans. *Marſ. Danub.* 5. *p.* 88. *t.* 42.

Sterna. *Geſn. av.* 53. *Aldr. orn.* 3. *p.* 78. *Jonſt. av.* 130. *t.* 46.

Sterna major. *Briſſ. av.* 6. *p.* 203. *n.* 1. *t.* 19. *f.* 1.

Hirundo marina major. *Raj. av. p.* 191. *n.* 7.

Grande Hirondelle de mer. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 331. *t.* 27. *Pl. enl. n.* 987.

Sea-Swallow. *Raj. av. p.* 131. *n.* 1. *Will. orn. p.* 352. *t.* 68. *Albin. av.* 2. *t.* 88.

Great

Great Tern. *Brit. zool.* 2. *n.* 254. *t.* 90.
Common Tern. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 361. *n.* 14. Forst. t. 29.

β) Sterna pedibus nigris, rectricibus extimis totis albis. *Forst. act. angl.* 62. *p.* 421.

Habitat in Europae, Asiae, Americae *maritimis et ripis*, 14 *pollices et ultra longa*, *audax*, *et incubationis praesertim tempore ferox*, *in parvis foveis*, *paucis nonnunquam foliis circumscriptis*, *aut in gramine muscisque ova* 3-4 *olivacea*, *nigro maculata*, *partim* 1¾ *pollices longa pariens.*

Rostrum *rubrum*, *apice nigrum*; vertex *cum* area *oculorum niger*; *reliquum* caput, collum, cauda, *et* corpus *subtus alba*; dorsum *et* alae *cinerea*; pedes *rubri*; ungues *nigri*. Mas *et* femina *indissolubiles socii monogami.*

panayensis. 16. St. subtus alba, rostro pedibusque nigris, vertice nigro maculato, alis caudaque supra ex atro fuscis, subtus cinerascentibus.

Panayan Tern. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 363. *n.* 15.
Habitat in insula Panay, *St. Hirundini aequalis et similis.*
Cervix *ex cinerascente nigra.*

cinerea. 17. St. cinerea, rostro, capite, gula et unguibus nigris, tectricibus caudae inferioribus et margine alarum superiore albis.

Sterna cinerea. *Briss. av.* 6. *p.* 210. *n.* 3.
Larus niger fidipes alter, alis brevioribus. *Raj. av. p.* 131. *n.* 5.
Other clovenfooted Gull of Aldrovandus with shorter Wings. *Will. orn. p.* 354.
Cinereous Tern. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 363. *n.* 16.
Habitat in Italia, 13 *pollices longa.*
Frons *et* mentum *interdum albis maculis notata*; pedes *rubescentes.*

alba. 18. St. tota alba, rostro pedibusque nigris. *Sparrm. mus. Carls. t.* XI.
Habitat in India, *ad* caput bonae spei, *et in insulis* maris australis, *nigrae magnitudine et statura.*

candida. 19. St. alba, pennarum scapularium, remigum, rectricumque, rostro, palpebris et unguibus nigris, pedibus fuscis.
White Tern. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 363. *n.* 17.
Habitat in insula nativitatis Christi, *aliisque* maris australis, *visa quoque in insula* S. Helenae, *an vere distincta ab alba specie?*

Longi-

Longitudo *pollicum* 13; rectrices 3 *utrinque extimae totae albae*; membrana *digitos connectens fulva.*

obscura. 20. St. corpore supra fusco, subtus albo, capite nigro, alis partim fuscis, partim cinereis.
Brown Tern. *Brit. zool.* 2. *n.* 253. *Raj. av. p.* 131. *n.* 15. *Will. orn. p.* 352. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 368. *n.* 23.
Gregaria avis, cauda non furcata; probabiliter non nisi aetate minore diversa a reliquis speciebus.

nigra. 3. St. corpore cano, capite rostroque nigro, pedibus rubris.
Fn. suec. 159. *Georg. it. p.* 171. *Nozem. nederl. Vogel t.* 67.
Sterna atricapilla. *Briss. av.* 6. *p.* 214. *n.* 5.
Hirondelle de mer à tête noire ou Gachet. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 342.
Habitat in Europa, *fissipede paulo major*, $9\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Orbitae *cinereae*; ungues, collum *et* pectus *superius nigrum*; *inferius cum* abdomine, crisso, alis *et* cauda *album.*

australis. 21. St. cinerea, rostro pedibusque nigris, fronte sordide lutescente, remigibus albis, membrana digitos connectente fulva.
Southern Tern. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 365. *n.* 20.
Habitat in insula nativitatis Christi, $7\frac{1}{2}$-9 *pollices longa.*

sinensis. 22. St. alba, dorso, alis caudaque cinereis, rostro et fascia verticis ad nucham usque producta nigris, pedibus fulvis.
Chinese Tern. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 365. *n.* 19.
Habitat in Sina, *minutae affinis*, 8 *pollices longa.*
Ungues *nigri.*

metopoleucos. 23. St. alba, capite praeter frontem, collo, unguibusque nigris, dorso cano, pedibus croceis. *S. G. Gmelin nov. comm. Petrop.* 15. *p.* 475. *t.* 12. *f.* 1.
Habitat in Russia *et* Sibiria *australi ad aquas, mas et femina indissolubiles socii*, $8\frac{1}{2}$ *pollices longa, piscibus minoribus victitans, Junio nidificans, ova plerumque* 2 *pariens, quibus per aliquot septimanas incubat, alte velocissimeque volans; nonne mera varietas minutae?*

minuta. 4. St. corpore albo, dorso cano, fronte superciliisque albis.
Scop. ann. 1. *n.* 110.
Sterna minor. *Briss. av.* 6. *p.* 206. *n.* 2. *t.* 19. *f.* 2.
Petite hirondelle de mer. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 377. *Pl. enl. n.* 996.

Larus

Larus piscator. *Gesn. av.* 587. *t.* 588. *Aldr. orn.* 3. *p.* 80. *t.* 79. *Jonst. av. t.* 46.
Lesser Sea-Swallow. *Raj. av. p.* 131. *n.* 2. *Will. orn. p.* 353. *t.* 68. *Alb. av.* 2. *t.* 90.
Lesser Tern. *Brit. zool.* 2. *n.* 155. *t.* 90. *Arct. zool.* 2. *p.* 524. *n.* 449. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 364. *n.* 18.
Habitat in Europa, Asia *et* America *paulo australiore, circa* mare nigrum *et* caspium *obvia, moribus congenerum aemula, magnitudine minima, vix hirundinis domesticae,* 8½ *pollices longa, ova pariens* 1½ *pollices longa, ex flavicante sordide fusca, lituris rubicundis notata.*
Rostrum *flavum, apice nigrum;* irides *fuscae;* caput, *praeter frontem et tempora,* fascia ocularis *et* ungues *nigra;* pedes *flavi.*

naevia. 5. St. corpore variegato, macula aurium nigra.
Sterna naevia, *Briss. av.* 6. *p.* 216. *n.* 6. *t.* 20. *f.* 2.
Rallus lariformis. *Syst. nat.* X. 1. *p.* 153. *Scop. ann.* 1. *n.* 156.
Larus cinereus fissipes, rostro et pedibus rufescentibus. *Mars. dan.* 5. *p.* 92. *t.* 44.
Guisette. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 339. *Pl. enl. n.* 924.
Cloven-footed Gull. *Albin. av.* 2. *t.* 82.
Kamtschatcan Tern. *Arct. zool.* 2. *p.* 525. A.
Habitat in Camtschatca *et* Europa *australiore, frequens in littore* Picardiae, 11½ *pollices longa, in foliis siccis medium inter gramen ova* 3 *pariens, quibus per* 17 *dies incubat; an junior sterna cantiaca?*
Rostrum pedes*que obscuri;* occiput *nigrum, pennarum margine ex rufo fusco;* supercilia *nigra;* caput *reliquum,* collum *et* corpus *subtus alba;* dorsum *et* alae *ex caerulescente fusca;* cauda *perparum forficata.*

striata. 24. St. alba supra nigro-undulata, rostro et occipite nigris, pedibus plumbeis.
Striated Tern. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 358. *n.* 10. *t.* 98.
Habitat circa novam Scelandiam, *pullo cantiacae similis, candidae aequalis.*
Irides *plumbeae;* vertex *et* genae *albae, nigro-maculatae;* rectrices *aliae margine, aliae apice nigrae.*

vittata. 25. St. cinerea, vertice ad oculum usque nigro alba linea circumscripto, rostro sanguineo, uropygio, cauda crissoque albis, pedibus fulvis.
β) Sterna cauda cinerea.
Habitat in insula nativitatis Christi, 15 *pollices longa.*

26. St.

spadicea. 26. St. spadicea, rostro et unguibus nigris, cauda remigibusque obscuris, secundariis apice albis.
Brown Tern. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 359. *n.* 12.
Habitat in Cayenna, *stolidae magnitudine*, 15 *pollices longa.*
Corpus *subtus*, *et* pedes *pallide spadicei*; crissi *regio alba*; dorsi *pennae et* tectrices *alarum apice ex rubicundo albae*; *scapulares albae*; alarum *margo superior*, tectrices *inferiores*, remigum rectricumque *scapi subtus albi.*

fuscata. 6. St. corpore nigricante immaculato, pedibus rubris, rostro fusco.
Sterna fusca. *Briss. av.* 6. *p.* 220. *n.* 7. *t.* 21. *f.* 1.
Habitat in insula S. Dominici, *spadiceae affinis*, *fissipedi aequalis*, 11 *pollices longa.*
Rostrum *ex cinereo fuscum*, *apice nigrum*; caput, gula, cervix, uropygium *ex atro fusca*; jugulum corpusque *subtus totum fuscum*; tectrices *alarum inferiores canae*; cauda remigesque *obscurae*, *proximae* 2 *corpori*, rectricesque 2 *intermediae apice rufae*; pedes *rubri*; ungues *nigri.*

fissipes. 7. St. corpore nigro, dorso cinereo, abdomine albo, pedibus rubicundis. *Brünn. n.* 153.
Sterna nigra. *Briss. av.* 6. *p.* 211. *n.* 4.
Larus merulinus. *Scop. ann.* 1. *n.* 108.
Larus niger. *Gesn. av.* 588. *Aldr. orn.* 3. *p.* 181.
Larus niger fidipes. *Aldr. orn.* 3. *p.* 82. *et* 270. *t.* 68. *Raj. av.* 132.
Cloven-footed Gulls. *Will. orn. p.* 354. §. 4. 6. *t.* 70.
Hirondelle de mer noir ou Epouvantail. *Buff. hist. nat. des oif.* 8. *p.* 341. *Pl. enl. n.* 333.
Scare-Crow. *Raj. av. p.* 131. *n.* 3. *Will. orn. p.* 353. *t.* 68.
Black Tern. *Brit. zool. n.* 256. *Arct. zool.* 2. *p.* 525. *n.* 450. *Lath. syn.* III. 2. *p.* 366. *n.* 22.
Habitat in Europae *et* Americae *magis septentrionalis maritimis*, Sibiriae *et* Tatariae *lacubus salsis*, 10 *pollices longa*, *insectis et piscibus minoribus victitans*, *inter paludum arundines ova pariens* 3·4 *sordide virescentia maculis nigris taeniaque media circulari atra notata.*
Rostrum *nigrum*; alae *et* cauda *cinereae*; crissum *et* tectrices *caudae inferiores albae*; pedes *obscure rubri*; mari *macula alba sub mento.*

Sterna rubicosa: subtus alba, supra nigra, alis cinereo-nigris, remigibus caudaque furcata, rostro [illegible] Mus. Carl. M. n. 63.
Habitat in Suecia.

78. RYNCHOPS. *Roſtrum* rectum: mandibula ſuperiore multo breviore; inferiore apice truncata.

nigra. 1. R. nigricans, ſubtus alba, roſtro baſi rubro.
Rynchops alia dorſo nigro ventre albo. *Barr. av.* 20. *Briſſ. av.* 6. *p.* 223. *n.* 1. *t.* 21. *f.* 2.
Plotus roſtro conico inaequali. *Klein av.* 142.
Avis novaculae facie. *Raj. av. p.* 194. *n.* 5. *t.* 1. *f.* 5. *Petiv. gazoph. t.* 76. *f.* 2.
Bec-en-ciſeaux. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 454. *t.* 36. *Pl. enl. n.* 357.
Coupeur d'eau. *Fermin Surin.* 2. *p.* 291.
Bec-de-hache ou Pied rouge. *du Pratz Louiſ.* 2. *p.* 117.
Sea-crow. *Edw. glean. t.* 281.
Cutwater. *Arct. zool.* 2. *p.* 522. *n.* 445. *Catesb. Car.* 1. *t.* 90.
Black Skimmer. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 347. *n.* 1. *tab. in front.*
Habitat in Americae *a* Noveboraco *ad* Surinamum *usque maritimis, gryllae magnitudine, 20 pollices longa, perpetim volans et aquae ſuperficiem radens, roſtrum immergendo, vel mandibulam potius inferiorem, qua minores piſces, victum ſibi paratura, extrahit; tempore procelloſo in littore oſtreas, aliaque teſtacea quaerit.*
Roſtrum *nigrum, baſi rubrum, mandibula inferiore ſulcata;* frons mentumque *alba;* alarum *faſcia transverſa alba;* rectrices 2 *intermediae nigrae; proximae utrinque exteriori margine albae;* 4 *extimae albae obſcuro-maculatae;* pedes *rubri;* ungues *nigri:* Femina *mari ſimilis.*

fulva. 2. R. fulva, roſtro nigro. *Barr. av.* 20.
Habitat in Gujana, *mera nigrae varietas.*

Genus *hoc vitae genere, victu, moribus, cauda alis multo breviore forficata, naribus linearibus, digito poſteriore exiguo cum laris convenit: Pedes debiles ſunt, naresque pervias.*

IV. GRALLAE.

Roſtrum ſubcylindricum obtuſiuſculum.
Lingua integra carnoſa.
Femora ſupra genua denudata.

79. PHOENICOPTERUS.

Roſtrum denudatum, infracto-ineurvatum, denticulatum.

Nares lineares.

Pedes palmati, tetradactyli.

ruber. 1. Ph. remigibus nigris. *Scop. ann.* I. *n.* 114.
Phoenicopterus. *Bell. av.* 199. *Geſn. av.* 689. *t.* 690. *Aldr. orn. p.* 319. *t.* 321. 322. *Will. orn.* 360. *t.* 60. *Raj. av. p.* 117. *n.* 2. *Tetr. it.* 300. *Worm. muſ.* 200. *Grew muſ.* 67. *t.* 5. *Briſſ. av.* 6. *p.* 532. *n.* 1. *t.* 47. *f.* 1.
Flamant. *Acct. zool.* 2. *p.* 504. *n.* 422. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 475. *t.* 39. *Pl. enl. n.* 63.
Flamingo. *Act. angl.* 29. *n.* 350. *t.* 2. *p.* 523. *Raj. av. p.* 190. *n.* 1. *Sloan. jam. p.* 321. *n.* 17. *Catesb. Car.* I. *t.* 73. 74. *Alb. av.* 2. *t.* 77. *Kolb. cap.* 2. *p.* 137. *Brown jam.* 7. p. 152. *p.* 480. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 299. *n.* 1. *t.* 93.
Habitat in Africa, America *auſtrali, rarius ad littus potiſſimum occidentale* maris caſpii, *et in calidiori* Europa, *ultra* 40° *verſus boream vel auſtrum vix conſpicuus, junior facile cicurandus, frigoris tamen impatiens, inſectis aquaticis, piſcibus, eorumque ovis victitans, quae roſtro ex fundo aquarum petit, ita contorquendo collum, ut dorſum mandibulae ſuperioris terram tangat, excubias agente, ut ferunt, ex toto grege ave unica; nidum ſtruit in aqua ex limo, collis forma, in apice apertum, in quo ova 2 alba anſeri-*

Aves *hujus generis, anſerum ordinem cum grallis combinantes, collo pedibusque longiſſimis, roſtro craſſo magno, mandibula ſuperiore ſupra carinata, margine denticulata, inferiore compreſſa, transverſim ſulcata, naribus ſupra tenui membrana tectis, pervii, digito poſteriore minimo, membrana anteriores nectente ad ungues usque protenſa diſtinguuntur.*

anſerinis aequalia, ſed magis oblonga parit femina, cuique inſidet, pedibus in utroque latere exſertis; caro juniorum praeſertim, lingua inprimis ſapidiſſima; dat mihi penna rubens nomen, ſed lingua guloſis, *teſtibus* Plinio, Martiali, Suetonio, Lampridio *expetita* Apicio, Caligulae, Vitellio, Heliogabalo.

Magnitudo *vix anſeris*, collo *tamen* pedibus*que longiſſimis, ut ab apice roſtri ad apicem caudae* 2-3 *pollicibus* 4 *pedes longitudine, ad apicem unguium nonnunquam ſex pedes altitudine ſuperet;* roſtrum *a baſi ad curvaturam usque ex rubente flavum, ab hac ad apicem nigrum, baſi ipſa ad oculum usque cera incarnata tecta;* lingua *magna, carnoſa, papillis* 12 *aut pluribus retrorſum uncinatis aſpera, apice cartilaginea;* color *corporis trienni demum avi conſtans, coccineus; annuae ex cinereo albus; bienni roſeus, alis et interſcapuliis rubris.*

chilenſis. 2. Ph. remigibus albis. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 214.

Habitat in regni Chilenſis *aquis dulcibus, colli pedumque longitudine, nido, et moribus rubro ſimilis,* 5 *pedes altus: Pennae Americanis ornamento inſerviunt.*

Color, *junioribus quoque, albus,* dorſo *et* tectricibus *alarum flammeis;* caput *parvum, ſubcriſtatum;* roſtrum 5 *pollices longum, cera rubra veſtitum;* cauda *brevis rotundata;* remiges *conſtanter albae.*

80. PLATALEA.

Roſtrum planiuſculum, longum, tenue: apice dilatato, orbiculato, plano.

Nares exiguae ad baſin roſtri.

Lingua parva, acuminata.

Pedes tetradactyli, ſemipalmati.

Leucorodia. 1. Pl. corpore albo, gula nigra, occipite ſubcriſtato. *Muſ. Ad. Fr.* 2. *p.* 26. *Fn. ſuec.* 160. *Scop. ann.* 1. *p.* 115. *Brünn. orn.* 46. *Nozem. nederl. Vogel n.* 88. 89. *Miller illuſtr. t.* 22.

Platea. *Briſſ. av.* 5. *p.* 352. *n.* 1.

Platea ſ. Pelecanus. *Geſn. av.* 666. *Jonſt. av.* 103. *t.* 46. *Worm. muſ.* 1. *f.* 2. *t.* 11. *f.* 10. *Marſ. Dan.* 5. *p.* 28. *t.* 12.

Leucorodias. *Aldr. orn. l.* 20. *c.* 13. *et* 3. *p.* 384. *t.* 385.
Platina ſ. Cochlearia. *Olear. muſ.* 23. *t.* 13. *f.* 4. *Besl. muſ. t.* 9. *f.* 4.
Spatule. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 448. *t.* 24. *Pl. enl. n.* 405.
Pelican or Spoonbill. *Brit. zool.* 2. *app. t.* 9. *Arct. zool. p.* 441. A. *Raj. av. p.* 102. *n.* 1. *Will. orn. p.* 288. *t.* 52. *Albin. av.* 2. *t.* 66.
White Spoonbill. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 13. *n.* 1.
β) Platalea pedibus ſpadiceis.
Spatule blanche de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p.* 89. *t.* 51.
γ) Platalea tota alba, criſta longa, pedibus rubeſcentibus.
Spatule huppée de l'isle de Luçon. *Sonn. it. p.* 90. *t.* 52.
Habitat ad aquas ab inſulis Ferro *ad* caput bonae ſpei, *et* mare caſpium *usque*, β) *et* γ) *in inſulis* Philippinis, *migrans, ardeae magnitudine, collo tamen pedibusque brevioribus*, 2 *pedes et* 8 *pollices longa, gramine, caricibus, arundinum radicibus, ſerpentibus, ranis, mytilis aliisque teſtaceis, praeſertim piſcibus victitans, quos aliis ſaepe avibus eripit; in altiſſimis arboribus nidificans, et ova* 3-4 *alba, paucis maculis rubeſcentibus varia, gallinaceis aequalia pariens, incubationis tempore clamoſa; caro anſerina, juniorum praecipue.*
Roſtrum *nigrum, fuſcum aut maculatum*; lingua *cordata*; irides *griſeae*; lora, orbitae *et* gula *dilatabilis, calva et nigra*; remigum *apex interdum niger*; pedes *nigri, vel ex cinereo fuſci.*

Ajaja. 2. Pl. corpore ſanguineo.
Platea roſea. *Briſſ. av.* 5. *p.* 356. *n.* 2. *t.* 30.
Platea incarnata. *Sloan. jam.* 2. *p.* 316. *Raj. av. p.* 189. *n.* 5.
Platea braſilienſis Ajaja dicta. *Marcgr. braſ.* 204.
Spatule couleur de roſe. *Buff. pl. enl. n.* 165.
Spatule ou Palette. *Pern. it.* 1. *p.* 184. *t.* 2. *f.* 3. *du Prat. Louiſ.* 2. *p.* 116.
Bec à cueiller. *Fermin Surin.* 2. *p.* 153. *Bajon Cayenn.* 2. *p.* 257.
Braſilian Spoonbill, called Ajaja. *Will. orn. p.* 289. *Raj. av. p.* 152. *n.* 3. *Harris coll. it.* 1. *p.* 728.
Roſeate Spoonbill. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 16. *n.* 2. *t.* 73.
β) Tlauhquechul ſ. Platea mexicana. *Hern. mex.* 49. *Raj. av. p.* 102. *n.* 2. *Will. orn. p.* 289. *n.* 2.
Avis vivivora. *Nieremb. nat.* 212.

Platea

Platea coccinea. *Briſſ. av.* 5. *p.* 359. *n.* 3.
Scarlet Spoonbill. *Sloan. jam.* 2. *p.* 316. *Baner. Guj. p.* 170.
Habitat in America *auſtrali, inſulisque vicinis, leucorodia paulo minor, 2 pedes et 3 pollices longa, piſcibus minoribus victitans.*
Roſtrum *ſubpellucidum, ex cinereo album, ſulco exaratum, margini parallelo*; facies *et* gula *denudata, albida*; pedes *griſei*; ungues *nigricantes*; *β) primo aetatis anno colore ex nigricante badio, altero roſeo, tertio coccineo induta eſſe fertur.*

pygmaea. 3. Pl. corpore ſupra fuſco, ſubtus albo. *Muſ. Ad. Fr.* 2. *p.* 26. *Baner. Guj. p.* 171.
Dwarf Spoonbill. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 17. *n.* 3.
Habitat in Surinamo *et* Gujana, *paſſeris magnitudine.*
Roſtrum *nigrum, capite longius, apice fere rhomboidali, mandibulae ſuperioris apice et angulis albis*; remigum *ſcapi albi*; cauda *brevis, rotundata, leucophaea*; pedes *fiſſi*; *unguibus acuminatis.*

81. PALAMEDEA.

Roſtrum conicum, mandibula ſuperiore adunca.
Nares ovales.
Pedes tetradactyli, fiſſi, breviſſima modo membrana digitos ad ortum connectente.

cornuta. 1. P. alulis biſpinoſis, fronteque cornuta.
Anhima. *Marcgr. braſil.* 215. *Jonſt. av. t.* 61. *Will. orn. p.* 276. *t.* 47. *Raj. av. p.* 96. *n.* 7. *Laët amer.* 13. *Cond. amaz.* 174. *Briſſ. av.* 5. *p.* 518. *n.* 1.
Kamichy. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 335. *t.* 18. *Pl. enl. n.* 451.
Aigle d'eau cornu. *Fermin ſurin.* 2. *p.* 143.
Camoucle. *Bajon Cayenn.* 2. *p.* 286. *t.* 4.
Horned Screamer. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 18. *n.* 1. *t.* 74.
Habitat rarior, mare feminaque ſimilibus perpetuo junctis, in Americae *auſtralis regionibus nonnullis, potiſſimum uliginoſis et maritimis, herbis, ſeminibus, praeſertim reptilibus*

libus victitans, gallopavonis magnitudine, 3 pedes et 4 pollices alta; nidum ad aquas furni facie, magnum ex luto struens, et ova 2, si haec auferantur, altera adhuc vice, anserinis aequalia pariens, terribili voce clamitans; caro *obscura, adultae tenax, pulli esculenta.*

Rostrum *nigricans, mandibulae superioris basi subgibbosa;* nares *circa medium rostri, perviae;* cornu *in vertice* 3 *pollices longum, gracile, acuminatum;* irides *aureae;* caput, collum, pedes *et* corpus *supra nigrum, subtus album;* alae *subtus rufescentes, spinis robustis, acutis, corneis, flavis munitae;* digitus *posticus rectus.*

cristata. 2. P. inermis, fronte cristata.

Cariama. *Marcgr. bras.* 203. *Will. orn. p.* 276. *t.* 51. *Raj. av. p.* 96. *n.* 6. *Briss. av.* 5. *p.* 516. *n.* 1. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 325.

Crested Screamer. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 20. *n.* 2.

Habitat in Brasilia, *ardeae magnitudine et victu, voce gallopavonis feminae late longeque sonora, carne sapida.*

Rostrum *breve, accipitis;* irides *aureae;* *fasciculus pennarum nigrarum cinereo variarum supra basin rostri;* color *corporis ex griseo, rufo et fusco mistus;* pedes *longi, flavi; posterior alte positus;* ungues *fusci.*

82. MYCTERIA.

Rostrum subadscendens, acutum: Mandibula superiore triquetra, rectissima; inferiore trigona, acuminata, adscendente.

Frons calva.

Nares lineares.

Lingua nulla.

Pedes tetradactyli.

americana. 1. Mycteria.

Ciconia brasilienfis. *Briss. av.* 5. *p.* 371. *n.* 4.

Jabiru-guacu. *Marcgr. bras.* 701. *Pis. brasil.* 87. *Raj. av. p.* 96. *n.* 5. *Will. orn. p.* 276.

Jabiru. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 280. *t.* 13. *Pl. enl. n.* 817.

Touyouyou. *Baj. Cayenn.* 2. *p.* 263. *t.* 3.

Ameri-

American Jabiru. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 22. *n.* 1. *t.* 75.
β) Ciconia gujanensis. *Briss. av.* 5. *p.* 373. *n.* 5.
Jabiru. *Raj. av. p.* 96. *n.* 4. *Will. orn. p.* 275. *t.* 47.
Habitat in Americae *australis*, *praesertim* Gujanae *et* Cayennae *humidis, struthione solo minor, rheae perquam affinis*, 6 *fere pedes longa, ferox, voracissima, piscibus victitans, in arboribus magnis riparum nidificans, ova* 2 *magna pariens, primo anno grisea, altero rosea, tertio demum constanter fere tota alba; junioris caro sapida, adultae dura et oleosa.*

Rostrum *ciconiae nigrum*; caput *et plurima pars* colli *calva, subatra*; *reliquum* collum *similiter denudatum, sed sanguineum*; occiput *cinerascens*; pedes *robusti, longissimi, nigricantes.*

83. CANCROMA. *Rostrum* gibbosum: mandibula superiore cymbae resupinatae forma.

Nares exiguae in sulco rostri.

Lingua parva.

Pedes fissi.

Cochlearia. 1. C. ventre rufescente,
Cochlearius. *Briss. av.* 5. *p.* 506. *n.* 1.
Savacou. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 443. *t.* 23. *Pl. enl. n.* 38.
Boatbill. *Brown illustr. p.* 92. *t.* 36.
Crested Boatbill. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 26. *n.* 1. *t.* 76.
β) Cochlearius naevius. *Briss. av.* 5. *p.* 508. A.
Habitat in Americae *australis arboribus ad aquas positis, ut rami supra aquas pendeant, piscibus inhians, quibus victitat,* 22 *pollices longa.*
Rostrum *obscurum aut fuscum*; mandibula *superior margine superiore prominente, utrinque sulco excarata*; nares *ovales, obliquae*; cutis *inter mandibulam inferiorem distensilis*; occiput *pennis nigris, ab* 1-6 *pollices longis, angustis, pendulis, acuminatis cristatum*; frons *alba*; *reliquum* corpus *ex caerulescente cinereum, subtus ex caerulescente album, abdomine rufo, semitorque nigro*; pedes *ex flavicante fusci, unguibus nigris.*

Cancrophaga. 2. C. ventre candicante.
Cochlearius fuscus. *Briss. av.* 5. *p.* 509. *n.* 2.
Tamatia. *Marcgr. bras.* 208. *Jonst. av. t.* 59. *Will. orn.* *p.* 318. *t.* 78. *Raj. av. p.* 116. *n.* 12.
Cuillier brune. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 443. *Pl. enl.* *n.* 869.
Patria, facie, magnitudine, moribus, victu Cochleariae maxime affinis, cancris tamen etiam vescitur.
Corpus *supra ex rufescente fuscum, subtus pallidissime stramineum*; cauda *ex rufo cinerea*; rostrum *et* pedes *ex flavo fusci.*

SCOPUS. *Rostrum* crassum, compressum, longum, rectum.

Nares lineares, obliquae.

Pedes tetradactyli, fissi.

Umbretta. 1. Scopus. *Briss. av.* 5. *p.* 503. *n.* 1.
Ombrette. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 440.
Ombrette du Sénégal. *Buff. pl. enl. n.* 796.
Umbre. *Brown illustr. p.* 90. *t.* 35.
Tufted Umbre. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 30. *n.* 1. *t.* 77.
Habitat in Africa, *cornicis magnitudine*, 20 *pollices longus.*
Rostrum *fuscum*; mandibula *superior apice parumper adunca, utrinque sulco longitudinali exarata, in quo nares sitae sunt, inferior versus finem angustior, paulisper truncata*; color *corpori fuscus, terrae umbriae aemulus*; occiput (maris) *cristatum*; cauda *obscure fasciata*; pedes *longi, digitis ad ortum membrana brevi connexis, unguibus exiguis.*

84. ARDEA. *Roſtrum* rectum, acutum, longum, ſubcompreſſum, ſulco e naribus verſus apicem exaratum.

Nares lineares.

Lingua acuminata.

Pedes tetradactyli.

* Criſtatae: *roſtro vix capite longiore.*

pavonina. 1. A. criſta ſetoſa erecta, temporibus palearibusque binis nudis.

Pavo marinus. *Cluſ. exot.* 105.

Balearica. *Briſſ. av.* 5. *p.* 511. *n.* 1. *t.* 41.

Grus balearica. *Aldr. orn.* 3. *p.* 361. *t.* 362. 363. *Dodart mém.* 3. *p.* 199. *t.* 28. *Beſl. muſ.* 36. *t.* 9.

Grus capenſis fuſca, capite aureo galeato. *Petiv. gaz. t.* 76. *f.* 9.

Balearic Crane. *Raj. av. p.* 95. *n.* 3. *Will. orn. p.* 275. *t.* 48. *Sloan. jam. p.* 214.

Crowned african Crane. *Edw. av. t.* 192.

Crown Bird. *Boſm. Guin. p.* 250. *t.* 11.

Crowned Heron. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 34. *n.* 1.

Pfau. *Kolb. Vorgeb.* 2. *p.* 245. *t.* 7. *f.* 5.

Habitat in Africa *a* Guinea *ad* Caput viride, *ardeae majoris magnitudine*, 2 *pedes et* 9 *pollices longa*, *facile manſueſcens*, *vermibus et vegetabilibus victitans*, *celerrime currens*, *egregie diuque volans*; *pedi inſiſtendo dormiens*; *caro tenax.*

Roſtrum *fuſceſcens*; irides *griſeae*; vertex *pennis brevibus holoſericeis aterrimis tectus*; occipitis *criſta ſpadicea*, *ambitu circulari*; tempora *membrana carnoſa*, *reniformi*, *ſubtus rubicunda veſtita*; corpus *ex caeruleſcente cinereum*, *feminae nigrum*, *cui palearia nulla*, *et guttaris pennae pendulae vix elongatae*; tectrices *alarum albae*, *majores rufeſcentes*, *corpori proximae nigricantes*; cauda remigesque *majores nigrae*; *ſecundariae badiae*; pedes *obſcuri.*

Virgo. 2. A. ſuperciliis albis poſtice retrorſumque longe criſtatis.

Grus numidica, virgo numidica vulgo dicta. *Briſſ. av.* 5. *p.* 388. *n.* 12.

Grue de Numidie ou Demoiſelle. *Dodart mém.* 3. *p.* 3. *t.* 35. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 313. *t.* 15. *Pl. enl. n.* 241.

Numidian Crane. *Alb. av.* 3. *t.* 83.
Demoiſelle of Numidia. *Edw. av. t.* 134.
Demoiſelle Heron. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 35. *n.* 2.
Habitat in Africae *littore orientali et occidentali*, Aegypto, Numidia, *terra* Tripolitana, *circa* mare Caſpium *et* nigrum *lacumque* Baikal *in uliginoſis fluminumque vicinia, facile manſueſcens et docilis, gruis magnitudine*, 3 *pedes et* 3 *pollices longa.*
Roſtrum *flavicans, baſi vireſcens, apice rubrum*; irides *rubrae*; vertex *cinereus*; *reliquum* caput, cervix, guttur, pectus, pedes, remigum, tectricum*que apex nigra*; pectoris *pennae longae, pendulae*; criſta *alba retrorſum pendula*; dorſum, uropygium, cauda, abdomen, criſſum *ex caeruleſcente cinerea.*

* * Grues: *capite calvo.*

canadenſis. 3. A. ſyncipite nudo papilloſo, corpore cinereo, alis extus teſtaceis.
Grus freti Hudſonis. *Briſſ. av.* 5. *p.* 385. *n.* 11.
Grue brune. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 310.
Blue Crane. *Forſt. act. angl.* 62. *p.* 409.
Brown and aſhcoloured Crane. *Edw. av. t.* 133.
Brown Crane. *Arct. zool.* 2. *p.* 443. *n.* 340. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 43. *n.* 7.
Habitat in America *ſeptentrionali, ad* novam Hiſpaniam *usque migrans, in hoc itinere campos* Huronum *oryziferos devaſtans, ova* 2 *pariens, frumento etiam victitans, moribus ceterum americanae ſimilis*, 3 *pedes et* 3 *pollices longa.*
Roſtrum *obſcurum, mandibulae inferioris apice pallide incarnato*; vertex *cute rubra pariſſimis pilis veſtita tectus*; occiput, collum, dorſum *inferius*, uropygium, cauda *et* corpus *ſubtus cinereum*; dorſo *ſuperiore, interſcapuliis*, tectricibus *alarum*, remigibus*que ſecundariis rufeſcentibus*; remiges *majores ex atro fuſcae*; pedes *nigri.*

Grus. 4. A. occipite nudo papilloſo, pileo remigibusque nigris, corpore cinereo, rectricibus intimis laceris. *Fn. ſuec.* 161. *Scop. ann.* 1. *n.* 122. *Brünn. orn. n.* 156. *Kram. el. n.* 345.
Grus. *Bell. av.* 41. *n.* 6. *Geſn. av. p.* 528. *t.* 529. *Aldr. orn.* 3. *p.* 324. *t.* 329. *Marſ. Dan.* 5. *p.* 6. *t.* 1. *Briſſ. av.* 5. *p.* 374. *n.* 6. *t.* 33.
Grue. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 287. *t.* 14. *Pl. enlum. n.* 769.

Crane.

Crane. *Raj. av. p.* 95. *n.* 1. *Will. orn. p.* 374. *t.* 48. *Albin. av.* 2. *t.* 65.
Common Crane. *Brit. zool. app. p.* 629. *t.* 1. *Arct. zool.* 2. *p.* 453. A. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 40. *n.* 5.
Kranich. *Kolbe Vorgeb.* 2. *p.* 141. *Frisch av. t.* 194. *Bloch berl. Besch.* 4. *p.* 586. *t.* 16.
β) Grus japonensis. *Briss. av.* 5. *p.* 381. *n.* 9.

Habitat in Asia *et* Europa *septentrionali*, *autumno gregatim in* Asiam *australem et* Africam *migrans*, 5 *pedes longitudine excedens*, *reptilibus omnis generis*, *et frumento viridi victitans*, *hinc segetibus infesta*, *in uliginosis nidificans et ova* 2 *caerulescentia pariens*, 3000 *passus alte volans*, *super unicum pedem quiescens.*

Rostrum *ex virescente nigrum*; frons *lanugine nigra tecta*; occiput *rubrum*, *pilis rarissimis*; *infra* occiput *area cinerea*; tempora *et* cervix *alba*; tectrices *alarum majores nigricantes*; *in extremo alarum fasciculus pennarum laxarum apice crispatarum*, *quas erigere potest avis*; pedes *nigri*: Mari trachea *intra angulum acutiorem sterni ceterum obtusanguli decurrit*, *ad finem ejus flectitur*, *prope superficiem inferiorem versus anteriora procedit*, *iterum flectitur*, *ad mediam sterni altitudinem regressa arcum dimidium format*, *antrorsum currit*, *versus cavum pectoris flectitur*, *et nunc demum in bronchia discedit*; *ceterum immota*, *et ad sternum affixa*; *hoc in superficie inferiore supra et infra eminet*, *ut flexurae tracheae locus sit*; feminae *trachea recta*, *ad medium sterni pertingens*, *in bronchia abit.*

americana. 5. A. vertice, nucha temporibusque nudis papillosis, fronte, nucha remigibusque primariis nigris, corpore albo.

Grus americana. *Briss. av.* 5. *p.* 382. *n.* 10.
Grue blanche. *Buff. hist. nat. desois.* 7. *p.* 303.
Grue d'Amerique. *Buff. pl. enl. n.* 889.
Hooping Crane. *Arct. zool.* 2. *p.* 442. *n.* 339. *Catesb. Car.* 1. *t.* 75. *Edw. av. t.* 132. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 42. *n.* 6.

Habitat in America, *a sinu* Hudsonis *ad* Floridam *usque*, *Majo illuc migrans*, *Septembri huc redux*, 4 *pedes* 6 *pollices longa*, *alte clamans*, *vermibus et insectis paludum victitans*, *nidum struens ex gramine et plumis*, *ova pariens* 2 *alba*, *cygneis similia*, *quibus per* 20 *dies incubat*, *pullis primo flavis.*

Rostrum *ex flavicante fuscum*; *mandibulis prope apicem margine serratis*; verticis *cutis rubra*, *pilis nigris vestita*; alarum

alarum *plica rosea*; uropygii *pennae deorsum curvatae*; pedes *nigri*.

Antigone. 6. A. capite nudo collarique papilloso rubris, corpore cinereo, remigibus primoribus nigris.

Grus orientalis indica. *Briss. av.* 5. *p.* 378. *n.* 7.

Greater indian Crane. *Edw. av. t.* 45.

Indian Crane. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 38. *n.* 4.

β) Grus torquata.

Grue à collier. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 307. *Pl. enl. n.* 865.

Habitat in India *et deserto* Mongolico, *ultra lacum* Baikal *migrans, grue major et* 5 *fere pedes alta.*

Rostrum *ex virescente flavum, apice obscurum*; irides *splendido avellanae colore tinctae*; vertex *et macula circa aures alba*; pedes *rubri, unguibus albis.*

gigantea. 11. A. alba, temporibus et fronte rubris calvis rugosis, remigibus decem primoribus splendide nigris, rostro pedibusque rubris. *S. G. Gmelin it.* 2. *p.* 189. *t.* 21.

Grus leucogeranos. *Pall. it.* 2. *p.* 714. *n.* 30. *t.* I. *Georg. it. p.* 171.

Sibirian Crane. *Arct. zool.* 2. *p.* 455. B. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 37. *n.* 3.

Habitat circa mare Caspium, *et in* Sibiriae *vastissimis paludibus campisque lacuum maxima copia irrigatis circa fluvios* Ischimum, Irtim *et* Ob *et in septentrionalibus, inter arundines inaccessas supra cumulos cespitum majores ex herbis congestis nidum struens, et ova* 2 *cinerascentia lituris crebris fuscis varia, anserinis aequalia pariens, crebro clamans, pisciculis, ranis, lacertis victitans, congenerum maxima, ut stans erecta* $4\frac{1}{2}$ *pedes altitudine aequet. Utriusque mandibulae margines versus apicem serrati*; facies *ultra oculos nuda, setulis crebris rufis adspersa*; irides *pallide albae; pennae scapulares parum elongatae*; cauda *subaequalis, rectricibus* 12; annua avis *toto corpore fulvescens, subtus albida, rostro, facie, pedibusque ex fusco virescentibus.*

*** Ciconiae: *orbitis nudis.*

Ciconia. 7. A. alba, orbitis remigibusque nigris, rostro, pedibus cuteque sanguineis. *Fn. suec.* 162. *Scop. ann.* 1. *n.* 123. *Brünn. orn. n.* 154.

Ciconia.

Ciconia. *Bell. av.* 45. a. *Gesn. av.* 262. *Aldr. orn.* 3. *p.* 291. *Jonst. av.* 147. *t.* 50. *Marsf. Dan.* 5. *p.* 26. *t.* 11.
Ciconia alba. *Briss. av.* 5. *p.* 365. *t.* 32.
Cigogne blanche. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 253. *n.* 12. *Pl. enl. n.* 866.
White Stork. *Arct. zool.* 2. *p.* 455. C. *Raj. av. p.* 97. *n.* 1. *Will. orn. p.* 286. *t.* 52. *Alb. av.* 2. *t.* 64. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 47. *n.* 9.

Habitat in Europa, Asia, Africa, *semidomestica, rarior in* Italia, Anglia, 3 *pedes totidemque pollices circiter longa, victitans amphibiis, bufonibus tamen repudiatis, hinc bonos serpentum exitio tantus, ut nefas in multis terris, occidere; noctu stridet in nido magno ex baculis structo ad pagos in altis, passeribus resonante, ubi glomerat immenso de turre* ciconia *rostro, ova* 2-4 *sordide ochroleuca, anserinis aequalia, paulo tamen longiora parit, ex quibus prodeunt pulli initio fusci, a mare et femina alternatim custoditi, uni pedi insistens dormit, statis autumni temporibus numerosissimis cohortibus miro ordine et velocitate migrat trans pontum in* Aegyptum *et* Barbariae *paludes; aestivat inter* Sueciam *et* Italiam: *Caro insipida.*

Rostrum $7\frac{3}{4}$ *pollices longum; pennae* scapulares *nonnullae, et* tectrices *alarum majores nigrae;* mas *feminae similis.*

Maguari. 22. A. alba, orbitis pedibusque rubris, rostro cinereo, tectricibus caudae superioribus et alarum majoribus, remigibus pennisque scapularibus nigris.

Ciconia americana. *Briss. av.* 5. *p.* 369. *n.* 3. *Raj. av. p.* 97. *n.* 3. *Will. orn. p.* 287.
Maguari. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 275.
American Stork. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 50. *n.* 10.

Habitat in calidiori America, *praesertim* Brasilia, *albae aequalis, et hujus more rostro stridens, carne sapida.*

Rostrum 9 *pollices longum, basi ex flavicante virens;* irides *argenteae; pennae* juguli *longae laxaeque;* ungues *lati planique.*

nigra. 8. A. fusca, pectore abdomineque albo. *Fn. suec.* 163. *Scop. ann.* 1. *n.* 124. *Brünn. orn. n.* 157. *Georg. it. p.* 171.
Ciconia fusca. *Briss. av.* 5. *p.* 362. *n.* 1. *t.* 31.
Ciconia nigra. *Bell. av.* 145. *Gesn. av.* 273. *Aldr. orn.* 3. *p.* 310. *t.* 371.
Cigogne noire. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 271.
Cigogne brune. *Buff. pl. enl. n.* 399.

Black

Black Stork. *Arct. zool.* 2. *p.* 456. D. *Raj. av. p.* 97. *n.* 2. *Will. orn. p.* 286. *t.* 52. *Albin. av.* 3. *t.* 82. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 50. *n.* 11.

Habitat in Europa *et ad* Tanain *ad* mare Caſpium *usque, alba rarior, magis ſolitaria, hominemque magis metuens, ut in ſilvas denſas et paludes ſecedat, aeſtate partes magis boreales, quam alba, frequentans, piſcibus et amphibiis victitans,* 2 *pedes* 9 *pollices longa, carne inſipida.*

Roſtrum $5\frac{1}{2}$ *pollices longum, ex viresſcente griſeum, apice albicans;* vertex remiges*que fuſcae, nitore violaceo et viridi;* collum *fuſcum, inferius violaceo-nitens, et interdum fuſco-maculatum;* dorſum, tectrices *alarum et* ſcapulares *pennae ex violaceo fuſcae, nitore viridi;* uropygium *fuſcum;* remiges *corpori proximae anguſtae;* cauda *rotundata;* pedes *rubri;* ungues *lati et plani.*

* * * * Ardeae: *ungue intermedio introrſum ſerrato.*

dubia. 27. A. glauca, ſubtus ſordide alba, roſtro ſubtrigono.
Argill or Hargill. *Ives it. p.* 183.
Boorong Cambing or Booring-volar. *Marsd. Sumatr. p.* 98?
Gigantic Crane. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 45. *n.* 8.
Habitat in India *et* Africa, *gregatim ad oſtia fluviorum, teſtaceis, amphibiis, avibus, mammalibus victitans, voraciſſima, docilis, facileque manſueſcens, ad* 7 *pedes alta.*
Roſtrum *multicolor, baſi* 16 *pollices amplum in ambitu;* pennae *ſuperiores robuſtae, pectoris longae;* abdomen *lanugine tectum; ſimili, ſed alba et rariore veſtitum* caput; *in medio colli membrana longa conica, veſicae ſimilis, rarius lanugine brevi conſita.*

torquata. 28. A. occipite nigro criſtato, dorſo fuſco, collo et abdomine ſordide albis, pectore nigro, lunulis flaveſcentibus. *Miller illuſtr. t.* 36.
Habitat in America *meridionali.*

Nyctico-rax. 9. A. criſta occipitis tripenni alba horizontali, dorſo nigro, abdomine flaveſcente. *Scop. ann.* 1. *p.* 116.
Ardea Kwakwa. *S. G. Gmelin. nov. comm. Petr.* 15. *p.* 452. *t.* 14.
Ardea cinereo nigro alboque varia, criſta horizontali ex tribus pennis longitudine roſtri. *Kramer el.* 347.
Ardea cinerea minor. *Marſ. Dan.* 5. *p.* 10. *t.* 3. *Aldr. orn.* 3. *p.* 380. *t.* 381.

Nyctiſ-

Nycticorax. *Bell. av.* 44. *Gesn. av.* 627. *t.* 628. *Aldr. orn.* 3. *p.* 271. *t.* 272. *Briss. av.* 5. *p.* 493. *n.* 45. *t.* 39. *Nozem. nederl. Vogel t.* 77. 78.

Bihoreau. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 435. *t.* 22. *Pl. enl. n.* 758.

Lesser ash-coloured Heron or Night-Raven. *Raj. av. p.* 99. *n.* 3. *Will. orn. p.* 279. *t.* 49. *Alb. av.* 2. *t.* 67.

Night-Heron. *Artt. zool.* 2. *p.* 450. *n.* 356. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 52. *n.* 13.

grisea. b) A. capite laevi fusco, corpore fuscescente subtus albo, remigibus primoribus apice macula alba. *Syst. nat.* XII. 1. *p.* 239. *n.* 22.

Ardea grisea. *Briss. av.* 5. *p.* 412. *n.* 9. *t.* 36. *f.* 1.

Femelle de Bihoreau. *Buff. pl. enl. n.* 759.

Habitat in Europa (*rarissime tamen in* Anglia, *rarius in* Suecia *occurrens*), America (*praesertim in* Noveboraco *et insula* Rhode), *et* Asia, *in deserto* Uralensi, *circa mare* caspium, *in* Sina *et* Syria, *migrans*, 20 *pollices longa, piscibus et amphibiis victitans, in cacumine arborum, praesertim alni, interdum inter rupes nidificans, et ova* 3-4 *alba pariens; vox vomiturientis*; caro *insipida.*

Rostrum 4 *fere pollices longum, nigrum, basi flavicans*; irides *fulvae*; lora *cum* orbitis *viridia*; vertex *ex virescente niger, area nigra in cervicis parte superiore angulo acuto terminata*; crista 6 *fere pollices longa, apice obscura*; cervix *et latera* colli *cinerea*; dorsum *superius obsolete viride*; *inferius cum* uropygio, alis *et* cauda *cinerascens*; frons *alba*; pedes *ex flavicante virides*; ungues *obscuri.* Feminae (b) crista *nulla*; lora *alba*; vertex *et* corpus *supra fuscum et nitens*; dorso *tamen inferiore et* uropygio *fere griseo*; supercilia *albida, fusco mixta*; mentum *album*; guttur *griseum, striis flavicantibus*; alae *ex griseo fuscae, striis ochroleucis*; remiges rectrices*que cinereae, plurimae apice albae.*

jamaicensis. 29. A. fusca, subtus alba, capite subcristato, pectore et abdomine fuscescente striatis.

Jamaica Night-Heron. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 54. *n.* 14.

Habitat in Jamaicae *silvis, rarior, hominem metuens,* 1 *pedem et* 11 *pollices longa.*

Rostrum *obscurum, mandibulae superioris apice paulisper deorsum flexa*; irides *pallide stramineae*; area *oculorum nuda, virescens*; colli *pennae laxae*; *pennae* scapulares *non-*

nonnullae, remiges *primariae*, *et* alae *ſpuriae apice*, tectrices *alarum ſcapo albae*; pedes *fuſci*.

caledonica. 30. A. ferruginea ſubtus alba, criſta occipitis tripenni, capillitio nigro, ſuperciliis albis.
Caledonian Night-Heron. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 55. *n.* 15.
Habitat in nova Caledonia, 22 *pollices longa.*
Roſtrum *nycticoracis nigrum*; area *oculorum viridis*; *pennae* gutturis *laxae*; pedes *flavi*; ungues *obſcuri*.

cayennenſis. 31. A. cinerea, capitis nigri vertice albo, et criſta inaequali ſexpenni, alba, altera parte nigra.
Bihoreau de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 439. *Pl. enl. n.* 899.
Cayenne Night-Heron. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 56. *n.* 16.
Habitat in Cayenna, *Nycticoraci aequalis*, *ſed gracilior*, 21 *pollices longa.*
Roſtrum *nigrum*; lora *pallide viridia*; *linea alba a naribus infra oculos ad occiput*; color corporis *ex caeruleſcente cinereus*; dorſi *pennis per medium ſcapi ſtria nigricans*; remiges *nigrae*; pedes *alti flavicantes*.

purpurea. 10. A. occipite nigro, criſta dependente pennis duabus elongatis, corpore olivaceo ſubtus purpuraſcente.
Ardea criſtata, purpuraſcens. *Briſſ. av.* 5. *p.* 424. *n.* 14. *t.* 36. *f.* 2.
Héron pourpré. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 369. *Pl. enlum. n.* 788.
Creſted purpled Heron. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 95. *n.* 65.
β) Ardea, an botaurus major. *S. G. Gmelin nov. comm. Petrop.* XV. *p.* 482. *n.* 22. *t.* 24.
b) Ardea caſpia. *S. G. Gmelin it.* 2. *p.* 193. *t.* 24 (*avis annotina*).
Habitat circa Pontum Euxinum, *mare* caſpium, *lacus magnae* Tatariae, *fluvium* Irtiſch, 50° *latitudinis borealis non transgrediens*, *majore paulo minor*, 2 *pedes* 10½ *pollices longa.*
Roſtrum *fuſcum apice obſcurum ſubtus flavicans*; criſta *nigra*; orbitae *nudae*, *flavicantes*; *ab angulo oris ad occiput ſtria nigra*; mentum *album*; colli *pars dimidia ſuperior rufa lineis* 3 *longitudinalibus nigris*, *altera poſterius olivacea*, *ad latera rufa*, *anterius rufeſcens*, *pennis anguſtis*, *longis*, *pendulis*, *ſingulis macula nigra notatis*, *infimis apice albis*; corpus *ſubtus faſcia nigra a medio pectoris ad criſſum*; tectrices *caudae inferiores albae*, *rufo mixtae*,

mixtae, apice nigrae; alarum *anguli rufi;* remiges *obſcurae;* pedes *viresſcentes.*

major. 12. A. occipite criſta nigra dependente, corpore cinereo, collo ſubtus linea faſciaque pectorali nigris. *Scop. ann.* I. *n.* 117. *Kram. el. p.* 346. *n.* 4.
Ardea criſtata. *Briſſ. av.* 5. *p.* 396. *n.* 2. *t.* 35.
Ardea alia. *Geſn. av.* 219. *t.* 220. *Aldr. orn.* 3. *p.* 383.
Héron hupé. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 342. *Pl. enl. n.* 755.
Creſted Heron. *Albin. av.* I. *t.* 67.
Common Heron. *Brit. zool.* 2. *n.* 173. *Arct. zool.* 2. *p.* 444. *n.* 343. *Raj. av. p.* 98. *n.* I. *Will. orn. p.* 277. *t.* 49. *Lath. ſyn.* III. I. *p.* 83. *n.* 50.
Reiher. *Friſch av. t.* 199.

cinerea. b) Ardea occipite nigro laevi, dorſo caeruleſcente, ſubtus albido, pectore maculis oblongis nigris. *Fn. ſuec.* 165. *Syſt. nat.* XII. I. *p.* 236. *n.* II. *Scop. ann.* I. *n.* 117. *Brünn. orn. n.* 156.
Ardea cinerea major. *Bell. av.* 42. *Aldr. orn.* 3. *p.* 377. A 378. *Geſn. av.* 212. *Jonſt. av.* 151. *t.* 50. *Marſ. dan.* 5. *p.* 8. *t.* 2.
Ardea. *Geſn. av.* 207. *Aldr. orn.* 3. *p.* 365. *Briſſ. av.* 5. *p.* 392. *n.* I. *t.* 34.
Héron. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 342. *t.* 19. *Pl. enl. n.* 787.
Common Heron. *Brit. zool. n.* 173. *t.* 61. *Alb. av.* 3. *t.* 78.
Reiger. *Friſch av. t.* 198. *Günth. Samml. Neſt. u. Eyer. t.* 44.
c) Ardea rhenana. *Sander Naturf.* XIII. *p.* 195.
Habitat per omnem terrarum orbem in uliginoſis et ad aquas, per integras nonnunquam horas piſcibus inhians, quibus potiſſimum, praeterea etiam ranis et ipſis vegetabilibus victitat; junior facile manſueſcens, olim venatoribus magni aeſtimata, ſupra nubes volitando procellas indicans, volando caput inter humeros abſcondens, pedibus pendulis, incubationis tempore gregaria, nidum in collibus ex mari eminentibus, frequentius in altiſſimis arboribus ex baculis ſtruens, caricibus, lana, plumisque inſtratis, ova pariens 4-5 ex viresſcente caerulea. Tres pedes, totidemque pollices longa.
Roſtrum *obſcurum, baſi ſubtus flavicans;* area *oculorum viresſcens nuda;* irides *flavae;* tempora *nigra;* frons, vertex *et* cervix *alba,* criſtae (*in femina* b) *vix conſpicuae*) *pen-*

nae 2-8 *pollices longae*; alae *ſpuriae* remigésque *majores nigrae*; pennae *ſcapulares et gutturis laxae*, *longae*, *anguſtae*, *pendulae*; corpus *ſubtus album*; pedes *ſordide virides*. Feminae *caput griſeum*; pennae *pendulae breviores*.

Garzetta. 13. A. occipite criſtato, corpore albo, roſtro nigro, loris pedibusque vireſcentibus. *Kram. el. p.* 346. *n.* 3.
Ardea alba minor ſ. Garzetta. *Aldr. orn.* 3. *p.* 389. *t.* 391. *Will. orn. p.* 280. *Raj. av. p.* 99. *n.* 5. *Marſ. dan.* 5. *p.* 14. *t.* 5.
Ardea alba minor ſecunda. *Will. orn. p.* 281.
Leucorodias. *Aldr. orn.* 3. *p.* 392. *t.* 395.
Garzetta. *Geſn. av.* 214.
Egretta. *Bell. av.* 43. *Geſn. av.* 795. *Aldr. orn.* 3. *p.* 392.
Aigrette. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 372. *t.* 20. *Pl. enl. n.* 901.
Little Egret. *Brit. zool.* 2. *app.* *t.* 7. *Arct. zool. p.* 446. *n.* 347. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 90. *n.* 59.
Habitat in temperatiorum et calidiorum Orbis *partium uliginoſis et fluviorum ripis, piſcibus victitans*, 1 *pedem longa.*
Irides *flaveſcentes*; criſtae *pennae anguſtae*, *duae* 5 *pollices longae*; facies *nuda*, *viridis*; ungues *nigri.*

leucogaſter. 32. A. ex caerulco nigra ſubtus alba, occipitis criſta bipenni, roſtro, facie nuda pedibusque flavis.
Demi-Aigrette. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 378.
Héron bleuâtre à ventre blanc de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 350.
Demi-Egret. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 88. *n.* 57.
Habitat in Cayenna, *vix* 2 *pedes longa.*
Caput collum*que ex caeruleo atra*; dorſi *inferioris pennae paucae longae*, *anguſtae*, *pendulae*, *rufae.*

rufeſcens. 33. A. ex nigricante griſea, loris orbitisque viridibus, capitis, colli et longioribus anguſtisque dorſi pennis ex ferrugineo rufis.
Aigrette rouſſe. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 378. *Pl. enl. n.* 902.
Reddiſh Egret. *Arct. zool.* 2. *p.* 447. *n.* 348. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 88. *n.* 56.
Habitat in Louiſiana, 2 *fere pedes longa.*
Roſtrum *flavicans*, *apice obſcurum*; pedes *nigri.*

Egretta. 34. A. ſuberiſtata alba, pedibus nigris, pennis dorſi pectoriſque laxis anguſtis, pendulis longiſſimis.

Grande Aigrette. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 377. *Pl. enl. n.* 925.

Guiratinga. *Raj. av. p.* 101. *n.* 17? *Will. orn. p.* 285?

Great Egret. *Arct. zool.* 2. *p.* 446. *n.* 346. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 89. *n.* 58.

Habitat in inſula S. Dominici, *inſulis* Falkland *et* America *auſtrali ad* Louiſianam *usque*, *ſolitaria*, *hominem metuens*, *ad fluvios et lacus*, *in quorum inſulis et arundinetis latet*; *noctu victum quaerit*, *voce lupi aliquantum aemula*; pennae *ornamenti muliebris pars*: *Garzetta duplo major.*

Criſta *vix conſpicua*; roſtrum *nigrum*, *aut ſordide flavum*, *dorſo et apice obſcurum.*

Agami. 35. A. ex atro caerulea, ſubtus rufa, occipite laete caeruleo criſtato, temporibus et regione ſupraoculari albis.

Agami. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 382. *Pl. enl. n.* 859. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 97. *n.* 70.

Habitat in Cayenna, 31 *pollices longa.*

Roſtrum *obſcurum*; *pennae* criſtae 6-8 *longae*, *anguſtae*; colli *pars inferior et latera*, dorſique *pars inferior pennis longis*, *caeruleis*, *anguſtis*, *laxis*, *pendulis.*

Cocoi. 14. A. occipite, criſta dependente dorſoque cinereis, collo ſubtus nigro maculato, capitis lateribus nigris.

Ardea cayanenſis criſtata. *Briſſ. av.* 5. *p.* 400. *n.* 3.

Ardea fecunda. *Tetr. antill.* 2. *p.* 273. *t.* 246.

Soco. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 379.

Cocoi. *Margr. braſ.* 209. *Piſ. braſ.* 89. *Will. orn. p.* 284. *t.* 51. *Raj. av. p.* 100. *n.* 15. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 98. *n.* 71.

Blue Heron. *Alb. av.* 3. *t.* 79.

Habitat in Braſilia *et* Cayenna, *tres pedes longitudine excedens*, *tempore pluvio ſapida.* Habitat quoque in Asia. Gmel.

Roſtrum *ex virescente flavum*; irides *aureae*; corpus *cinereum*; criſtae *occipitalis pennae anguſtae* $5\frac{1}{2}$ *pollices longae*; genae, gula *et* cervix *albae*; colli *inferioris* dorſique *pennae longiſſimae pendulae.*

Johannae. 36. A. corpore ſupra cinereo, ſubtus albo, criſta dependente remigibusque nigris, juguli pennis longis laxis nigro-maculatis.

Johanna Heron. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 100. *n.* 74.

Habitat in inſula S. Johannae.

Roſtrum *flavicans*; facies *nuda ex flavicante viridis*; pedes *fuſceſcentes*.

Hoactli. 37. A. capite criſtato et corpore ſupra atro, ſubtus albo, facie nuda flavicante, fronte inter oculos alba, alis caudaque cinereis.

Ardea mexicana criſtata. *Briſſ. av.* 5. *p.* 418. *n.* 11.
Hoctli. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 382.
Hoactli or Dry Bird. *Raj. av. p.* 179. *n.* 8. *Will. orn. p.* 389.
Hoacton. *Will. orn. p.* 391.
Dry Heron. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 100. *n.* 79.
Habitat in novae Hiſpaniae *lacubus*, 3 *pedes* 3 *pollices longa, inter arundines pariens, mordicus ſe defendens, alte vociferans.*
Roſtrum *nigrum, ad latera flavum*; irides pedesque *flavi*: Femina *ſupra fuſca, albedine interniſta, ſubtus alba, fuſco tinctu adſperſo.*

Hohu. 38. A. capite purpureo criſtato, corpore cinereo, alarum angulis albis, fronte ex nigro et albo, alarum tectricibus ex caeruleo et cinereo variis.

Ardea mexicana cinerea. *Briſſ. av.* 5. *p.* 504. *n.* 5.
Xoxoukqui Hoactli, Hoacton, ſeu ardea cinerea minor mexicana criſtata. *Raj. av. p.* 102. *n.* 21.
Hohou. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 384.
Houhou Heron. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 101. *n.* 76.
Habitat, rarior, in novae Hiſpaniae *humidis.*

Herodias. 15. A. occipite criſtato, corpore fuſco, femoribus rufis, pectore maculis oblongis nigris.

Ardea virginiana criſtata. *Briſſ. av.* 5. *p.* 416. *n.* 10.
Grand Héron d'Amérique. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 385.
Larged creſted Heron. *Catesb. Car. app. t.* 10. *f.* 1.
Great Heron. *Arct. zool.* 2. *p.* 443. *n.* 341. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 85. *n.* 51.
Habitat ad Virginiae *lacus et fluvios, lacertis, ranis piſcibusque victitans*, 5 *pedes longitudine ſuperans.*
Roſtrum *fuſcum*; facies *flaveſcens*; criſtae *pennae nigrae nonnullae* 5 *pollices longae*; collum *et* pectus *rufa*; remiges *nigrae.*

Ludoviciana. 39. A. capite colloque rufis, fronte alba rufo-maculata, vertice criſtato, tectricibus alarum caudaque viridibus, dorſo cinereo purpura tincto, ventre ex rufo fuſco.

Crabier roux à tête et queue vertes. *Buff. hiſt. nat. des. oiſ.* 7. *p.* 407.

Crabier

Crabier de la Louisiane. *Buff. pl. enl. n.* 909.
Louisiane Heron. *Arct. zool.* 2. *p.* 448. *n.* 350. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 81. *n.* 47.
Habitat in Louisiana, 16 *pollices longa.*
Rostrum *obscurum*; lora *flavescentia*; remiges *nigricantes multae apice albae*; tectrices *alarum margine fulvae*; pedes *flavi*; ungues *nigri.*

violacea. 16. A. occipite luteo, crista alba, corpore albo nigroque striato, subtus caerulescente, pedibus luteis.
Ardea caerulea. *Raj. av. p.* 189. *n.* 2. *Sloan. jam.* 2. *p.* 314. *t.* 264. *f.* 5.
Cancrophagus bahamensis. *Briss. av.* 5. *p.* 481. *n.* 41.
Crabier gris-de-fer. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 399.
Grey-crested Gaulding. *Brown jam. p.* 478.
Crested Bittern. *Catesb. car.* 1. *t.* 79.
Yellow crowned Heron. *Arct. zool.* 2. *p.* 448. *n.* 352. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 80. *n.* 46.
Habitat in Carolina (*pluvio tempore*) *et in insulis* Bahamensibus *frequentissima, hominem non metuens, carne sapida*, 15½ *pollices longa.*
Rostrum *nigrum*; irides *rubrae*; facies *nuda viridis*; cristae *pennae* 4-5 *ad* 6 *pollices longae*; caput *ex caeruleo atrum*; stria *ab oris angulo utrinque ad occiput alba*; remiges *ex caerulescente fuscae*; cauda *caerulea*; ungues *obscuri.*

caerulea. 17. A. occipite cristato, corpore caeruleo.
Ardea major grisea cristata, capite nigro, vertice et ciliis albicantibus. *Brown jam.* 478.
Cancrophagus caeruleus. *Briss. av.* 5. *p.* 484. *n.* 42.
Black or blue Gaulding. *Raj. av. p.* 189. *n.* 3. *Sloan. jam. p.* 315. *t.* 263. *f.* 3.
Blue Heron. *Arct. zool.* 2. *p.* 448. *n.* 351. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 78. *n.* 45.
Blue Bittern. *Catesb. Car.* 1. *t.* 76.
β) Ardea caerulea capite et collo ex rufo fuscis.
Crabier bleu à cou brun. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 399.
Heron bleuâtre de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 349.
γ) Ardea corpore ex caeruleo viridi, mento gulaque albis.
δ) Cancrophagus brasilienfis. *Briss. av.* 5. *p.* 479. *n.* 40.
Ardeola brasiliensis Marcgravii. *Raj. av. p.* 101. *n.* 18.
Crabier chalybé. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 404.
Small brasilian Bittern of Marcgrave. *Will. orn. p.* 285.
Habitat in America, *praesertim australi, insulisque oppositis, etiam in* Tahiti, *cornice minor*, 16-19 *pollices longa.*

Roſtrum *caeruleum*, *ſubtus flavicans*; irides *flavae*; facies *et* orbitae *flavicantes*; caput collum*que purpureum*; dorſi *pennae anguſtae*, *longae*, *ſericeae*, *pendulae*; pedes *virides*; feminae *caput vix criſtatum*; dorſi *pennae longae nullae*; mentum *album*; colli *pars inferior albo nigroque ſtriata*; dorſum *plumbeum*.

rubiginoſa. 40. A. ferruginea, ſubtus exalbida nigro-ſtriata, capite ſubcriſtato, gula alba, dorſi maculis paucis nigris.

Ardea naevia. *Miller illuſtr. t.* 35.
Ruſty-crowned Heron. *Arct. zool.* 2. *p.* 452. *n.* 358. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 87. *n.* 53.
Habitat in America *ſeptentrionali*, *ſtellaris magnitudine.*
Roſtrum *gracile*; irides pedes*que flavi*; frons *et* remiges *obſcurae*; juguli *ſtriae* 4 *nigrae*; pectoris *pennae longae laxaeque*; *a* pectore *ad* cervicem *linea nigra*; cauda *brevis*, *plumbea.*

Hudſonias. 18. A. vertice criſtato nigro, corpore fuſceſcente ſubtus albido, collo ſubtus nigro-rufeſcente maculato.

Ardea freti Hudſonis. *Briſſ. av.* 5. *p.* 407. *n.* 7.
Héron de la baye de Hudſon. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 386.
Aſhcoloured Heron from North-America. *Edw. av. t.* 135.
Red-ſhouldered Heron. *Arct. zool.* 2. *p.* 444. *n.* 342. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 86. *n.* 52.
Habitat in America *a* Noveboraco *ad ſinum* Hudſonis *usque*, *lacus praeſertim frequentans*, 3 *pedes et* 3 *pollices longa*, *an herodiae femina?*
Roſtri *mandibula ſuperior nigra*, *inferior fulva*; criſtae *pennae ad* 4 *pollices longae*; facies *ex vireſcente flava*; tempora, capitis *pars inferior et* pectus *alba*, *hoc maculis oblongis nigris varium*; colli *pennae longae graciles*, *anteriores lituris amplis albis*, *poſteriores taeniis obſcuris variae*; pedes *obſcuri*; unguis *poſterior praelongus.*

comata. 41. A. ferruginea, ſubtus alba, criſta occipitis longiſſima alba nigro-marginata dependente. *Pall. it.* II. *p.* 715. *n.* 31.

Cancrophagus luteus. *Briſſ. av.* 5. *p.* 472. *n.* 37.
Guacco. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 392.
Crabier de Mahon. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 393. *Pl. enl. n.* 348.
Squacco. *Raj. av. p.* 99. *n.* 8. *Will. orn. p.* 381. *n.* 8. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 74. *n.* 39.

β) Cra-

β) Crabier de la Côte de Coromandel. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 393. *Pl. enlum. n.* 910.

Habitat in Italia *circa* Bononiam, *circa maris* caspii *sinus, et ad aquas stagnantes deserti* australioris, β) *in* Coromandel, *minutae magnitudine, audax.*

Rostrum *ex livido rubens, apice fuscum*; lora *virescentia*; irides *flavae*; crista *pennis* 6 *in dorsum dependentibus, in* β) *nulla*; cervix *quasi jubata*; dorsum *in violaceum colorem vergens, jubis alarum spuriarum longissimis*; alae, uropygium *et* cauda *nivea*; pedes *magni ex flavo virescentes.*

erythrocephala. 42. A. occipitis crista dependente rubra, corpore albo. *Molin. hist. nat. Chil. p.* 207.

Habitat in regno Chilensi.

Ohula. 43. A. occipitis crista et toto corpore albis. *Molin. hist. nat. Chil. p.* 208.

Habitat in regno Chilensi.

cyanocephala. 44. A. vertice cristato dorsoque caeruleis, alis nigris margine albis. *Molin. hist. nat. Chil. p.* 208.

Habitat in regno Chilensi.

Rostrum *nigrum*; abdomen *ex flavo virens*; cauda *viridis*; pedes *flavi.*

candidissima. 45. A. tota nivea, rostro pedibusque nigricantibus, oculis digitisque flavis, crista longissima setoso-pennacea, occiput, collum, pectus dorsumque tegente. *Jacquin Beytr. p.* 18. *n.* 13.

Habitat in inundatis prope Carthagenam Americae, *stellari tertia parte minor, voce clangosa, ingrata*; carne *eduli.*

Pennae *omnes immaculatae.*

castanea. 46. A. castanea subtus alba, facie et superciliis viridibus, gula saccata et uropygio albis, capite cristato. *S. G. Gmelin nov. comm. Petr.* 15. *p.* 454. *t.* 15. *et it.* 3. *p.* 253.

Ardea ralloides. *Scop. ann.* 1. *n.* 121.

Castaneous Heron. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 75. *n.* 40.

Habitat ad Tanain, *quo ex* Arabia *et* Ponto Euxino *venit, in arboribus nidificans; an varietas comatae?*

Irides *croceae*; capitis *latera flavescentia*; collum *ex badio flavum, infra ex flavo et candicante varium*; rectrices remigesque *niveae*; tectrices *alarum ochroleucae.*

47. A.

Squaiotta. 47. A. badia, crista capitis nigra: media penna alba, pennis scapularibus longis angustis basi albis.
Cancrophagus. *Briss. av.* 5. *p.* 466. *n.* 33.
Crabier Caiot. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 389.
Squajotta. *Raj. av. p.* 99. *n.* 9. *Will. orn. p.* 281. *t.* 50. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 72. *n.* 36.
Habitat in Italia *circa* Bononiam, 18 *pollices longa.*
Rostrum *flavum, apice nigrum*; facies *nuda flava*; crista *pennis* 30; pedes *virides.*

Galatea. 48. A. occipite subcristato, corpore lacteolo, rostro luteo, pedibus coccineis. *Molin. hist. nat. Chil. p.* 207.
Habitat in Chili.
Rostrum 4 *pollices longum*; pedes, *prouti* collum, 2 *pedes* 7 *pollices alti.*

ferruginea. 49. A. capite subcristato, corpore nigricante: pennarum apice ferrugineo, subtus ex ferrugineo, candicante, fuleo et cinereo vario. *S. G. Gmelin nov. comm. Petrop.* 15. *p.* 456. *t.* 16 *it.* 3. *p.* 253.
Ferruginous Heron. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 76. *n.* 41.
Habitat ad Tanain, *in arborum cacuminibus nidificans, migrans, piscibus et insectis victitans, pedem et* 9 *pollices longa.*
Rostrum *supra fuscum, subtus ex incarnato viride*; facies *nuda, viridis*; irides *croceae*; mentum *ochroleucum*; remiges *ex fusco nigrae, apice albae.*

erythropus. 88. A. capite cristato, corpore ex croceo in badium vergente.
Ardea haematopus f. Cirris. *Raj. av. p.* 99. *n.* 7. *Will. orn. p.* 281. *n.* 50.
Cancrophagus rufus. *Briss. av.* 5. *p.* 489. *n.* 35.
Crabier roux marron. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 390.
Red-legged Heron. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 73. *n.* 38.
Habitat circa Bononiam, *virescentis magnitudine.*
Rostrum *caeruleum et viride, apice nigrum*; caput *ex flavo et nigro varium*; collum *breve*; cauda *brevissima*; pedes *ruberrimi*; ungues *nigri.*

striata. 19. A. occipite subcristato, dorso cano striato, collo subtus ferrugineo, remigibus secundariis apice albis.
Heron of Gujana. *Bancr. Guj. p.* 171.
Striated Heron. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 82. *n.* 48.
Habitat in Gujana, Surinamo, Astracania, *majoris magnitudine.*
Vertex *niger*; nucha *subcristata*; remiges *fuscae.*

20. A.

virescens. 20. A. occipite subcristato, dorso viridi-nitente, pectore rufescente, loris luteis, rectricibus viridi-aureis.

Cancrophagus viridis. *Briss. av.* 5. *p.* 486. *n.* 43. *t.* 38. *f.* 1.
Crabier verd. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 404.
Small Bittern. *Catesb. car.* 1. *t.* 80.
Green Heron. *Arct. zool.* 2. *p.* 447. *n.* 349. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 68. *n.* 30.

b) Cancrophagus viridis naevius. *Briss. av.* 5. *p.* 490. *n.* 44. *t.* 38. *f.* 2.
Crabier verd tacheté. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 405. *Pl. enl. n.* 912.

β) Crabier gris à tête et queue vertes. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 408.
Crabier de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 908.

γ) Botaurus americanus naevius. *Briss. av.* 5. *p.* 464. *n.* 32.
Etoilé. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 428.
Crab catcher. *Brown jam. p.* 478.
Small Bittern. *Raj. av. p.* 189. *n.* 4. *Sloan. jam. p.* 315. *n.* 5. *t.* 263. *f.* 2.
Brown Bittern. *Catesb. Car.* 1. *t.* 78.

Habitat in America, *ad* Noveboracum *usque*, 18 *pollices longa*, *ranis*, *cancris*, *piscibus minoribus victitans*, *et in arborum ramis praedae inhians.*

Rostrum *ex virescente fuscum*; irides *flavae*; vertex *ex nigricante viridi-aureus*, *aereo nitore adspersо*; cervix *ex ferrugineo badia*; mentum *et* gula *alba*; jugulum *albo-striatum*; dorsum, cauda *et* alae *obscure fusca*, *tinctu plumbeo*; tectrices *alarum majores et mediae nitide virides*, *margine ferrugineae*; pectus *et* abdomen *obscura*; pedes *virescentes.*

Feminae (b) *crista vix ulla*, vertex *obscurus*; collum *fusce scens albo-striatum*; tectrices *alarum macula trigona alba ad apicem notatae*; remiges *secundariae obscure virides*; *majores fuscae*, *nitore viridi*, *apice albo*; corpus *subtus cinerascens*,

stellaris. 21. A. capite laeviusculo, supra testacea maculis transversis, subtus pallidior, maculis oblongis fuscis. *Fn. suec.* 164. *Scop. ann.* 1. *p.* 125. *Brünn. orn. n.* 155. *Kram. el. p.* 148. *Georg. it. p.* 171. *Otto act. soc. physiogr. Sand. Goth.* 4. 1786.
Ardea vertice nigro, pectore pallido maculis longitudinalibus nigricantibus. *Fn. suec.* 1. *n.* 134.
Ardea stellaris minor. *Bell. av.* 42. *Gesn. av.* 314. *t.* 215. *Aldr. orn.* 3. *p.* 403. *t.* 405. *Marsd. dan.* 5. *p.* 16. *t.* 6. *Nozem. nederl. Vogel t.* 40. 41.

Botaurus. *Briſſ. av.* 5. *p.* 444. *n.* 24. *t.* 37. *f.* 1.
Butor. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 411. *t.* 21. *Pl. enl. n.* 789.
Bittour or Bittern. *Brit. zool.* 2. *n.* 174. *Arct. zool.* 2. *p.* 452. *Raj. av. p.* 100. *n.* 11. *Will. orn. p.* 282. *t.* 50. 52. *Alb. av.* 1. *t.* 68. *Hayes brit. birds t.* 19. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 56. *n.* 17.
Rohrdommel. *Friſch av. t.* 205.

β) Botaurus freti Hudſonis. *Briſſ. av.* 5. *p.* 449. *n.* 25.
Butor de la Baye d'Hudſon. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 430.
Bittern from Hudſon's Bay. *Arct. zool.* 2. *p.* 451. *n.* 357. *Edw. av. t.* 136. *Forſter act. angl.* 62. *p.* 410.

Habitat in temperatiori Europa, *aeſtate etiam in borealem migrans*, *β*) *in* America *a* Carolina *ad ſinum* Hudſonis, *majore paulo minor*, 6, *β*) 3 *pedibus duos pedes longitudine excedens*, *indolens*, *muribus*, *ranis*, *aliis amphibiis*, *piſcibusque victitans*, *quos integros deglutit*, *mordicus ſe defendens*, *et hoſtium oculos roſtro petens*, *mugit inſtar bovis*; *veſpere*, *occiduo jam ſole*, *potiſſimum autumno ſpiraliter et altiſſime in aërem adſcendit*; *nidum in uliginoſis et arundinetis*, *ex juncis*, *β*) *ex plantis aquaticis in area quadam ſicca medium inter longius gramen ſtruit*; *femina* 4-5 *ex virescente cinerea ova parit*, *ex quibus poſt* 25 *dies pulli prodeunt*, *in β*) *primo nigri*; *venatus ejus falconum ope olim magnatibus placebat*; *caro ſapidiſſima.*

Roſtrum *fuſcum*; capitis *pennae longae*; colli *potiſſimum ſuperius aut poſterius*, *quemadmodum in* 19-23, 50-57, *laxae et fluctuantes*, *in femina minus*; vertex *niger*; corpus *variegatum*, *feminae magis obſcurum*; pedes *virescentes*, *unguibus longis gracilibus.*

Botaurus. 50. A. capite laeviuſculo nigro, corpore ſupra ex cinereo fuſco, ſubtus rufo, loris orbitisque nudis flavis, gutture albo nigro et rufeſcente-ſtriato.

Botaurus major. *Briſſ. av.* 5. *p.* 455. *n.* 28.
Grand Butor. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 422.
Greater ſpeckled or red Heron. *Raj. av. p.* 100. *n.* 13. *Will. orn. p.* 283.
Greater Bittern. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 58. *n.* 18.

Habitat in Italiae *paludibus*, *aeſtate etiam in* Aſtracania, *ſtellari major*, *et* 3 *pedes* 9 *pollices longa.*

Roſtrum *flavicans*; irides *flavae*; capitis pectorisque *pennae longae fluctuantes*; pennae *ſcapulares anguſtae*, *et* colli *latera rufa*; *haec ſtria nigra notata.*

solonien- 51. A. vertice nigro, capite laevi colloque ferrugineis, corpo-
sis. re supra nigricante, subtus rufescente.
Ardeae stellaris tertium genus Aldrovandi. *Raj. av. p.* 100. *n.* 12.
Botaurus rufus. *Briss. av.* 5. *p.* 458. *n.* 29.
Butor roux. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 425.
Quoimeau. *Salern. orn. p.* 315?
Aldrovandus's 3d sort of speckled Heron. *Will. orn. p.* 283.
Rufous Bittern. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 60. *n.* 19.
Habitat in Italia *circa* Bononiam, *et? in* Soloniensi Galliae *provincia*, *Marsigliana paulo major.*
Rostrum *nigricans*, *subtus corneum*; irides *flavae*; tectrices *alarum ex ferrugineo et albo variae*; remiges *majores nigricantes*, *minores ferrugineae*; pedes *fusci.*

Marsigli. 52. A. rufa, fusco striata, capite laevi, gutture albo, remigibus fuscescentibus obscure fasciatis, cauda albida.
Boraurus minor. *Briss. av.* 5. *p.* 452. *n.* 26.
Petit Butor. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 423.
Swabian Bittern. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 60. *n.* 20.
Habitat ad ripas Danubii, *stellari multo minor.*
Facies *flava*, *nuda*; irides *albicantes*; dorsi *striae latiores et copiosiores*; pedes *flavescentes.*

danubia- 53. A. fusco, nigro et rufescente lineata, capite laevi, loris
lis. nudis flavis, gutture et pectore albidis.
Botaurus striatus. *Briss. av.* 5. *p.* 454. *n.* 27.
Butor brun rayé. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 424.
Rayed Bittern. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 61. *n.* 21.
Habitat ad ripas Danubii, *praecedentis magnitudine.*
Rostrum *fuscum*, *subtus flavicans*; pedes *et* ungues *grisei.*

undulata. 54. A. ex rufo grisea, striis ex atro fuscis, plurimis undulatis et angulatis, capitis laevis pileo nigro.
Petit butor de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 430. *Pl. enlum. n.* 763.
Zigzag bittern. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 61. *n.* 22.
Habitat in Cayenna, 13 *pollices longa.*
Rostrum *fuscum*; lora *caerulescentia*; collum *tumidum*; pedes *flavi.*

brasilien- 23. A. capite laevi, corpore nigricante flavo-punctato, remigi-
sis. bus, rectricibus, rostro pedibusque nigricantibus.
Ardea brasiliensis. *Briss. av.* 5. *p.* 441. *n.* 23.

Soco.

Soco. *Margr. braſ.* 199. *Will. orn. p.* 209. *t.* 51. *Raj. av. p.* 100. *n.* 14.
Onoré des bois. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 433.
Clucking Hen. *Brown jam. p.* 478.
Braſilian Bittern. *Gentlem. Mag.* 34. *p.* 209. *Brown illuſtr. p.* 88. *t.* 34. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 62. *n.* 23.
Habitat in Americae *auſtralis, inſularum oppoſitarum, et ipſius ſeptentrionalis calidioris ripis*, 2 *pedes*, 8 *pollices longa, piſcibus victitans; carne, junioris praeſertim, ſapida.*
Irides *flavae*; caput collumque *fuſca, maculis paucis nigris*; guttur *album, maculis longitudinalibus nigris fuſcisque.*

tigrina. 55. A. capitis laevis vertice, caudaque albo-faſciata nigris, corpore nigro-maculato ſupra rufo ſubtus ochroleuco, mento et criſſo albis.
Onoré. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 431. *Pl. enl. n.* 790.
Heron tigré. *Fermin Surin.* 2. *p.* 151.
Tiger Bittern. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 63. *n.* 24.
Habitat in America *auſtrali*, 2 *pedes et* 6 *pollices circiter longa, in arundinetis latens, in terra nidificans*, 7-8 *rotundata ova albida viridi-maculata pariens.*
Roſtrum *vireſcens*; irides *flavicantes*; gula collique *latera rufeſcentia, maculis nigris*; colli *pennae praelongae*; caudae *faſciae* 4; pedes *virides.*

lineata. 56. A. capite laevi, roſtro lorisque caeruleis, remigibus caudaque nigris, corpore ſupra lineis rufis, flaveſcentibus et fuſcis undulato, ſubtus ſordide albo.
Onoré rayé. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 432. *Pl. enl. n.* 860.
Lineated Bittern. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 64. *n.* 25.
Habitat in Cayennenſium *fluviorum ripis, ſolitaria*, 2 *pedes* 6 *pollices longa, mordicus ſe defendens, inimicique oculos petens, rattis infeſta.*
Caput *et* cervix *rufa, lineis fuſcis numeroſiſſimis decuſſantibus*; juguli *ſtria alba a mento incipiens, dimidiae ſui parti maculis fuſcis adpoſitis*; pedes *flavi.*

flava. 57. A. capite laevi et cervice flaveſcentibus nigro-ſtriatis, corpore ſupra fuſco flavicante-ſtriato, ſubtus albo, fuſco-undulato, gula alba, remigibus rectricibusque ex nigro et viridi mixtis apice albis.
Botaurus braſilienſis. *Briſſ. av.* 5. *p.* 460. *n.* 30.

Ardea

Ardea braſiliana roſtro ſerrato, cinereae ſimilis. *Raj. av. p.* 101. *n.* 16.
Butor jaune du Bréſil. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 429.
Braſilian Bittern, with a ſerrated bill. *Will. orn. p.* 285.
Yellow Bittern. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 64. *n.* 26.
Habitat in Braſilia, *anatis domeſticae magnitudine*, 2 *pedes et* 3 *pollices longa*, *carne ſapida.*
Roſtrum *prope apicem ſerratum fuſcum*, *baſi vireſcens*; irides *aureae*; abdominis *pennae margine flavae*; cauda *lineis albis picta*; pedes *obſcure griſei.*

bononiensis. 58. A. nigra, torque albo, pedibus, roſtri flavi maculis duabus nigris.
Ardea nigra torquata. *Briſſ. av.* 5. *p.* 440. *n.* 22.
Ardeae congener. *Raj. av. p.* 102. *n.* 19.
Bird a kin to the Heron. *Will. orn. p.* 282. *t.* 50.
Collared Heron. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 52. *n.* 12.
Habitat circa Bononiam, *ſcolopacis arquatae magnitudine, roſtro brevi.*

alba. 24. A. capite laevi, corpore albo, roſtro fulvo, pedibus nigris.
Fn. ſuec. 166. *Scop. ann.* 1. *n.* 126. *Kram. el. p.* 346. *n.* 2.
Ardea candida. *Briſſ. av.* 5. *p.* 428. *n.* 15.
Ardea alba. *Geſn. av.* 213. *Aldrov. orn.* 3. *p.* 389. *t.* 390.
Ardea alba major. *Marſ. danub.* 5. *p.* 12. *t.* 4.
Héron blanc. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 365. *Pl. enl. n.* 886.
Great white Gaulding. *Sloan. jam. p.* 314. *t.* 266. *Brown jam. p.* 478. *Raj. av. p.* 189. *n.* 1.
Great white Heron. *Brit. zool.* 2. *n.* 175. *Arct. zool.* 2. *p.* 445. *n.* 344. *Raj. av. p.* 99. *n.* 4. *Will. orn. p.* 279. *t.* 49. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 91. *n.* 60.

b) Ardea egrettoides. *S. G. Gmelin it.* 2. *p.* 193. *t.* 25.
β) Ardea alba, capillitio nigro, occipite criſtato.
Héron blanc à calotte noire. *Buff. hiſt. nat. des. oiſ.* 7. *p.* 380.
Héron hupé de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 907.
Habitat in Europa, *rarior in ſeptentrionali*, *ad* pontum euxinum, mare caſpium, *lacus magnae* Tatariae, *fluvium* Irtiſch, America *potiſſimum auſtrali* (β. *in* Gujana) *ad* Noveboracum *usque*, *et in* nova Seelandia, 3 *pedes* 6 *pollices longa.*
Roſtrum *ultra* 6 *pollices longum*; irides *flaveſcentes.*

nivea. 59. A. capite laevi, roſtro pedibusque nigris, corpore niveo, colli dorſique pennis fluctuantibus. *S. G. Gmelin nov. comm. Petr.* 15. *p.* 458. *t.* 17. *it.* 1. *p.* 164. 2. *p.* 193. 3. *p.* 253.

Snowy Heron. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 92. *n.* 61.

β) Ardea xanthedactylos. *S. G. Gmelin it.* 3. *p.* 253.

Habitat ad Tanain, *quo a* ponto euxino *venit*, *in* Sina, β) *ad littora maris* Caſpii, *ultra* 2 *pedes longa*, femina. *minore*, *in arboribus altis nidificans.*

Facies *e flavicante caerulea*; dorſi *pennae paululum ochroleucae*; digiti *crocei.*

Helias. 60. A. capite laevi, corpore ſupra nigro lineis transverſis ferrugineis undulato, ſubtus albido, remigum rectricumque faſciis ferrugineis. *Pall. n. nord. Beytr.* 2. *p.* 48. *t.* 3.

Petit Paon des roſeaux de Cayenne. *Rozier obſ. de phyſ.* V. 1. *p.* 212. *t.* 1.

Oiſeau du Soleil. *Fermin Surin.* 2. *p.* 192.

Caurâle ou petit Paon des roſes. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 169. *t.* 14. *Pl. enl. n.* 702.

Caurale Snipe. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 156. *n.* 32.

Habitat in Americae *auſtralis ripis*, *piſcibus minoribus inſectisque victitans*, *caudam pavonis ad inſtar expandens*, *minutae magnitudine*, *ſed humilior*, 16 *fere pollices longa*, *ſolitaria*, *rarior.*

Roſtrum *apice ſubulatum*, *nigricans*; lingua *anguſtiſſima*, *ſulcata*, *cornea integra*; pupilla *rubra*; caput *cum* colli *initio nigrum*, *ſtriis pluribus albis*; collum *pennis brevioribus rarius veſtitum lineis transverſis obſcure cinereis pictum*; juguli pectoris*que pennae ſcapi altera parte ochroleucae*, *altera flavae*, *obſcure cinereo undulatae*; uropygium *lineis transverſis albis*; alae *caudae aequales*; tectrices 7 *ad apicem macula magna alba notatae*; remiges 22, 1ma *faſciis* 3 *cinereis ſtriatis*, *ſpatio intermedio ferrugineo*, 2 *faſciis* 2 *latis ferrugineis*, *et inter eas nigris cinereoſtriatis*, 3-5 *verſus apicem faſcia ferruginea et altera nigra*; 6-13 *rhachi propiorem habent faſciam ferrugineam latam et alteram nigram*; cauda 5 *pollices longa nigricans albo-ſtriata*, *faſciis* 2 *ferrugineis.*

lacra. 61. A. capite laevi, corpore albo, pennis verticis, dorſi, tectricibus caudae, remigibus nonnullis, rectricibusque ſcapo obſcure ſtriatis, roſtro fuſco, pedibus flavis.

Sacred Heron. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 92. *n.* 62.

β) Ardea vertice, remigibusque totis albis.

Habitat

Habitat in Tahiti, *insulisque vicinis, incolis sacra, 2 pedes 3 pollices longa.*

Pennae *scapulares nigro-maculatae;* remiges *majores apice obscurae;* rectrices *exteriores totae albae.*

atra. 62. A. tota nigra, facie nuda, capite laevi.

Ardea nigra. *Briss. av.* 5. *p.* 439. *n.* 21.

Héron noir. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 368.

Black Heron. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 94. *n.* 64.

Habitat in Silesia, *majori aequalis.*

Alis *nitor caeruleus.*

purpura- tа. 63. A. capitis laevis vertice colloque ex nigricante cinereis, corpore supra ex purpureo badio, subtus cinereo, facie nuda flavicante.

Ardea purpurascens. *Briss. av.* 5. *p.* 420. *n.* 12.

Héron pourpré. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 369.

Purple Heron. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 96. *n.* 66.

Habitat in ripa Danubii, *majori aequalis, capite colloque longiore.*

Mandibula *superior ex flavicante viridis, inferior flavicans;* cervix *lineolis nigricantibus,* guttur *maculis flavis pictum;* remiges *ex nigricante fuscae;* pedes *fusci.*

spadicea. 64. A. ex purpureo-badia, remigibus, cauda et capite laevi badiis, vertice nigro.

Ardea mexicana seu avis Xoxunquihoactli. *Seb. mus.* 1. *t.* 64. *f.* 2.

Ardea mexicana purpurascens. *Briss. av.* 5. *p.* 422. *n.* 13.

Crabier pourpré. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 402.

Mexican Heron. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 96. *n.* 67.

Habitat in nova Hispania, *cornicis magnitudine,* 12 *pollices longa.*

aequinoctialis. 25. A. capite laevi, corpore albo, remigibus duabus primis margine exteriore fuscis.

Ardea carolinensis candida. *Briss. av.* 5. *p.* 435. *n.* 18.

Crabier blanc à bec rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 401.

Little white Heron. *Arct. zool.* 2. *p.* 443. *n.* 345. *Catesb. Car.* 1. *t.* 77. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 93. *n.* 63.

β) Ardea candida minor. *Briss. av.* 5. *p.* 438. *n.* 20.

Garzette blanche. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 371.

Third small white Heron of Aldrovand. *Will. orn. p.* 280. *Raj. av. p.* 99. *n.* 6.

γ) Ardea mexicana candida. *Briss. av.* 5. *p.* 437. *n.* 19.

Héron

Héron blanc du Mexique. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 406.
Ardea mexicana minima candidiſſima. *Raj. av. p.* 102. *n.* 22.
Habitat in Jamaica, *et continente* Americae, *a* Carolina *ad* Noveboracum, *β)* Bononiae, *γ) in* nova Hiſpania, 18 *pollices longa.*
Roſtrum *rubrum*, *aliquando nigrum*; facies *nuda*, *rubra*; irides *flavae*; pedes *virides.*

Cracra. 65. A. capitis laevis vertice ex caeruleſcente cinereo, dorſo et uropygio ex cinereo, viridi et rufo variis, gutture et pectore albis maculis foliorum mortuorum colore, abdomine cinereo, remigibus caudaque nigris.
Cancrophagus americanus. *Briſſ. av.* 5. *p.* 477. *n.* 39.
Craera. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 403. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 96. *n.* 68.
Habitat in Chili, *aliisque* Americae *partibus*, *ad ripas fluviorum maritimorum.*
Roſtrum *nigrum*, *ſubtus ex flavicante fuſcum*; irides *aureae*; orbitae *nudae*, *flaveſcentes*; occiput *et* cervix *fuſca*, *flavedine foliorum emortuorum adſperſa*; tectrices *alarum minores virides*, *margine rufae*; *majores et* remiges *margine albae*; cauda *ex vireſcente nigra*; pedes *flavi*; ungues *nigri.*

leucocephala. 66. A. ex caeruleſcente nigra violaceo-nitens, vertice laevi nigro, reliquo capite, collo criſtoque albis.
Héron de la côte de Caromandel. *Buff. pl. enlum. n.* 906.
Héron violet. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 370.
Violet Heron. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 97. *n.* 69.
Habitat in Coromandel, 33 *pollices longa.*
Roſtrum pedes*que fuſci*; colli *pars inferior ex caeruleſcente atra*; tectrices *caudae inferiores albae.*

rufa. 67. A. nigra, capite laevi, temporibus ferrugineis, pectore rufo, collo inferiore albido, maculis longitudinalibus fuſceſcentibus, ſuperiore, dorſo et alis ex cinereo fuſcis. *Scop. ann.* 1. *n.* 119. *Kram. el. p.* 347. *n.* 6.
Rufous Heron. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 99. *n.* 72.
Habitat in Auſtria, *majoris magnitudine.*
Roſtrum 7 *pollices longum*; *ab* oculo; *ad* occiput *utrinque ſtria nigra*; pedes *fuſci.*

Sinenſis. 68. A. fuſca, lituris pallidis, capite laevi, cauda remigibusque nigris.
Chineſe Heron. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 99. *n.* 73.

Habitat

Habitat in Sina, *parva.*
Roſtrum *flaveſcens*; color *corporis ſubtus dilutior*; pedes *virides.*

virgata. 69. A. vertice laevi, dorſo, remigibus caudaque obſcuris, cervice et genis ex ferrugineo et nigro miſtis, mento gulaque albis, jugulo virgis albis et nigris, tectricibus alarum nigris et ochrolcucis variis.
Streaked Heron. *Arct. zool.* 2. *p.* 449. *n.* 354. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 87. *n.* 55.
Habitat in America *ſeptentrionali*, 17 *pollices longa.*
Pedes *vireſcentes.*

cana. 70. A. cinereo-nebuloſa, ſubtus alba, vertice laevi, obſcuro, genis mentoque albidis, colło ex cinereo fuſceſcente, anterius albo-ſtriato.
Aſhcoloured Heron. *Arct. zool.* 2. *p.* 449. *n.* 353. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 87. *n.* 54.
Habitat in Noveboraco, *Majo adveniens, Octobri diſcedens, pollice pedes duos longitudine ſuperans.*
Roſtrum *robuſtum, nigrum*; pennae *hypochondriorum longae, latae, pendulae*; pedes *flavicantes.*

caruncu-lata. 71. A. dorſo, alis, pedibus et vertice ex atro caeruleis, capite laevi colloque albis, corpore ſubtus nigro, roſtro mentoque carunculatis.
Wattled Heron. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 82. *n.* 49. *t.* 78.
Habitat in Africa, *ciconiae magnitudine*, 5 *pedes*, 6 *pollices longa.*
Roſtrum *baſi ad* $\frac{1}{3}$ *rubrum, cetera nigrum*; orbitae *nudae, rubrae*; irides *rubeſcentes*; carunculae *geminae a mento pendentes albis plumis tectae*; dorſi *pennae nonnullae anguſtae, longae, pendulae.*

malaccen-ſis. 72. A. fuſca, ſubtus, alis caudaque alba, capite laevi colloque fuſco et albo ſtriatis, facie nuda cinerea.
Crabier blanc et brun. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 394.
Crabier de Malac. *Buff. pl. enl. n.* 911.
Malacca Heron. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 78. *n.* 44.
Habitat in Malacca, 19 *pollices longa.*
Roſtrum *nigrum, baſi ad latera flavum*; *pennae* capitis collique *longae, anguſtae, laxae*; pedes *flavi.*

cinnamo-mea. 73. A. cinnamomea, capite laevi, mento criſſoque albis, jugulo fuſco-ſtriato, gulae utrinque litura alba.

Cinnamom Heron. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 77. *n.* 43.
Habitat in Sina, *virescentis magnitudine.*
Roltrum pedes*que flavi.*

pumila. 74. A. capite laevi colloque ex flavicante, castaneo et albo variis, corpore supra castaneo, subtus albicante, rectricibus niveis. *Lepechin nov. comm. Petr.* 14. 1. *p.* 502. *t.* 14. *f.* 1.
Dwarf Heron. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 77. *n.* 42.
Habitat ad mare Caspium, *pedem et 7 pollices longa.*
Roltri *mandibula superior nigra, margine flavescens, inferior ochroleuca, basi nigricans*; facies *ochracea*; irides *flavae*; gula, *et fascia ab ea ad* pectus *producta alba*; uropygium *niveum*; pedes *sordidi*; ungues *nigricantes.*

badia. 75. A. badia, subtus exalbida: stria media longitudinali nivea, capite laevi, remigibus nigris, tectricibus alarum caerulescentibus.
Cancrophagus castaneus. *Briss. av.* 5. *p.* 468. *n.* 34.
Crabier roux. *Buff. hist. nat. desois.* 7. *p.* 390.
Chesnut Heron. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 73. *n.* 37.
Habitat in Silesia, *cornicis magnitudine, in arboribus altis nidificans, insectis piscibusque victitans.*
Roltrum *fuscum*; irides *flavescentes*; cauda *badia*; pedes *rubri.*

philippensis. 77. A. subtus alba, vertice laevi et cervice ex rufo fuscis, dorso lineis transversis rufis et fuscis picto, alis caudaque nigris, gutture ex rufescente sordide albo.
Cancrophagus Philippensis. *Briss. av.* 5. *p.* 474. *n.* 38. *t.* 37. *f.* 2.
Petit crabier. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 395. *Pl. enl. n.* 898.
Philippine Heron. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 72. *n.* 35.
Habitat in insulis Philippinis, *parva*, 11 *pollices longa.*
Roltrum *ex virescente flavum*; facies *nuda viridis*; alarum *margo ex rufo albus*; pedes *flavi.*

novae Guineae. 78. A. nigra, capite laevi, roltro fusco, facie nuda virescente.
Crabier noir. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 394.
Crabier de la nouvelle Guinée. *Buff. pl. enl. n.* 926.
New Guinea Heron. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 71. *n.* 34.
Habitat in nova Guinea, 10 *pollices longa.*
Irides *flavae.*

cyanopus. 79. A. cinerea, subtus alba, capite laevi, facie caerulea, remigibus partim albis partim nigris.

Ardea

Ardea americana cinerea. *Briſſ. av.* 5. *p.* 406. *n.* 6.
Crabier cendré. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 401.
Cinereous Heron. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 71. *n.* 33.
Habitat in America, *cornice paulo major.*
Roſtrum *caeruleum*, *apice nigrum*; tectrices *alarum cinereae, nigro intermiſto*; pedes *caerulescentes.*

maculata. 80. A. fuſca, cervice dorſoque ſuperiore albo-maculatis, capite laevi, loris nudis virescentibus.
Botaurus naevius. *Briſſ. av.* 5. *p.* 462. *n.* 31.
Butor tacheté ou Pouacre. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 427.
Spotted Heron. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 70. *n.* 31.
Schwarzer Reiger. *Friſch av.* 2. *t.* 9.
Habitat in Europae *uliginoſis*, *ranis piſcibusque victitans, cornicis magnitudine*, 18¼ *pollices longa.*
Roſtrum *fuſcum*, *ſubtus ex virescente flavum*; remiges *apice alba macula notatae*; pedes *ex virescente fuſci.*

Gardeni. 81. A. fuſca, capite laevi, dorſo nigricante, gutture et pectore albidis fuſco-maculatis.
Pouacre de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 939.
Gardenian Heron. *Arct. zool.* 2. *p.* 450. *n.* 355. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 71. *n.* 32.
Habitat in Cayenna *et auſtrali* Carolina, *maculatae aequalis, et valde affinis*, 22 *pollices longa*; roſtrum *robuſtum, obſcurum.*

ſenegalenſis. 82. A. rufa, ſubtus alba, capite laevi, gutturis pennis ſtria media longitudinali nigra notatis, alis albis medio rubescentibus.
Petit Butor du Sénégal. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 426.
Petit Héron roux du Sénégal. *Buff. pl. enl. n.* 315.
Senegal Bittern. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 67. *n.* 29.
Habitat in Senegal, 12 *pollices longa.*
Roſtrum *ex rufo fuſcum*, *ſubtus flavum*; *pennae* colli *laxae totae rufae*; remiges *nonnullae interiores rufae*; pedes *flavi.*

exilis. 83. A. capite laevi et corpore ſupra ex rufo badio, ſubtus albo, colli lateribus rufis, remigibus caudaque nigris.
Minute Bittern. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 66. *n.* 28.
Habitat rarior in Jamaica, *turdi magnitudine*, 11½ *pollices longa.*
Roſtrum *virescens*; irides *ſtramineae*; colli *pennae laterales et inferiores praelongae et laxae*; pectus *ex fuſcescente nigrum*;

nigrum; tectrices *alarum mediae ferrugineae*; remiges *nonnullae apice badiae*; pedes *virides*.

minuta. 26. A. capite laevi, corpore fuſco, ſubtus rufeſcente, rectricibus nigro-vireſcentibus, loris flavicantibus. *Kram. el. p.* 348. *Friſch av. t.* 206. 207.
Ardeola. *Briſſ. av.* 5. *p.* 497. *n.* 46. *t.* 40. *f.* 1. *Nozem. nederl. Vogel t.* 28. 29.
Blongios de Suiſſe. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 395. *Pl. enl. n.* 323.
Boo-onk or Long-neck. *Shaw it. tab. p.* 255. *Ruſſel Alepp. p.* 71. *t.* 10. *Edw. glean. t.* 275.
Little Bittern. *Brit. zool. app. p.* 663. *t.* 8. *Arct. zool.* 2. *p.* 457. *n.* 359. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 65. *n.* 27.
b) Ardeola naevia. *Briſſ. av.* 5. *p.* 497. *n.* 47.
Blongios tacheté. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 395.
Little brown Bittern. *Edw. glean. t.* 275.
Habitat in Helvetia, *in aliis* Europae *partibus rarior, in* Arabia, Syria, Sibiria, *turdo vix major*, 15 *pollices longa.*
Roſtrum *ex viridi flavum*; vertex, dorſum *et* cauda *virent*; collum *praelongum*; cervix *nuda*; jugulum, pectus *et* femora *luteſcunt*; abdomen *et* uropygium *albent*; alae *macula magna badia*; remiges *nigrae*; pedes *obſcuri.* Feminae b) *pennae corporis fuſcae margine rufae*; frons *badia linea circumſcripta*; cauda *ex nigricante viridis, margine apicis fuſco*; pedes *vireſcentes.*

***** *roſtro in medio hiante.*

pondiceriana. 84. A. ſordide cinerea, remigibus nigris longis, ungue medio non ſerrato.
Bec-ouvert. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 409. *Pl. enl. n.* 932.
Pondicherry Heron. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 101. *n.* 77.
Habitat in tractu Pondiceriano, *aliisque* Indiae, 14½ *pollices longa.*
Roſtrum *flavum longum, craſſum, ſed a prima* ¼ *longitudinis ſuae gracilius, mandibula ſuperiore intus curvata, ut non niſi baſi et apice inferiorem contingat*; facies *plumis tecta*; pedes *flavicantes.*

coromandeliana. 86. A. alba, dorſo, remigibus caudaque nigris, mandibula ſuperiore a medio ad apicem ſerrata.
Bec-ouvert des Indes. *Sonner. it.* 2. *p.* 219. *t.* 219.
Coromandel Heron. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 102. *n.* 78.

Habitat

Habitat Septembri ad Decembrem in Coromandel, *ad ripas fluviorum et ſtagnorum, quorum piſcibus et amphibiis victitat.*

Capitis *pennae breves, anguſtae, erectae;* roſtrum *et* pedes *ex rufo flavi;* facies *nuda, nigra;* irides *rubrae;* alae *breviores, quam praecedenti.*

Scolopacea. 87. A. fuſca, gutture et pectore albo-ſtriatis, mento pedibusque albis, cauda remigibusque aeneo-nitentibus.

Courlan ou Courliri. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 442. *Pl. enl. n.* 848.

Scolopaceous Heron. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 102. *n.* 79.

Habitat in Cayenna, *inter ardeam et ſcolopacem ambigua, ardeae majori aequalis,* 25 *pollices longa.*

Roſtrum *rubeſcens, apice caeruleſcens, verſus apicem pauliſper deorſum flexum; in mandibula ſuperiore ſulcus longus, in quo nares fiſſuram ſimplicem ſimilantes;* orbitae *nudae ſpadiceae;* unguis *medius interiori margine pectinatus.*

85. TANTALUS. *Roſtrum* longum ſubulatum, teretiuſculum, ſubarcuatum.

Facies nuda ultra oculos.

Lingua brevis, lata.

Saccus jugularis nudus.

Nares ovatae.

Pedes tetradactyli, baſi palmati.

Loculator. 1. T. facie caeruleſcente, roſtro rubeſcente, pedibus, remigibus rectricibusque nigris, corpore albo.

Numenius americanus major. *Briſſ. av.* 5. *p.* 335. *n.* 8.

Tacab, Miſe perſis. *Chardin it.* 3. *p.* 40.

Curicaca. *Marcgr. braſ.* 191. *Will. orn. p.* 295. *t.* 54. *Raj. av. p.* 103. *n.* 4. *Damp. it.* 3. *tab. p.* 96. *f.* 2. *March. it.* 3. *p.* 326. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 276. *Pl. enl. n.* 868.

Wood Pelecan. *Catesb. Car.* 1. *t.* 81.

Wood Ibis. *Arct. zool.* 2. *p.* 458. *n.* 360.

Habitat gregarius in nova Hollandia, *et in* Americae *australis*, *aestate etiam* Carolinae *inundatis*, *anseris magnitudine*, 3 *pedes longus*, *stupidus*, *hominem non metuens*, *tarde fugiens*, *erecta*, *rostro pectori incumbente*, *quiescens in cypressis aliisque arboribus*, *herbis*, *fructibus*, *seminibus*, *piscibus*, *amphibiis victitans*, *carne delicioſa*.

Roſtrum 9 *pollices longum*, *ex flavicante fuscum*; irides *rufescentes*; cutis *a capite ad medium collum nuda*, *aspera*, *verrucoſa*, *fusca aut nigricans*; ſaccus *jugularis dimidiae pintae capax*.

Falcinellus. 2. T. facie nigra, pedibus caeruleis, alis caudaque violaceis, corpore caſtaneo. *Brünn. orn. n.* 167. *Scop. ann.* I. *n.* 131.

Numenius roſtro arcuato, corpore caſtaneo, pedibus obſcure virentibus. *Kram. el.* 350.

Numenius viridis. *Briſſ. av.* 5. *p.* 326. *n.* 4. *t.* 27. *f.* 2.

Falcinellus. *Geſn. av.* 220.

Falcinellus ſ. avis falcata. *Aldr. orn.* 3. *p.* 422. *t.* 423. *Marſ. dan.* 5. *p.* 42. *t.* 19.

Falcinellus or Sithebill. *Raj. av. p.* 103. *n.* 3. *Will. orn. p.* 295. *t.* 54.

Bay Ibis. *Arct. zool.* 2. *p.* 460. A. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 113. *n.* 12.

Courlis verd. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 29.

Courlis d'Italie. *Buff. pl. enl. n.* 819.

β) Numenius caſtaneus. *Briſſ. av.* 5. *p.* 329. *n.* 5.

Habitat gregatim circa lacus Italiae, Germaniae *australis*, Daniae, *deſerti* Uralenſis, *mare* Caſpium, Pontum Euxinum, *ſcolopacis arquatae magnitudine*, *pedem et* 9 *pollices longus*.

Roſtrum *fuscum*; facies *ex atro viridis*; corpus *nitens*, *ſupra nitore viridi*.

viridis. 8. T. facie, et pedibus nigris, alis viridibus et cyaneis, collo ex cinereo nigro, infra albo-faſciato, corpore ſupra cum cauda viridi-aureo, ſubtus cum uropygio ex fuſco nigricante.

Numenius viridis. *S. G. Gmelin. nov. comm. Petrop.* 15. *p.* 462. *t.* 19. *it.* 1. *p.* 167.

Green Ibis. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 114. *n.* 13.

Habitat ad Tanain *et* Choperum, *gregaria*, *piſcibus et inſectis victitans*, *in altis nidificans*, *pedem et* $7\frac{1}{2}$ *pollices longus*.

Roſtrum

Roſtrum *plumbeum*; lingua *initio bifida dentata*, *fine longo acuto*; caput *nigricans*; macula *ſupra oculos alba*.

igneus. 9. T. capite colloque nigris, pedibus viridibus, corpore e cyaneo, nigricante, viridi et vinaceo ſplendente, ſubtus e nigricante rufo, remigibus rectricibusque viridi-aureis.
Numenius igneus. *S. G. Gmelin it.* I. *p.* 166. *nov. comm. Petrop.* 15. *p.* 460. *t.* 13.
Gloſſy Ibis. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 115. *n.* 14.
Patria, victu, moribus viridi ſimilis, altius tamen volans, et $3\frac{1}{2}$ *pollices longios.*
Roſtrum *viride*; linguae *initium bifidum, dentatum, finis longus, acutus*; tectrices *alarum lucidis coloribus variae.*

leucocephalus. 10. T. capite, collo et corpore albis, roſtro facieque flavis, pedibus pallide incarnatis, uropygii pennis roſeis longiſſimis.
White-headed Ibis. *Ind. zool. t.* 10. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 116. *n.* 15.
Habitat in Zeylon, *tantalorum maximus, roſtro clangens inſtar ciconiae, tempore anni pluvio pennas roſeas amittens.*
Roſtrum pedes*que longiſſimi*; nares *anguſtae*; pectoris *faſcia lata*; remiges *primae*, *et* tectrices *alarum nigrae.*

calvus. 11. T. capite albo, colli parte poſterius tuberculata, et ſacco jugulari calvis, vertice, roſtro, pedibusque nigris, corpore nigro.
Courlis à tête nuë. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 32. *Pl. enl. n.* 867.
Bald Ibis. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 116. *n.* 16.
Habitat in Africae *aquoſis, facile manſueſcens, arquatae magnitudine*, 26-31 *pollices longus.*
Irides *fuſcae*; tectrices *alarum nitore viridi, ad apicem aeneo*; rectrices 12, 7 *pollices longae.* Feminae *vertex magis complanatus.*

manillenſis. 12. T. roſtro orbitisque vireſcentibus, pedibus miniatis, corpore ex rufo fuſco.
Courlis brun de l'iſle de Luçon. *Sonner. it.* 85. *t.* 47. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 31.
Manilla Ibis. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 117. *n.* 17.
Habitat in inſula Luçon, *arquatae magnitudine.*
Irides *miniatae.*

minutus. 3. T. facie, roſtro pedibusque vireſcentibus, corpore ferrugineo, ſubtus albo.

Leſſer Ibis. *Edw. glean. t.* 356. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 117. *n.* 18.

Habitat in Surinamo, *magnitudine phaeopodis.*

Roſtrum *baſi caeruleum, apice nigrum*; pectoris *pennae laxae, reliquis longiores*; uropygium *et* femora *alba*; ungues *nigri.*

criſtatus. 13. T. facie pallida, capite, colli parte, cauda et criſſo nigris, criſtae occipitis longae pennis partim albis partim nigris, corpore ferrugineo, alis exalbidis.

Courlis huppé de Madagaſcar. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 33. *Pl. enl. n.* 841.

Creſted Ibis. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 119. *n.* 19.

Habitat in Madagaſcar, 20 *pollices longus.*

Roſtrum pedes*que ex fuſceſcente flavi.*

niger. 14. T. facie, roſtro pedibusque rubris, corpore nigro.

Ibis. *Briſſ. av.* 5. *p.* 347. *n.* 13.

Ibis noir. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 17.

Ibis of Bellonius. *Raj. av. p.* 98. *Will. orn. p.* 288. *t.* 44.

Black Ibis. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 112. *n.* 11.

Habitat in ſola Aegypto *prope* Damiattam, *forſan ſola aetate minore ab Ibi diſtincta, arquatae magnitudine.*

Ibis. 4. T. facie rubra, roſtro luteo, pedibus griſeis, remigibus nigris, corpore rufeſcente-albido.

Ardea capite laevi, corpore albo, roſtro flaveſcente apice pedibusque nigris. *Syſt. nat.* X. 1. *p.* 114.

Ardea (Ibis) tota alba, pedibus atris, unguibus arcuatis maximis. *Haſſelq. it.* 248.

Ibis candida. *Dod. act.* 3. *p.* 61. *t.* 13. *Briſſ. av.* 5. *p.* 349. *n.* 14.

Ibis blanc. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 14. *t.* 1. *Pl. enl. n.* 389.

Emſeeſy or Ox-bird. *Shaw it. p.* 255.

Egyptian Ibis. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 111. *n.* 10.

Habitat copioſus in Aegypto, *praeſertim inferiore, ciconia paulo major*, 30-40 *pollices longus, ranis, inſectis, ſerpentibus victitat, quibus poſt inundationes frequentioribus terram purgat, erectus quieſcens, ita ut cauda pedes contingat.*

Roſtrum *luteum, verſus apicem obtuſum rubeſcens, nonnunquam nigrum*; irides *albidae*; cauda *nigra*; pedes *longi, griſei, interdum rubri.*

5. T.

ruber. 5. T. facie, roſtro pedibusque rubris, corpore ſanguineo, alarum apicibus nigris.

Numenius braſilienſis coccineus. *Briſſ. av.* 5. *p.* 344. *n.* 12. *t.* 29. *f.* 1. 2.

Numenius indicus. *Cluſ. exot.* 366.

Porphyrio et Porphyrio amboinenſis ſ. Ardea rubra corallina. *Seb. muſ.* 1. *p.* 98. *t.* 82. *f.* 3. *et t.* 62. *f.* 3.

Guara. *Marcgr. braſ.* 203. *Will. orn. p.* 296. *t.* 54. *Raj. av. p.* 104. *n.* 6. *Laët amer.* 575. *Worm. muſ.* 308. *Pernett. it.* 1. *p.* 183. *Sloan. jam. p.* 317. *n.* 8. *Harris coll. it.* 1. *p.* 728.

Red Curlew. *Catesb. Car.* 1. *t.* 84. *Bancr. Guj. p.* 172.

Scarlet Ibis. *Arct. zool.* 2. *p.* 458. *n.* 361. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 106. *n.* 2.

Courlis rouge du Bréſil. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 35. *Pl. enl. n.* 80. 81.

Habitat gregarius in inſulis Bahamenſibus *aliisque oceani ejusdem, et* Americae *partibus intra tropicos poſitis, praeſertim* Florida *orientali*, 25 *pollices longus, maritimâ praeſertim frequentans, refluente mari piſcibus et inſectis victitans, facile manſueſcens, animoſus, crebro in arboribus degens, in terra tamen nidum ex foliis ſiccis ſtruens, ovaque pariens vireſcentia, ex quibus pulli prodeunt nigri, paulo poſt griſei, antequam adhuc volant, albeſcentes, tum ſenſim rubeſcentes, donec tertio demum anno tinctu ſanguineo compareant:* Caro *eximia.*

Oculi *nigri;* remigum rectricumque *ſcapi albi.*

albus. 6. T. facie, roſtro pedibusque rubris, corpore albo, alarum apicibus viridibus.

Numenius braſilienſis candidus. *Briſſ. av.* 5. *p.* 339. *n.* 10.

Courlis blanc du Bréſil. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 41. *Pl. enl. n.* 915.

White Curlew. *Catesb. Car.* 1. *t.* 82.

White Ibis. *Arct. zool.* 2. *p.* 459. *n.* 363. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 111. *n.* 9.

Habitat in Braſiliae, *ſub aeſtatis finem copioſiſſimus in* Carolinae *aquoſis, piſcibus et inſectis aquaticis victitans, phaeopodis magnitudine,* 22 *pollices longa; pinguedo et caro nonnullis eſculenta croceae.*

Irides *griſeae.*

fuſcus. 7. T. facie, roſtro pedibusque rubris, corpore fuſco ſubtus albo.

Numenius braſilienſis fuſcus. *Briſſ. av.* 5. *p.* 341. *n.* 11.

Courlis brun à front rouge. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 42.
Brown Curlew. *Catesb. Car.* 1. *t.* 83.
Brown Ibis. *Artt. zool.* 2. *p.* 459. *n.* 362. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 110. *n.* 8.
Habitat in Americae *calidioribus*, *aeſtate in* Carolina, *albo rariar*, 2 *fere pedes longus.*
Irides *griſeae*; dorſum *inferius et* uropygium *alba*; ungues *fuſci*; cutis *et* pinguedo *flava.*

Coco. 15. T. facie roſtroque ex flavo carneis, pedibus ex carneo pallentibus, corpore albo, alis ad apicem usque albis, remigibus tribus extimis apice ſupra nigris. *Jacquin Beytr. p.* 13.
Habitat in inſulis caribaeis, *quorum incolis caro cibo inſervit*, *albo valde affinis*, *facile manſueſcens*, *voce rauca.*
Alarum *apex non viridis*; pedes 6 *pollices alti*; caput *flaveſcens*; oculi *glauci.*

Pillus. 16. T. facie, roſtro pedibusque fuſcis, corpore albo, remigibus rectricibusque nigris. *Molina hiſt. nat. Chil. p.* 215.
Habitat ad fluvios et lacus regni Chilenſis, *anſere vix major*, *amphibiis victitans*, *medias inter carices nidificans et ova* 2 *alba caeruleſcentia pariens.*
Cauda *brevis*; pedes 2 *pedes et* 8 *pollices longi.*

cayennenſis. 17. T. facie obſcure rubeſcente, roſtro obſcuro, corpore nigro viridi-nitente.
Courlis des bois. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 42.
Courlis verd de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 820.
Cayenne Ibis. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 107. *n.* 3.
Habitat in Cayenna, *non copioſus*, *per paria arborum truncis in fluviis haud procul a mari natantibus inſidens*, *piſces capturus*, *rubro minor*, 22 *pollices longus.*
Roſtrum $5\frac{1}{2}$ *pollices longum*; cauda remiges*que tinctu profundiore*; pedes *ex fuſceſcente flavi.*

mexicanus. 18. T. roſtro caeruleſcente, facie rubeſcente, capite colloque ex obſcuro, albo, viridi paucoque flavo variis, dorſo, uropygio pedibusque nigris, pectore et abdomine fuſcis, cauda remigibusque viridi-aeneis.
Numenius mexicanus varius. *Briſſ. av.* 5. *p.* 333. *n.* 7.
Acalotl. *Raj. av. p.* 104. *n.* 5. *Will. orn. p.* 296.
Acalot. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 45.
Mexican Ibis. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 108. *n.* 5.

Habitat

Habitat ad novae Hiſpaniae *lacus*, *magnus*, 3 *pedes longus*, *piſcibus victitans*, *carne delicioſa.*
Dorſo *et* uropygio *nitor viridis et purpureus*; tectrices *alarum virides.*

melanopis. 19. T. roſtro, facie unguibusque nigris, vertice fulvo, collo et pectore flaveſcentibus, pennis dorſi, ſcapularibus, et tectricibus alarum faſciaque pectorali cinereis margine fuſcis, remigibus, criſſo et cauda ex vireſcente nigris, pedibus rubris.
Blackfaced Ibis. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 108. *n.* 5. *t.* 79.
Habitat in inſula novi anni, *in rupium inacceſſis nidificans*, *loculatore vix minor*, 28 *pollices longus.* Forſter.
Lingua *triangularis*, *poſterius ciliata*; irides *rubicundae*; facies *verrucoſa*; faccus *jugularis rugoſus*; occipitis *et* cervicis *pennae elongatae*; cauda *rotundata*; rectrices 12.

albicollis. 20. T. roſtro nigro, capite colloque ex rufo albis, corpore fuſco grifeo-undulato et viridi nitente, pedibus rubris.
Grand Courlis de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 47.
Courlis à cou blanc. *Buff. pl. enl. n.* 976.
White-necked Ibis. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 109. *n.* 6.
Habitat in Cayenna, *arquata major*, 27 *pollices longus.*
Tectrices *alarum majores albae.*

griſeus. 21. T. roſtro ſpadiceo, facie unguibusque nigris, occipite et cervice griſeis, corpore albido, dorſo inferiore, uropygio, remigibus caudaque ex vireſcente nigris, pedibus rubeſcentibus.
Grey Ibis. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 111. *n.* 7.
Numenius americanus minor. *Briſſ. av.* 5. *p.* 337. *n.* 9.
Matuitui. *Will. orn. p.* 296. *
Matuitui des rivages. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 46.
Habitat in Braſilia, *gallinae magnitudine.*
Scolopax Falcinellus? in Syst. Nat.?

CORRIRA. *Roſtrum* breve, rectum, edentulum.

Pedes longi tetradactyli palmati: digitis brevibus.

italica. 1. C. *Briſſ. av.* 6. *p.* 542.
Trochilus vulgo Corrira. *Aldr. orn.* 3. *p.* 288. *t.* 289. *Raj. av. p.* 118. *n.* 3. *Will. orn. p.* 321. *t.* 60.

Habitat

Habitat in Italia, *celerrime currens, recurvirostra minor*; rostrum *flavum*; irides *interius albae exterius badiae*; caput, alae *et* corpus *supra ferruginea, hoc subtus album*; rectrices *nigrae, intermediae 2 albae, apice nigrae.*

§6. SCOLOPAX. *Rostrum* teretiusculum, obtusum, capite longius.

Nares lineares.

Facies tecta.

Pedes tetradactyli: postico plurimis articulis intistente.

Guarauna. 1. Sc. rostro arcuato flavicante, pedibus fuscis, capite fusco albo-striato.

Numenius americanus fuscus. *Briss. av.* 5. *p.* 330. *n.* 6.
Guarauna. *Marcgr. brasil.* 204. *Will. orn. p.* 292. *t.* 53.
Raj. av. p. 104. *n.* 7. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 44.
Brasilian Whimbrel. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 125. *n.* 7.
Habitat in Brasilia, *aliisque* Americae *australis partibus, phaeopodis magnitudine*, 21 *pollices longa.*
Rostrum *fuscum, basi flavum*; capitis colli*que pennae fuscae margine albidae*; dorsum *et* corpus *subtus badium*; humeri, tectrices *alarum*, uropygium caud*aque fusca, viridinitentia*; remiges *fuscae, margine exteriori viridi-nitentes*; ungues *nigricantes.*

borealis. 17. Sc. rostro obscuro arcuato, pedibus caeruleis, vertice fusco, secundum longitudinem stria alba diviso, genis, collo et pectore fuscescentibus, obscure striatis, scapularibus et tectricibus alarum nigro et dilute spadiceo maculatis, cauda nigro et fuscescente lineatis. *Forster act. angl.* 62. *p.* 411.
Eskimaux Curlew. *Arct. zool.* 2. *p.* 461. *n.* 364. *t.* 19. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 126. *n.* 8.
Habitat aestate gregibus numerosissimis in sinu Hudsonis, *Octobri in* nova Scotia *adveniens, phaeopode major, sibilans, empetri nigri baccis victitans, et* 4 *ova pariens, carne pingui delicioja.*
Remiges *primariae obscurae, scapis albis, intus maculis ovatis rubris notatae.*

africana. 19. Sc. roſtro arcuato ex nigricante fuſco, pedibus fuſcis, corpore cinereo, ſubtus albo, pectoris maculis ferrugineis.
Cape Curlew. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 126. *n.* 9.
Habitat gregatim in uliginibus et humidis capitis bonae ſpei, *gallinaginis magnitudine.*
Facies *et* uropygium *alba;* alarum *margo ex albo et griſeo mixtus;* remiges *fuſcae, ſcapis albis;* tectrices *alarum ſecundariae apice albae.*

pygmea. 20. Sc. roſtro arcuato pedibusque nigris, corpore ex ferrugineo, fuſco et albo vario, ſubtus albo.
Pygmy Curlew. *Gen. of birds p.* 64. *t.* 11. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 127. *n.* 10.
Habitat in Belgio, *alaudae magnitudine.*
Uropygium *album;* rectrices *obſcurae, exteriores margine albae.*

madagaſcarienſis. 2. Sc. roſtro arcuato, pedibusque rufeſcentibus, maculis dorſi rhomboidalibus.
Numenius madagaſcarienſis. *Briſſ. av.* 5. *p.* 321. *n.* 3. *t.* 28.
Courlis de Madagaſcar. *Buff. pl. enl. n.* 198.
Madagaſcar Curlew. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 121. *n.* 2.
Habitat in Madagaſcar, *arquatae perquam affinis, et aequalis.*
Caput, collum *et* corpus *ſupra fuſcum, pennarum margine griſeo;* tectrices *caudae ſuperiores ex rufo griſeae faſciis transverſis griſeis;* mentum, abdomen *et* criſſum *alba;* pectus *et* hypochondria *flavicantia maculis fuſcis;* remiges 3 *primae totae nigrae, quarta intrinſecus, reliquae cum ſecundariis utrinque marginatae;* cauda *griſea, lineis fuſcis.*

Arquata. 3. Sc. roſtro arcuato, pedibus caerulescentibus, alis nigris maculis niveis. *Fn. ſuec.* 168. *It. ſcan.* 333. *Brünn. orn. n.* 158. *Kram. el. p.* 350. *n.* 1.
Numenius. *Briſſ. av.* 5. *p.* 311. *n.* 1. *Nozem. nederl. Vogel t.* 57.
Numenius ſ. Arquata. *Geſn. av.* 222. *Aldr. orn. l.* 20. *c.* 21. *Marſ. dan. t.* 17.
Corlis. *Bell. av.* 47.
Courlis. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 19. *Pl. enl. n.* 818.
Curlew.

Scolopacum *quoque*, Tringarum *&c. ſpecies difficillime diſtinguuntur, aetate ſexuque mutabiles, colore parum diſtinctae, quae pedibus ſunt rubris, a reliquis probe ſeparandae, cum pedes rarius varient.*

Curlew. *Brit. zool.* 2. *n.* 176. *t.* 63. *Arct. zool.* 2. *p.* 462. A. *Raj. av. p.* 103. *n.* 1. *Will. orn. p.* 294. *t.* 54. *Albin. av.* 1. *t.* 79.

Common Curlew. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 119. *n.* 1.

Brachvogel. *Frisch av. t.* 224.

β) Arquata pedibus nigris.

Habitat gregatim in Europae *et septentrionalis* Asiae, *littoris etiam* Caspii, β) *in* Americae *borealis, et insulae maris australis ab* Herveyo *dictae uliginosis et maritimis, vermibus terrestribus et marinis insectisque victitans, velociter volans, ova* 4 *pallide olivacea maculis fuscescentibus notata pariens, circiter* 2 *pedes longa*; caro *esculenta, saepius rancida.*

Rostrum *fuscum, prope apicem nigrum, mandibulae inferioris basi incarnata*; area oculorum *alba*; dorsum, pectus *et* abdomen *alba nigro-striata*; cauda *ex rufescente alba, nigro-lineata.*

luzonien-sis. 21. Sc. vertice remigibusque majoribus nigris, dorso tectricibusque alarum succineis, capite, collo et pectore albis, striis, abdomine arcubus nigris notatis.

Courlis tacheté de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p.* 85. *t.* 48. *Buff. hist. nat. desois.* 8. *p.* 32.

Luzonian Curlew. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 122. *n.* 3.

Habitat in insula Luçon, *arquata multo minor.*

Dorsi *pennae marginibus albo-maculatae*; cauda *ex vinaceo grisea, nigro-lineata.*

tahitien-sis. 22. Sc. rostro fusco, basi rubescente, pedibus ex caeruleo-griseis, vertice fusco, superciliis pallidis, corpore ex rubescente albo, obscure striato et maculato, dorso nigro albido-undulato.

Otaheite Curlew. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 122. *n.* 4.

Habitat in Tahiti, *arquatae fere magnitudine*, 20 *pollices longa.*

Remiges *obscurae, margine pallidiores*; cauda *sordide flava*; *pars basi proxima maculis, altera fasciis obscuris notata*; ungues *nigri.*

leucoce-phala. 23. Sc. rostro rubro, pedibus ex atro cinereis, capite colloque albis, corpore caeruleo, remigibus atris.

White-headed Curlew. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 183. *n.* 5. *t.* 80.

Habitat ad caput bonae spei, *arquatae magnitudine et habitu.*

Rostrum *praelongum.*

4. Sc.

Phaeopus. 4. Sc. roſtro arcuato, pedibus caeruleſcentibus, maculis dorſalibus fuſcis rhomboidalibus. *Fn. ſuec.* 169. *Scop. ann.* 1. *n.* 132. *Brünn. orn. n.* 159. *Kram. el. p.* 350. *Georg. it. p.* 171. Frisch. 225.

Numenius minor. *Briſſ. av.* 5. *p.* 317. *n.* 2. *t.* 27. *f.* 1.

Phaeopus altera ſ. Arquata minor. *Geſn. av.* 500. *Aldr. arn.* 3. *p.* 458. *t.* 460.

Corlieu ou petit Courlis. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 27. *Pl. enl. n.* 842.

Whimbrel. *Brit. zool.* 2. *n.* 177. *t.* 64. *Arct. zool.* 2. *p.* 462. B. *Raj. av. p.* 103. *n.* 2. *Will. orn. p.* 294. *Edw. gleam. t.* 307.

Habitat in Europa *et* America, *etiam ad littora maris* Caſpii, 16-17 *pollices longa, gregaria, migrans.*

Roſtrum *nigrum, mandibulae inferioris baſi rubeſcente*; caput, collum, corpus *ſupra et* pectus *fuſceſcentia, ſtriis obſcure fuſcis*; mentum, uropygium, abdomen, *et* criſſum *alba*; cauda *fuſca, obſcure faſciata*; remiges *nigrae, interius albo maculatae*; pedes *nigri.*

fuſca. 5. Sc. roſtro apice inflexo, corpore nigro albo-nebuloſo, uropygio alisque ſubtus albis.

Limola fuſca. *Briſſ. av.* 5. *p.* 276. *n.* 4. *t.* 23. *f.* 2.

Barge brune. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 508. *Pl. enl. n.* 875.

Dusky Snipe. *Arct. zool.* 2. *p.* 471. C. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 155. *n.* 30.

Habitat ad Europae *littora, intra* arcticum *circulum nidificans, in* Ruſſiam *et* Sibiriam *migrans*, 12 *circiter pollices longa.*

Roſtrum *nigrum, mandibulae inferioris baſi pallida*; dorſi *pars inferior cum* uropygio *alba*; genae *cum* gutture *cinereae*; remiges *fuſcae, griſeo-maculatae*; rectrices *fuſcae transverſim albo-ſtriatae*; pedes *fuſci.*

cinerea. 24. Sc. roſtro nigro, pedibus ex fuſco rubentibus, corpore cinereo ſubtus albo, alarum faſcia transverſa exalbida. *Güldenſt. nov. comm. Petrop.* 19. *p.* 473. *t.* 19.

Terek Avoſet. *Arct. zool.* 2. *p.* 502. A.

Terek Snipe. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 155. *n.* 31.

Habitat aeſtate ad mare Caſpium, *circa oſtium fluvii* Terek, *gregatim, potiſſimum in inundatis et ad lacus ſalſos inſectis victitans, migrans, habitu, colore, magnitudine canuto proxima, totano minor, recurviroſtram cum ſcolopace nectens.*

Roſtrum

Roſtrum *phaeopodis, capite duplo longius, ſubrecurvum, mandibulae ſuperioris apice paululum deorſum flexo*; oculi *fuſci*, pennae *in medio fuſcae*; guttur pectusque *cinereo-ſtriata*; remiges *primores fuſcae*, *ſecundariae cinereae*; rectrices *cinereae*; ungues *nigri*.

ſubarquata. 25. Sc. roſtro arcuato pedibusque nigris, capite, collo alisque ſpuriis fulcis, ſubferrugineo-undulatis, corpore ſupra cinereo, ſubtus ex rufo ferrugineo, gula, criſſo et uropygio albis. *Güldenſt. nov. comm. Petrop.* 19. *p.* 471. *t.* 19.

Habitat aeſtate circa mare Caſpium *et ad* Tanain *verſus oſtium fluvii* Choper, *ultra* 8 *pollices longa*, *inſectis et verniculis victitans*, *tringae maculatae magnitudine*, *colore*, *habitu affinis*, *magis adhuc islandicae*, *an ſola aetate minore diverſa?*

Roſtri *mandibula inferior brevior*; lingua *longa*, *ſagittata*, *integerrima*; oculi *fuſci*; orbitae *albidae*; lora *fuſca*; uropygium *et* criſſum *maculis fuſcis varia*; cauda *rotundata*, *ex fuſco cinerea*.

incana. 26. Sc. roſtro nigro, pedibus ex flavicante viridibus, corpore cinereo, macula inter roſtrum et oculos, mento, jugulo et abdominis medio albis.

Aſhcoloured Snipe. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 154. *n.* 29.

Habitat in inſulis Eimeo *et* Palmerſton, 11 *pollices longa.*

Roſtrum *apice pauliſper incurvum*; gula *lituris fuſcis varia.*

griſea. 27. Sc. roſtro, pedibus, tectricibus alarum remigibusque fuſcis, capite, collo et humeris ex cinereo fuſcis atro-maculatis, dorſo et abdomine albis.

Brown Snipe. *Arct. zool.* 2. *p.* 464. *n.* 369. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 154. *n.* 28.

Habitat in Noveboraci *maritimis*, 11 *pollices longa*; faſcia *inter roſtrum et oculum*, *et litura utrinque ſupra oculum alba*; remiges *ſecundariae margine albae*; pectus *ex albo et fuſco varium*; cauda *et* uropygium *nigro-et albo-lineata*; digitus *poſterior altus et praelongus.*

noveboracenſis. 28. Sc. pedibus obſcure viridibus, capite, collo humerisque ex nigro, cinereo et rubro variis, gutture et pectore ferrugineis, nigro parumper maculatis, dorſo et uropygio albis.

Red-breaſted Snipe. *Arct. zool.* 2. *p.* 464. *n.* 368. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 153. *n.* 26.

Habitat

Habitat in Noveboraci *maritimis*, *magnitudine et roſtro gallinagini affinis.*

Tectrices *alarum*, remigesque *ſecundariae obſcure cinereae, hae apice albae*; cauda *obſcuro- et albo-lineata.*

nigra. 29. Sc. roſtro pedibusque rubris, corpore nigro.

Black Snipe. *Arct. zool.* 2. *p.* 469. *n.* 381. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 153. *n.* 26.

Habitat in inſulis inter Aſiam *borealem et* Americam *intermediis.*

nutans. 30. Sc. roſtro nigro, pedibus vireſcentibus, corpore cinereo, vertice et ſuperiore dorſo obſcuro rubro-ſtriato, inferiore albo nigro-maculato.

Nodding Snipe. *Arct. zool.* 2. *p.* 465. *n.* 370. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 153. *n.* 25.

Habitat in littore Labrador, *capite perpetim nutans, gallinaginis magnitudine.*

Genae *cinereae, nigro-ſtriatae*; collum *et* pectus *ex cinereo et ferrugineo mixta, maculis obſcuris notata*; abdomen *album*; tectrices *alarum minores cinereae, majores obſcurae, margine fuſcae*; remiges *obſcurae, ſecundariae apice albae*; cauda *nigro- et albo-lineata, apice rubeſcens.*

flavipes. 31. Sc. roſtro nigro, pedibus flavis, corpore exalbido nigro-maculato, gutture et pectore ex nigro et albo variis, abdomine et caudae tectricibus albis.

Yellowſhank. *Arct. zool.* 2. *p.* 468. *n.* 378. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 152. *n.* 24.

Habitat auctumno in Noveboraco, 11 *pollices longa.*

Roſtrum *apice pauliſper incurvum*; tectrices *alarum minores fuſcae*; remiges *primariae obſcurae*; cauda *fuſco et albo lineata.*

melanoleuca. 32. Sc. roſtro nigro, pedibus flavis, corpore ex albo et nigro vario.

Stone Snipe. *Arct. zool.* 2. *p.* 468. *n.* 376. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 152. *n.* 23.

Habitat auctumno in arenis littoris Labrador, *perpetuo nutans, gallinagine duplo major.*

Cauda *et* uropygium *albo et nigro lineata*; remiges *primariae obſcurae.*

ſemipalmata. 33. Sc. pedibus ſemipalmatis roſtroque obſcuris, capite colloque nigro- et albo-ſtriatis, pectore albo nigro-guttato, dorſo cinereo, maculis ſagittatis nigris.

Semipalmated Snipe. *Arct. zool.* 2. *p.* 469. *n.* 380. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 152. *n.* 22.
Habitat in Noveboraco, 14 *pollices longa.*
Abdomen *totum album*; hypochondria *alba*, *lineis transversis nigris*; remiges *primariae obscurae*, *fascia obliqua alba*, *secundariae albae*; rectrices *intermediae cinereae*, *nigro lineatae*, *exteriores albae.*

rusticola. 6. Sc. rostro recto basi rufescente, pedibus cinereis, femoribus tectis, fascia capitis nigra. *Fn. suec.* 170. *Scop. ann.* I. *n.* 134. *Brünn. orn. n.* 164. *Kram. el. p.* 351. *Georgi it. p.* 171.
Numenius rostri apice laevi, capite linea utrinque nigra, rectricibus nigris apice albis. *Fn. suec.* 1. *n.* 141.
Gallina rustica. *Gesn. av.* 477.
Rusticola s. perdix rustica major. *Ges. av.* 501. *t.* 502.
Scolopax s. perdix rustica. *Gesn. av.* 502. *Aldr. orn.* 3. *p.* 471. *t.* 473.
Scolopax. *Bell. av.* 272. *Briss. av.* 5. *p.* 292. *n.* 1.
Bécasse. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 462. *t.* 25. *Pl. enl. n.* 885.
Woodcock. *Brit. zool.* 2. *n.* 178. *t.* 65. *Arct. zool.* 2. 470. A. *Raj. av. p.* 104. *n.* 1. *Will. orn. p.* 289. *t.* 53. *Borl. Cornw. p.* 245. *t.* 24. *f.* 12. *Albin. av.* 1. *t.* 70. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 129. *n.* 1.
Schnepf. *Frisch av. t.* 226. 227. *Günth. Nest. u. Eyer. t.* 18.
β) Scolopax candida. *Briss. av.* 5. *p.* 295. A.
γ) Scolopax pallidissime straminea.
δ) Scolopax capite rubescente, corpore albo, alis fuscis.
Habitat in Europa, Asia *et* Africa, *migrans gregatim*, *stupida*, *victitans lumbricis*, 15 *pollices longa*; *noctu volitans et rediens iterato eadem via aetherea*, *sed depressiore*; *nidum in terra struens ex fibris foliisve paucis exsuccis*, *ad truncum vel radicem arboris cujusdam*, *ovaque parieus* 4-5 *columbinis majora ex rufo grisea lituris obscuris*; *caro*, *et ipsa intestina delicioſa.*
Mandibula *superior longior*, *basi rufa*; frons *cinerea*; palpebra *inferior alba*; vertex, cervix, dorsum, tectrices*que alarum ex ferrugineo*, *nigro et griseo mista*; mentum *cinerascens*; guttur *flavicans*, *maculis minutis obscuris*; corpus *subtus exalbidum*, *obscure lineatum*; remiges *obscurae*, *maculis trigonis rufis*; cauda *rotundata*, *apice cinerea*; pedes *fuscescentes.*

minor. 34. Sc. roſtro recto, pedibus fuſceſcentibus, fronte cinerea, occipite nigro lineis 4 transverſis flavicantibus, mento albo, corpore ſupra nigro fulveſcente-undulato, ſubtus flavo.

Little Woodcock. *Arct. zool.* 2. *p.* 463. *n.* 365. *t.* 19. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 131. *n.* 2.

Habitat in Americae, *a Septembri inde in* Carolinae, *ab Aprilis fine in* Noveboraci *ſilvis humidis, ruſticolae affinis, ſed multo minor,* 11½ *pollices modo longa, in terra aut arboris trunco ova* 8 *aut plura pariens, incubante femina recta via altiſſime ſurſum volans, eademque via cantu fiſtulante deſcendens eamque viam multoties remetiens. Caro eximia.*

Mandibula *inferior longa brevior; a roſtro ad oculos linea obſcura;* tectrices *alarum majores lineis angulatis nigris et rubris; interiores ferrugineae;* remiges *primores obſcurea;* cauda *nigra, apice fuſca.*

paludoſa. 35. Sc. roſtro pedibusque fuſcis, loris et ſuperciliis nigris, corpore nigro vario ſupra rufo, ſubtus exalbido.

Bécaſſe des Savanes. *Buff. pl. enl. n.* 895.

Bécaſſe de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 481.

Savanna Woodcock. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 132. *n.* 3.

Habitat in uliginoſis Cayennae, *tempore pluvio frequens, quarta parte minor ruſticola, bis in anno in fovea loci cujusdam elatioris ſiccis foliis cincta nidificans,* 2 *pariens ova;* caro *ſapidiſſima.*

Roſtrum, *quam ruſticolae longius;* corpus *ſubtus maculis nigris varium.*

major. 36. Sc. pedibus et vertice nigris, hoc per mediam ſtriam pallidam bipartito, ſtria pallida ſupra et infra oculos, corpore ſupra variegato ſubtus albo.

Scolopax media. *Friſch av. t.* 228.

Great Snipe. *Brit. zool.* 2. *n.* 188. *Arct. zool.* 4. *p.* 470. B. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 133. *n.* 4.

Habitat rarior in Anglia, Germania, *boreali* Sibiria, 16 *pollices longa, media inter ruſticolam et gallinaginem.*

Roſtrum *ruſticolae; pennae* corporis *inferiores, mediis abdominis exceptis, margine nigrae;* remiges *obſcurae;* rectrices *rubeſcentes et, intermediis duabus exceptis, nigrolineatae.*

cayennenſis. 37. Sc. roſtro obſcuro baſi rubeſcente, pedibus fuſcis, corpore ſupra ex cineraſcente fuſco luteſcente-maculato, ſubtus albo.

Cayenne Snipe. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 134. *n.* 5.
Habitat in Cayenna, 13 *pollices longa.*
Tectrices *alarum majores exalbidae; inferiores ex obscuro et albo variae;* remiges *fuscae, basi, nonnullae quoque apicibus albae;* guttur *paulisper maculatum;* uropygium *album;* cauda *lineis et apice obscuris.*

Gallinago. 7. Sc. rostro recto tuberculato, pedibus fuscis, frontis lineis fuscis quaternis. *Fn. suec.* 173. *Scop. ann.* 1. *n.* 138. *Brünn. orn. n.* 160. 161. *Kram. el. p.* 352. *Georg. it. p.* 182.
Numenius capite lineis 4 fuscis, rostro tuberculoso, femoribus seminudis. *Fn. suec.* 1. *n.* 142.
Gallinago. *Briss. av.* 5. *p.* 298. *n.* 2. *t.* 26. *f.* 1.
Gallinago minor. *Bell. av.* 54. *Aldr. orn.* 3. *p.* 484. 476. *t.* 477. *Marsf. danub.* 5. *p.* 34. *t.* 15.
Bécassine. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 483. *t.* 26. *Pl. enlum. n.* 883.
Snipe or Snite. *Raj. av. p.* 105. *n.* 2. *Will. orn. p.* 290. *t.* 53. *Alb. av.* 1. *t.* 71.
Common Snipe. *Brit. zool.* 2. *p.* 187. *t.* 68. *Arct. zool.* 2. *p.* 463. *n.* 366. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 134. *n.* 6.
Schnepf. *Frisch av. t.* 229.
Moosschneppe. *Schranck Naturf.* 18. *p.* 68.
Habitat per omnem terrarum orbem *in uliginosis, migrans,* 12 *fere pollices longa,* capella caelestis, *vermibus, insectis, serpentibus minoribus victitans, nidum ex plantis siccis paucisque plumis struens, et ova* 4-5 *sordide olivacea, obscure maculata pariens, tempore incubationis turbata altissime cum singulari sono adscendens et summa cum velocitate descendens iterum.*
Vertex, rostrum, fascia *ocularis et* alae *nigra;* gula *pallide ferruginea;* rectrices *basi nigrae;* pectus, abdomen *et* crissum *alba, illa immaculata, hoc striis nigris pictum.*

gallinaria. 38. Sc. rostro recto tuberculato, pedibus flavis, capite toto griseo. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 23. *n.* 183.
Finmark Snipe. *Arct. zool.* 2. *p.* 471. D. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 136. *n.* 7.
Habitat in Finnia, *gallinagini maxime affinis.*

Gallinula. 8. Sc. rostro recto tuberculato, pedibus virescentibus, loris fuscis, uropygio violaceo-vario. *Scop. ann.* 1. *n.* 139. *Brünn. orn. n.* 163.

Galli-

Gallinago minor. *Briſſ. av.* 5. *p.* 303. *n.* 3. *t.* 26. *f.* 2.
Gallinago minima. *Bell. av.* 217.
Cinclus quartus. *Aldr. orn.* 3. *p.* 493.
Petite bécaſſine. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 490. *Pl. enlum. n.* 884.
Gid, Jackſnipe, Judcock. *Brit. zool.* 2. *n.* 189. *t.* 68. *Arct. zool.* 2. *p.* 464. *n.* 367. *Raj. av. p.* 105. *n.* 3. *Will. orn. p.* 291. *Albin. av.* 3. *t.* 86. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 136. *n.* 8.
Haſchnepfe. *Friſch av. t.* 231.
Habitat in Americae, Europae *et* Aſiae *ad* Syriam *usque paludibus, moribus praecedentibus ſimilis, at minor,* $8\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum *nigrum*; vertex *niger*, *ferrugineo colore admiſto*; ſupercilia *flava*; collum *ex albo*, *fuſco et rubeſcente varium*; pennae *ſcapulares anguſtae*, *longae*, *fuſcae*, *margine flavae*; abdomen *et* criſſum *alba*; remiges *majores obſcurae*; rectrices 12 *fuſcae.*

belgica. 39. Sc. roſtro rectiſſimo apice nigro, capite, collo et pectore ferrugineis, abdomine albo, dorſo, alis, cauda pedibusque nigris. *Nozem. nederl. Vogel t.* 27.
Habitat in Belgio, *inſectis terreſtribus victitans.*

puſilla. 40. Sc. roſtro ſubrecurvo, ventre, uropygio et lateribus albis, dorſo et tectricibus alarum caudaque ferrugineis albo-lineatis. *Falck it.* 3. *p.* 371.
Gallinago anglicana. *Briſſ. av.* 5. *p.* 309. *n.* 5.
Dunlin. *Brit. zool.* 2. *n.* 205. *Arct. zool. p.* 476. *n.* 391. *Raj. av. p.* 109. *n.* 12. *Will. orn. p.* 305. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 185. *n.* 33.
Habitat in Anglia, *et provincia* Sibiricae Iſetenſi.

obſcura. 41. Sc. roſtro recto purpureo, pedibus incarnatis, capite cinereo, remigibus ex atro griſeis. *S. G. Gmelin it.* 3. *p.* 92. *t.* 17.
Habitat ad littus maris Caſpii.

Fedoa. 9. Sc. roſtro recto flavicante, pedibus fuſcis, remigibus ſecundariis rufis nigro-punctatis.
Limoſa americana rufa. *Briſſ. av.* 5. *p.* 287. *n.* 7.
Barge rouſſe de la baye de Hudſon. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 507.
Great Godwit. *Arct. zool.* 2. *p.* 465. *n.* 371.

American Godwit. *Edw. av. t.* 137. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 142. *n.* 12.

Habitat ad sinum Hudsonis, *aegocephalae magnitudine*, 16 *pollices longa.*

Rostrum *apice nigrum*; supercilia *alba*; lora *obscura*; genae *et* gula *albae*; caput collum*que ex obscuro et dilute fusco varia*; pectus *nigro-lineatum*; abdomen *fuscum*; dorsum *et* tectrices *alarum ex ferrugineo et obscuro variae*; remiges *extus ferrugineae*; cauda *dilutius fusco et nigro lineata.*

Glottis. 10. Sc. rostro recto basi inferiore rubro, corpore subtus niveo, pedibus virescentibus. *Fn. suec.* 171. *Scop. ann.* 1. *n.* 137. *Brünn. orn. n.* 167.

Numenius pedibus virescentibus, uropygio albo, remigibus lineis albis fuscisque undulatis. *Fn. suec.* 1. *n.* 142.

Pluvialis major. *Aldr. orn.* 3. *p.* 535. *Raj. av. p.* 106. *n.* 8. *Marsf. dan.* 5. *p.* 48. *t.* 22.

Limosa. *Gesn. av.* 519.

Limosa venetorum. *Aldrov. orn.* 3. *p.* 434. *t.* 435.

Limosa grisea major. *Briss. av.* 5. *p.* 272. *n.* 3. *t.* 24. *f.* 2.

Glottis. *Gesn. av.* 520.

Barge variée. *Buff. hist. nat. desois.* 7. *p.* 503.

Greater Plover of Aldrovand. *Will. orn. p.* 106. *t.* 55. *Sloan. jam. p.* 317. *n.* 9. *t.* 268? *Raj. av. p.* 190. *n.* 6?

Green legged Horseman. *Albin. av.* 2. *t.* 69.

Greenshank. *Brit. zool.* 2. *n.* 183. *Arct. zool.* 2. *p.* 469. *n.* 379. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 147. *n.* 18.

Habitat in Asia, America *et* Europa, *aestate in borealibus, potissimum in maritimis, calidris magnitudine*, 14 *pollices longa; caro delicioſa.*

Rostrum *nigrum*, *mandibulae superioris apice paulisper deorsum*, *inferioris sursum flexo*; supercilia dorsum*que interius alba*; caput, cervix *et* dorsum *pallide cinerea*, *scapis pennarum fusco maculatis*; remiges *obscurae*, *interius albo-maculatae*; cauda *alba*, *lineis obscuris*; pedes *praelongi*, *unguibus nigris.*

Calidris. 11. Sc. rostro recto rubro, pedibus coccineis, remigibus secundariis albis. *Kram. el. p.* 353.

Scolopax Totanus. *Fn. suec.* 167.

Totanus. *Bell. av.* 46. *Briss. av.* 5. *p.* 188. *n.* 3. *t.* 17. *f.* 1.

Calidris Bellonii. *Aldr. orn.* 3. *p.* 431. *t.* 433.

Gallinula erythropus. *Gesn. av.* 504.

Gallinula erythropus major. *Marsf. dan.* 5. *p.* 50. *t.* 23.

Cheva-

Chevalier aux pieds rouges. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 513.
Redſhank or Poolſnipe. *Brit. zool. n.* 184. *t.* 65. *Raj. av. p.* 107. *n.* 1. *Will. orn. p.* 299. *Alb. av.* 3. *t.* 87. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 150. *n.* 20.
Rotbein. *Friſch av.* 2. *t.* 240.

β) Totanus ſinenſis. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 151. *n.* 20. A.

Habitat in Europae, Americae, Sibiriae, *β*) *in* Sinae *praecipue maritimis*, 12 *pollices longa*, *in uliginoſis nidificans*, *et ova* 4 *albida olivaceo-tincta et nigro-maculata pariens*, *turbata motu concentrico circa nidum volitans.*

Roſtrum *apicem verſus nigrum*; irides *rubeſcente avellanae colore*; caput cervix*que cinerea*; dorſum *et* humeri *ex viridi-nitente fuſci*; tectrices *alarum cinereae*, *obſcuro et fuſco miſtae*, *albido maculatae*; remiges *ſecundariae*, 2 *interioribus exceptis*, *verſus apicem albae*; primores *obſcurae*, *interiorum* 4-5 *apice albae*; linea *ſuperciliaris alba*; *inter roſtrum et oculum macula obſcura*; mentum *et* guttur *ſtriis brevibus obſcuris notata*; pectus, abdomen, criſſum, dorſum *inferius et* uropygium *alba*, *maculis minutis obſcuris*; rectrices *ſingulae lineis* 12-13 *transverſis nigris*; ungues *nigri.*

Totanus. 12. Sc. roſtro ſubrecto, pedibus fuſcis, ſuperciliis, pectore, abdomine uropygioque albis. *Brünn. orn. n.* 157. *Georg. it. p.* 171.
Crex. *Bell. it.* 103. *Aldr. orn.* 3. *p.* 428. *Will. orn.* 220. *Raj. av.* 106.
Totanus. *Geſn. av.* 518. *Aldr. orn.* 3. *p.* 428.
Limoſa griſea. *Briſſ. av.* 5. *p.* 267. *n.* 2. *t.* 23. *f.* 1.
Corlieu. *Alb. av.* 2. *p.* 45. *t.* 71.
Spotted Redſhank. *Brit. zool.* 2. *n.* 186.
Spotted Snipe. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 148. *n.* 19.

β) Spotted Woodcock. *Forſter act. angl.* 62. *p.* 410.
Spotted Snipe. *Arct. zool.* 2. *p.* 467. *n.* 374.

Habitat in Europa, *β*) *in ſeptentrionali* America, *ad ripas fluviorum*, *teſtaceis minoribus aliisque vermibus victitans*, *glottidis magnitudine.*

Rectrices *intermediae*, caput, tectrices *alarum cinereae*, *illud ſtriis nigris*, *hae*, *prouti* dorſum *obſcurum*, *maculis trigonis albis variae*; remiges *obſcurae*; pectus *pauliſper nigro-maculatum*; abdomen *et* femora *alba*; rectrices *exteriores albidae*, *nigro-lineatae*; pedes *longi.*

Limoſa. 13. Sc. roſtro ſubrecurvato baſi rubro, pedibus fuſcis, remigibus macula alba: quatuor primis immaculatis. *Fn. ſuec.* 172. *Fabric. Fn. groenl. n.* 72. *Georg. it. p.* 171.

Numenius uropygio albo, rectricibus nigris, baſi albis, remigibus transverſa macula alba: exceptis quatuor primis. *Fn. ſuec.* 1. *n.* 144.

Gallinago cinerea major. *Marſ. Danub.* 5. *p.* 30. *t.* 13. 14.

Limoſa. *Briſſ. av.* 5. *p.* 262. *n.* 1.

Totanus. *Aldr. orn.* 3. *p.* 431. *t.* 430.

Barge. *Bell. av.* 48. *Aldr. orn.* 3. *p.* 434. *t.* 436. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 500. *t.* 27. *Pl. enl. n.* 874.

Stone Plover. *Raj. av. p.* 105. *n.* 5.

Second ſort of Godwit. *Will. orn. p.* 293. *t.* 53.

Leſſer Godwit. *Brit. zool.* 2. *n.* 182.

Jadreka. *Arct. zool.* 2. *p.* 467. *n.* 375. *Olaff. Isl.* 2. *p.* 201. *t.* 48. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 146. *n.* 17.

Habitat in Europa *boreali*, *gregatim in* Ruſſiam *et* Sibiriam *auſtralem*, *ad ripas* Volgae, *lacus* Baikal, *maris* Caſpii *migrans*, 17 *pollices longa.*

Roſtrum *obſcurum*, *baſi flavicans*; irides *albae*; caput collum*que cinerea*; genae, mentum, uropygium *et* criſſum *alba*; dorſum *fuſcum*; rectrices 2 *intermediae totae nigrae*, *reliquae apice albae.*

capenſis. 14. Sc. roſtro recto lineaque verticis rufeſcentibus, faſcia pectorali nigra, linea utrinque dorſali alba.

Gallinago capitis bonae ſpei. *Briſſ. av. app. p.* 141. *t.* 6.

Bécaſſine du cap de bonne eſperance. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 494. *Pl. enl. n.* 270.

Cape Snipe. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 138. *n.* 9.

β) Scolopax orbitis, capite, cervice et pectore nigris, area oculorum mentoque albis. *Lath. ſyn.* III. 1. *t.* 81.

γ) Bécaſſine de la Chine. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 495. *Pl. enl. n.* 881.

δ) Bécaſſine de Madagaſcar. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 495. *Pl. enl. n.* 992.

Habitat ad caput bonae ſpei, *γ*) *in* Sina, *δ*) *in* Madagaſcar, *gallinaginis magnitudine*, 10 *pollices longa.*

Vertex *cinereus nigro-ſtriatus*; area *oculorum alba*; *reliquum* caput *cum* collo *rufum*; pectoris *pars inferior cum* abdomine *et* criſſo *alba*; corpus *ſupra*, alae *et* cauda *cinerea*, *transverſim nigro-undulata et lineata.*

maderaspatana. 42. Sc. roſtro rufeſcente, corpore ſupra ex fulvo et nigricante vario, ſubtus albo, verticis ſtria media et capitis utrinque laterali ex atro fuſca, gutture fulvo nigricante-maculato.
Gallinago maderaspatana. *Briſſ. av.* 5. *p.* 308. *n.* 4.
Bécaſſine de Madras. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 496.
Partridge Snipe. *Raj. av. p.* 193. *t.* 1. *f.* 2.
Madras Snipe. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 141. *n.* 10.
Habitat in Madras.
In dorſo *faſciae duae ex atro fuſcae*; pectoris *faſcia transverſa nigra*; remiges *et* rectrices *ex nigro, fulvo et griſeo variae*; digitus *poſterior anterioribus aequalis.*

indica. 43. Sc. roſtro pedibusque nigris, corpore ſordide griſeo, fuſceſcente-undulato, ſubtus albido, faſcia oculari et infra-oculari griſea.
Bécaſſine blanche des Indes. *Sonner. it.* 2. *p.* 218.
White indian Snipe. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 141. *n.* 11.
Habitat in India, *gallinagine minor.*
Caput *album*; guttur *et* pectus *maculis ſtriisque*, hypochondria *faſciis ſordide griſeis varia.*

lapponica. 15. Sc. roſtro ſubrecurvato flaveſcente pedibusque nigris, subtus tota rufo-ferruginea. *Fn. ſuec.* 174. *Brünn. orn. n.* 165. *Forſter act. angl.* 62. *p.* 411.
Recurviroſtra pectore croceo. *Fn. ſuec.* 1. *n.* 138.
Limoſa rufa. *Briſſ. av.* 5. *p* 281. *n.* 5. *t.* 25. *f.* 1.
Barge rouſſe. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 504. *Pl. enl. n.* 900.
Redbreaſted Godwit. *Edw. av. t.* 138.
Red Godwit. *Brit. zool.* 2. *n.* 181. *t.* 77. *Arct. zool.* 2. *p.* 466. *n.* 372. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 142. *n.* 13.
β) Scolopax capite colloque cinereis, mento et abdomine albis.
Habitat gregaria in America, *et* Europa, *praeſertim ſeptentrionali, ad mare quoque* Caſpium, 18 *pollices longa, carne eximia.*
Roſtrum *nigrum, baſi flavicans*; caput, collum, pectus *et* corpus *ſupra ferruginea, et, collo excepto, nigro-ſtriata*; dorſi *pars inferior et* uropygium *ex rufo album*; remiges *majores extus nigrae, baſi intus albae*; *ſecundariae et* rectrices *altera parte albae, altera nigrae.*

aegocephala. 16. Sc. roſtro recto, pedibus vireſcentibus, capite colloque rufeſcentibus, remigibus tribus nigris baſi albis.
Barge ſ. aegocephalus. *Marſ. danub.* 5. *p.* 36. *t.* 16.

Grande Barge aboyeuſe. *Buff. hiſt. nat. des oiſ. 7. p. 501. Pl. enl. n. 876.*
Godwit, Yarwhelp or Yarwip. *Raj. av. p. 105. n. 4. Will. orn. p. 292. Alb. av. 2. t. 70.*
Common Godwit. *Brit. zool. 2. n. 179. Arct. zool. p. 466. n. 373. Lath. ſyn. III. 1. p. 144. n. 14.*
β) Limoſa rufa major. *Briſſ. av. 5. p. 284. n. 6.*
Grande Barge rouſſe. *Buff. hiſt. nat. des oiſ. 7. p. 505. Pl. enl. n. 916.*
Barbary Godwit. *Shaw it. p. 255.*
Habitat in Americae, Aſiae, Europae, β) *quoque in* Barbariae *arenis*, 16 *pollices longa.*
Roſtrum *nigrum*, *baſi purpuraſcens*, *mandibula inferiore breviore*; linea *ſuperciliaris albida*; corpus *ſupra rufum*, *pennarum ſingularum macula media obſcura*; abdomen *et* criſſum *alba*; rectrices *albae*, *intermediae* 2 *nigro lineatae.*

caneſcens. 44. Sc. pedibus longis cinereis, capite, collo dorſoque ex cinereo et albo variis, gula et pectore cinereo-maculato albis.
Cinereous Godwit. *Brit. zool. 2. n. 180. t. 66. Lath. ſyn. III. 1. p. 145. n. 15.*
Habitat in Lincolnia Angliae, *glottidis magnitudine.*
Roſtrum, *quam glottidi*, *craſſius*; cauda *cinereo-lineata.*

cantabrigienſis. 45. Sc. pedibus aurantiis, capite, cervice et dorſo ex cinereo fuſcis, corpore ſubtus albo.
Cambridge Godwit. *Brit. zool. 2. n. 185. Lath. ſyn. III. 1. p. 146. n. 16*
Habitat Cantabrigiae, *calidri major.*
Tectrices *alarum minores fuſcae*, *nigro-lineatae*, *margine exalbidae*; remiges *primores obſcurae*; *ſecundariae obſcuro et albo*, rectrices *cinereo et nigro lineatae.*

candida. 18. Sc. roſtro recto pedibusque aurantiis, corpore albicante, rectricibus candidis griſeo faſciatis.
Totanus candidus. *Briſſ. av. 5. p. 207. n. 8.*
Chevalier blanc. *Buff. hiſt. nat. des oiſ. 7. p. 519.*
White Redſhank. *Edw. av. t. 139. Lath. ſyn. III. 1. p. 151. n. 21.*
Habitat circa ſinum Hudſonis, *calidris magnitudine*, *forte varietas*, 11 *pollices longa.*
Roſtrum *apice nigrum*, frons, uropygium *et* corpus *ſubtus immaculata alba*; *reliquae partes ſtriis transverſis ex rufo griſeis pictae*; remiges *primores griſeae.*

46. Sc.

curonica. 46. Sc. griseo-maculata, alis nigricantibus, rostro nigricante: mandibula inferiore subtus a basi ad medium coccinea, pedibus lateritiis. *Beseke Schr. der berl. naturf. Ges. 7. p. 462.*

Habitat in Curonia.

Linn. Syst. Nat. ed. 12. rufipes. La Peyrouse. Obs. Obs. 38.

87. TRINGA. *Rostrum* teretiusculum, longitudine capitis.

Nares lineares.

Lingua gracilis.

Pedes tetradactyli: postico uniarticulato, a terra elevato.

pugnax. 1. T. rostro pedibusque rufis, rectricibus tribus lateralibus immaculatis, facie papillis granulatis carneis. *Fn. suec.* 175. *Scop. ann.* 1. *p.* 140. *Brünn. orn. n.* 168. 169. *Kram. el. p.* 352. *Georg. it. p.* 172. *Frisch av. t.* 232–235.

Avis pugnax. *Aldr. orn.* 3. *p.* 523. *t.* 526. *Jonst. av.* 152. *t.* 51. 52. *Marsf. Danub.* 52. *t.* 24. *Briss. av.* 5. *p.* 240. *n.* 18. *t.* 22. *f.* 1. 2.

Tringa seu Glareola pugnax. *Nozem. nederl. Vogel t.* 16.

Combattant ou Paon de mer. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 521. *t.* 29. 30. *Pl. enl. n.* 305. 306.

Ruff. *Brit. zool.* 2. *n.* 192. *t.* 69. *Artt. zool.* 2. *p.* 479. A. *Raj. av. p.* 107. *n.* 3. *Will. orn. p.* 302. *t.* 56. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 159. *n.* 1.

Ruff and Reeve. *Albin. av.* 1. *t.* 72. 73.

Habitat in Sibiria *et* Europa, *aestate quoque in boreali, pedem longa; mares numerosiores pro femina pugnant ferocissime, quae in cespite graminea* 4 *parit ova alba, maculis magnis ferrugineis notata, ex quibus mensis tempore prodeunt pulli; avis facile pinguescit, et carnem praebet sapidam.*

Rostrum *aliquando flavicans aut nigrum*; irides *avellanae colore*; cervix *umbone condecorata, cujus pars supra oculos eminet, in aliis atque aliis avibus alio atque alio colore conspicuo, in femina minore, utplurimum fusca subtus alba, rarissime tota alba, deficiente*; pectus *colore umbonis*; *reliquae* corporis *pennae plurimae fuscae nigro-lineatae, inferioris albae*; remiges *obscurae*; ungues *nigri*.

2. Tr.

Vanellus. 2. Tr. pedibus rubris, crista dependente, pectore nigro. *Fn. suec.* 176. *Scop. ann.* I. *n.* 141. *Brünn. orn. n.* 170. *Kram. el. p.* 353. *Olin. uccell. tab. p.* 21. *Georg. it. p.* 172. *Nozem. nederl. Vogel t.* 35. *S. G. Gmelin it.* I. *t.* 15.

Capella f. Vanellus. *Bell. av.* 49. a. *Gesn. av.* 764. *Aldr. orn.* 3. *p.* 523. *t.* 526. *Jonst. av.* 164. *t.* 53. 27. *Briss. av.* 5. *p.* 94. *n.* I. *t.* 8. *f.* I.

Vanneau. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 48. *t.* 4. *Pl. enlum. n.* 242.

Lapwing or Bastard Plover. *Brit. zool. n.* 190. *Arct. zool.* 2. *p.* 480. D. *Raj. av. p.* 110. *n.* I. *Will. orn. p.* 307. *t.* 57. *Alb. av.* I. *t.* 74. *Hayes brit. birds t.* II. *Lath. syn.* III. I. *p.* 161. *n.* 2.

Kywiz. *Frisch av.* 2. *t.* 213. *Günther Nest. u. Eyer t.* 31.

Habitat in omni Europa, *hieme quoque in* Sina, Persia, *et* Aegypto, $13\frac{1}{2}$ *pollices longus, vermibus in statu fero victitans, hisque et limacibus praesertim hortos liberans, in gramine sicco terrae instrato ova* 4 *pariens, sordide olivacea, nigro-maculata, ex quibus incubante et multiplici astu adversarios avertente femina, post tres septimanas prodeunt pulli; caro et ova inter delicias mensae.*

Rostrum *nigrum*; irides *avellanae colore*; vertex *ex viridi-nitente niger*; crista *occipitalis*, 4 *pollices longa, apice sursum versa*; *orbitae*, colli *latera*, abdomen, rectrices *altera parte basi propiore, exteriores fere totae albae*; stria *infra oculos et* guttur *nigra*; cervix *ex albo et fusco varia*; dorsum *et* alae *virides*; *illud nitore purpureo, hae caeruleo*; remiges *nigrae, primae* 4 *macula ad apicem alba*; crissum *rufescens.*

bononiensis. 6. Tr. pedibus ochraceis, capite et cervice badiis, corpore supra nigro subtus albo, gutture et pectore maculis ferrugineis notato.

Vanellus bononiensis major. *Briss. av.* 5. *p.* 110. *n.* 5.

Greater Lapwing. *Lath. syn.* III. I. *p.* 163. *n.* 3.

Habitat circa Bononiam, *vanello major.*

Rostrum *flavicans, apice nigrum.*

erythropus. 10. Tr. pedibus rubris, fronte, uropygio et cauda ex rufo albis, corpore supra et alis ex cinereo fuscis, abdomine fuliginoso. *Scop. ann.* I. *p.* 146.

Red-

Scolopaces *digitis quatuor insistunt, per paludes vadunt*; tringae *per campos et littora currunt, vix digito posteriori insistentes.*

Red-legged Sandpiper. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 163. *n.* 4.
Pugnace major; roſtrum *nigrum*; remiges 7 *primae nigrae, ſecundariae albae*; cauda *ad apicem faſcia nigra.*

faſciata. 17. Tr. roſtro, vertice, occipite, taenia pone oculos et abdomine nigris, fronte caudaque rotundata albis, dorſo cinereo, remigibus ſeptem primoribus atris. *S. G. Gmelin it.* 2. *p.* 194. *t.* 26.
Habitat in Aſtracania.

Gambetta. 3. Tr. roſtro pedibusque rubris, corpore luteo cinereoque variegato, ſubtus albo. *Fn. ſuec.* 177. *Scop. ann.* 1. *n.* 142.
Tringa variegata. *Brünn. orn. n.* 181.
Totanus ruber. *Briſſ. av.* 5. *p.* 192. *n.* 4.
Totanus alter. *Will. orn.* 221. *Raj. av. p.* 106. *n.* 11.
Gambetta. *Will. orn. p.* 300. *Raj. av. p.* 107. *n.* 2.
Calidris nigra ſ. Gambetta. *Aldr. orn.* 3. *p.* 434. *t.* 432.
Chevalier. *Geſn. av.* 795.
Gambette. *Buff. pl. enl. n.* 845.
Red-legged Horſeman. *Alb. av.* 2. *t.* 68.
Gambet. *Brit. zool.* 2. *n.* 198. *t.* 70. *Arct. zool.* 2. *p.* 477. *n.* 394. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 167. *n.* 9.
Habitat in Europa, *et in ipſo mari* glaciali *inter* Europam *et* Americam *intermedio*, *glottidis magnitudine*, *ruſticolae voce*, 12 *pollices longa.*
Roſtrum *apice nigrum*; irides *ex flavicante virides*; tectrices *alarum*, *et* pennae *ſcapulares cinereae*, *margine flavae*; remiges *primores et* rectrices *obſcurae*, *hae margine flavae.*

Interpres. 4. Tr. pedibus rubris, corpore nigro, albo ferrugineoque vario, pectore abdomineque albo. *It. gotl.* 217. *Fn. ſuec.* 178. *Brünn. orn. n.* 175.
Arenaria. *Briſſ. av.* 5. *p.* 132. *n.* 1.
Tourne-pierre. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 130. *t.* 10.
Coulon-chaud. *Buff. pl. enl. n.* 856.
Hebridal Sandpiper. *Brit. zool.* 2. *n.* 200. *Arct. zool.* 2. *p.* 472. *n.* 382. *Lightf. Flor. ſcot. n.* 152. *t.* 3.
Turnſtone or Sea-Dotterel. *Raj. av. p.* 112. *n.* 5. *Will. orn. p.* 311. *t.* 58. *Edw. av. t.* 141. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 188. *n.* 37.
Steindreher. *Otto act. ſoc. Hal.* 1. *p.* 111.

Morinella. *β*) Tringa pedibus rubris, rectricibus nigricantibus baſi albis, corpore griſeo, pectore nigro. *Syſt. nat.* XII. 1. 249. *n.* 6.
Arenaria cinerea. *Briſſ. av.* 5. *p.* 137. *n.* 2. *t.* 11. *f.* 2.

Turn-

Turnſtone or Sea-Dotterel. *Brit. zool. 2. n.* 199. *Catesb. Car. 1. t. 72.*

γ) Coulon-chaud de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 340.

δ) Coulon-chaud gris de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 857.

Habitat in Europa, Africa, America *et ad* mare Caſpium, *turdi magnitudine*, $8\frac{1}{2}$ *pollices longa*, *vermibus victitans*, *quos dum ſub lapidibus quaerit*, *hos invertit*, 3-4 *ova magna*, *columbinis fere aequalia*, *oblonga*, *acuminata*, *ex viresſcente cinerea fuſco-maculata et punctata in arena parit*, *tempore incubationis hominem canesque perſequens*, *et oſtrálegi more clamitans.*

Corpus *parvum*, *minus compreſſum*, *quam congeneribus*; roſtrum *capite brevius*, *digitis aequale*, *et* ungues *nigri*; cauda alae*que ſubtus*, dorſi*que pars inferior alba*; collum pectus*que ſuperius nigra*; vertex *niger*, *ſtriis albidis*; rectrices *baſi et apice albae*; pulli *ſubtus albi*, *ſupra cinerei ſtriis nigricantibus*; digiti *penitus liberi.*

ſtriata. 5. Tr. roſtri baſi pedibusque flavis, rectricibus albis fuſco-faſciatis, remigibus plurimis albis. *Act. Nidroſ.* 3. *p.* 440.

Totanus ſtriatus. *Briſſ. av.* 5. *p.* 196. *n.* 5. *t.* 18. *f.* 1.

Chevalier rayé. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 516. *Pl. enlum. n.* 827.

Striated Sandpiper. *Arct. zool.* 2. *p.* 472. *n.* 383. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 176. *n.* 21.

β) Totanus naevius. *Briſſ. av.* 5. *p.* 200. *n.* 6.

Habitat in Europae *frigidioris*, *rarior tamen in* Ruſſiae *et* Sibiriae *maritimis*, *ſturni magnitudine*, $10\frac{3}{4}$ *pollices longa*, *recedente maris unda colligens relicta teſtacea et molluſca*, *celeriterque recurrens*, *ne pedes madefiant*; *timida*; *voce hirundinis*, *cujus etiam more ſuſpenſa quaſi*, *ut inſecta capiat*, *ſupra aquas haeret*, *cum undis*, *quas tamen non contingit*, *cadens et adſcendens*; *in littore ova pariens* 4-6, *quam ſturnus*, *majora*, *pallide maculata. Caro cibo*, *plumae pulvinaribus inſerviunt.*

Roſtrum *apice nigrum*; corpus *ſupra obſcuro- et cinereo-undulatum*; guttur *obſcurum*; pectus *et* abdomen *alba*; remiges *primores et ſecundariae nigrae*; *hae apice albae*, *tertiae albae ſtria nigra*; rectrices *nigrae*, *exteriores cinereae*, *margine albae.*

macularia. 7. Tr. roſtro baſi pedibusque incarnatis, corpore undique maculato, ſuperciliis faſciaque gemina alarum albis.

Turdus aquaticus. *Briſſ. av.* 5. *p.* 255. *n.* 20.

Grive

Grive d'eau. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 140.
Spotted Tringa. *Edw. gleam. t.* 277. *f.* 2.
Spotted Sandpiper. *Brit. zool.* 2. *n.* 196. *Arct. zool.* 2. *p.* 473. *n.* 385. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 179. *n.* 24.
Habitat in Europa *et ſeptentrionali* America, *a* Penſylvania *ad ſinum* Hudſonis, *turdi magnitudine*, 8 *pollices longa.*
Color *ſupra ex vireſcente fuſcus*; caput *maculis oblongis obſcuris notatum minutis*, *in collo verſus dorſum majoribus*; humeri *et* alae *ſimilibus ſed transverſis maculis conſpicuae*; corpus *ſubtus album*, (*in mare*) *obſcure maculatum*; rectrices 2 *intermediae ex vireſcente fuſcae*, *reliquae albae obſcure lineatae.*

Keptuſchca. 42. Tr. corpore cinereo, vertice nigro, abdomine nigricante ad exitum rufeſcente. *Lepechin it.* 2. *p.* 229.
Habitat in Sibiriae *paludibus.*

cinerea. 25. Tr. cinerea ſubtus alba, pedibus obſcure viridibus, capite nigro-maculato, collo obſcure virgato. *Brünn. orn. n.* 179. *Friſch. av. t.* 237.
Aſhcoloured Sandpiper. *Brit. zool.* 2. *p.* 194. *Arct. zool.* 2. *p.* 474. *n.* 386. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 177. *n.* 22.
Habitat in Europae *et* Americae *ſeptentrionalis maritimis gregaria*, 10 *pollices longa.*
Dorſum *et* rectrices *alarum ſemicirculis concentricis nigris*, *cinereis et albis varia*; rectrices *caudae ex albo et nigro*; cauda *cinerea*, *margine alba*; pectus *nigro-maculatum*; digiti *membrana anguſta denticulata marginati.*

atra. 26. Tr. capite colloque nigris, dorſo alisque fuſcéſcentibus nigro mixtis, pectore et abdomine cinereis, uropygio cinereo, albo nigroque undulato. *Sander Naturf.* 13. *p.* 193.
Habitat ad Rheni *ripas.*

noveboracenſis. 27. Tr. obſcura, ſubtus alba, pectore fuſco-maculato, cauda cinerea.
New-York Sandpiper. *Arct. zool.* 2. *p.* 474. *n.* 387. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 180. *n.* 25.
Habitat in Noveboraco.
Dorſi *pennae*, remigesque *ſecundariae margine cinereae*; rectrices *alarum minores margine albae*; caudae *nigro- et albo-lineatae.*

28. Tr.

virgata. 28. Tr. obſcura ſubtus alba, pedibus flavicantibus, capite colloque albis longitudinaliter obſcure ſtriatis.
Streaked Sandpiper. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 180. *n.* 26.
Habitat in ſinu Sandwich, *gallinaginis magnitudine.*
Roſtrum *obſcurum*; dorſi *pennae margine albae*; ſcapulares *margine maculisque ferrugineis*; dorſum *inferius et* cauda *obſcure cinerea*; tectrices *alarum cinereae*; uropygium *album.*

borealis. 29. Tr. roſtro pedibusque fuſcis, corpore ſupra cinereo ſubtus albo, cauda remigibusque obſcuris.
Boreal Sandpiper. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 181. *n.* 27.
Habitat in ſinu regis Georgii.
Roſtrum *breve, ad apicem nigrum ſubgibbum*; ſupercilia *alba.*

novae terrae. 30. Tr. ſupra nigra, ſubtus ex cinereo alba, roſtro, alis ſpuriis, remigibus caudaque nigris, pedibus cinereis.
New Foundland Sandpiper. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 181. *n.* 28.
Habitat in inſula novae terrae.
Pennae *corporis ſuperiores margine ferrugineae.*

variegata. 31. Tr. ſupra ex fuſco, nigro et rufo varia, fronte gulaque pallidis, jugulo et pectore exalbidis longitudinaliter nigro-ſtriatis, abdomine albo, roſtro pedibusque obſcuris.
Variegated Sandpiper. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 181. *n.* 29.
Habitat in ſinu regis Georgii, *cincli magnitudine.*
Faſcia *pectoris transverſa obſcura maculata*; cauda *brevis, fuſca.*

lobata. 8. Tr. roſtro ſubulato, apice inflexo, pedibus pinnatis, pectore albo undulato. *Fn. ſuec.* 179. *Brünn. orn. n.* 171. *Fabric. Fn. groenl. n.* 75.
Phalaropus. *Briſſ. av.* 6. *p.* 18. *n.* 1.
Phalarope à feſtons dentelés. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 226.
Grey Coot-footed Tringa. *Edw. glean. t.* 308. *Act. angl.* 50. *t.* 6.
Grey Phalarope. *Brit. zool. n.* 218. *t.* 76. *Arct. zool.* 2. *p.* 494. *n.* 412. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 272. *n.* 2.
β) Tringa inferne alba ſupra nigra lituris longitudinalibus flaveſcentibus, faſcia alarum alba, pedibus lobatis. *Lepechin nov. comm. Petrop.* XIV. 1. *p.* 501. *t.* 13. *f.* 3.
Habitat in boreali Europa, Sibiria, *in glacie* Aſiae *et* Americae *interjecta, ut tamen etiam lacus ſalſos* Sibiriae *auſtralis, ipſumque maris* caſpii *litus frequentet.*

Roſtrum

Roſtrum *nigrum*; frons *alba*; vertex *obſcurus*; cervix *dilute cinerea*; dorſum, uropygium *et* humeri *columbina*, *maculis obſcuris*; tectrices *alarum* remigesque *fuſcae*; pectus *et* abdomen *alba*; cauda *obſcura*, *margine cinerea*; pedes *nigri*, *membrana digitis interſerta denticulata.*

glacialis. 32. Tr. pedibus pinnatis flavicantibus, roſtri nigri apice dilatato, genis et gutture teſtaceis, corpore ſupra obſcuro, ſubtus albo.

Plain Phalarope. *Arct. zool.* 2. *p.* 495. *n.* 415. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 273. *n.* 3.

Habitat in mari glaciali.

Vertex *obſcure flavus*; linea *ocularis nigra*; remiges *primores et tertiae margine obſcure flavae*; tectrices *alarum et* cauda *cinereae*; membrana *digitis interſerta integerrima.*

fuſca. 33. Tr. roſtro, vertice pedibusque pinnatis nigris, corpore ſupra ex fuſceſcente cinereo ſubtus albo, jugulo cinereo roſeo tincto.

Phalaropus fuſcus. *Briſſ. av.* 6. *p.* 18. *n.* 3.

Coot-footed Tringa. *Edw. av. t.* 46.

Brown Phalarope. *Arct. zool.* 2. *p.* 495. *n.* 414. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 274. *n.* 4.

Habitat in America.

Membrana *inter digitos ſerrata.*

cancellata. 34. Tr. pennis ſuperioribus fuſcis, margine albis, inferioribus albis transverſim obſcure lineatis, pedibus pinnatis obſcuris.

Baned Phalarope. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 274. *n.* 5.

Habitat in inſula nativitatis Chriſti, $7\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

Roſtrum *nigrum*; remiges rectricesque *obſcurae*, *margine et apice pallidiori.*

hyperborea. 9. Tr. roſtro ſubulato apice inflexo, pedibus pinnatis, pectore cinereo, colli lateribus ferrugineis. *Fn. ſuec.* 179. (*deſcr. poſter.*) *Fabr. Fn. groenl. n.* 75.

Phalaropus cinereus. *Briſſ. av.* 6. *p.* 15. *n.* 2.

Larus fidipes alter noſtras. *Raj. av. p.* 132. *n.* 7.

Phalarope cendré. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 224.

Phalarope de Siberie. *Buff. pl. enl. n.* 766.

Cock Coot-footed Tringa. *Edw. av. t.* 143.

Small cloven-footed Gull. *Will. orn. p.* 355.

Red Phalarope. *Brit. zool.* 2. *n.* 219. *t.* 76. *Arct. zool.* 2. *p.* 494. *n.* 413. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 270. *n.* 1.

b) Tringa (fulicaria) pedibus pinnatis, roſtro recto flavo, corpore griſeo ſubtus rufo. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 249. *n.* 10. *Fabr. Fn. groenl. n.* 76.
Phalaropus rufeſcens. *Briſſ. av.* 6. *p.* 20. *n.* 4.
Phalarope rouge. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 225.
Red Coot-footed Tringa. *Edw. av. t.* 142.
β) Tringa pectore fuſceſcente.
Habitat in Europa, America *et* Aſia *ſeptentrionali, ad mare tamen etiam* Caſpium *obvia, cincli magnitudine,* 8 *pollices longa, per paria incedens, inſecta roſtro ex aqua petens, urinari neſcia, et natando imperita, in loco ſicco* 4 *ova pariens.*
Roſtrum *nigrum;* vertex, cervix, dorſum, tectrices*que alarum ſuperiores cinerea;* ſtria *oculoris obſcura, et alia utrinque pone oculum rufa;* uropygium *et* tectrices *caudae ſuperiores faſciis obſcuris et albis;* corpus *ſubtus album;* cauda remiges*que obſcurae;* pedes *plumbei.*

alpina. 11. Tr. teſtaceo-fuſca, pectore nigricante, rectricibus cinereo-albidis, pedibus fuſceſcentibus. *Fn. ſuec.* 180. *Brünn. orn. n.* 173. *Fabr. Fn. groenl. n.* 77. *Friſch av. t.* 241.
Cinclus torquatus. *Briſſ. av.* 5. *p.* 216. *n.* 11. *t.* 19. *f.* 2.
Brunette. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 493.
Habitat in Lapponia, *ſturni magnitudine.*
Abdomen *album;* rectrices 2 *intermediae paulo longiores.*

helvetica. 12. Tr. roſtro pedibusque nigris, ſubtus nigra, criſſo albo, rectricibus albis nigro-faſciatis. *Forſt. act. angl.* 62. *p.* 412. *Pall. it.* 3. *p.* 699.
Vanellus helveticus. *Briſſ. av.* 5. *p.* 106. *n.* 4. *t.* 10. *f.* 1.
Vanneau de Suiſſe. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 60. *Pl. enlum. n.* 853.
Swils Sandpiper. *Arct. zool.* 2. *p.* 478. *n.* 396. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 167. *n.* 10.
Habitat in Helvetia, Gallia, Ruſſia, Sibiria, *ſeptentrionali* America, *vanelli magnitudine,* 11 *pollices longa, baccis, vermibus et inſectis victitans.*
Frons *alba;* occiput *ex albo et nigro varium;* genae, guttur, pectus *et* abdomen *nigra;* cervicis *pennae albae, ſcapis fuſco-maculatis;* dorſum *et* tectrices *alarum albae, nigro-maculatae;* remiges *primores nigrae;* cauda *alba, faſciis anguſtis nigris.*

ochropus. 13. Tr. roſtri apice punctato, pedibus virescentibus, dorſo fuſco-viridi, abdomine rectricibusque extimis albis. *Fn. ſuec.* 180. *Brünn. orn. n.* 183.

Tringa. *Gesn. av.* 501. *Aldrov. orn.* 3. *p.* 480. *t.* 481. 482. *Will. orn. p.* 222. *t.* 55. 56. *Raj. av.* 108. *Briss. av.* 6. *p.* 177. *n.* 1. *t.* 16. *f.* 1.
Tringa alia seu tertia. *Aldr. orn.* 3. *p.* 480. *t.* 483. *Will. orn.* 223. *Raj. av.* 109.
Cinclus tertius. *Aldr. orn.* 3. *p.* 490. *t.* 492. *Will. orn.* 227. *Raj. av.* 110. *Frisch.* 229.
Cinclus. *Aldr. orn.* 3. *p.* 480.
Gallinula aquatica, 8 genus. *Gesn. av.* 511.
Gallinula aquatica, species secunda de novo. *Gesn. av.* 516.
Gallinula rodopus s. phoenicopus. *Will. orn.* 223.
Ocrophus medius. *Gesn. ic.* 107. *Aldr. orn.* 3. *p.* 461. *t.* 463.
Rhodopus s. Ocropus. *Gesn. av.* 508. 511. *Aldr. orn.* 3. *p.* 456. *t.* 457.
Bécasseau ou Cul-blanc. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 534. *Pl. enl. n.* 843.
Green Sandpiper. *Brit. zool.* 2. *n.* 201. *Artt. zool.* 2. *p.* 475. *n.* 389. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 170. *n.* 12.

littorea. *β*) Tringa rostro laevi pedibusque cinereis remigibusque fuscis, rachi prima nivea. *Syst. nat.* XII. 1. *p.* 251. *n.* 17. *Fn. suec.* 185. *Brünn. orn. n.* 177. 178.
Totanus cinereus. *Briss. av.* 5. *p.* 203. *n.* 7. *t.* 17. *f.* 2.
Chalidris nigra. *Bell. av.* 208. *Aldr. orn.* 3. *p.* 432.
Chevalier varié. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 517. *Pl. enl. n.* 300.
Mr. Oldham's white Heron. *Alb. av.* 3. *t.* 89.
Shore Sandpiper. *Artt. zool.* 2. *p.* 481. F.

γ) Tringa dorso alisque cinereis: maculis obsoletis albidis.
Habitat solitaria ad Europae *et* Americae *septentrionalis* Sibiriaeque *aquas*, 10 *pollices longa*, *moschum olens*; *pariendi tempore mas et femina individui comites.*
Vertex *et* occiput *obscure cinereum*; facies *obscura*; linea *superciliaris pallens*; pennarum *dorsalium et alarium margo maculis exalbidis varius*; corpus *subtus cum rectricibus caudae album*; guttur *obscure virgatum*; rectrices *albae*, *extima utrinque excepta*, *obscure lineatae.*

Glareola. 21. Tr. rostro laevi, pedibus virescentibus, corpore fusco albo-punctato, pectore albido. *Fn. suec.* 185.
Wood Sandpiper. *Artt. zool.* 2. *p.* 482. G. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 172. *n.* 13.
Habitat in Sueciae *silvis humidis*, *sturni magnitudine.*

Dorſum *fuſcum*, *albo-guttatum*; uropygium *et* abdomen *album*; remiges *fuſcae*, *ſecundariae apice albae*; cauda *fuſco alboque faſciata*.

leucoptera. 35. Tr. nigra, ſubtus rufa, roſtro cinereo, pedibus viridibus, criſſo flavo.
White-winged Sandpiper. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 172. *n.* 14. *t.* 82.
Habitat in inſulis maris auſtralis, Tahiti *et* Eimeo, *cinclo paulo major*, $8\frac{1}{2}$ *pollices longa*.
Roſtrum *cum* pedibus *aliquando flavicans*; irides *obſcure fuſcae*; ſupercilia *pallida aut ferruginea*, *qui color nonnunquam tinctui etiam reliquo intermiſtus*; vertex *interdum obſcurus*; tectrices *alarum albae*; *frequentius majores ex ferrugineo et nigro mixtae*; uropygium *ſordide flavum*; rectrices 2 *intermediae ex atro fuſcae*, *reliquae nigro- et rufo-limeatae*.

maritima. 36. Tr. ſupra ex griſeo et nigro varia ſubtus alba; pedibus flavis, dorſi medio violaceo, gutture caudaque obſcuris. *Brünn. orn. n.* 182. *Leem. Lap. n.* 254.
Selninger Sandpiper. *Arct. zool.* 2. *p.* 480. C. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 173. *n.* 15.
Habitat in Norwegiae *et* Islandiae *maritimis*, *fiſtulans*, *ſturni magnitudine*.
Rectrices 4 *exteriores breviſſimae*, *margine albae*.

undata. 37. Tr. obſcura luteo et albo undulata, uropygio, remigum ſecundariarum et tectricum alarum apice albis, cauda cinerea apice nigra. *Brünn. orn. p.* 55. *n.* 183.
Waved Sandpiper. *Arct. zool.* 2. *p.* 481. E. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 173. *n.* 16.
Tringa ſordide flava ſubtus alba, roſtro pedibusque ex atro fuſcis. *Beſeke Schr. der berl. naturf. Geſ.* 7. *p.* 463.
Habitat in Dania *et* Norwegia.
Remigum *primorum primae ſcapus albus*.

uniformis. 38. Tr. tota dilute cinerea, roſtro brevi nigro. *Müller zool. dan. prodr. n.* 205.
Uniform Sandpiper. *Arct. zool.* 2. *p.* 482. H. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 173. *n.* 17.
Habitat in Islandia.

hypoleucos. 14. Tr. roſtri laevi, pedibus lividis, corpore cinereo lituris nigris, ſubtus albo. *Fn. ſuec.* 181. *Scop. ann.* 1. *n.* 143. *Brünn. orn. n.* 174. *Kram. el. p.* 353.

Galli-

Gallinula hypoleucos. *Gesn. av.* 509. *Aldr. orn.* 3. *p.* 469.
Motacillae genus. *Aldr. orn.* 3. *p.* 119. *t.* 123.
Motacillae seu cincli genus. *Aldr. orn.* 3. *p.* 485. *t.* 486.
Guinetta. *Briss. av.* 5. *p.* 183. *n.* 2. *t.* 16. *f.* 2.
Guignette. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 540.
Petite alouette de mer. *Buff. pl. enl. n.* 850.
Sandpiper. *Raj. av. p.* 108. *n.* 6. *Will. orn. p.* 301. *t.* 55.
Common Sandpiper. *Brit. zool.* 2. *n.* 204. *t.* 71. *Arct. zool.* 2. *p.* 474. *n.* 388. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 178. *n.* 23.

Habitat in Europa, Sibiria *ad* Camtschatcam *et mare* caspium, America *ad* Cayennam *usque*, *cincli magnitudine*, $7\frac{1}{2}$ *pollices longa*, *sibilans*, *caudam motitans*, *ova* 5 *ex flavicante exalbida*, *obscure guttata*, *pallideque maculata in foramine ripae pariens.*

Rostrum *fuscum*; irides *avellanae colore*; caput *fuscum*, *virgis nigris*; supercilia *alba*; cervix *cinerea*; dorsum *et* alae *ex virescente fusca*, *lineis multis angustis obscuris*; remiges *fuscae*, *prima exceptâ*, *intus macula alba notatae*; cauda *rotundata*, *ex viridi-nitente fusca.*

Canutus. 15. Tr. rostro laevi, pedibus cinerascentibus, remigibus primoribus serratis, rectrice extima alba immaculata. *Fn. suec.* 183. *Brünn. orn. n.* 182.

Tringa cinerea, remigibus secundariis basi albis, rectricibus quatuor mediis immaculatis. *Fn. suec.* 1. *n.* 150.
Canutus. *Briss. av.* 5. *p.* 258. *n.* 21.
Canut. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 142.
Knot. *Brit. zool.* 2. *n.* 193. *Arct. zool.* 2. *p.* 473. *n.* 384. *Raj. av. p.* 108. *n.* 5. *Will. orn. p.* 302. *t.* 56. *Edw. glean. t.* 276. *Lightf. fl. scot. p.* 34. *t.* 3. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 187. *n.* 36.

Habitat in Europa, Noveboraco, *ripa lacus* Baikal, 9 *pollices longus aut longior*, *facile pinguescens*, *carne esculenta.*

Rostrum *obscure cinereum*; irides *avellanae colore*; lora *obscura*; supercilia *et* fascia *alarum alba*; color *supra cinereus*, *subtus albus*; tectrices *alarum inferiores apice albae*; gula *et* pectus *maculis minutis*, abdomen *et* crissum *lineis obscuris varium*; uropygium *lunulis fuscis.*

australis. 39. Tr. supra cinerea, fusco maculata, subtus rufescens, abdomine et uropygio exalbidis, cauda remigibusque obscuris, rostro pedibusque nigris.

Southern Sandpiper. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 187. *n.* 35.

Habitat in Cayenna, 11 *pollices longa.*
Vertex *fusco-striatus*; uropygium *obscure lineatum*; tectrices *caudae superiores praelongae.*

Arenaria. 16. Tr. rostro pedibusque nigris, corpore griseo, subtus toto facieque albis, loris griseis.
Calidris grisea minor. *Briss. av.* 5. *p.* 236. *n.* 17. *t.* 20. *f.* 2.
Arenaria. *Will. orn.* 225. *Raj. av.* 109. *Alb. av.* 2. *p.* 48. *t.* 74.
Habitat gregaria ad Europae *et* maris Caspii *littora arenosa.*

Cinclus. 18. Tr. rostro pedibusque nigris, loris albis, cauda uropygioque griseis fuscisque. *Georg. it. p.* 172.
Cinclus. *Briss. av.* 5. *p.* 211. *n.* 10. *t.* 19. *f.* 1. *Gesn. av.* 616. *t.* 617. *Aldr. orn.* 3. *p.* 490. *t.* 491. 493. *Raj. av.* 110.
Schoeniclos seu Junco Bellonii. *Aldr. orn.* 3. *p.* 487. *t.* 489.
Alauda marina. *Bell. av.* 50.
Alouette de mer. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 548. *Pl. enlum. n.* 851.
Stint or Ox-eye. *Raj. av. p.* 110. *n.* 13. *Will. orn. p.* 305.
Least Snipe. *Raj. av. p.* 190. *n.* 11. *Sloan. jam. p.* 320. *n.* 14. *t.* 265. A.
Wagtail. *Brown jam. p.* 477.
Sanderling. *Alb. av.* 3. *t.* 88.
Purre. *Brit. zool. n.* 206. *t.* 71. *Arct. zool.* 2. *p.* 475. *n.* 390. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 182. *n.* 30.
β) Cinclus pedibus fuscis.
Cincle. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 553. *Pl. enlum. n.* 852.
Habitat gregaria ad caput bonae spei, *in* America, *insulisque vicinis*, *in* Europa, *et omni* Sibiria *ad mare* Caspium *usque*, $7\frac{1}{2}$ *pollices longa*, *carne sapida.*
Caput *et* cervix *pallide cinerea*, *striis fuscis*; dorsum *et* tectrices *alarum ex fuscescente cinereae*, *majores apice albae*; guttur *album*, *fusco intermisto*; pectus *et* abdomen *alba*; rectrices 2 *intermediae obscuriores*, *reliquae margine albae.*

ruficollis. 22. Tr. pedibus nigris, capite supra et collo ferrugineo nigroque striatis, gutture ferrugineo. *Pall. it.* 3. *p.* 700. *n.* 31.
Red-necked Purre. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 183. *n.* 31.
Habitat frequens et gregaria circa lacus salsos Daauriae *campestris*, *Cinclo aequalis et similis*, *an varietas?*

19. Tr.

Calidris. 19. Tr. roſtro pedibusque nigricantibus, corpore ſubtus olivaceo, uropygio variegato.

Calidris. *Briſſ. av.* 5. *p.* 226. *n.* 14. *t.* 20. *f.* 1.
Ruſticola ſylvatica. *Geſn. av.* 505. *t.* 504. *Aldr. orn.* 3. *p.* 476. *t.* 477.
Maubeche. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 529. *t.* 31.
Dusky Sandpiper. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 174. *n.* 18.
Habitat in Galliae *et* Germaniae *maritimis*, *ſcolopacis calidris magnitudine*, $9\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum *baſi pallidum*; color *ſupra ex fuſco alter*; rectrices *ex griſeo fuſcae*, *intermediis* 2 *exceptis margine albae.*

naevia. 40. Tr. roſtro obſcuro, pedibus vireſcentibus, corpore ſupra cinereo, rubro nigroque maculato, ſubtus ex rufeſcente albo, obſcuro badioque maculato.

Calidris naevia. *Briſſ. av.* 5. *p.* 229. *n.* 15. *t.* 21. *f.* 1.
Maubeche tachetée. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 531. *Pl. enlum. n.* 365.
Freckled Sandpiper. *Arct. zool.* 2. *p.* 480. B. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 174. *n.* 19.
Habitat in Gallia, *et ſeptentrionali* Ruſſia *ac* Sibiria, *calidri paulo minor*, 9 *pollices longa.*
Rectrices *cinereae*, *margine albae*; *extimae extus linea longitudinali alba.*

griſea. 41. Tr. roſtro pedibusque nigris, corpore ſupra griſeo, ſubtus albo, remigibus primoribus fuſcis, cauda griſea margine alba: fatcia obſcurius griſea margini parallela.

Calidris griſea. *Briſſ. av.* 5. *p.* 233. *n.* 16. *t.* 21. *f.* 2.
Maubeche griſe. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 531. *Pl. enl. n.* 366.
Grisled Sandpiper. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 175. *n.* 20.
Habitat in Europae *maritimis*, *naeviae magnitudine*, $9\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Uropygii *pennae pallide griſeae*, *margine albo*, *faſcia duplici fuſca margini parallela.*

puſilla. 20. Tr. roſtro pedibusque fuſcis, corpore ſubtus rufeſcente, rectricibus extimis ſcapo albo, uropygio variegato.

Cinclus dominicenſis minor. *Briſſ. av.* 5. *p.* 222. *n.* 13. *t.* 25. *f.* 2.
Little Sandpiper. *Brit. zool.* 2. *n.* 207. *Gener. of birds p.* 65. *t.* 12. *Arct. zool. p.* 479. *n.* 397. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 184. *n.* 32.

Habitat in insula S. Dominici, *sinu* Americae Natka, *et* Europa *boreali*, *rarius in* Anglia, $5\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

Rostrum *apice nigrum*; caput *pennaeque* corporis *superiores fuscae*, *margine nigrae et dilutius ferrugineae*; tectrices *alarum majores* remigesque *fuscae*, *apice albae*; cauda *obscura*; pectus *et* abdomen *alba.*

Squataro-la. 23. Tr. rostro nigro, pedibus virescentibus, corpore griseo subtus albido. *Fn. suec.* 186. *Scop. ann.* I. *n.* 144. *Brünn. orn. n.* 176. *Georg. it. p.* 172.
Vanellus griseus. *Briss. av.* 5. *p.* 100. *n.* 2. *t.* 9. *f.* 1.
Pluvialis cinerea. *Bell. av.* 62. *Aldr. orn.* 3. *p.* 533. *t.* 534.
Pardalus. *Gesn. av.* 639.
Vanneau pluvier. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 68.
Vanneau gris. *Buff. pl. enl. n.* 854.
Grey Plover. *Raj. av. p.* 111. *n.* 3. *Will. orn. p.* 309. *t.* 57. *Brown Jam. p.* 478. *Albin. av.* 1. *t.* 76.
Grey Sandpiper. *Brit. zool. n.* 191. *Arct. zool.* 2. *p.* 477. *n.* 393. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 168. *n.* 11.

varia. *β*) Tr. rostro pedibusque nigris, corpore fusco albo-variegato, abdomine albo, rectricibus albis fusco-fasciatis. *Syst. nat.* XII. 1. *p.* 252. *n.* 21.
Vanellus varius. *Briss. av.* 5. *p.* 103. *n.* 3. *t.* 9. *f.* 2.
Pardali Bellonii congener. *Aldr. orn.* 3. *p.* 530.
Vanneau varié. *Buff. pl. enl. n.* 923.
Habitat in Europae, Carolinae, Sibiriae *maritimis, ad mare* Caspium *quoque*, *gregaria*, *charadrii pluvialis magnitudine*, *septem pollices longa.*
Caput, dorsum, tectricesque *alarum nigrae*, *margine ex virescente cinereae*; genae gulaque *maculis oblongis obscuris variae*, *et cum* abdomine *et* uropygio *albae*; cauda *albo nigroque fasciata.*

islandica. 24. Tr. rostro pedibusque fuscis, corpore subtus ferrugineo, remigibus secundariis margine albis.
Tringa ferruginea. *Brünn. orn. n.* 180.
Aberdeen Sandpiper. *Brit. zool.* 2. *n.* 203.
Red Sandpiper. *Brit. zool.* 2. *n.* 202. *t.* 72. *Arct. zool.* 2. *p.* 476. *n.* 392. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 186. *n.* 34.
Habitat in Islandiae, *magnae* Britanniae, *septentrionalis* Americae *maritimis*, *turturis magnitudine*, 8-10 *pollices longa.*
Corpus *e nigro et ferrugineo confertim maculatum*, *subtus totum ex rufo ferrugineum*; tectrices *alarum margine exteriore*

teriore albae; uropygium *et* criſſum *albidum*, *illud nigro undulatum*, *hoc ſtriis aliquot nigris*; remiges *omnes nigrae rachi alba*; rectrices *cinereae*, *rachi alba*.

88. CHARADRIUS. *Roſtrum* teretiuſculum, obtuſum.

Nares lineares.

Pedes curſorii, tridactyli.

Hiaticula. 1. Ch. pectore nigro, fronte nigricante faſciola alba, vertice fuſco, pedibus luteis. *Fn. ſuec.* 187. *Scop. ann.* I. *n.* 147. *Brünn. orn. n.* 184. *Kram. el. p.* 354. *n.* 2. *Georg. it. p.* 172. *Fabr. Fn. groenl. n.* 78. *Friſch av. t.* 214.
Charadrios ſ. Hiaticula. *Aldr. orn.* 3. *p.* 536. *t.* 537. *Jonſt. av.* 166. *t.* 53.
Pluvialis torquata minor. *Briſſ. av.* 5. *p.* 63. *n.* 8. *t.* 5. *f.* 2.
Matuitui. *Margr. braſ.* 199.
Pluvier à collier. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 90. *t.* 6.
Petit pluvier à collier. *Buff. pl. enlum. n.* 921.
Sea lark. *Raj. av. p.* 112. *n.* 6. *p.* 190. *n.* 13. *Will. orn. p.* 310. *t.* 57. *Sloan. jam. p.* 319. *n.* 13. *t.* 269. *f.* 2. *Albin. av.* I. *t.* 80.
Ringed Plover. *Brit. zool.* 2. *n.* 211. *Arct. zool.* 2. *p.* 401. *n.* 485. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 201. *n.* 8.
β) Charadrius dorſo et abdomine cinereis.
Habitat ſolitaria in America, Europa, *ad mare* Caſpium, *β*) *in* Cayenna *et inſula* Owhyhée, 6-7 *pollices longus*, *ad ripas curſitans velociter*; *ova* 4, 1½ *pollices longa dilute cinerea nigroque maculata in terra pariens.*
Roſtrum *fulvum*, *altera parte verſus apicem nigrum*; irides *avellanae colore*; faſcia *ocularis nigra*; mentum, gula, pectus *et* abdomen *alba*; torques *niger*; dorſum *et* tectrices *alarum fuſceſcentes*; remiges *obſcurae*; rectrices 6, 6 *ex griſeo fuſcae*, *verſus apicem nigricantes*; 5, 4, 3 *apice ipſo albae*, 2, 2 *totae albae*, *faſcia fuſca*, 1, 1 *albae*, *macula fuſca*; pedes *fulvi*; ungues *nigri.*

alexandrinus. 2. Ch. fuſcus, fronte, collarique dorſali et abdomine albis, rectricibus lateralibus utrinque candidis, pedibus nigris.
Charadrius alexandrinus. *Huſſelq. it. p.* 255. *n.* 30.
Charadrius griſeus, fronte, linea ſuperciliari, collari dorſali abdomineque albis, rectricibus lateralibus utrinque candi-

candidis, pedibus fuſco-caeruleſcentibus. *Brünn. orn. app. p.* 77.
Pluvialis torquata. *Briſſ. av.* 5. *p.* 60. *n.* 7. *t.* 5. *f.* 1.

aegyptius. β) Charadrius faſcia pectorali nigra, ſuperciliis albis, rectricibus apice albis, faſcia nigra, pedibus caeruleis. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 254. *n.* 4. *Haſſelq. it. p.* 256. *n.* 31.

erythropus. γ) Charadrius vertice nigro, pedibus rubris.

δ) Petit pluvier à collier de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p.* 84. *t.* 46.

Habitat ad Aegypti *ex* Nilo *canalem*, *in* Aegypti *apricis*, *in* Norwegia *et* Ruſſia, *et ad lacus ſalſos*, *inter fluvios* Argun *et* Onon *intermedios*, γ) *ad* caput bonae ſpei, δ) *in inſula* Luçon, *alaudae magnitudine*, *inſectis victitans.*
Roſtrum *nigrum*; vertex, dorſum *et* alae *fuſca*; torques *et* abdomen *alba*; remiges *ex nigricante cinereae*, *ſecundariae et* tectrices *alarum majores apice albae*; cauda *rotundata*; rectrices 6, 5 *obſcure fuſcae*; 4, 3 *exalbidae*, *apice fuſcae.*

novae Seelandiae. 4. Ch. ſubtus albus, roſtro, palpebris, pedibusque rubris, facie, mento, gula et torque nigris, arcu a vertice ad nucham et area alarum albis, occipite et reliquo corpore ſupra ex virescente cinereis.
New zealand Plover. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 206. *n.* 10. *t.* 83.
Habitat in nova Seelandia, *hiaticula paulo major*, *et* 8 *pollices longa.*
Roſtrum *apice nigrum*; irides *glaucae*; remiges rectrices*que obſcurae.*

gregarius. 8. Ch. cinereus, vertice fuſco albido-variegato, fronte, gula, uropygio, criſſo, remigibus ſecundariis, rectricibusque aequalibus albis, loris nigris, pectoris arcu atro, poſtice ex rufo teſtaceo. *Pall. it.* 1. *p.* 456. *n.* 9.
Gregarious Plover. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 206. *n.* 11.
Habitat copioſe in campeſtribus ad fluvios Volga, Ural *et* Samara, *vanelli magnitudine*, *cui quoque habitu*, *roſtro*, *pedibus ſubtetradactylis affinis.*
Remiges *primariae atrae*; rectricibus *mediis area magna*, *transverſa*, *atra.*

aſiaticus. 13. Ch. ſupra fuſcus, ſubtus albus, jugulo ferrugineo, faſcia pectorali transverſa fuſca, roſtro pedibusque fulvis, cauda rotundata margine albida. *Pall. it.* 2. *p.* 715. *n.* 32.

Aſiatic

Asiatic Plover. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 207. *n.* 12.
Habitat rarior et solitarius ad lacus salsos deserti Tatarici *australioris, hiaticula major.*
Frons, supercilia, *et* tempora *alba.*

mongolus. 14. Ch. fronte ad rostrum alba hinc nigra, gula, torque et abdomine niveis, jugulo et pectore ferrugineis, dorso ex cinereo fuscescente. *Pall. it.* 3. *p.* 700. *n.* 29.
Mongolian Plover. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 207. *n.* 13.
Habitat solitarius circa lacus salsos versus Mongoliae *fines non infrequens, morinelli magnitudine et forma.*

vociferus. 3. Ch. fasciis pectoris, colli, frontis genarumque nigris, cauda lutea fascia nigra, pedibus flavis.
Pluvialis virginiana torquata. *Briss. av.* 5. *p.* 68. *n.* 9.
Kildir. *Buff. hist. nat. desois.* 8. *p.* 96.
Chattering Plover or Killdeer. *Catesb. Carol.* 1. *t.* 71.
Noisy Plover. *Arct. zool.* 2. *p.* 484. *n.* 400. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 199. *n.* 6.

torquatus. *β)* Ch. pectore nigro-variegato, fronte alba, vertice collarique nigro, rostro pedibusque caerulescentibus. *Syst. nat.* XII. 1. *p.* 255. *n.* 8.
Pluvialis dominicensis torquata. *Briss. av.* 5. *p.* 70. *n.* 10. *t.* 6. *f.* 2.
Pluvier à collier de S. Domingue. *Buff. pl. enl. n.* 286.
Habitat in America, *gallinaginis magnitudine,* $9\frac{3}{4}$ *pollices longus, inquietus et clamosus, vere in* Noveboracum *migrans, ova* 3-4 *pariens.*
Corpus *supra fuscum, subtus album*; rostrum, oculi, remigesque *majores nigrae*; palpebrae *rubrae*; frons *alba*; uropygii *pennae praelongae ex ferrugineo fulvae*; cauda *rotundata, apice alba.*

jamaicensis. 15. Ch. supra fuscus, subtus albus, pectore ex nigro et albo, cauda ex albido, rufo et nigricante varia, rostro nigro, torque pedibusque albis.
Pluvialis jamaicensis torquata. *Briss. av.* 5. *p.* 75. *n.* 11.
Larger grey Snipe with a withe neck. *Brown jam. p.* 477.
Greatest Snipe. *Raj. av. p.* 190. *n.* 10. *Sloan. jam. p.* 318. *t.* 265. *f.* 3.
Habitat in Jamaica, *ad ripas fluviorum, vocifero paulo minor,* 8 *pollices longus.*
Irides *aurantiae*; *articuli* pedum *obscuri*; ungues *nigri.*

5. Ch.

Morinellus. 5. Ch. pectore ferrugineo, fascia superciliorum pectorisque linea alba, pedibus nigris. *Fn. suec.* 188. *Brünn. orn. n.* 185.

Charadrius pectore ferrugineo linea alba transversa collum pectusque distinguente. *Fn. suec.* 1. *n.* 158.

Pluvialis minor s. Morinellus. *Briss. av.* 5. *p.* 54. *n.* 5. *t.* 4. *f.* 2.

Morinellus. *Gesn. av.* 615. *Aldrov. orn.* 3. *p.* 540.

Petit pluvier ou Guignard. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 87. *Pl. enlum. n.* 832.

Dotterel. *Brit. zool. n.* 210. *t.* 73. *Arct. zool.* 2. *p.* 487. A. *Raj. av. p.* 111. *n.* 4. *Will. orn. p.* 309. *t.* 55. 57. *Albin. av.* 2. *t.* 62. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 208. *n.* 14.

b) Charadrius pectore cinereo, abdomine rufescente, vertice fusco. *Fn. suec.* 1. *n.* 160. (*Femina*).

β) Morinellus anglicanus. *Briss. av.* 5. *p.* 58. *n.* 6.
Dottrel. *Albin. av.* 2. *t.* 63.

γ) Charadrius tataricus. *Pallas it.* 2. *p.* 715. *n.* 32. *

Habitat, *gregatim migrans*, *in* Europa septentrionali *et* Sibiria, γ) *ad lacus salsos desertorum* Tatariae *australium*, 9-10 *pollices longus*, *stupidus*, *carne sapida*.

Rostrum *nigrum*; frons *ex obscuro et griseo mista*; occiput *nigrum*; tempora *et* gula *alba*; cervix, dorsum *et* alae *ex griseo fusca*; jugulum *ex cinereo olivaceum*, *linea nigra terminatum*; abdomen *medium nigrum*, *inferius ex rufo album*; remiges *majores fuscae*, *nonnullae margine albae*; cauda *ex olivaceo fusca*, *fascia prope apicem obscura*, *apice ipso alba*. Femina *paulo major*.

atricapillus. 16. Ch. supra ex cinereo fuscus, subtus albus, rostro pedibusque rubris, vertice nigro circulo albo cincto, collo et pectore cinereis, stria transversa obscura terminatis.

Black crowned Plover. *Arct. zool.* 2. *p.* 485. *n.* 402. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 210. *n.* 15.

Habitat in Noveboraco, *morinelli habitu*, 10 *pollices longa*. Frons *nigra*; rostrum *apice nigrum*; remiges *primores obscurae*, *basin versus albae*; cauda *basi alba*, *versus apicem nigra*, *apice ipso alba*; digiti *brevissimi*.

obscurus. 17. Ch. obscurus subtus ochraceus, rostro nigro, pedibus caerulescentibus, fronte ex rubescente alba, collo striis obscuris, et ad latera lineis angustis transversis vario.

Dusky Plover. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 211. *n.* 16.

Habitat

Habitat in nova Seelandia, *gallinagine major.*
Mentum *et* gula *obſcure alba*; remiges *obſcurae*; ungues *nigri.*

fulvus. 18. Ch. ſupra niger, pennis margine fulvis, ſubtus exalbidus nigro-maculatus, roſtro obſcuro, pedibus glaucis, pectore fulvo nigro-maculato.
Fulvous Plover. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 211. *n.* 17.
β) Charadrius ſupra fuſcus, ſubtus albus.
Habitat in Tahiti *maritimis et uliginoſis, vanelli magnitudine,* 10½, β) 8 *pollices longus.*
Irides *ex glauco nigrae*; frons *et* gula *obſcure alba*; tectrices *alarum nigrae fulvo-maculatae, inferiores ex fuſco nigrae, apice albae*; remiges *ex fuſceſcente nigrae, ſcapis albis*; cauda *ejusdem coloris, faſciis albicantibus*; ungues *nigri, obtuſi.* Forſter.

leucogaſter. 19. Ch. fuſcus ſubtus albus, pedibus glauceſcentibus, fronte, lineaque ſupra- et infra-oculari albis.
White bellied Plover. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 212. *n.* 18.
Longitudo 6 *pollicum*; remiges *ſecundariae nonnullae a baſi ad medium usque albae*; rectrices 6, 5, 4 *fuſcae*; 4, 4 *baſi et apice albae*; 3, 2, 1 *albae*; 2, 2 *extrinſecus prope apicem macula fuſca*; 1 *apice nigra.*

rubricollis. 20. Ch. ſupra cinereus, ſubtus albus, roſtro pedibusque incarnatis, cauda remigibusque obſcuris, capite colloque nigris, macula utrinque ad collum magna quadrata badia.
Red necked Plover. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 212. *n.* 19.
Habitat in terra van Diemen, *tringae cinclo magnitudine.*
Roſtrum *apice nigrum*; irides *aurantiae*; alis *ſpuriis candor intermiſtus.*

apricarius. 6. Ch. gula abdomineque nigro, corpore fuſco, albo, luteoque punctato, pedibus cinereis. *Fn. ſuec.* 189. *Brünn. orn. n.* 186. *Fabr. fn. groenl. n.* 79. *Georg. it. p.* 172.
Charadrius nigro-lutescente variegatus, pectore nigro. *It. oel.* 72. *Fn. ſuec.* 1. *n.* 156.
Pluvialis aurea freti Hudſonis. *Briſſ. av.* 5. *p.* 51. *n.* 4.
Pluvier doré à gorge noire. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 85.
Spotted Plover. *Edw. av. t.* 140. *Bancr. Guj. p.* 173.
Alwargrim Plover. *Act. zool.* 2. *p.* 483. *n.* 398. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 198. *n.* 5.

Habitat

Habitat ad ſeptentrionalis Europae, Americae, Sibiriae *lacus, gregatim verſus auſtrum migrans, ut in ipſa* Gujana *viſus ſit, pluvialis magnitudine, molluſcis, et empetri nigri baccis victitans; caro delicioſa.*

Color *generalis niger*; oculi *magni*; irides *fuſcae*; tempora *nigra* (*feminae fuſca*); frons, ſupercilia, palpebra *inferior*, hypochondria *et* criſſum *alba*; corpus *ſupra maculis aurantiis varium*; remiges *et* cauda *fuſco et nigro faſciatae.*

Pluvialis. 7. Ch. corpore nigro viridique maculato, ſubtus albido, pedibus cinereis. *Fn. ſuec.* 190.

Pluvialis viridis. *Marſ. Danub.* 5. *t.* 25.

Pluvialis aurea. *Briſſ. av.* 5. *p.* 43. *n.* 1. *t.* 4. *f.* 1.

Pluvialis. *Geſn. av.* 714. *Aldr. orn.* 3. *p.* 528. *t.* 531.

Pluvier doré. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 81. *t.* 5. *Pl. enl. n.* 904.

Green Plover. *Raj. av. p.* 111. *n.* 2. *p.* 190. *n.* 9. *Will. orn. p.* 308. *t.* 57. *Sloan. jam. p.* 318. *n.* 10. *t.* 269. *f.* 1. *Alb. av.* 1. *t.* 75.

Golden Plover. *Brit. zool. n.* 208. *t.* 72. *Arct. zool.* 2. *p.* 483. *n.* 399. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 193. *n.* 1.

β) Pluvialis aurea minor. *Briſſ. av.* 5. *p.* 47. *n.* 2.

γ) Pluvialis dominicenſis aurea. *Briſſ. av.* 5. *p.* 48. *n.* 3. *t.* 6. *f.* 1.

Habitat in omni Europa, *in* America *a terra* Labrador *ad* Cayennam *et inſulis alluentis* Oceani, *ad mare* Caſpium, *in* Syria, Sina, *in inſulis* Batavia, Tonga-Tabu, Owhyhee, *et* York, *γ*) *in inſula* S. Dominici, 10½ *pollices longus, aliquando minor, ſibilans,* 4 *pariens ova,* 2⅛ *pollices longa, acutiora, quam vanelli, ex pallido cinereo olivacea, maculis nigri[illegible] varia.*

Roſtrum *obſcurum*; iri[illegible]*brae*; orbitae *cum* mento *fere albae*; tempora, collum *et* hypochondria *obſcura, maculis ex vireſcente flavis varia*; abdomen *medio exalbidum, aliis totum nigrum, aut ex nigro et albo varium*, remiges *majores obſcurae*; cauda *obſcuro et flavo faſciata*; pedes *interdum ungue poſteriori muniti.*

rubidus. 21. Ch. ruber, nigro-maculatus et albo conſperſus, roſtro pedibusque nigris, rectricibus 2 intermediis fuſcis margine ferrugineis, reliquis exalbidis.

Ruddy Plover. *Arct. zool.* 2. *p.* 486. *n.* 404. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 195. *n.* 2.

Habitat

Habitat in ſinu Hudſonis.
Remiges 4 *primae extus fuſcae, intus albae, apice fuſcae, reliquae ſupra albae, ſubtus fuſcae.*

Calidris. 9. Ch. roſtro pedibusque nigris, loris uropygioque ſubgriſeis, corpore ſubtus albo immaculato. *Georg. it. p.* 172.
Calidris griſea minor. *Briſſ. av.* 5. *p.* 236. *n.* 17. *t.* 20. *f.* 2.
Sanderling or Curwillet. *Brit. zool.. n.* 212. *t.* 73. *Arct. zool.* 2. *p.* 486. *n.* 403. *Raj. av. p.* 109. *n.* 11. *Will. orn. p.* 303 *Alb. av.* 2. *t.* 74. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 532. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 197. *n.* 4.
β) Charadrius fronte et corpore ſubtus ex cinereo albis.
Habitat gregatim in Angliae *maritimis, ad lacum* Bajkal, *mare* Caſpium, *frequentior in* America *ſeptentrionali*, *β*) *in inſula* novae terrae, 8 *pollices longus, gracilis.*
Frons *et* genae *albae*; faſcia *ocularis griſea*; caput, cervix *et* corpus *ſupra nigro-ſtriatum*; *pennae* dorſi *et* ſcapulares *ex fuſceſcente griſeae, margine exalbidae*; tectrices *alarum*, remiges*que obſcurae*; cauda *cinerea, margine pallidior.*

Oedicnemus. 10. Ch. griſeus, remigibus primoribus duabus nigris medio albis, roſtro acuto, pedibus cinereis.
Oedicnemus. *Bell. av.* 51. *Aldr. orn.* 2. *p.* 98. *t.* 99. 100.
Fedoa tertia. *Will. orn.* 216. *Raj. av.* 105.
Charadrius. *Geſn. av.* 256.
Pluvialis major, oedicnemus vulgo dicta. *Briſſ. av.* 5. *p.* 77. *n.* 12. *t.* 7. *f.* 1.
Grand Pluvier, appelé ordinairement Courlis de terre. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 105. *t.* 7. *Pl. enl. n.* 919.
Stone Curlew. *Raj. av. p.* 105. *n.* 6. *p.* 108. *n.* 4. *Will. orn. p.* 306. *t.* 58. 77. *Alb. av.* 1. *t.* 69.
Thikkneed Buſtard. *Brit. zool.* 1. *n.* 100. *Lath. ſyn.* III. 2. *p.* 806. *n.* 9.
β) Charadrius Kervari. *Haſſelq. it.* 210. *n.* 32.
γ) Charadrius Scolopax. *S. G. Gmelin it.* 3. *p.* 88. *t.* 16.
Habitat in Europae, Africae *et* Orientis *campeſtribus, ad mare* caſpium, *in deſerto* Sibiriae Uralenſi, Perſia *boreali frequens, aliquando migrans, vermibus, muribus, larvis, teſtudinibus, et muſcis victitans, voce ſtrepente, volatu mediocri, ova* 2-3 *cinerea maculis olivaceis pariens.*
Roſtrum *nigrum*; palpebra *inferior nuda luteola*; lineola *ſupra infraque oculos flava*; linea *a roſtro ſub oculis ad aures fuſca.*

22. Ch.

sibiricus. 22. Ch. fronte ex albo et nigro varia, vertice nigricante fasciato, pectore fusco fascia alba terminato, abdomine ferrugineo. *Lepechin it.* 2. *t.* 6.
Habitat in Sibiria.

Himantopus. 11. Ch. albus, dorso nigro, rostro nigro capite longiore, pedibus rubris longissimis. *Scop. ann.* 1. *n.* 148. *S. G. Gmelin it.* 1. *t.* 32.
Charadrius autumnalis. *Hasselq. it.* 253. *n.* 29.
Himantopus. *Sibb. Scot.* 18. *t.* 11. 13. *Raj. av. p.* 106. *n.* 9. *p.* 193. *t.* 1. *f.* 1. *Will. orn. p.* 297. *t.* 54. *Aldr. orn.* 3. *p.* 443. *t.* 445. 446. *Gesn. av.* 547. *Bell. av.* 53. *Marsh. Danub.* 5. *p.* 46. *t.* 21. *Briss. av.* 5. *p.* 33. *n.* 1. *t.* 3! *f.* 1.
Echasse. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 114. *t.* 8. *Pl. enl. n.* 878.
Long legs. *Raj. av. p.* 190. *n.* 7. *Sloan. jam.* 2. *p.* 316. *n.* 6. *t.* 267.
Long-legged Plover. *Brit. zool.* 2. *n.* 209. *Artt. zool.* 2. *p.* 487. *n.* 405. *Lightf. flor. scot.* 1. *p.* 35. *t.* 4. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 195. *n.* 3.
Habitat in Aegypti, Europae, *rarius septentrionalis*, Americae *a* Connecticut *ad* Jamaicam *usque*, Sinae, Indiae, Tatariae *uliginosis*, *aquosis*, *maritimis*, *frequens ad* Tanain, *mare* Caspium, *lacus salsos* Tatariae, *migrans*, *nunc is victitans*, *propter pedes longissimos* $1\frac{1}{2}$ *pedem fere longus.*
Rostrum *gracile*, *apice crassius*; irides *rubrae*; frons, orbitae, uropygium, cauda *et* corpus *subtus alba*; vertex, dorsum *et* alae *nitenti-nigrae*; cervix *maculis obscuris varia.*

spinosus. 12. Ch. remigibus, pectore pedibusque atris, occipite cristato, rectricibus dimidiato-albis, alulis spinosis. *Hasselq. it. p.* 260. 261.
Pluvialis senegalensis armata. *Briss. av.* 5. *p.* 86. *n.* 15. *t.* 7. *f.* 2.
Pluvier à aigrette. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 99.
Pluvier, armé du Sénégal. *Buff. pl. enl. n.* 801.
Spur-winged Plover. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 213. *n.* 20.
β) Pluvialis persica cristata. *Briss. av.* 5. *p.* 84. *n.* 14.
Pluvier huppé de Perse. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 98.
Black breasted indian Plover et (*fem.*) Spurwinged Plover. *Edw. av. t.* 47. *et glean. t.* 280.
Lapwing. *Russel Alepp.* 72. *t.* 11.

γ) Plu-

γ) Pluvier armé de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 102. *Pl. enl. n.* 833.

Habitat in inferioris Aegypti *et terrae* Senegal *uliginoſis*, β) *in* Ruſſia, Perſia, Syria, γ) *in* Cayenna, *pluvialis magnitudine*, *ad* 12 *pollices usque longus.*

Roſtrum, vertex, gula, pectoris lunula, tectrices *alarum minores*, ſpina *alularum*, caudae*que apex nigra*; cervix, humeri, tectrices *alarum mediae* corpus*que ſupra griſea*; tempora, corpus *ſubtus*, tectrices *alarum majores et* cauda *ochroleuca.*

pileatus. 23. Ch. roſtro pedibusque rubris, facie nuda flava carunculata, capite collique parte nigra, occipite ſubcriſtato ſubtus albo, corpore ſupra ex rufo griſeo, ſubtus albo.

Pluvier coiffé. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 100.
Pluvier du Sénégal. *Buff. pl. enl. n.* 834.
Hooded Plover. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 215. *n.* 21.

Habitat in Senegal, 10½ *pollices longus.*

Roſtrum *baſi flavum*, *apice nigrum*; criſta *brevis*, *acuminata*; jugulum *parumper maculatum*; remiges caudae*que brevis apex nigra.*

coronatus. 24. Ch. roſtro rubeſcente, pedibus ferrugineis, capite nigro, verticis circulo, abdomine, tectricibus alarum majoribus, caudaque nigro-faſciata albis, gutture griſeo, cervice dorſoque nitente-fuſcis.

Pluvier couronné. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 101.
Pluvier du cap de bonne eſperance. *Buff. pl. enl. n.* 800.
Wreathed Plover. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 216. *n.* 22.

Habitat ad caput bonae ſpei, 12 *pollices longus.*

Roſtrum *apicem verſus obſcurum*; pectus *fuſcum*, *nitore ex vireſcente purpureo*, *nigro-maculatum*; remiges *nigrae.*

bilobus. 25. Ch. roſtro pedibusque flavis, frontis cute nuda utrinque lobi inſtar pendula, corpore ſupra ex flavicante griſeo, ſubtus albo.

Pluvier à lambeaux. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 102.
Pluvier de la côte de Malabar. *Buff. pl. enlum. n.* 880.
Wattled Plover. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 216. *n.* 23.

Habitat in Malabar, *pluvialis magnitudine*, 9½ *pollices longus.*

Vertex, faſcia caudae *et* remiges *nigrae*; faſcia *ocularis*, tectricum*que alarum majorum et* rectricum *quarundam apex alba.*

melano-cephalus. 26. Ch. roſtro, capite, unguibus, cervice, dorſoque nigris, corpore ſubtus rufeſcente, alis, uropygio, cauda pedibusque cinereis, fronte flavicante.
Pluvian. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 104. *Pl. enl. n.* 918.
Black-headed Plover. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 217. *n.* 24.
Longitudo 7 *pollicum*; remiges *extus albo-*, rectrices, 2 *intermediis exceptis*, *prope apicem nigro-maculatae*, *apice albae*; pectus *lituris transverſis obſcuris.*

gallicus. 27. Ch. rufeſcens, pedibus ochroleucis, remigibus et litura pone oculos per mediam ſtriam pallidam bipartita nigris.
Coure-vîte. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 128. *Pl. enl. n.* 795.
Creamicoloured Plover. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 217. *n.* 25.
Habitat in Gallia, *velociſſime currens*, 10 *pollices longus.*
Roſtrum *gracile*, *apice pauliſper curvatum*; cauda *rufeſcens*, *prope apicem nigro-maculata.*

coromandelicus. 28. Ch. pedibus ochroleucis, vertice et gutture ſpadiceis, mento albido, corpore ſupra fuſco, ſubtus obſcuro, remigibus faſciaque oculari nigris, uropygio caudaeque apice albis.
Coure-vîte de Coromandel. *Buff. pl. enl. n.* 892.
Coromandel Plover. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 217. *n.* 26.
Habitat in Coromandel, *gallici magnitudine et roſtro.*
Pone oculos *faſcia alba.*

curonicus. 29. Ch. albus, roſtro nigricante, cervicis faſcia et lunula frontis nigra, verticis pileo cinereo, faſcia oculari nigricante-undulata, dorſo, alis caudaque cinereis, pedibus rubeſcentibus. *Beſeke Sch. der berl. naturf. Geſ.* 7. *p.* 463.
Habitat in Curonia.
Orbitae *citrinae.*

naevius. 30. Ch. ſupra ex cinereo, nigro alboque varius ſubtus albus, faſcia infraoculari nigro-punctata, roſtro pedibusque nigricantibus. *Beſeke Schr. der berl. naturf. Geſ.* 7. *p.* 464.

89. RECURVIROSTRA.

Roſtrum depreſſo-planum, ſubulatum, recurvatum, acuminatum: apice flexili.

Pedes palmati tetradactyli; digito poſtico breviſſimo altiſſime poſito.

Nares anguſtae, perviae.

Lingua brevis.

Avocetta. 1. R. albo nigroque varia. *Fn. ſuec.* 191. *Amoen. ac.* 4. *p.* 591. *Scop. ann.* 1. *n.* 129. *Brünn. orn. n.* 188. *Kram. elench. p.* 348. *Georg. it. p.* 172.

Avoſetta ſ. Recurviroſtra. *Geſn. av.* 231. *t.* 232. *Aldr. orn.* 3. *p.* 288. *t.* 287. *Will. orn.* 321. *t.* 60. *Raj. av. p.* 117. *n.* 1. *Marſ. danub.* 5. *p.* 72. *t.* 34. *Alb. av.* 1. *p.* 96. *t.* 101. *Nozem. nederl. Vogel t.* 36.

Scooping Avoſetta. *Brit. zool.* 2. *n.* 228. *t.* 80. *Arct. zool.* 2. *p.* 503. B. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 293. *n.* 1.

Avocette. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 466. *t.* 38. *Pl. enl. n.* 353.

Habitat in Europae, *potiſſimum auſtralioris maritimis*, Belgio *tamen*, Anglia, *ipſa* Scandinavia *et* Ruſſia *non rara*, *in* Sibiria *quoque*, *ad lacus ſalſos*, *ad flumen* Krymſzcam *et ad mare* Caſpium *obvia*, *vanelli magnitudine*, *ſed altior*, *et* 18 *pollices longa*, *vermibus et inſectis*, *praeſertim cancro pulice et locuſta victitans*, *quae roſtro ex limo extrahit*; 2 *ova pariens*, *columbinis aequalia*, *cinerea*, *maculis ex fuſceſcente nigris notata*, *pictonibus delicioſa.*

Roſtrum $3\frac{1}{2}$ *pollices longum*; irides *avellanae colore*; vertex *niger*, *macula pone et infra oculos alba*; *reliquum* caput, collum, dorſum, alarum *pars exterior*, remiges *minores*, cauda *et* corpus *ſubtus alba*; *pennae* ſcapulares *internae*, *et* remiges *majores extus et apice nigrae*; pedes *longiſſimi*, *caeruleſcentes*; membrana, *digitos connectens*, *denticulata.*

americana. 2. R. capite colloque rufeſcente, dorſo nigro, corpore ſubtus albo.

Avoſetta. *Dampier it.* 3. *tab. p.* 123. *f.* 3.

American Avoſet. *Arct. zool.* 2. *p.* 502. *n.* 421. *t.* 21: *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 295. *n.* 2. *t.* 92.

Habitat in America *ſeptentrionali et* nova Hollandia, *Avocetta major et longior*, 14 *pollices alta.*

Roſtrum *nigrum*; frons *obſcure alba*; cervix *alba*; remiges *majores*, tectrices *alarum primores et tertii ordinis nigrae*, *mediae cum remigibus ſecundariis nonnullis albae*; pedes *ultra* 8 *pollices longi*, *obſcuri.*

alba. 3. R. tota alba, tectricibus alarum inferioribus fuſceſcentibus, roſtro aurantio, pedibus fuſcis.

Scolopax (alba) roſtro ſubadſcendente aurantio, corpore albo, remigibus rectricibusque flavicantibus, pedibus fuſcis fiſſis. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 247. *n.* 17.

Limoſa candida. *Briſſ. av.* 5. *p.* 290. *n.* 8.

Barge blanche. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 508. *Pl. enl. n.* 875.

White Godwit. *Edw. av. t.* 139.

White Avoſet. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 296. *n.* 3.

Habitat ad ſinum Hudſonis, *lapponicae magnitudine*, 14¼ *pollices longa*, *an varietas americanae?*

Roſtrum *ultra* 3 *pollices longum*, *apice nigrum*; *margo* alarum, remiges *majores*, *et* cauda *tinctu flavicante.*

90. HAEMATOPUS.

Roſtrum compreſſum: apice cuneo aequali.

Nares lineares.

Lingua tertia parte roſtro brevior.

Pedes curſorii, tridactyli, fiſſi.

Oſtralegus. 1. Haematopus. *It. oel.* 83. *Fn. ſuec.* 192. *Bell. av.* 18. *Geſn. av.* 546. *Aldr. orn.* 3. *p.* 447. *Nozem. nederl. Vogel t.* 27. *Brünn. orn. n.* 189.

Scolopax Pica. *Scop. ann.* 1. *n.* 135.

Oſtralega Pica marina. *Briſſ. av.* 5. *p.* 38. *n.* 1. *t.* 3. *f.* 2.

Huîtrier. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 119. *t.* 9. *Pl. enl. n.* 929.

Seapie. *Raj. av. p.* 105. *n.* 7. *Will. orn. p.* 297. *Alb. av.* 1. *t.* 78. *Hayes brit. birds t.* 12.

Bied

Pied Oiſtercatcher. *Brit. zool.* 2. *p.* 213. *Arct. zool.* 2. *p.* 489. *n.* 406. *Catesb. carol.* 1. *t.* 85. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 219. *n.* 1. *t.* 84.

Habitat in Europae, Americae, *et vicinarum inſularum a* Noveboraco *ad* Cayennam, novae Hollandiae *et* Seelandiae, terrae ignis *et* van Diemen, Japoniae *maritimis, ad mare* Caſpium, *ad* Volgam, *cornicis magnitudine,* 16¼ *pollices longa, teſtaceis, potiſſimum oſtreis, aliisque vermibus marinis victitans, ubi videt venatorem hoſtemve, clamitando anſeribus indicare et fugam ſuadere fertur; ſerior praecociorve a migratione reditus ejusmodi ver indicat; junior avis facile cicuratur; femina in terra nuda littoris parit ova* 4-5 *ex viresçente griſea lituris nigris.*

Roſtrum, pedesque *rubri, illud aliquando parte dimidia nigrum;* irides *ruberrimae; reliqua avis interdum tota nigra; frequentius* caput, collum, corpusque *ſupra nigrum, ſubtus album; ſub* palpebra *utplurimum macula exigua, in* pectore *lunula alba;* tectrices *alarum mediae apice, majores totae albae;* remiges *intus albo maculatae;* cauda, *baſi ad medium usque alba, ceterum nigra;* ungues *nigri.*

GLAREOLA.

Roſtrum robuſtum, breve, rectum, apice aduncum.

Nares ad baſin roſtri, lineares, obliquae.

Rictus amplus.

Pedes tetradactyli: digitis longis, gracilibus, baſi membrana inter ſe connexis.

Cauda furcata: rectricibus 12.

auſtriaca. 1. Gl. ſupra ex griſeo fuſca, torque nigro, mento gulaque albis, pectore et abdomine ex rufo griſeis.

Hirundo (pratincola) femoribus feminudis. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 345. *n.* 12.

Hirundo marina. *Aldr. orn.* 2. *p.* 696. *t.* 697. *Will. orn. p.* 214. *Raj. av. p.* 72.

Hirundo riparia. *Marſ. dan.* 5. *p.* 96. *t.* 46.

Pratincola. *Kram. elench. p.* 381. *t.* 1.

Glareola. *Briſſ. av.* 5. *p.* 141. *n.* 1. *t.* 12. *f.* 1.
Gallinula erythropus minor. *Geſn. av.* 513. *Aldr. orn.* 3. *p.* 454.
Perdrix de mer. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 544. *Pl. enl. n.* 882.
Auſtrian Pratincole. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 222. *t.* 85.

β) Glareola torquata. *Briſſ. av.* 5. *p.* 145. *n.* 2.
Perdrix de mer à collier. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 546.

γ) Glareola capitis et corporis ſupra colore umbrae aemulo.
Perdrix de mer. *Sonner. it. p.* 216.

δ) Glareola rectricibus baſi ad medium usque albis, ceterum nigris.
Perdrix de mer. *Sonner. p.* 216.

ε) Glareola rectricibus fuſcis, exterioribus litura curva alba notatis.
Perdrix de mer. *Sonner. it. p.* 216.

Habitat gregaria in Germaniae, Alſatiae, Lotharingiae *campeſtribus et ripis, in deſertis* mari Caſpio *vicinis, et per omne deſertum* mongolicum *ad fluvios* Kamyſchloska *et* Irtiſh *usque*, γ) *ad littus inſularum* Maldivicarum, δ) *et* ε) *ad littus* Coromandel, $9\frac{1}{4}$ *pollices longa, vel paulo minor, vermibus inſectisque aquaticis victitans, clamoſa, inquieta*, β) *ad* 7 *usque ova oblonga pariens.*

Roſtrum *nigrum, baſi rubrum*; tectrices *alarum ſuperiores albidae*; remiges rectrices*que obſcurae, hae apice intus griſeae, extima exterius per omnem longitudinem alba*; pedes *cum nuda* femorum *parte ſanguinei.*

ſenegalenſis. 2. Gl. tota fuſca.
Tringa (fuſca) roſtro pedibusque fuſcis, corpore fuſco immaculato. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 252. *n.* 22. *Falck it.* 3. *p.* 376. *t.* 26.
Glareola ſenegalenſis. *Briſſ. av.* 5. *p.* 148. *n.* 4.
Perdrix de mer brune. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 544.
Senegal Pratincole. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 225. *n.* 2.
Habitat ad fluvium Senegal, *et in provincia* Sibiriae Iſettenſi, $9\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

naevia. 3. Gl. fuſca albo-maculata, abdomine inferiore criſſoque ex rufo albis nigro-maculatis, roſtro pedibusque nigris.
Glareola naevia. *Briſſ. av.* 5. *p.* 147. *n.* 3.
Gallinula melanopus, Rothknuſſel. *Raj. av. p.* 109. *n.* 9. *Will. orn. p.* 304. *t.* 56. *
Giarole. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 545.

Spotted

Spotted Pratincole. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 225. *n.* 3.
Habitat in Germania, *austriacae magnitudine.*
Maculae in superiori corporis *parte minus distinctae;* remiges *nigrae, secundariae nigrae et cinereae;* cauda *albida, apice nigra.*

91. FULICA. *Rostrum* convexum: mandibula superiore margine supra inferiorem fornicata; inferiore pone apicem gibba.

Nares oblongae.

Frons calva.

Pedes tetradactyli, subpinnati.

* *Pedibus fissis:* Gallinulae.

fusca. 1. F. fronte flavescente, armillis concoloribus, corpore fuscescente.
Fulica albiventris. *Scop. ann.* 1. *p.* 105.
Gallinula minor. *Briss. av.* 6. *p.* 6. *n.* 2.
Gallinula alia chloropus fulicae similis. *Aldr. orn.* 3. *p.* 496. *t.* 497. *Will. orn. p.* 314.
Rallus Italorum. *Gesn. av.* 392. *Aldr. orn.* 3. *p.* 98. *Will. orn. p.* 319. *Raj. av. p.* 116. *n.* 15.
Poulette d'eau. *Buff. hist. nat. desois.* 8 *p.* 177.
Brown Gallinule. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 260. *n.* 14.
Wasserhühnchen. *Schranck Naturf.* 18. *p.* 70. *Günth. Nest. u. Eyer t.* 20.

β) Gallinula major. *Briss. av.* 5. *p.* 9. *n.* 3.
Gallina chloropus altera Aldrovandi. *Raj. av. p.* 114. *n.* 3. *Will. orn. p.* 313.
Grande Poule d'eau ou Porzane. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 178.

Fulicae *ad aquas degunt, cujus incolis vermibus, insectis, piscibus minoribus victitant, corpore compresso ad rallos accedunt, rostro crasso, versus apicem inflexo, mandibula superiore longius versus frontem procedente, cauda alisque brevibus conspicuae, in duas tribus abeunt, alias fissipedes, rallis proximas mandibula superiore basi membranacea, alis concavis, alias digitis membrana crenata cinctis, mandibulis aequalibus, naribus ovalibus, angustis, brevibus.*

Habitat in Europa, *potiſſimum auſtraliore, ſolitaria, plantis et piſcibus minoribus victitans, ob carnem delicioſam prope* Venetias *accipitrum ope capta, ochropode minor, pedem longa.*

Roſtrum *ex olivaceo viride*; pedes *et* corpus *ſupra ex olivaceo fuſcum, ſubtus cinereum, pennarum apice ad marginem albo*; gutturi *tinctus olivaceus interſperſus*; tectrices *caudae inferiores nigrae*; *flexura* alarum *alba*; remiges *obſcure fuſcae, extima margine alba*; rectricum *extima alba, ſubrotundata*; armillae *flavae.*

chloropus. 4. F. fronte fulva, armillis rubris, corpore nigricante. *Scop. ann.* I. *n.* 153. *Brünn. orn. n.* 191.

Fulica cinereo-fuſca, roſtro viridi baſin verſus coccineo, fronteque coccinea. *Kram. elench. p.* 358.

Gallinula. *Briſſ. av.* 6. *p.* 3. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 1. 2.

Gallinula chloropus major. *Aldr. orn.* 3. *p.* 449. *t.* 450. *Nozem. nederl. Vogel t.* 38.

Poule d'eau. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 171. *t.* 15. *Pl. enl. n.* 877.

Common Water-hen or More-hen. *Raj. av. p.* 113. *n.* 1. *p.* 190. *n.* 15. *Will. orn. p.* 312. *t.* 58. *Albin. av.* 2. *t.* 72. 3. *t.* 91. *Hayes brit. birds t.* 30.

Common Gallinule. *Brit. zool.* 2. *n.* 217. *t.* 77. *Arct. zool.* 2. *p.* 492. *n.* 411. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 258. *n.* 12.

Rothbläschen. *Friſch av.* 2. *t.* 209.

Habitat in Europa, *potiſſimum auſtraliore, etiam* Anglia, *in* Jamaica, Martinica, *et* America *ſeptentrionali a* Carolina *ad* Noveboracum, *ad mare* Caſpium, 14 *pollices longa* (*femina minore*), *plantis et piſcibus minoribus victitans, pedibus pendulis non procul volans, celeriter currens, ſatis bene natans, in trunco aut frutice aquis vicino ex herbis nidum ſtruens, et bis in anno* 7 *ova ochroleuca, paucis maculis ſpadiceis notata,* 2 *fere pollices longa pariens; carne delicioſa.*

Roſtrum *rubrum, apice vireſcens*; irides *rubrae*; corpus *ſupra fuliginoſum, olivaceo admiſto, ſubtus cinereum*; alarum *margo exterior, et caudae* tectrices *inferiores albae*; pedes *vireſcentes*; digiti *plani, latiuſculi.*

viridis. 5. F. ſupra viridis, ſubtus alba, fronte, roſtro, pedibusque ex vireſcente flavis.

Porphyrio viridis. *Briſſ. av.* 5. *p.* 529. *n.* 3.

Poule-Sultane verte. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 204.

Green Gallinule. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 257. *n.* 11.

Habitat

Habitat in India, 11½ *pollices longa.*
Ungues *grisei.*

melanocephala. 9. F. caerulea, capite colloque nigris.
Porphyrio melanocephalos. *Briss. av.* 5. *p.* 526. A.
Habitat in America.
Feminae *vertex*, *et* corpus *supra fulvum*; humeri *albo-striati*; alae *virescentes*, *tinctu fulvo*; remiges *ex virescente caeruleae.*

purpurea. 10. F. purpurea, rostro pallido, pedibus ex virescente flavis.
Acintli. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 208.
Quachilto. *Raj. av. p.* 116. *n.* 14. *Will. orn. p.* 319.
Crowing Gallinule. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 257. *n.* 9.
Habitat in novae Hispaniae *uliginosis*, *galli instar canens*, *piscibus victitans*; *caro sapida.*
Purpureis albae etiam pennae interspersae.

flavirostris. 11. F. supra caerulea, gutture ex caerulescente albo, abdomine et uropygio albis, cauda alisque fuscis, rostro pedibusque flavis.
Favorite de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 207. *Pl. enl. n.* 897.
Favourite Gallinule. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 256. *n.* 8.
Habitat in Cayenna, 12 *pollices longa.*
Pedes *longi*; digitus *posterior praelongus.*

Porphyrio. 5. F. fronte rubra, armillis multis, corpore viridi subtus violaceo. *Scop. ann.* 1. *n.* 152.
Porphyrio. *Bell. av.* 52. *Gesn. av.* 716. *t.* 717. *Aldr. orn.* 3. *p.* 437. *t.* 439. *Clus. exot.* 370. *t.* 84. *Briss. av.* 5. *p.* 522. *n.* 1. *t.* 42. *f.* 1. *S. G. Gmelin it.* 3. *p.* 79. *t.* 12.
Poule-Sultane. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 194. *t.* 17.
Talève de Madagascar. *Buff. pl. enl. n.* 810.
Purple Water-hen. *Albin. av.* 3. *t.* 11. *Edw. av. t.* 87.
Purple Gallinule. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 254. *n.* 6.
Habitat in America *australi*, *insulis maris* australis, Tongatabu, Tanna, *aliisque amicis*, *in* Sibiria *occidentali*, *ad mare* Caspium, *in* Persia, Sina, India, insulis Java, Madagascar, *ad littora* Barbariae; *in insulis nonnullis maris* mediterranei, e. g. Sicilia, *frequentissima*, 1 *pedem et* 5 *pollices longa*, *facile cicuranda et docilis*; *uni pedi insistendo altero cibum ori admovens*, *pisces*, *aqua prius mersos liguriens*, *sed radicibus quoque*, *fructibus et seminibus victitans*; *caro eximia.*

Roſtrum pedes*que rubri*; irides *fulvae*; caput *et* cervix *violaceo-nitens*; genae *et* guttur *ex violaceo caeruleum*; dorſum *et* uropygium *nitente-viridia*; remiges *et* cauda *rotundata viridi-nitentes*, *intus fuſcae.*

carthagena. 6. F. fronte caerulea, corpore rufo.
Carthagena Gallinule. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 252. *n.* 2.
Habitat Carthagenae *in* America, *atrae magnitudine.* Jacquin.

cayennenſis. 12. F. ex griſeo fuſca, mento, temporibus, et gutturis parte ex griſeo albis, pectore, abdomine ſuperiore et remigibus ex rubeſcente rufis, roſtro flavo, pedibus rubris.
Grande Poule d'eau de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 182. *Pl. enl. n.* 352.
Cayenne Gallinule. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 252. *n.* 3.
Habitat frequens in Gujanae *et* Cayennae *uliginoſis*, *piſcibus minoribus et inſectis victitans*, 18 *pollices longa.*
Roſtri *apex obſcurus*; dorſum *et* tectrices *alarum olivaceae.*

ruficollis. 13. F. pedibus rubris, vertice, cervice, dorſo remigibusque fuſcis, mento albo, gutture et pectore rufis, abdomine, criſſo et uropygio nigris.
Black bellied Gallinule. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 253. *n.* 4.
Habitat in Cayenna, *congeneribus intermiſta*, 17 *pollices longa.*
Roſtrum *baſi rubrum*, *apice flavum*; cervix *cinereo*, dorſum *vireſcente tinctu adumbratum*; remiges *margine rufae*; hypochondria *et* tectrices *alarum inferiores faſciis transverſis rufis et nigris*; pedes *praelongi.*

maderaspatana. 14. F. fronte temporibusque albis, corpore ſupra cinereo ſubtus albo.
Porphyrio maderaspatanus. *Briſſ. av.* 5. *p.* 543. *n.* 10.
Angoli. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 205.
Madras Rail-Hen. *Raj. av. p.* 194. *t.* 1. *f.* 4*.
Madras Gallinule. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 253. *n.* 5.
Habitat in Coromandel *et* Malabar, *anatis domeſticae magnitudine.*
Roſtrum pedes*que praelongi*; jugulum *lunulis nigris variegatum*; remiges *cinereae*, *margine nigrae.*

martinicenſis. 7. F. fronte caerulea, armillis concoloribus, corpore violaceo.
Jacquin Beytr. p. 12. *n.* 9. *t.* 3.
Porphyrio minor. *Briſſ. av.* 5. *p.* 526. *n.* 2. *t.* 42. *f.* 2.

Petite

Petite Poule-Sultane. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 206.
Martinico Gallinule. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 255. *n.* 7. *t.* 88.
Habitat in Martinicae, *aliarumque ejusdem* oceani *inſularum paludibus et inundatis, rhizophoris, conocarpis et avicenniis conteĸtis,* $8\frac{1}{2}$ *pollices alta, rarius vocem, hanc vero ſubtilem et dulcem edens, facile cicuranda, tumque oryza, piſis, pane &c. viĸtitans; caro eximia.*
Roſtrum *rubrum apice flavum;* oculi *nigri;* pedes *cum* digitis *flavi;* pennae *nitentes;* dorſum *et* alarum *pars ſuperior ex vireſcente fuſca;* cauda *ſupra nigricans ſubtus alba;* caput, collum, humeri, *et reliquum* corpus *eximie violacea.*

novebora- cenſis. 15. F. pedibus fuſcis, vertice et cervice olivaceis albo maculatis, dorſo fuſco, pectore ſordide flavo.
Yellowbreaſted Gallinule. *Arct. zool.* 2. *p.* 491. *n.* 410. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 262. *n.* 15.
Habitat in Noveboraco, *coturnice minor.*
Pennae *ſcapulares margine ochroleucae.*

naevia. 16. F. roſtro pedibusque vireſcentibus, fronte flava, capitis ſuperioribusque corporis pennis nigris margine rufis, dorſi margine albis, ſuperciliis albis, remigibus caudaque fuſcis.
Porphyrio naevius. *Briſſ. av.* 5. *p.* 538. *n.* 8.
Poliopus Gallinula minor Aldrovandi. *Raj. av. p.* 114. *n.* 5.
Grinette. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 179.
Small Water-hen, called Grinetta. *Will. orn. p.* 315. *t.* 58.
Small Water-hen. *Albin. av.* 2. *t.* 73.
Grinetta Gallinule. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 263. *n.* 17.
Habitat in Italia, *rallo aquatico minor,* $9\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Irides *ex flavicante virides;* gula, jugulum *et* pectus *ex caeruleſcente cinerea, utrumque poſterius tinĸtu olivaceo, maculis nigris;* abdomen *rufeſcens;* hypochondria *lineis transverſis nigris et albis;* tectrices *alarum rufae, lineis transverſis undulatis aut angulatis;* remigum *margo exterior albus;* cauda *expanſa concava;* rectrices *exteriori,* 2 *intermediae utroque margine albae;* digiti *praelongi.*

maculata. 17. F. ſupra ex rufo fuſca, fronte roſtroque flavis, temporibus et gutture albis, alis nigro alboque maculatis, pectore, abdomine et cauda fuſcis, rectricibus 2 intermediis nigris apice albis.
Porphyrio punctulatus. *Briſſ. av.* 5. *p.* 536. *n.* 7.
Matkneltzel, Matkern. *Raj. av. p.* 109. *n.* 10. *Will. orn. p.* 304. *t.* 56.

Speckled

Speckled Gallinule. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 266. *n.* 19.
Habitat in Germaniae *paludosis*, *cregis magnitudine*, 11 *pollices longa.*
Pedes *grisei.*

flavipes. 18. F. fronte pedibusque flavescentibus, capite et corpore supra rufo nigro-maculato, subtus albo, remigibus nigris, cauda rufa nigro-maculata.
Porphyrio rufus. *Briss. av.* 5. *p.* 534. *n.* 6.
Gallinula ochropus major. *Raj. av. p.* 115. *n.* 6.
Smirring. *Buff. hist. nat. desois.* 8. *p.* 180.
Water-hen, called Ochropus. *Will. orn. p.* 316.
Yellow-legged Gallinule. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 266. *n.* 20.
Habitat in Germania, *chloropodis magnitudine.*
Rostrum *flavum*, *apice nigrum*; palpebrarum *margo croceus*; tempora *alba*; tectrices *alarum majores corpori proximae albae*; *reliquae cum minoribus maculis obscuris*, *et prope apicem margine rubescente conspicuae.*

fistulans. 19. F. fronte ex flavicante viridi, corpore supra fusco subtus albo, remigibus caudaque fuscis.
Porphyrio fuscus. *Briss. av.* 5. *p.* 531. *n.* 4.
Glout. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 181.
Piping Gallinule. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 267. *n.* 21.
Habitat ad Germaniae *et* Alsatiae *fluvios et piscinas*, *voce fistulae aemula.*
Rostrum *nigrum*; tempora *alba*; pedes *ex flavicante grisei*; ungues *grisei.*

cinerea. 20. F. cinerea, medio abdomine albo, fronte et vertice gibboso calvis rubescentibus, pedibus fuscis.
Crested Gallinule. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 267. *n.* 22.
Habitat in Sina, *atrae magnitudine*, 18 *pollices longa.*
Mentum *lituris albis varium*; dorsum *et* alae *ex virescente cinereae*, *hae exteriori margine pallidae.*

* * *pedibus pinnatis:* Fulicae.

atra. 2. F. fronte incarnata, armillis luteis, corpore nigricante.
Fn. suec. 193. *Scop. ann.* 1. *n.* 149. *Brünn. orn. n.* 190. *Kram. el. p.* 357. *n.* 1. *Georg. it. p.* 172.
Fulica. *Bell. av.* 36. *Gesn. av.* 91. *Aldrov. orn.* 3. *p.* 91. *t.* 95. *Marsf. Danub.* 5. *p.* 70. *t.* 33. *Briss. av.* 6. *p.* 23. *n.* 1. *t.* 2. *f.* 1.
Phalaris. *Gesn. av.* 130. *Aldr. orn.* 3. *p.* 260.

Foulque

Foulque ou Morelle. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 211. *t.* 18. *Pl. enl. n.* 197.
Coot. *Raj. av. p.* 116. *n.* 1. *Will. orn. p.* 319. *t.* 59. *Alb. av.* 1. *t.* 83.
Common Coot. *Brit. zool.* 2. *n.* 220. *t.* 77. *Arct. zool.* 2. *p.* 496. *n.* 416. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 275. *n.* 1.
Waſſerhuhn. *Friſch av. t.* 208.
Kleiner Blaesling. *Günth. Neſt. u. Eyer t.* 29.
Habitat in omnis Europae, Sibiriae, Perſiae, Sinae, Jamaicae, Americae *ſeptentrionalis aquoſis*, *in* Gallia *hybernans*, *buteonibus valde infeſtata*, *piſcibus minoribus*, *inſectis aquaticis*, *feminibus adeo et juncorum radicibus victitans*, *incubationis tempore per paria in aquis arundine et juncis repletis frequens*, *egregie ſupra aquas currens*, *natans et urinans*, *inter medias arundines ex earum foliis nidum ſtruens*, *iisque affigens*, *et ova* 14-15 *ex fuſcescente alba guttis ſpadiceis conſperſa*, $2\frac{1}{4}$ *pollices longa pariens*; *vix junior edulis.*
Longitudo 15 *pollicum*; roſtrum *ex virescente album*; frons *extra tempus incubationis alba*; caput, collum *et* dorſum *nigra*; pectus, abdomen *et* criſſum *cinerea*; *rariſſime* corpus *totum album*; alarum *margo exterior albus*; pedes *ex flavicante virides.*

aterrima. 3. F. fronte alba, armillis rubris, corpore nigricante. *Scop. ann.* 1. *n.* 150.
Fulica major. *Briſſ. av.* 6. *p.* 28. *n.* 2. *t.* 2. *f.* 2. *Raj. av. p.* 117. *n.* 2. *Will. orn. p.* 239. *t.* 51.
Fulica alia, Diabolus marinus. *Aldr. orn.* 3. *p.* 98.
Fulica. *Nozem. nederl. Vogel t.* 31. 32.
Grande Foulque ou Macroule. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 220.
Greater Coot. *Brit. zool.* 2. *n.* 221. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 277. *n.* 2.
Blaesling. *Günther Neſt. u. Eyer t.* 36.
Habitat in Europae *praeſertim maritimis*, *etiam in tractu* Solonienſi Galliae, *et* Sibiria *occidentali frequens*, *inter alia aquatica edulis*, *magnitudine fere ſola*, *et profundiore nigredine ab atra diſtincta.*

leucoryx. 21. F. nigra, alis albis. *Sparrm. muſ. Carlſ. t.* 12.
Habitat in Suecia, *magnitudine et ſtatura atrae.*
Roſtrum *incarnatum*; frons *et* orbitae *rubrae punctatae*; pedes *fuſci.*

22. F.

Aethiops. 22. F. tota nigra. *Sparrm. muſ. Carlſ. t.* 13.

Magnitudo *et* habitus *atrae; ſed alarum plumae omnes nigrae;* pectus *et* abdomen *ferrugineo fuſcoque undulatum;* frons *rubeſcens;* roſtrum *flaveſcens, apice caeruleſcens;* mandibula *ſuperior in regione narium, inferior apice magis nigricans.*



americana. 23. F. cinerea, fronte, mento et media abdominis linea albis, pedibus ex caeruleo atris.

Cinereous Coot. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 279. *n.* 5.

Habitat in America *ſeptentrionali, atra minor.*

Roſtrum *vireſcens;* membrana *digitorum anguſtior, quam congeneribus.*

mexicana. 24. F. purpurea, fronte roſtroque rubris, dorſo, alis et uropygio vireſcentibus.

Fulica mexicana. *Briſſ. av.* 6. *p.* 31. *n.* 3.

Yohoalcoachillin. *Raj. av. p.* 117. *n.* 3.

Mexican Coot. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 278. *n.* 4.

Habitat in nova Hiſpania, *aterrimae magnitudine.*

Roſtrum *apice flavum;* dorſum, uropygium *et* tectrices *alarum caeruleo et fulvo variae.*

criſtata. 25. F. ex caeruleo atra, fronte verticeque calvis rubris: caruncula bifida ruberrima.

Grande Foulque à crête. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 222.

Foulque de Madagaſcar. *Buff. pl. enl. n.* 797.

Creſted Coot. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 278. *n.* 3. *t.* 90.

Habitat in Madagaſcar *et* Sina, *aterrima major,* 18 *pollices longa.*

Roſtrum *albidum, baſi rubrum;* pedes *obſcuri, armillis tricoloribus, rubris, viridibus et flavis.*

VAGI-

VAGINALIS. *Roſtrum* robuſtum, craſſum, conico-convexum, compreſſum: mandibula ſuperiore ſupra vagina cornea emarginato-lacera tecta.

Nares exiguae ante vaginam conſpicuae.

Lingua ſupra teres, ſubtus complanata, apice acuminata.

Facies nuda papilloſa.

Alae ſub flexura nodo obtuſo munitae.

Pedes robuſti, curſorii, parumper ſupra genua nudi: digitis ſubtus ſcabris; unguibus ſulcatis.

alba. 1. VAGINALIS. Chionis. *Forſter enchir. hiſt nat.* White Sheathbill. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 268. *n.* 1. *t.* 89.

Habitat gregaria in novae Seelandiae *aliarumque maris* auſtralis *inſularum maritimis, columbae majoris magnitudine*, 15-18 *pollices longa, teſtaceis et cadaveribus victitans.*

Roſtrum *baſi nigrum*; vagina *mobilis, ut erigi, et ad roſtrum apprimi poſſit*; facies *nuda*, (*in adultioribus*) *verrucis albis aut pallide aurantiis obſita*; verruca *ſupra oculos fuſca aut nigricans, reliquis major*; pennae *omnes albae*; nodus *alarum nigricans*; pedes 2 *pollices longi, utplurimum rubeſcentes, unguibus nigris, alias fuſci, digitis nigris, aut albi, aut caeruleſcentes, aut nigri.*

92. PARRA. *Roſtrum* teretiuſculum, obtuſiuſculum.

Nares ovatae in medio roſtri.

Frons carunculata: carunculis lobatis.

Alulae ſpinoſae.

dominica. 1. P. unguibus modicis, pedibus flavis.
Vanellus dominicenſis armatus. *Briſſ. av.* 5. *p.* 118. *n.* 8.

Habitat

Habitat in insula S. Dominici, *et calidiori generatim* America, *an varietas ludovicianae, quam magnitudine aequat?*
Rostrum *flavum*, *caruncula* frontis *laxa lutea*; caput *et* corpus *supra flavescens*, *subtus ochroleucum*, *in roseum colorem vergens.*

ludovicia- **6.** P. rostro et caruncula frontis fulvis, vertice nigro, corpore
na. supra ex griseo fusco, subtus ochroleuco.
Vanellus ludovicianus armatus. *Briss. av.* 5. *p.* 114. *n.* 7. *t.* 3. *f.* 2.
Vanneau armé de la Louisiane. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 65. *Pl. enl. n.* 835.
Armed Sandpiper. *Arct. zool.* 2. *p.* 478. *n.* 395.
Louisiane Sandpiper. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 164. *n.* 6.
Habitat in Louisiana, *vanelli magnitudine*, 11 *pollices longa.*
Remiges *nigrae*, *griseo pauco intermisto*; cauda *ochroleuca*, *apice nigra*; pedes *rubri*, *unguibus nigris.*

cayen- **7.** P. pedibus rubescentibus, occipitis fusci crista nigricante.
nensis. Vanneau armé de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 66. *Pl. enl. n.* 836.
Vanneau. *Fermin Surin.* 2. *p.* 193.
Cayenne Sandpiper. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 164. *n.* 5.
Habitat in Cayennae *uliginosis*, *insectis victitans*, *vanello minor*, $8\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Rostrum *rubrum*, *apice nigrum*; frons *et* gula *nigra*; verticis *medium cinereum*; cervix *exalbida*; pectoris *fascia lata nigra*; abdomen *et* crissum *alba*; dorsum *ex virescente purpureum*; alae *extus albae*; cauda *a basi ad medium alba*, *altera parte nigra*, *apicis margine albo*; digiti *modici*; ungues *nigri.*

goensis. **8.** P. caruncula rubra, pedibus flavis, capite, collo, remigibus caudaeque medio nigris, corpore subtus albo.
Vanneau armé des Indes. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 64.
Vanneau armé de Goa. *Buff. pl. enl. n.* 807.
Goa Sandpiper. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 165. *n.* 4.
Habitat circa Goam, 13 *pollices longa.*
Rostrum *obscurum*, *a posteriore oculi parte* stria *alba per latera colli ad pectus decurrens*; dorsum *et* tectrices *alarum ex rufo fuscae*; *majores albae*; cauda *basi alba*, *apice fusca*; digiti *modici.*

senegalla. **2.** P. unguibus modicis, pedibus rubris.
Vanellus senegalensis armatus. *Briss. av.* 5. *p.* 111. *n.* 6. *t.* 10. *f.* 2.

Vanneau

Vanneau armé du Sénégal. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 62. *Pl. enl. n.* 362.
Sénégal Sandpiper. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 166. *n.* 8.
Habitat ad fluvium Senegal, *vanelli magnitudine*, 12 *pollices longa.*
Roſtrum *ex flavicanti viride*, *apice nigrum*; frons *alba*, *caruncula laxa lutea*; mentum *et* gula *nigra*; abdomen *inferius*, tectrices *caudae et majores alarum exalbidae*; remiges *nigrae*, *baſi albae*; *ſpina* alarum *nigra*; cauda *a baſi ad medium exalbida*, *ceterum nigra*, *apice rufeſcens*; *reliquum* corpus *et* caput *ex griſeo fuſcum.*

chilenſis. 9. P. unguibus modicis, pedibus fuſcis, occipite ſubcriſtato. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 229.
Habitat in Chili, *picae magnitudine*, *at altior*, *alularum ſpinis acriter ſe defendens*, *in planitie degens*, *et vermibus inſectisque victitans*, *noctu transeunte homine clamitans*, *ob carnem delicioſam olim falconum ope*, *nunc ſclopeti ictu capta*, *monogama*, *inter gramina nidificans*, *et ova* 3 *ovis perdicis non majora*, *ex nigro et fuſco varia*, *gallinaceis potiora pariens.*
Roſtrum *conicum*, 2 *pedes longum*, *apice parumper curvatum*; irides *flavicantes*; pupillae *fuſcae*; nares *perviae*, *quadratae*; caruncula *biloba*, *rubra*; collum, dorſum, *et anterior* alarum *pars violacea*; guttur *et* pectus *nigra*; remiges rectrices*que brevi ſſimae*, *fuſcae*; ſpinae *alularum flavicantes*, *conicae*, *oſſeae*, ½ *pollicem longae.*

Jacana. 3. P. unguibus poſticis longiſſimis, pedibus virideſcentibus.
Jacana armata fuſca. *Briſſ. av.* 5. *p.* 125. *n.* 4. *t.* 11. *f.* 1.
Jacana quarta. *Marcgr. braſ.* 191.
Gallinula braſilienſis 4ta. *Raj. av. p.* 115. *n.* 11. *Will. orn. p.* 318.
Yohualquachili. *Hern. mex.* 50. *Raj. av. p.* 178. *n.* 5.
Jacana. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 185. *t.* 16. *Pl. enl. n.* 322.
Chevalier. *Ferm. Surin.* 2. *p.* 193.
Spurwinged Water-hen. *Edw. glean. t.* 357.
Chesnut Jacana. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 241. *n.* 1.
Habitat in Gujanae, Braſiliae, Surinami, *inſulae* S. Dominici *aquoſis*, *ralli aquatici magnitudine*, 10 *fere pollices longa*, *timidiſſima*, *clamoſa voce acuta et alta*, *utplurimum mas et femina ſimul*, *quae ſeparatae ſibi acclamant*; *caro eximia.*

Roſtrum *fulvum*; caput, collum *et* truncus *nigra*, dorſo, tectricibus *alarum*, *et* humeris *badiis*; abdomini *aliquando albedo intermixta*; ſpinae *robuſtae*, *flavae*; remiges *ex olivaceo flavae*, *apicis margine obſcuro*; cauda *rotundata*; rectrices *apice nigrae*, *ceterum fuſcae*, 2 *intermediae ex badio et fuſco variae.*

nigra. 10. P. unguibus poſticis longiſſimis, pedibus cinereis, capite, collo, cauda et corpore ſupra nigro.
Jacana armata nigra. *Briſſ. av.* 5. *p.* 124. *n.* 3.
Gallinulae tertia ſpecies Marcgravii. *Raj. av. p.* 115. *n.* 10. *Will. orn. p.* 318.
Chirurgien noir. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 189.
Black Jacana. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 242. *n.* 2.
Habitat in Braſilia, *Jacanae magnitudine.*
Roſtrum *croceum*; frons *rufa*; pectus, abdomen *et* criſſum *fuſca*; remiges *virides*, *apice fuſcae*; ſpina *alularum flava.*

braſilienſis. 11. P. unguibus poſticis longiſſimis, corpore ex virescente atro.
Jacana armata. *Briſſ. av.* 5. *p.* 123. *n.* 2.
Aguapecacá. *Raj. av. p.* 115. *n.* 9. *Will. orn. p.* 317.
Jacana-péca. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 190.
Braſilian Jacana. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 243. *n.* 3.
Habitat in Braſiliae, Cayennae *et* Gujanae *aquoſis*, *Jacanae magnitudine et moribus*, *piſcibus et inſectis aquaticis victitans*, *gregaria.*
Spina *alularum lutea.*

viridis. 12. P. unguibus poſticis elongatis flavis, pedibus ex flavicante viridibus, corpore ex nigricante viridi.
Jacana. *Briſſ. av.* 5. *p.* 121. *n.* 1.
Gallinula braſilienſis, Jacana dicta. *Raj. av. p.* 115. *n.* 8.
Jacana vert. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 189.
Braſilian Water-hen, called Jacana. *Will. orn. p.* 317. *t.* 59.
Green Jacana. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 243. *n.* 4.
Habitat in Braſilia, *columbae magnitudine.*
Roſtri *pars rubra*, *altera flava*; frons *colore turcoſae*; caput, collum *et* pectus *violaceo-nitens*; digiti *praelongi.*

variabilis. 4. P. unguibus poſticis elongatis, pedibus caeruleſcentibus.
Jacana armata varia. *Briſſ. av.* 5. *p.* 129. *n.* 5.
Jacana varié. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 192.
Jacana du Bréſil. *Buff. pl. enlum. n.* 846.
Spurwinged Water-hen. *Edw. av. t.* 48. *Bancr. Guj. p.* 173.
Variable Jacana. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 244. *n.* 5.

Habitat

Habitat in Cayenna, Braſilia, *et circa* Carthagenam Americae, 9 *pollices longa.*

Roſtrum *fulvum*; caruncula *rubra*; vertex *fuſcus*, *maculis obſcurioribus varius*; ſupercilia *alba*; linea *ocularis nigra*; occiput *fuſcum*; tempora *et* corpus *ſubtus alba*; ſpina *alularum flava*; *pennae* ſcapulares *fuſceſcentes*; tectrices *alarum minores ex purpuraſcente badiae*, *mediae fuſcae*, *majores nigrae*; remiges *corpori proximae* 4 *fuſcae*, *reliquae virides*, *apicis margine nigro.*

luzonienſis. 13. P. ſubtus alba, digitis elongatis, pedibus nigris.

Chirurgien de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p.* 82. *t.* 45.

Luzonian Jacana. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 245. *n.* 6.

Habitat in inſulae Manillae *humidis*, *maritimis*, *ripis*, *vanello minor*, *moribus congenerum.*

Roſtrum *griſeum*; vertex *fuſcus*; linea *ſupra oculos ad latera colli decurrens*, *initio alba*, *pone oculos flaveſcens*; *alia cinerea trans oculos ad alas procedens*; dorſum *et* pectoris *macula ingens fuſca*; tectrices *alarum minores albae*; *reliquae fuſceſcentes*, *lineis transverſis nigris*; remiges *ſecundariae albae*, *primores nigrae*, *ex quarum tribus ultimis prodeunt tres ſcapi nudi*, 2 *pollices longi*, *penna lanceolata terminati.*

africana. 14. P. pallide cinnamomea, digitis elongatis, pedibus ex vireſcente atris.

African Jacana. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 246. *n.* 7. *t.* 87.

Habitat in Africa, $9\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

Roſtrum *obſcurum*, *apice pallide corneum*; mentum *et* gula *alba*; pectus *luteum*, *nigro-maculatum et lineatum*; faſcia *ocularis ad dorſum usque procedens*, remiges*que majores nigrae*; unguis *poſterior* $1\frac{1}{2}$ *pollices longus.*

ſinenſis. 15. P. digitis elongatis, pedibus vireſcentibus, corpore vinaceo.

Chineſe Jacana. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 246. *n.* 8.

Habitat in Sina, 21 *pollices longa.*

Roſtrum *obſcurum*; vertex, frons, mentum, guttur *et* pectus *ex pallide cinereo rufeſcens*; occiput *nigrum*; cervix *flava*, *linea nigra utrinque circumſcripta*; tectrices *alarum albae*; remiges *nigrae*; cauda *longa.*

Chavaria. 5. P. digitis elongatis, pedibus fulvis, occipite criſtato.

Faithfull Jacana. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 246. *n.* 9.

Habitat in fluviis, *lacubus et inundatis*, *vicinis flumini* Cinu, *leucis* 30 Carthagena Americae *diſtanti.* *Veſcitur herbis.*

herbis. Inceſſus gravis, lentus. Volatus facilis, celer. Currere omnino nequit, niſi ſimul ſemivolet. Tacta manu cutis, ſub pennis etiam lanoſa, crepat omnino fortiter. Lana haec denſa levitatem conciliat corpori, ita ut perfecte natet pedibus digitisque longiſſimis, ſed omnino fiſſis, quibus etiam in ſtagnis herboſis profundis incedere poſſit. Roſtro vel unguibus nocere nequit. Calcaria in alis ſingulis 2-3 craſſa, duriſſima, ſemipollicaria, et occultata, niſi quando alis, quas longiſſimas fortiſſimasque habet, quantum fieri poteſt, extenſis, hoſtem aggreditur, et ictibus fortiſſimis trucidat. Aves rapaces ferre nequit, et primo adoritur. Vulturem Auram ibi frequentiſſimum, ſaepeque obambulantem et appropinquantem, illico occurrit et expellit. Americani, qui gallinas, anſeres &c. nutriunt in magno numero, unicam chavariam cicuratam habent, quae cum reliqua gallinarum turba per vicina pergit, nunquam deſerit, etſi volare poſſit, et domum ad veſperam revertitur. Ab homine adulto ſe tangi patitur, et nemini nocet; contra pueros ſe defendit ſaepius. Vox clara alta, ſed ingrata. Jacquin.

Corpus *ſeſquipedale a terra altum, magnitudine galli, uti alae et cauda, nigricans cum nebulis griſeis; minus nigricat venter.* Roſtrum *conico-incurvum, ſordide albicans: maxilla ſuperiore imbricata gallinae.* Nares *oblongae, perviae*; membrana *ad baſin roſtri utrinque rubra ad tempora extenditur, in cujus media parte ſunt* oculi *iride fuſca.* Lanugo *absque pennis curta denſaque, ſed nigra tegit totum collum, at nivea inferiorem capitis partem ſub roſtro et tempora ad latitudinem pollicis unius.* Frons *et* occiput *tegitur pennis veris, corpori concoloribus, ſed minus fuſcis.* Criſta *ex* 12 *circiter pennis tripollicaribus nigricantibus, reſpectu loci perpendicularibus, orta in infima parte occipitis, ubi lanugo ceſſat.* Femora *ſeminuda craſſa.* Genua *craſſiſſima ſ. nodoſa.* Tibiae *longae, flavo-rubrae, validae.* Pedes *tetradactyli, fiſſi.* Digiti *craſſi, omnium longiſſimi, unde maxime decuſſent ſub inceſſu.* Collum *longum.* Cauda *brevis.* Jacquin.

93. RALLUS. *Roſtrum* baſi craſſius, compreſſum, dorſo attenuatum apicem verſus, aequale, acutum.

Nares ovatae.

Pedes tetradactyli, fiſſi.

Corpus compreſſum.

Crex. 1. R. alis rufo-ferrugineis. *Fn. ſuec.* 194. *Scop. ann.* I. *n.* 154. *Brünn. orn. n.* 192. *Kram. el. p.* 349. *n.* 1. *Georg. it. p.* 172.

Ortygometra alis rufo-ferrugineis. *Fn. ſuec.* I. *n.* 162.

Ortygometra. *Bell. av.* 49. *Geſn. av.* 360. *t.* 361. *Aldr. orn.* 2. *p.* 174. *t.* 176.

Crex. *Geſn. av.* 362. *Aldr. orn.* 3. *p.* 428.

Rallus genitarum ſ. ortygometra. *Briſſ. av.* 5. *p.* 159. *n.* 3. *t.* 13. *f.* 2.

Râle de genêt ou roi des cailles. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 146. *t.* 12. *Pl. enl. n.* 750.

Land Hen. *Will. orn. p.* 316.

Daker Hen or Rail. *Raj. av. p.* 58. *n.* 8. *Will. orn. p.* 170. *t.* 29. *Alb. av.* I. *t.* 32.

Crake Gallinule. *Brit. zool.* 2. *n.* 216. *t.* 75. *Arct. zool.* 2. *p.* 492. A. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 250. *n.* 1.

Wieſenſchnarre, Wachtelkönig. *Friſch av. t.* 211. *Günth. Neſt. u. Eyer t.* 45.

β) Porphyrio rufeſcens. *Briſſ. av.* 5. *p.* 533. *n.* 5.

γ) Crex roſtro nigro, mento criſſoque ex rufeſcente albis, pedibus obſcure rubris.

δ) Crex tectricibus alarum et corpore ſubtus ferrugineo, pedibus obſcuris.

Habitat in Europae *agris, erectis, in* Syria, γ) *in* Jamaica, δ) *in* Sina, $9\frac{1}{2}$ *pollices longus, migrans, pingueſcens, ſeminibus inſectisque victitans, inter gramina celerrime curſitans, at inepte volans pedibus pendulis, veſperi et noctu ſonorus voce ingeminata crex, alliciendus pectine papyro intertexto, in muſca aut gramine ſicco ova pariens* 12-16, $1\frac{1}{2}$ *pollices longa, ex rufeſcente cinereo-alba maculis ferrugineis varia, ovis turdi viſcivori ſimilia; caro ſapidiſſima.*

Roſtrum *et* pedes *ex cineraſcente fuſci*; irides *avellanae colore*; *pennae* corporis *ex rufeſcente fuſcae, ſuperiores per mediam*

mediam longitudinem nigrae; mentum *pallidissimum*; abdomen *ochroleucum*. Pulli *lanuginosi atri*.

aquaticus. 2. R. alis grisеis fusco-maculatis, hypochondriis albo-maculatis, rostro subtus fulvo. *Fn. suec.* 195. *Scop. ann.* I. *n.* 155. *Brünn. orn. n.* 193.

Rallus aquaticus. *Aldr. orn.* 3. *p.* 455. *Briss. av.* 5. *p.* 151. *n.* 1. *t.* 12. *f.* 2.

Ortygometra alis fuscis, lumbis nigris lituris transversis albis. *Kram. el. p.* 349. *n.* 2.

Ortygometra. *Bell. av.* 49. *Aldr. orn.* 3. *p.* 455. *t.* 456.

Gallinula aquatica. *Gunner. act. nidros.* 2. *p.* 340. *t.* 12. *Ström. sondm.* 218.

Gallinula s. Gallinago fericea. *Aldr. orn.* 3. *p.* 470. *Raj. av. p.* 114. *n.* 4.

Gallinula chloropus. *Marsf. Danub.* 5. *p.* 68. *t.* 32.

Gallinula Sammthünle. *Gesn. av.* 517.

Râle d'eau. *Buff. hist. nat. desois.* 8. *p.* 154. *t.* 13. *Pl. enl. n.* 749.

Water-rail, Bilcock, or Brook-ouzel. *Brit. zool.* 2. *n.* 214. *t.* 75. *Raj. av. p.* 113. *n.* 2. *p.* 190. *n.* 12. *Will. orn. p.* 314. *t.* 58. *Sloan. jam. p.* 321. *n.* 16. *Alb. av.* I. *t.* 77. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 227. *n.* 1.

Habitat in Europae *et* Sibiriae *paludosis*, 12 *pollices longus, ab hostibus in curecta fugiens, inepte pedibusque pendulis volans, at satis bene natans et celerrime currens, migrans, ova* 1½ *pollices longa, flavescentia, maculis fuscis fere aequalibus varia pariens.*

Rostrum *nigrum, basi rubescens*; irides *rubrae*; corporis *pennae superiores ex olivaceo fuscae, medio nigrae, inferiores cinereae*, abdominis *inferioris et* crissi *margine rufae*; remiges *obscurae*; tectrices *caudae inferiores albae*; rectrices *breves, nigrae, intermediae* 2 *apice, reliquae margine ferrugineae*; pedes *obscure rubri.*

Porzana. 3. R. rectricibus binis intermediis albo-marginatis, rostro pedibusque subolivaceis. *Scop. ann.* I. *n.* 144. *Frisch av.* 168. *t.* 211.

Rallus aquaticus minor s. Maruetta. *Briss. av.* 5. *p.* 155. *n.* 2. *t.* 13. *f.* 1.

Gallinula

Ralli *rostro paulisper inflexo, naribus exiguis, lingua aspera, cauda brevissima distincti.*

Gallinula Ochra. *Gesn. av.* 513. *Aldr. orn.* 3. *p.* 468. *Raj. av. p.* 115. *n.* 7. *Will. orn. p.* 316.
Porzana minor. *Aldr. orn.* 3. *p.* 558.
Petit râle d'eau ou Marouette. *Buff. hist. nat. des ois.* 8. *p.* 157. *Pl. enl. n.* 751.
Spotted Gallinule. *Brit. zool.* 2. *n.* 215. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 264. *n.* 18.
Habitat in Europa, Sibiria, *septentrionali* America *ad ripas et inter arundines solitarius, migrans, mansuescens, nidum scaphae forma ex juncis inter arundines struens, hisque altero fine affigens, ovaque* 7-8 *pariens, crege minor, et* 9 *pollicibus brevior.*
Rostrum *ex virescente flavum*; irides *avellanae colore*; caput *fuscum, nigro-maculatum*; linea *superciliaris pallide grisea*; cervix *et* hypochondria *ex cinereo fusca, maculis exiguis albis*; dorsum *et* tectrices *alarum olivaceae, lituris nigris, et ad margines pennarum maculis albis; majores lituris et lineis albis*; genae, mentum *et* guttur *pallide grisea, maculis fuscis*; pectus *fuscum maculis albis*; abdomen *ex cinereo et albo varium*; crissum *ochroleucum.*

crepitans. **12.** R. rostro pedibusque fuscis, corpore supra olivaceo: pennarum margine cinerascente, mento albo, gutture et pectore ex flavicante fuscis.
Clapper Rail. *Arct. zool. p.* 490. *n.* 407. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 229. *n.* 2.
Habitat aestate in Noveboraco, *aquatico major*, 14-16 *pollices longus, Junio pariens.*
Genae *cinereae.*

troglodytes. **13.** R. fuscus, rostro pedibusque spadiceis, genis, linea superciliari, gulaque cinereis, alulis spinosis.
Troglodyte Rail. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 219. *n.* 3.
Habitat in nova Seelandia *et insulis vicinis*, 17 *pollices longus, aquae nunquam se confidens, inepte volans, sed celerrime currens; mitis, humum gallinae more ruspans, vermibus praesertim victitans, in foveas et dumeta fugiens; caro sapida.*
Irides *sordide fuscae*; pennae *plurimae et ipsa* cauda *margine ex rufo griseae*; alae *brevissimae*; remigum *margo maculis transversis ferrugineis*; pinguedo *aurantia; an ad parram potius spectat?*

fuscus. **4.** R. fuscus, crisso albo undulato, pedibus flavis.
Rallus philippensis fuscus. *Briss. av.* 5. *p.* 173. *n.* 7. *t.* 15. *f.* 2.

Tiklin brun. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 161.
Râle brun des Philippines. *Buff. pl. enl. n.* 773.
Brown Rail. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 233. *n.* 6.
Habitat in inſulis Philippinis, 7 *pollices longus.*
Corpus *ſubtus ſpadiceum, abdominis colore in griſeum vergente;* cauda *nigro- et albo-faſciata.*

ſtriatus. 5. R. nigricans albo-undulatus, gula rufeſcente.
Rallus philippenſis ſtriatus. *Briſſ. av.* 5. *p.* 167. *n.* 5. *t.* 14. *f.* 2.
Tiklin rayé. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 161.
Habitat in inſulis Philippinis, 8¼ *pollices longa, an mera philippenſis varietas?*
Roſtrum *corneum;* vertex *ex obſcuro et badio varius;* nucha *badia;* cervix, dorſum, humeri *et* uropygium *fuſca, maculis albidis;* tectrices *alarum ſtriis paucis transverſis albis;* gula *ex rufo alba;* genae, guttur, pectus *et* abdomen *ſuperius cinerea, tinctu olivaceo, inferius obſcuro- et albo-faſciatum;* remiges *fuſcae, faſciis extus ex rufo albis, intus albis;* cauda *fuſca, albo-lineata;* pedes *ex griſeo fuſci.*

torquatus. 6. R. fuſcus, ſubtus albo-undulatus, linea infra oculos alba.
Rallus philippenſis torquatus. *Briſſ. av.* 5. *p.* 170. *n.* 6. *t.* 15. *f.* 1.
Tiklin à collier. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 162.
Banded Rail. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 233. *n.* 5.
Habitat in inſulis Philippinis, 12 *pollices longus.*
Roſtrum *et* pedes *ex griſeo fuſci:* genae *et* gula *nigrae;* corpus *ſubtus transverſim nigro-alboque ſtriatum;* torques *badius;* remiges *exteriori margine pallidiores, intus faſciis, primae tres albis, ſex inſequentes ex rufo badiis.*

philippenſis. 7. R. fuſcus, ſubtus griſeo-faſciatus, ſuperciliis albis, collo ſubtus rufeſcente.
Rallus philippenſis. *Briſſ. av.* 5. *p.* 163. *n.* 4. *t.* 14. *f.* 1.
Tiklin ou Râle des Philippines. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 160.
Râle des Philippines. *Buff. pl. enl. n.* 774.
Philippine Rail. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 230. *n.* 4.
β) Rallus ſuperciliis, mento et gutture cinereis. *Lath. ſyn.* III. 1. *t.* 86.
γ) Rallus ſuperciliis griſeis, corpore ſubtus toto albo.
Habitat in inſulis Philippinis, β) *in* Tahiti, γ) *in* Tonga-Tabu, *aquatici magnitudine,* 11 *pollices longus.*

Roſtrum

Roſtrum *et* pedes *griſei*; color *ſupra obſcurus*, *pennarum margine ex rufo griſeo*; gula *ſordide alba*; guttur *ex rufo griſeum faſciis transverſis obſoletis fuſceſcentibus*; pectus *et* abdomen *griſeo-fuſcoque lineatum*; alae *maculis albis et badiis*; cauda *obſcura*, *margine ex rufo griſea*; rectrices, *intermediis 2 exceptis*, *intus maculis badiis variae.*

bengalenſis. 8. R. albus capite colloque nigro, alis dorſoque viridibus, remigibus primariis rubro maculatis.

Totanus benghalenſis. *Briſſ. av.* 5. *p.* 209. *n.* 9.
Chevalier vert. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 7. *p.* 520.
Bengal Water-rail. *Albin. av.* 3. *t.* 90.
Habitat in Bengala, $8\frac{1}{2}$ *pollices longus*; *an mera varietas ſcolopacis capenſis?*
Roſtrum, irides, pedes*que flavi*; vertex, area *oculorum*, dorſum *inferius*, *et* corpus *ſubtus alba*; tempora *et* gula *ex atro fuſca*; remiges *primores purpureae*, *ſecundariae virides*, *corpori proximae albae*; cauda *purpurea*, *maculis fulvis.*

carolinus. 9. R. fuſcus, capiſtro nigro, pectore plumbeo, roſtro flavo, pedibus vireſcentibus.

Porphyrio freti Hudſonis. *Briſſ. av.* 5. *p.* 541. *n.* 9.
Râle de Virginie. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 165.
Little american Water-hen. *Edw. av. t.* 144.
Sorce. *Act. zool.* 2. *p.* 491. *n.* 409. *Catesb. Car.* 1. *t.* 70. *Barbat. it. p.* 16. 42. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 262. *n.* 16.
Habitat in Virginia, *frequentiſſimus*, *coturnicis magnitudine*; *ſed altior*, 7-8 *pollices longus*, *pingueſcens*, *carne delicioſa.*
Frons *nudiuſcula*; irides *rubrae*; vertex *et* corpus *ſupra fuſcum*, *maculis nigris*; facies, mentum *et* gula *nigra*; *reliquum* collum, tempora, *et* pectus *ex caeruleſcente cinerea*; abdomen *et* alarum *margo exterior alba*; remiges *et* cauda *fuſca.*

phoenicurus. 14. R. niger, ſubtus albus, roſtro pedibusque vireſcentibus, fronte nuda incarnata, criſſo caudaque ex ferrugineo rubris.

Zool. ind. t. 9.
Red-tailed Gallinule. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 259. *n.* 13.
β) Rallus ſupra cinereus, ſubtus albus, abdomine et criſſo rufis.
Poule-ſultane brune. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 204.
Poule-ſultane de la Chine. *Buff. pl. enl. n.* 896.
γ) Rallus fronte alba, criſſo rubro, pedibus flavis.

Habitat in insula Zeylon, β) *in* Sina, γ) *in* Madagascar, *fulicae ochropodis magnitudine*, 9 *pollices longus*, β) *et* γ) 15-16 *pollices.*
Rostro *et* pedibus *tinctus ruber intermistus*; vertex *et* genae *candidissimae*; remiges *caeruleo-maculatae.*

virginianus. 10. R. fuscus immaculatus, rostro pedibusque fuscis.
Rallus pensylvanicus. *Briss. av.* 6. *app. p.* 138.
American Water Rail. *Edw. glean. t.* 279.
Virginian Rail. *Arct. zool.* 2. *p.* 490. *n.* 408.
Habitat in Pensylvania, *aquatici magnitudine*, *an varietas?*
Mandibula *inferior basi rubescens*; irides *rubrae*; vertex *obscurus*; tempora *cinerea*; supercilia, mentum, *et* alarum *flexura alba*; cervix, dorsum *et* cauda *striis nigris*; guttur *et* pectus *ex fuscescente fulva*; abdomen *inferius obscuro- et albo-lineata*; crissum *ex albo, fulvo et nigro varium*; tectrices *alarum spadiceae*; remiges *obscurae.*

ferrugineus. 15. R. supra obscurus, subtus cinereus, collo et pectore ferrugineis, rostro pallido, pedibus flavis.
Red-breasted Rail. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 234. *n.* 7.
Magnitudo *aquatici*; longitudo 9 *pollicum*; supercilia *pallida*; hypochondria *lineis transversis angustis albis.*

capensis. 11. R. ferrugineus, pectore inferiore, abdomine, crisso, remigibus caudaque nigro-alboque undulatis, rostro nigro, pedibus sanguineis. *Mantiss.* 1771. *p.* 525.
Rail. *Brown illustr. p.* 94. *t.* 38.
Cape Rail. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 234. *n.* 8.
Habitat ad caput bonae spei, *et in* Zeylon, *cregis magnitudine.*
Rectrices 2 *intermediae ferrugineae.*

caerulescens. 16. R. spadiceus, subtus caerulescens, rostro pedibusque rubris, crisso albo, abdominis striis transversis nigris.
Blue necked Rail. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 234. *n.* 1.
Habitat ad caput bonae spei, $7\frac{1}{2}$ *pollices longus.*

zeylanicus. 17. R. capite obscuro, corpore supra ferrugineo, subtus rubescente fusco-nebuloso, remigibus primoribus nigris, rostro pedibusque rubris.
Rail. *Brown illustr. p.* 96. *t.* 37.
Habitat in Zeylon, *aquatico major.*
Cauda *praelonga.*

18. R.

australis. 18. R. cinereo-ferrugineus, alis caudaque saturate brunneis, pennis nigro-fasciatis. *Sparrm. mus. Carls. t.* 14.
Habitat ad novae Seelandiae *littus meridionale, gallinae vulgaris magnitudine.*
Roſtrum *et* pedes *flavicant*; corpus *supra ex ferrugineo fuscum, subtus ex cinereo ferrugineum*; remiges rectricesque *ex ferrugineo rufescentes nigro-undulatae.*

pacificus. 19. R. capite remigibusque fuscis, roſtro sanguineo, superciliis, abdomine et crisso albidis, nucha ferruginea, gula alba, dorso, uropygio, cauda et alis nigris, his albo-fasciatis, illis albo-maculatis.
Pacific Rail. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 235. *n.* 11.
Habitat in Tahiti *et vicinis insulis, aquatici magnitudine.*
Irides *rubrae*; pectus *ex caerulescente cinereum*; pedes *incarnati, unguibus pallidis.*

tabuensis. 20. R. ex fuscescente niger, subtus obscurus, roſtro nigro, pedibus spadiceis.
Tabuan Rail. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 235. *n.* 12.
β) Rallus pedibus rubris, crisso albo lineis nigris transversis striato.
Habitat in Tonga-tabu, Tahiti *et insulis vicinis*, β) *in* Tanna, $6\frac{1}{2}$ *pollices longus.*
Palpebrae *et* irides *rubrae.*

niger. 21. R. totus niger, roſtro basi flavo, apice fusco, pedibus fuscis rubrisve.
Black Rail. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 236. *n.* 13.
Habitat ad caput bonae spei, *et in aliis* Africae *partibus, porzanae magnitudine*, 9 *pollices fuscus.*

Sandwichensis. 22. R. pallide ferrugineus, roſtro obscure cinereo, pedibus obscure incarnatis.
Sandwich Rail. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 236. *n.* 14.
β) Rallus roſtro pedibusque flavicantibus.
Habitat exilis in insulis Sandwich, β) *in insula* Tanna.

tahitiensis. 23. R. cinereus, corpore supra spadiceo, roſtro, cauda rotundata unguibusque nigris.
Otaheitee Rail. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 236. *n.* 15.
Habitat in Tahiti *et in* insulis amicis, 6 *pollices longus.*
Remiges *obscurae, margine albae*; alarum *margo, et* remigum *prima alba*; pedes *obscure flavi.*

24. R.

obſcurus. 24. R. fuſcus nigro-ſtriatus, ſubtus ex ferrugineo fuſcus, roſtro nigro, pedibus ſpadiceis.
Dusky Rail. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 237. *n.* 16.
Habitat in inſulis Sandwich, 6 *pollices longus.*
Mandibularum *acies flavicans.*

longiroſtris. 25. R. dilute cinereus, ſubtus ex ferrugineo albus, ad latera ſtriatus, roſtro longo ferrugineo, pedibus pallide ſtramineis.
Râle à long bec de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 163. *Pl. enl. n.* 849.
Longbilled Rail. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 237. *n.* 17.
Habitat in Cayenna, *aquatico major*, $9\frac{1}{2}$ *pollices longus.*
Roſtrum *apice obſcurum*; mentum *albicans.*

variegatus. 26. R. albo nigroque ſtriatus et maculatus, occipite obſcuro, roſtro flavicante, mento albo, pedibus flavis.
Râle tacheté de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 165. *Pl. enl. n.* 775.
Variegated Rail. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 237. *n.* 18.
Habitat in Cayenna, 11 *pollices longus.*
Alae *fuſcae*; tectrices *albo-maculatae*; rectrices *obſcurae, mediarum nonnullae margine albae.*

cayennenſis. 27. R. vertice rufo, corpore ſupra ex olivaceo fuſco, ſubtus rufo, faſcia oculari nigricante, remigibus nigris, roſtro fuſco, pedibus ſpadiceis.
Kiolo. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 164.
Râle de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 368.
Cayenne Rail. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 238. *n.* 19.
β) Rallus vertice badio, mento et criſſo ex rufo albis.
Râle à ventre roux de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 753.
Habitat in Cayenna *et* Gujana, *ad* 8 *pollices longus, veſpere ſonorus et gregarius, interdiu in dumetis ſolitarius, in dichotomia fruticum prope terram nidificans.*
Criſſum *pallens.*

jamaicenſis. 28. R. ſupra ex rufo fuſcus, ſtriis nigricantibus, roſtro gulaque nigris, gutture et pectore ex caeruleſcente cinereis, abdomine albo- et fuſco-lineato.
Rallus jamaicenſis. *Briſſ. av.* 6. *app. p.* 140.
Râle Bidi-Bidi. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 166.
Leaſt Water-hen. *Edw. gleam. t.* 278. *Brown jam. p.* 479.
Jamaica Rail. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 239. *n.* 20.

Habitat

Habitat in Jamaica, *minutus*, 6 *pollices longus.*

Roſtrum *baſi rubeſcens*, tectrices *alarum fuſcae*, *albo-maculatae*; remiges *ex rufo fuſcae*, *nigro-lineatae*; *ſecundariae et* rectrices *albo-maculatae*; pedes *fuſci.*

minutus. 29. R. fuſcus ſubtus obſcure flavus, ſuperciliis, ſtriis dorſi, et maculis tectricum alarum albis, cauda nigro et albo faſciata.

Petit râle de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 167. *Pl. enl. n.* 847.

Little Rail. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 239. *n.* 21.

β) Rallus cervicis medio rufo, abdomine et criſſo nigro et albo undulato.

Habitat in Cayenna, *β*) *etiam in* Jamaica, *congenerum minimus*, 5 *pollices longus.*

Roſtrum *fuſcum*; tectrices *alarum nigrae*; mentum *et* gula *exalbida*; abdominis *color in cinereum vergens*; pedes *flaveſcentes.*

pusillus. 30. R. facie, gutture et pectore per mediam longitudinem ex caeruleſcente canis, gula media albida, corpore ſupra ferrugineo lituris nigris, ſubtus nigro taeniolis albis. *Pall. it.* 3. *p.* 700. *n.* 30.

Habitat circa Dauuriae *lacus ſalſos et arundineta*, *alaudae vulgaris magnitudine.*

Litura *per oculos longitudinalis*, *obſolete ferruginea*; vertex *ferrugineus*, *lituris nigris*; dorſum *lineolis longitudinalibus vagis albis varium*; cauda *arrigua*; pedes *vireſcentes.*

barbaricus. 31. R. ferrugineus, roſtro nigro, alis albo-maculatis, uropygio ſupra albo-nigroque ſtriato, infra albo, pedibus obſcure fuſcis.

Barbary Water-hen. *Shaw it. p.* 255.

Barbary Rail. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 240. *n.* 22.

Habitat in Barbaria, *pluvioli minor.*

94. PSOPHIA. *Rostrum* cylindrico-conicum, convexum, acutiusculum, mandibula superiore longiore.

Nares ovatae, patulae.

Lingua cartilaginea, complanata, apice fimbriata.

Pedes tetradactyli, fissi.

crepitans. 1. Ps. capite et pectore viridi-nitente laevibus.

Psophia. *Syst. nat.* XII. 1. *p.* 363. *n.* 1.

Psophia crepitans nigra pectore columbino. *Barr. av.* 62.

Gallina sylvatica crepitans, pectore columbino. *Barr. aequin.* 132.

Grus Psophia. *Pall. miscell. zool. p.* 66. *t.* 1. *Spicil. zool.* 4. *p.* 1. *t.* 1.

Phasianus antillarum. *Briss. av.* 1. *p.* 269. *n.* 2.

Perdix major brasilienfis. *Briss. av.* 1. *p.* 227. *n.* 5.

Trompette. *Condam. it.* 174. *Fermin Surin.* 2. *p.* 162.

Agami. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 487. *t.* 23. *Pl. enl. n.* 169.

Caracara. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 292. *du Tertr. Antill.* 2. *c.* 5. §. 8.

Gold-breasted Trumpeter. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 793. *n.* 1.

Habitat in insulis Caribaeis, *et* Americae *australis parte calidiori, arquatae magnitudine, sed crassior et brevior,* 20 *pollices longa; voce quadam rauca bis terve iterata ex imo quasi abdominis cavo sonitum edens, columbi pruricntis fere aemulum, pluries repetitum, gressu habituque gruem imitans, longis saepe passibus decurrens alisque ventilans, cum crecibus et phasianis subsultando motisque alis pugnans, ciconiae instar, uni pedi insistendo, retroque intra humeros collo dormiens, ora pariens gallinaceis paulo majora ex caeruleo viridia, facillime cicuranda, et tum pane, carnibus, pisciculisque comminutis vescens. Caro phasiani carni similis.*

Rostrum *fere otidis, ex flavicanti viride;* pedes *robusti, proceri, ex fuscescente cinerei aut virides, talo tumido, unguibus obtusis nigris;* cauda *brevissima;* corpus *atrum;* capitis *pennae lanuginosae;* orbitae *nudae, rubescentes;* colli *inferioris pennae squamiformes,* juguli *viridi- aut caeruleo-aureae,*

aureae, humerales *ferrugineae*, *laxae*, *pendulae*, *sericeae*; scapulares *praelongae*, *pendulae*; saccus *aëreus dexter in pelvim descendens*, *intra thoracem septis* 3-4 *transversis*, *membranaceis cellulosus*, *sinister longe angustior in hypochondriis terminatur*.

undulata. 2. Ps. occipitis crista brevi albida, pectorisque longa nigra dependentibus. *Jacquin Beytr. p.* 24. *n.* 18. *t.* 9.

Habitat in Africa, *anseris magnitudine.*

Caput *fuscum*, *maculis nigris*; corpus *infra ex caerulescente canum*, *maculis in* pectore *et* abdomine *paucis nigris*; dorsum, alae *et* cauda *dilute fusca lunulis nigris varia*; *margo* alarum *exterior*, rostrum *et* pedes *glaucescentes*.

V. GALLINAE.

Roſtrum convexum: mandibula ſuperiore fornicata, margine extra inferiorem dilatato.
Nares membrana cartilaginea convexa ſemitectae.
Rectrices plures quam duodecim.
Pedes fiſſi, ſed intimo articulo connexi.

95. OTIS.

Roſtrum ſubconvexum.
Nares ovatae, perviae.
Lingua bifida, acuta.
Pedes curſorii, tridactyli, alti, ſupra femora nudi.

Tarda. 1. O. maris capite juguloque utrinque criſtato. *Fn. ſuec.* 196. *Scop. ann.* 1. *n.* 159. *Kram. el. p.* 354. *n.* 1. *Georg. it. p.* 172.
Tarda. *Dodart mém.* 3. *p.* 309.
Otis ſ. Tarda avis. *Aldr. orn.* 2. *p.* 85. *t.* 89. *Geſn. av.* 484. *Briſſ. av.* 5. *p.* 18. *n.* 1.
Outarde. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 1. *t.* 1. *Pl. enl. n.* 245.
Buſtard. *Raj. av. p.* 58. *n.* 1. *Will. orn. p.* 178. *t.* 32. *Edw. av. t.* 79. 80. *Alb. av.* 3. *t.* 38. 39.
Great Buſtard. *Brit. zool.* 1. *n.* 98. *t.* 41. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 796. *n.* 1.
Trappe. *Friſch av. t.* 106. *Günth. Neſt. u. Eyer t.* 43. *Bloch Schr. der berl. Naturf.* 3. *p.* 376. *t.* 8. *f.* 2. *Sander Naturf.* II. *p.* 11.

Habitat in Orbe *antiquo a* Syria *et* Graecia *ad* Tatariam, Ruſſiam *et* Sueciam *usque*, *migrans*, *europaearum avium maxima*, *ut* 4 *pedes longitudine aequet*, *in terris cultis varior*, *timida*, *ſolitaria*, *niſi migrationis tempore*, *celerrime currens*, *tardius volans*, *ſeminibus*, *herbis*, *vermibusque victitans*, *viſu audituque acri munita*, *ſegetibus infeſta*, *in fovea excavata ſegetum ſiccarum ova* 2 *pariens anſerinis aequalia*, *ex pallido olivaceo fuſca*, *maculis obſcurioribus*; *caro ſapida.*

Caput *et* collum *cinerea*; dorſum *nigro et ſplendide ferrugineo transverſe ſtriatum*; remiges *nigrae*; abdomen *album*;

bum; cauda *rubro nigroque lineata rectricibus* 18-20 *constans*; pedes *obscuri*; faccus *ad* 7 *aquae librarum capax, a gula ad pectus expansus et pedem aliquando longus, infra linguam patens, pro asservanda aqua.* Mari *ad mandibulam inferiorem utrinque crista* 5 *circiter pollices longa*; feminae *dimidio minori crista nulla, color magis exsoletus*; vertex *fulvus, lineis transversis nigris varius, reliquum* caput *fuscum*; jugulum *cinereum.*

arabs. 2. O. auribus erecto-cristatis.
Otis arabica. *Briss. av.* 5. *p.* 30. *n.* 3.
Lohong ou Outarde huppée d'Arabie. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 52.
Arabian Bustard. *Edw. av. t.* 12. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 801. *n.* 3.
Habitat in Arabia *felici, ad mare* Caspium, *tardae magnitudine, rostro tamen, collo pedibusque longioribus.*
Rostrum *pallide corneum*; irides *fuscae*; occiput *cristatum, nigrum*; frons *albida*; tempora *macula nigra notata*; *reliquum* caput, collum *et* corpus *supra rufum nigro-varium, fere rusticolae instar*; guttur *cinereum, lineis nigris scriptum*; pectus *et* abdomen *alba*; remiges *nigrae, secundariae albo nigroque maculatae, corpori proximae rufae, lineis nigricantibus*; rectrices 2 *intermediae nigricantes, reliquae albae, parumper maculatae, fascia nigra*; pedes *fuscescentes.*

Tetrax. 3. O. capite juguloque laevi. *Fn. suec. n.* 196.
Otis minor, anas campestris vulgo dicta. *Briss. av.* 5. *p.* 24. *n.* 2. *t.* 2. *f.* 1.2.
Anas campestris. *Gesn. av.* 795. *Aldr. orn.* 2. *p.* 96. *Will. orn. p.* 179. *t.* 32. *Raj. av. p.* 59. *n.* 2.
Tetrax. *Bell. av.* 56. *Aldr. orn. l.* 13. *c.* 13.
Petite outarde, ou Cane-petiere. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 40. *Pl. enl. n.* 10. 25.
French Field Duck. *Alb. av.* 3. *t.* 41.
Little Bustard. *Act. angl.* 48. *p.* 502. *t.* 16. *Brit. zool.* 1. *n.* 99. *Act. zool.* 2. *p.* 321. A. *Edw. glean. t.* 251. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 799. *n.* 2.
Habitat in Europa, *potissimum in* Hispania, Gallia, Austria, Russia *australi, rarior in* Anglia *et* Suecia, *in desertis magnae* Tatariae *frequens, una cum tarda* Friderico II Imperatori *jam nota, phasiani colchici magnitudine*, 17 *pollices longa, timida, robusta, polygama, (mas) pugnax,*

celerrime currens, migrans, segete viridi, seminibus, formicis, scarabaeis victitans, Junio 3-5 ova splendide viridia delicata pariens, ex quibus prodeuntes pulli Augusto jam volant; caro nigricans eximia.

Rostrum *ex griseo fuscum*; vertex *niger*, *lituris rufis*; tempora, mentum *et* gula *ex rufo alba*, *maculis exiguis nigricantibus varia*; collum *nigrum*, *torque duplici albo* (*in femina cum corpore supra concolor*); dorsum *et* alae *rufae*, *lituris fuscis*, *lineolis irregularibus nigris*; corpus *subtus cum* alarum *margine exteriore album*; *in femina* pectus *ex rufo album nigro-striatum*; tectrices *caudae lineis nigricantibus variae*; rectrices 18, *intermediae* 4 *quasi ambustae*, *reliquae albae*, *omnes lineis nigricantibus transversis irregularibus variae.*

afra. 4. O. nigra, dorso cinereo, auribus albis.

White-eared Bustard. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 802. *n.* 4. *t.* 69.

Knorrhahn, Knorrhenne. *Kolbe Vorgeb. der gut. Hofn.* 2. *t.* 7. *f.* 2.

Habitat in ericetis aliisque locis infrequentibus capiti bonae spei *vicinis*, 22 *pollices longa*, *appropinquante homine clamitans aliasque aves admonens*, *in dumetis nidificans*, *et* 2 *modo ova pariens*; *caro sapida.*

Rostrum pedes*que flavi*; femina *tota*, *exceptis* pectore *et* abdomine, *uti in mare*, *nigris*, *ex nigricante fusca*, *lineolis*, *subtilioribus*, *quam in mare*, *rufis varia*; *mari* vertex *ex nigricante fuscus*, *lineis albis*; capitis *linea utrinque et litura ad aures magna alba*; *reliquum* caput, collum, *et* corpus *subtus nigra*; torques *et area* alarum *magna alba*; cauda 5 *pollices circiter longa*, *paulisper rotundata*, rectricum 14 *colore in cinereum vergente*; ungues *nigri.*

bengalensis. 5. O. nigra, area oculorum fusca, dorso, uropygio caudaque splendide fuscis.

Pluvialis bengalensis major. *Briss. av.* 5. *p.* 82. *n.* 13.

Churge ou outarde moyenne des Indes. *Buff. hist. nat. desois.* 2. *p.* 56.

Indian Bustard. *Edw. glean. t.* 250. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 804. *n.* 5.

Habitat in Bengala, 33 *pollices longa.*

Rostrum pedes*que albidi*; oculi *praegrandes*; irides *avellanae colore*; palpebrae *cinereae*; capitis, colli, *inferioresque* trunci *pennae laxae*, *superiores medio nigrae*; *taenia nigra*,

nigra, *fuſco-maculata*, pectus *circumſcribens*; cauda *nigro-lineata et maculata*; tectrices *alarum albae*; remiges *extus albae*, *apice cinereae*; *ſecundariae albae maculis faſciisque nigris*; ungues *nigri*.

Houbara. 6. O. flavicans, colli pennis albidis nigro-ſtriatis longiſſimis, remigibus maguis nigris, prope medium macula alba notatis.

Hubara. *Shaw it. p.* 252. *t. opp. f.* 1.

Houbara ou petite Outarde huppée d'Afrique. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 59.

Ruffed Buſtard. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 805. *n.* 6.

Habitat in Arabiae *deſertis*, *fruticibus et inſectis victitans*, *volatus varietate et ſtratagematibus accipitrem perſequentem eludens*, *caponis magnitudine*, *ſed longior*, *roſtro ſturni*.

Rhaad. 7. O. occipitis criſta (mari) ex atro caerulea, capite nigro, corpore ſupra alisque flavis, fuſco-maculatis, abdomine albo, cauda fuſceſcente: ſtriis transverſis nigris.

Rhaad. *Shaw it. p.* 255. *t. opp. f.* 2. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 61. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 805. *n.* 7.

Habitat in Arabia, *gregaria et granivora*, *roſtro pedibusque robuſtis*.

indica. 8. O. ſupra ferruginea albo-nigroque undulata ſubtus exalbida, mento albo, vertice, area oculorum et ſtria utrinque capitis nigris. *Miller illuſtr. t.* 33. A. B.

White chinned Buſtard. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 806. *n.* 8.

Habitat in India, *oedicnemi magnitudine*.

Pedes *fuſceſcentes*.

chilenſis. 9. O. capite juguloque laevi, corpore albo, vertice rectricibusque cinereis, remigibus primoribus nigris. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 231.

Habitat in Chili, *tarda major*, *gregaria*, *herbis victitans*, *facile cicuranda*, *ova* 6 *alba pariens*, *anſerinis majora*; *caro gallopavonis carne potior*.

Cauda *brevis*, *rectricibus* 18; pedum *digiti* 4 *craſſiſſimi*, *an vera otis? quod genus ex* America *exulare traditur*, *quamvis* Pennantus *otidem memoret*, *in ſeptentrionali ejus parte prope ſinum* Norton *gregariam*, *timidiſſimam*, *et celerrime currentem*.

95. STRUTHIO.

Roſtrum ſubconicum.
Nares ovatae.
Alae ad volandum ineptae.
Pedes curſorii.

Camelus. 1. Str. pedibus didactylis. *Scop. ann.* I. *n.* 160.
Struthio. *Briſſ. av.* 5. *p.* 3. *t.* I. *f.* I.
Struthio-Camelus. *Bell. av.* 55. *Geſ. av.* 739. *t.* 740. *Aldr. orn.* I. *p.* 587. *t.* 590. 591. *Dodart mém.* 335. *Seb. muſ.* I. *t.* 51. *f.* 6. *Jonſt. av. t.* 21. *Alp. aegypt.* I. *p.* 200.
Autruche. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* I. *p.* 398. *t.* 29. *Pl. enl. n.* 457.
Oſtrich. *Gentlem. Magaz.* 18. *tab. p.* 580. *Raj. av. p.* 36. *n.* I. *Will. orn. p.* 149. *t.* 25. *Alb. av.* 3. *t.* 53.
Black Oſtrich. *Brown Illuſtr. t.* 16. *Lath. ſyn.* III. I. *p.* 6. *n.* I. *t.* 71.
Habitat in Africa *vicinisque inſulis* Aſiae*que partibus, omnium avium maxima*, 8 *pedes longa, et* 6-8 *pedes alta, robuſtiſſima curſu omnibus animalibus antecellens, ut equitatio imperitum et debilem ſuffocet; volare neſcia, vegetabilibus victitans; dura etiam corpora*, e. g. *ferrum utplurimum innocue deglutiens, non tamen concoquens; ova candida laevia, capiti infantis aequalia, ſapidiſſima, teſta etiam ſua ad pocula aliasque ſupellectiles utilia, ad* 50 *usque in arena pariens; juniorum caro ſapida; pellis Arabibus corii vices ſupplet; pennae ornamenti materies, jam romanis militibus.*

Caput *parvum, anſerino aequale*; roſtrum *anſerino ſimile corneum*; irides *avellanae colore*; palpebrae *ciliatae*; caput, collique *pars maxima calva, incarnata, pilis rarioribus hirta*; colli *inferioris et* corporis *pennae laxae nigrae, decompoſitae, radiis diſcretis*; remiges rectrices*que niveae, undulatae, longae, hinc inde margine aut apice nigrae*; ſternum *calloſum*; *ſpuriae* alarum 2; *altera ad alulam, altera in alae apice*; femora *et* hypochondria *denudata*; pedes *robuſti, ex griſeo fuſci*; digiti *baſi connexi; exterior breviſſimus muticus.*

Caſuarius. 2. St. pedibus tridactylis, galea palearibusque nudis.
Caſuarius. *Olear. muſ.* 23. *t.* 13. *f.* 2. *Friſch av. t.* 105. *Briſſ. av.* 5. *p.* 10. *t.* I. *f.* 2.

Caſoar.

Caſoar. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* I. *p.* 464. *Pl. enl. n.* 313.
Emeu, Eme or Caſſowary. *Gentlem. Magaz.* 42. *tab. p.* 472. *Dodart mém.* 377. *Raj. av. p.* 36. *Cluſ. exot.* 97. *t.* 98. *Bont. jav.* 71. *Will. orn. p.* 151. *t.* 25. *Jonſt. av.* 172. *t.* 56. *Aldr. orn.* 3. *p.* 541. *t.* 541. *Alb. av.* 2. *p.* 39. 56. *t.* 60. *J. F. Miller Illuſtr. t.* 14.
Galeated Caſſowary. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 10. *n.* 1. *t.* 72.
Habitat intra zonam torridam Aſiae *orientalis*, $5\frac{1}{2}$ *pedes circiter longa, ferociſſima, ſuis inſtar grunniens, et equi inſtar pedibus calcitrans, ferociſſima, vegetabilibus victitans, quae integra deglutit, ova pariens ex vireſcente cinerea, punctis excavatis viridibus varia, anguſtiora et longiora, quam camelus, ungue intermedio majore feriens, celerrime currens, volare neſcius.*
Roſtrum pedes*que atri, unguibus nigris*; rictus *ampliſſimus*; irides *topazii colore*; palpebrae *ciliatae*; nares *ad apicem fere roſtri*; oculi *magni*; galea *a baſi roſtri ad medium verticis*, 3 *pollices alta, anterius nigricans, ceterum flava*; tempora *cum* collo *calva, rugoſa, rubeſcentia, tinctu caeruleo et purpureo, rarioribus pilis veſtita*; *ad* collum *utrinque carunculae duae pendulae partim rubrae, partim caeruleae*; ſternum, *cui avis quieſcens innititur, calloſum*; pennae *ex fuſceſcente nigrae, laxae*, 2 *utplurimum ex uno ſcapo*; uropygii 14 *pollices longae pendulae*; cauda *nulla*; alae *ſcapis circiter* 5 *nudis obſcuris conſtant*; digiti *unguibus rectis, acuminatis, nigris.*

Rhea. 3. Str. pedibus tridactylis: digito poſtico rotundato. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 232.
Rhea. *Briſſ. av.* 5. *p.* 8. *n.* 1.
Struthio. *Nieremb. nat.* 217. *t.* 218.
Struthio-Camelus americanus. *Raj. av. p.* 36.
Nhandaguacu Braſilienſibus. *Marcgr. braſ.* 190. *Piſ. braſ.* 84. *Will. orn.* 85.
Habitat in America *auſtrali, potiſſimum in vallibus* Andium, *hominis fere altitudine, pedibus ſe defendens, quaecunque obvia deglutiens, muſcis praeſertim victitans, ſibilo pullis acclamans, in nido, in terra excavato* 40-60 *ova ſapidiſſima*, 2 *libras laticis continentia pariens:* Pennae *incolis ornamento et umbraculis inſerviunt.*
Caput *parvum, rotundum, pennatum*; roſtrum *breve, fere anatis*; oculi *nigri*; palpebrae *ciliatae*; collum *pedes* 2, *et* 8 *pollices longum*; alae *volatui ineptae*; dorſum remigesque *ex atro cinereae*; *reliquum* corpus *albidum*, *ut tamen*

tamen detur varietas tota nigra, alia tota alba; caudae *loco uropygii pennae elongatae*; pedes *collo aequales*; digiti *tres anteriores, et posterioris vestigium*; *an mycteriae affinis?*

97. DIDUS. *Rostrum* medio coarctatum rugis duabus transversis: utriusque mandibulae apice inflexo.

Nares obliquae margini medii rostri propinquae.

Facies ultra oculos nuda.

Pedes breves, crassi, fissi.

Alae ad volandum ineptae.

Cauda nulla.

ineptus. 1. D. niger, albido-nebulosus, pedibus tetradactylis.

Didus. *Syst. nat.* XII. 1. *p.* 267. *n.* 1.
Struthio cucullatus. *Syst. nat.* X. *p.* 155.
Raphus. *Briss. av.* 5. *p.* 14. *n.* 1.
Cygnus cucullatus. *Nieremb. nat.* 231.
Gallus gallinaceus peregrinus. *Clus. exot.* 99. *t.* 10. *Olear. mus.* 23. *t.* 13. *f.* 5.
Dronte. *Bont. jav.* 70. *Buff. hist. nat. des ois.* 1. *p.* 480.
Dod-aersen or Valgh-Vogel. *Herbert it. p.* 382. *t.* 383.
Dodo. *Raj. av. p.* 37. *n.* 8. *Will. orn. p.* 153. *t.* 27. *Edw. glean. t.* 294.
Hooded Dodo. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 1. *t.* 70.

Habitat in insulis Franciae *et* Bourbon, *cygno major, et* 3 *fere pedes longus, lente ingrediens; caro edulis.*

Rostrum *robustum ingens caerulescens, macula rubra, mandibulae superioris apice flavicante*; rictus *amplissimus*; irides *albidae*; plumae *molles*; abdomen *albidum*; caput *ingens, nigro quasi pileo tectum*; alae *brevissimae, ex flavicante cinereae*; uropygii *pennae crispae, erectae, coloris in flavum vergentis*; pedes *flavicantes, unguibus nullis.*

solitarius. 2. D. ex griseo et fusco varius, pedibus tetradactylis.

Solitaire. *Buff. hist. nat. des ois.* 1. *p.* 485. *Leguat it.* 1. *p.* 98.
Solitary Dodo. *Lath. syn.* III. 1. *p.* 3. *n.* 2.

Habitat

Habitat ſolitarius in inſula Rodriguez, 25 *libras pondere aequans, gallopavoni, roſtro potiſſimum et pedibus ſatis affinis, quamvis altior; junior ſtupidus; ex palmae foliis in locis abditis nidum ſesquipedem craſſum ſtruens, ovumque unicum pariens, anſerino majus, mare feminam incubantem ſollicite cuſtodiente.*

Oculi *nigri, vivaces*; alae *ſpuriae tubere rotundo terminatae*; alae *ipſae rotundatae, tectricibus ſolis veſtitae*; femina *ſpecioſior, ad utrumque pectoris latus tubere albo munita, mammas aemulante.*

nazarenus. 3. D. niger, pedibus tridactylis.
Oiſeau de Nazareth, et Oiſeau de nauſée. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 1. *p.* 485. *Cauche Madag. p.* 130.
Nazarene Dodo. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 4. *n.* 3.
Habitat in inſulae Franciae *ſilvis, cygno major, nidum ex foliis ſiccoque gramine in terra ſtruens, et ovum unum album pariens.*
Roſtrum *ingens*; corpus *lanugine potius, quam pennis tectum*; uropygii *pennae erectae, criſpatae*; pedes *longi, ſquamati.*

98. PAVO. *Caput* pennis revolutis criſtatum.

Roſtrum convexum, robuſtum.

Nares amplae.

Pennae uropygii elongatae, latae, expanſiles, ocellatae.

criſtatus. 1. P. capite criſta compreſſa, calcaribus ſolitariis. *Fn. ſuec.* 197. *Scop. ann.* 1. *n.* 162. *Brünn. orn. p.* 58. *Kram. el. p.* 355.
Pavo. *Geſn. av.* 656. *Aldrov. orn.* 2. *p.* 1. *t.* 9. 10. *Jonſt. av.* 56. *t.* 22. *Briſſ. av.* 1. *p.* 281. *n.* 7. *t.* 27.
Paon. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 288. *t.* 10. *Pl. enl. n.* 433. 434.
Peacock. *Raj. av. p.* 51. *n.* 2. *p.* 183. *n.* 18. *Will. orn. p.* 158. *t.* 27. *Sloan. jam. p.* 302. *n.* 23. *Brown jam. p.* 470.
Creſted Peacock. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 668. *n.* 1.
Pfau. *Friſch av. t.* 118. *Bloch Beſch. der berl. Naturf.* 4. *p.* 605. *Günth. Neſt. u. Eyer t.* 22.

β) Pavo varius. *Briſſ. av.* 1. *p.* 288. A.
Paon panaché. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 327.
Bunter Pfau. *Friſch av. t.* 119.

γ) Pavo albus. *Briſſ. av.* I. *p.* 288. B.
Paon blanc. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 323.
White Peacock. *Raj. av. p.* 51, *n.* 2.
Weiſſer Pfau. *Friſch av. t.* 120.
Vincentio jam et Alberto M. *nota varietas.*
Habitat in Africa *et* Aſia, *potiſſimum in* India, 3 *pedes et* 8 *pollices circiter longus, in altis pernoctans, volucrum facile pulcerrimus, miſere ejulans, vindex, pertinax, ſuperbus, ſambuci floribus occidendus, tritico, hordeo, piſis victitans, dum pullus, etiam farina, gryllis, lepidopteris; in loco abſcondito ova* 5-6 *ex griſeo alba ovis gallopavonis aequalia pariens, ex quibus poſt* 27-30 *dies prodeunt pulli, tertio demum anno omni formae elegantia conſpicui; caro, juniorum praeſertim, edulis.*

Roſtrum pedes*que fuſci*; irides *flavae*; criſta *viridi aurea, ex* 24 *pennis, apice demum barbatis, ſcapo albidis conſtans; linea ſuperciliaris ut altera infra oculos alba*; caput, collum, pectus, dorſum *et* uropygium *viridi-aurea*; *pennis dorſi imbricatis, aeneo quoque ſplendore relucentibus; pennarum uropygii nonnullae* $4\frac{1}{2}$ *pedes longae*; rectrices *ex griſeo fuſcae* 18, $1\frac{1}{2}$ *pedem longae*; pennae *ſcapulares* tectrices*que* alarum *minores ex rufeſcente fuſcae, nigro variae; mediae caeruleae, nitore viridi-aureo; majores cum alis ſpuriis rufae*; remiges *rufae, nonnullae ex rufo, nigricante et viridi variae*; abdomen *et* criſſum *ex vireſcente nigra*; femora *flavicantia.*

Feminae *calcar nullum, criſta brevior*; uropygii *pennae caudae tectricibus non longiores, ſtatura et elegantia minor, ut tamen aliquando* (*Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 672. *t.* 60.) *marem ſimulet; irides plumbeae, roſtrum pectorisque fimbria alba, collum viride, reliquum corpus et alae ex cinereo fuſcae.*

bicalcaratus. 2. P. fuſcus capite ſuberiſtato, calcaribus binis.
Pavo chinenſis. *Briſſ. av.* I. *p.* 291. *n.* 9.
Petit paon de Malacca. *Sonner. it.* 2. *p.* 173. *t.* 99.
Eperonnier. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 368. *Pl. enl. n.* 492. 493.
Peacock Pheaſant. *Edw. av. t.* 67. 69. *f.* 1.
Iris Peacock. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 673. *n.* 3.
Habitat in Sina, *phaſiano colchico major.*
Roſtrum *nigricans, mandibula ſuperiore a naribus ad apicem rubra*; irides *flavae*; vertex *niger*; facies *calva, pilis rariuscribus conſperſa*; tempora *alba*; collum *ſplendide fuſcum,*

cum, *lineis atris*; dorſum *ſuperius*, humeri, *et* tectrices *alarum fuſca*, *lituris fuſceſcentibus et flavicantibus*; *ſingulis pennis prope apicem gutta ampla purpureo-aurea notatis*; dorſum *inferius et* uropygium *albo-maculatum*; corpus *ſubtus fuſcum*, *ſtriis transverſis nigris*; remiges *obſcurae*; pedes *cum* unguibus *fuſci*.

tibetanus. 4. P. cinereus nigricante ſtriatus, capite ſubcriſtato, calcaribus binis.

Pavo tibetanus. *Briſſ. av.* I. *p.* 294. *n.* 10. *t.* 28. A. *f.* 2.
Chinquis. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 365.
Thibet Peacock. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 675. *n.* 4.

Habitat in regno Thibet, *numidae magnitudine*, 2 *pedes* 1½ *pollices longus.*

Roſtrum *cinereum*; irides *flavae*; tectrices *alarum*, dorſum *et* uropygium *griſea*, *maculis exiguis albis*, *praeter quas in tectricibus maculae nitente-caeruleae*; remiges *guttis duabus nitente-caeruleis*; pedes *griſei*; ungues *nigricantes.*

muticus. 3. P. capitis criſta ſubulata, calcaribus nullis.

Pavo japonenſis. *Aldr. orn.* 2. *p.* 35. *t.* 33. 34. *Jonſt. av. t.* 23. *f.* 3. *Briſſ. av.* I. *p.* 289. *n.* 8.
Spicifere. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 366.
Japan Peacock. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 672. *n.* 2.

Habitat in Japonia, *criſtati magnitudine.*

Roſtrum *ingens*, pedes*que cinerei*; area *oculorum rubra*; irides *flavae*; verticis *criſta erecta*, 4 *pollices longa*, *ſpicae ſimilis*; color *avis ex caeruleo et viridi miſtus*; capitis *et* colli *vireſcens*, *maculis caeruleis: media ſtria alba*; dorſum *ex vireſcente caeruleum*; pectus *ex caeruleo et viridi-aureo varium*; abdomen, tectrices *alarum*, remiges*que ſecundariae et* femora *cinerea*, *maculis nigris*, *ſtriis in abdomine albis*; remiges *primores virides*, *lineis transverſis nigris*, *verſus apicem flavicantes*, *apice nigrae*; uropygii *pennae badiae*, *ſcapis albis*; feminae, *et huic minori*, abdomen *totum nigrum.*

99. MELEAGRIS. *Roſtrum* breve robuſtum.
Caput carunculis ſpongioſis tectum.
Gula caruncula membranacea longitudinali.
Cauda lata expanſilis.

Gallopavo. 1. M. capite caruncula frontali gularique, maris pectore barbato. *Fn. ſuec.* 198.
Gallopavo ſylveſtris. *Briſſ. av.* 1. *p.* 162. B.
New-England wild Turkey. *Raj. av. p.* 51. *n.* 3. *Alb. av.* 3. *p.* 33. *t.* 35. *Penn. act. angl.* 72. 1. *p.* 67.
American Turkey. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 676. *n.* 1.
β) Gallopavo. *Geſn. av.* 482. *Aldr. orn.* 2. *p.* 35. *t.* 39. 40. *Bell. av.* 60. a. *Jonſt. av.* 58. *t.* 24. *Briſſ. av.* 1. *p.* 158. *n.* 1. *t.* 16.
Dindon. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 132. *t.* 3. *Pl. enl. n.* 97.
Turkey. *Raj. av. p.* 51. *n.* 3. *Will. orn. p.* 159. *t.* 27. *Alb. av.* 3. *t.* 35. *Penn. act. angl.* 72. 1. *p.* 67. *Brit. zool.* 1. *n.* 97.
Indianiſcher Hahn. *Friſch. av. t.* 122.
γ) Gallopavo criſtatus. *Briſſ. av.* 1. *p.* 162. A. *Alb. av.* 2. *p.* 30. *t.* 33.
δ) Gallopavo cupreus, remigibus primoribus niveis cauda exalbida.
ε) Gallopavo totus albus.
Habitat gregarius in America, *praeſertim ſeptentrionali, ferus* $3\frac{1}{2}$ *pedibus longior, interdiu in ſilvis, glandibus victitans, noctu in paludum altiſſimis arboribus quieſcens, grana etiam coleoptera, hemiptera, dum pullus, allium, et urticam comedens; irae tenax, coloris rubri impatiens, fame facile et pluvia laedendus; mas exaeſtuat inflato pectore, expanſa cauda, ſanguinea facie, relaxata frontis caruncula:* femina *primo vere numeroſa parit ova alba, maculis rubeſcentibus aut flavis varia. Caro ſapida.*
Fera avis fere nigra, nitore alias viridi-aeneo, alias viridi, alias purpuraſcente; tectrices *alarum majores nitide fuſcae;* remiges *viridi-aureae, verſus apicem nigrae, apice ipſo albae;* rectrices 18 *fuſcae nigro-maculatae, apice nigrae;* tectrices *caudae albo nigroque undulatae;* barba *pectoris tertio anno excreſcens nigra,* 18 *pollices longa;* pedes *calcari brevi, obtuſo;* carunculae *rubrae.*

PENE-

PENELOPE. *Roſtrum* baſi nudum.
Caput pennis tectum.
Gula nuda.
Cauda rectricibus 12.
Pedes mutici (plerisque).

Satyra. 1. P. capite cornibus geminis, corpore rubro punctis ocellatis.
Meleagris Satyra. *Syſt. nat.* XII. *p.* 269. *n.* 3.
Phaſianus cornutus. *Briſſ. av.* 6. *app. p.* 16.
Napaul ou Faiſan cornu. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 362.
Horned Pheaſant. *Edw. av. t.* 116.
Horned Turkey. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 680. *n.* 2.
Habitat in Bengala, *gallopavone minor.*
Roſtrum *fuſcum*; nares, frons, *et* area *oculorum pennis tenuibus nigris piloſis tecta*; vertex *ruber*; *pone oculos cornu calloſum, caeruleum, retroflexum*; caruncula *gularis caerulea, maculis fulvis varia, ſubtus pilis hirta*; pectus *et* dorſum *ſuperius rubrum*; *reliquum* corpus *cum* cauda *ex rufo fuſcum maculis albis circulo nigro cinctis*; pedes *albidi, calcarati.*

criſtata. 2. P. capite pennis erectis criſtato, temporibus violaceis.
Penelope Jacupema. *Merrem Beytr.* 2. *p.* 42. *t.* 11.
Meleagris criſtata. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 269. *n.* 2.
Gallopavo braſilienſis. *Briſſ. av.* 1. *p.* 162. *n.* 2.
Phaſianus braſilienſis. *Raj. av.* 56. *n.* 2.
Jacupema. *Marcgr. braſ. p.* 198. *Piſ. ind. p.* 81. *Will. orn. p.* 118. *t.* 28. *Jonſt. av. p.* 204. *t.* 58.
Guan or Quan. *Edw. av. t.* 13. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 680. *n.* 3.
Habitat in Braſilia *et* Gujana, *gallinae majoris magnitudine, ob carnem ſapidam frequenter cicuratus, vocem*, Jacu *effutiens.*
Roſtrum *nigrum*; nares *amplae, a medio roſtri ad frontem usque extenſae*; caput *parvum, criſta brevi, nonnunquam (in femina?) vix conſpicua tectum*; oculi *magni*; irides *fulvae*; genae *nudae, atrae aut violaceae*; caruncula *gularis rubra, pilis rarioribus nigris veſtita*; collum *longum*; corpus *productum, nigrum, ſupra vireſcens, ſubtus interdum albo-maculatum*; dorſi *pennae fuſcae, apice nigrae*; tectrices *alarum nitore vireſcente et violaceo*; remiges *purpuraſcentes*; pedes *robuſti, rubri aut ſpadicei.*

3. P.

cumanen-sis. 3. P. nigra, crista remigibusque primis albis.
Crax cumanensis. *Jacquin Beytr. p.* 25. *n.* 19. *t.* 10.
Penelope leucolophos. *Merrem Beytr.* 2. *p.* 47. *t.* 12.
Yacou. *Bajon Cayenn.* 1. *p.* 398. *t.* 5. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 387. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 681. *n.* 4. *t.* 61.
Habitat in Gujana *a fluvio* Orenoko *ad* Oyapoc, *gallopavonis feminae magnitudine, cristam erigens, caudamque expandens, vocem edens gallopavonis pulli, aliamque lugubrem, in terra nidificans, facile cicurandus, et frequenter cicuratus in Cayenna et Gujana.*
Rostrum *et* ungues *nigri*; crista *longa, acuminata*; oculi *fusci*; irides *rufescentes*; area *oculorum nuda, et* caruncula *gularis caerulescentes*; corpus *subtus albo-punctatum*; cauda *longa aequalis*; pedes *rubri.*

Pipile. 4. P. caruncula gulari caerulea, ventre atro, dorso fusco atro-maculato.
Crax Pipile. *Jacquin Beytr. p.* 26. *n.* 20. *t.* 11.
Habitat in Gujana, *cumanensis magnitudine, sibilans.*
Caput *ex nigro et albo varium, breviter cristatum*; *area* oculorum *nigrorum alba*; collum pectus*que nigra*; dorsum *et* alae *ex atro fuscae*; tectrices *tamen alarum et* remiges *primae albae*; pedes *rubri.*

Marail. 5. P. ex virescente nigra, area oculorum nuda pedibusque rubris, gutture subnudo albo-punctato.
Marail. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 390. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 682. *n.* 5.
Faisan verdâtre de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n.* 338.
Maraye. *Bajon Cayenn.* 1. *p.* 383. *t.* 3. 4. *Fermin Surin.* 2. *p.* 149.
Habitat gregaria in silvis Gujanae, *paulisper a mari remotis, noctu in altis arboribus quiescens, quarum fructibus mane et vespere vescitur, junior facillime cicuranda, ingrate clamans, et irritata aut vulnerata altissime, quod si fiat, cutis quoque circa oculos gulaeque nuda colorem mutat, et quasi incrassatur; incubationis tempore, bis in anno, mas et femina soli incedunt in terra aut in fruticibus humilioribus habitant, femina nidum ad arborem humilem trunco proximum struente, et ova 3-4 pariente; caro eximia.*
Rostrum *et* irides *nigricantes*; mentum *et* jugulum *rarioribus pennis vestita*; capitis *pennae in cristam elongatae, quam avis agitata cum toto capite erigit*; alae *breves*; cauda *longa, aequalis, utplurimum pendula, quam tamen erigere,*

erigere, et gallopavonis ad instar expandere potest avis; ungues *uncinati, acuti; arteria aspera (in mare et femina) ad introitum in thoracem extra cavum adscendit, ligamento musculari firmata, parumper descendit, et nunc demum retroflexa et adscendens cavum pectoris et pulmones intrat.*

vocifer-ans. 6. **P.** rostro caeruleſcente, dorso fusco, pectore caeruleo, abdomine ex candicante fusco.

Chacamel. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 394.
Chachalacametl. *Fernand. nov. Hisp. c.* 41. *Raj. av. p.* 163.
Crying Curassaw. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 696. *n.* 4.
Habitat in novae Hispaniae *montosis, continue clamans, cracis magnitudine.*

100. CRAX. *Rostrum* robustum crassum, basi cera obductum in utraque mandibula, aut gibbum.

Nares exiguae in cera.

Pennae caput tegentes revolutae.

Cauda magna, recta.

Alector. 1. Cr. cera flava, corpore nigro, ventre albo. *Scop. ann.* I. *n.* 163.
Crax gujanensis. *Briss. av.* 1. *p.* 298. *n.* 12. *t.* 29.
Gallus indicus. *Dodart mém.* 3. *p.* 223. *t.* 33.
Avis montana. *Nieremb. nat.* 231.
Mitu poranga. *Marcgr. bras.* 195. *Will. orn. p.* 161. *t.* 28. *Raj. av. p.* 52. *n.* 6. 183. *n.* 19.
Moylon. *Laët amer.* 615.
Tepetototl. *Hern. mex.* 35.
Hocco de la Gujane. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 373. *t.* 13. *Pl. enl. n.* 86.
Currelo. *Damp. it.* 2. *part.* 2. *p.* 67. 3. *p.* 1. *p.* 75.
Peacock Phealant of Gujana. *Bancr. Guj. p.* 173.
Quirizai or Curassao. *Brown jam. p.* 470. *Sloan. jam. p.* 302. *t.* 260.
Crested Curassow. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 690. *n.* 1.
[illegible] Hahn. *Frisch av. t.* 121.

β) Cr.

Mitu. β) Cr. cera rubra, corpore nigro, abdomine fuſco. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 270. *n.* 3.
Crax braſilienſis. *Briſſ. av.* 1. *p.* 296. *n.* 11.
Mitu ſ. Mutu. *Marcgr. braſ.* 194. *Raj. av. p.* 54. *n.* 4. *Will. orn. p.* 158. *t.* 28.

γ) Crax caudae apice albo.
Hocco, Faiſan de la Gujane. *Buff. pl. enl. n.* 86.

δ) Crax criſta alba, apice nigra.

rubra. b) Cr. rubra, capite caeruleſcente. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 270. *n.* 2.
Crax peruvianus. *Briſſ. av.* 1. *p.* 305. *n.* 16.
Hocco de Perou. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 375. *t.* 14. *Pl. enl. n.* 123.
Coxilitli. *Raj. av. p.* 57.
Red peruvian Hen. *Alb. av.* 3. *t.* 40.

ε) Crax cervicis lineis alternis albis nigrisque, criſſo albo, cauda fuſca.

ζ) Crax ſpadicea, lineis pallide rufeſcentibus varia.

η) Crax ſpadicea, collo annulis alternis nigris albisque vario. *Lath. ſyn.* II. 2. *t.* 63.

Habitat in Americae *calidioris ſilvis montoſis numeroſa, facile cicuranda, et frequenter etiam in* America *auſtrali inſulisque vicinis ob carnem albam delicioſam cicurata, gallopavonis minoris magnitudine, fructibus victitans, et in arboribus quieſcens, 3 fere pedes longa.*

Roſtrum *atrum aut corneum, a medio cera obtectum, pone oculos producta;* capitis *criſta erecta, nigra, pennis contortis ad 3 pollices longis;* colli *pennae molles ſericeae;* cauda *nigra, ſubrotundata* 11 *pollices longa,* rectricibus 14; pedes *robuſti atri aut fuſci.* Feminae b) roſtrum *cinereum;* irides *rubrae;* criſtae *pennae albae, apice nigrae;* caput *et* cervix *cinerea;* cauda *nigra; reliquum* corpus *ſpadiceum;* pedes *fuſci.*

globicera. 4. Cr. flava, narium gibbere globoſo, corpore nigro caeruleſcente.
Crax curaſſous. *Briſſ. av.* 1. *p.* 300. *n.* 13.
Gallus indicus alius. *Aldr. orn.* 2. *p.* 332.
Gallina indica. *Aldr. orn.* 2. *p.* 333. *Raj. av. p.* 52. *n.* 7.
Other indian Cock. *Will. orn. p.* 162.
Curaſſow Cock and Hen. *Alb. av.* 2. *t.* 31. 32.
Curaſſow Bird. *Edw. glean. t.* 295. *f.* 1.
Globoſe Curaſſaw. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 695. *n.* 2.

Habitat

Habitat in Gujana, *praesertim circa* Curassao, *alectoris magnitudine.*

Rostrum *flavum apice cinereum*; gibber *narium durissimum, flavum*; irides *rubrae*; area *oculorum alba*; capitis *pennae nigrae, apice albae, antrorsum in cristam elongatae*; crissum *album*; pedes *pallide ferruginei.* Feminae rostrum pedes*que cinerei*; caput *et* cervix *nigra*; crista *nigra, fascia alba*; colli *pennae quaedam apice albae*; guttur, pectus, dorsum *et* alae *fusca*; abdomen *superius album, pennis nonnullis apice nigris*; crissum *ex flavescente fuscum*; cauda *nigra, fasciis 4 transversis albis.*

Pauxi. 5. Cr. cera caerulea, narium gibbere cristato, corpore nigricante, abdomine caudaque apice albis.

Crax mexicanus. *Briss. av.* 1. *p.* 302. *n.* 14.
Gallina indica alia. *Aldr. orn.* 2. *p.* 333. 334.
Pauxi. *Hern. mex.* 56. *Nieremb. nat.* 234. *Will. orn. p.* 161. 394. *Raj. av. p.* 52. *n.* 5.
Hocco du Mexique. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 382.
Pierre de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 78.
Cushew Bird. *Edw. glean. t.* 295. *f.* 2. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 696. *n.* 3.

Habitat in nova Hispania, *alectoris magnitudine, at speciosior.*

Rostrum *rubrum*, *feminae fuscum*; *basis* mandibulae *superioris, et gibber durissimum, pygium minus forma et magnitudine mentiens, caeruleum*; corpus *ex nitente purpurascente-caeruleo nigrum*; pedes *rubescentes*; ungues *nigri.*

101. PHASIANUS. *Rostrum* breve, robustum.
Genae cute nuda laevigata.
Pedes (plerisque) calcarati.

Gallus. 1. Ph. caruncula compressa verticis geminaque gulae auribus nudis cauda compressa adscendente. *Fn. suec.* 199.

Coq et Poule sauvage des Indes. *Sonner. it.* 2. *p.* 153. 160. *t.* 94. 95.
Wild Cock. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 698. *n.* 1.

domesticus. *β*) Gallus et Gallina. *Briss. av.* 1. *p.* 166. *n.* 1.
Gallus gallinaceus s. Gallina. *Gesn. av.* 395. 340. *Aldr. orn. l.* 14. *c.* 1.
Coq commun. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 116. *t.* 2. *Pl. enl. n.* 1.

Dunghill

Dunghill Cock and Hen. *Raj. av. p.* 51. *n.* 1. *Will. orn. p.* 154. *t.* 26. *Alb. av.* 3. *t.* 32.

crista-tus. γ) Gallina crista in vertice plumosa densissima. *Raj. av. p.* 51. *Briss. av.* 1. *p.* 169. A.
Coq huppé. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 116. *Pl. enl. n.* 49.
Copped Hen. *Will. orn. p.* 156.

pentada-ctylus. δ) Gallus pedum digitis 5, posterioribus duobus. *Briss. av.* 1. *p.* 169. B.
Coq à cinq doigts. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 124.
Haushahn. *Frisch av. t.* 127. 128.

crispus. ε) Gallus pennis revolutis, remigibus absque radiis. *Briss. av.* 1. *p.* 273. *n.* 3. *t.* 17. *f.* 1.
Gallina crispa. *Aldrov. orn. l.* 14. *p.* 329.
Coq frisé. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 121. *t.* 13. *Fermin Surin.* 2. *p.* 159.
Crisped or Friesland Hen. *Raj. av. p.* 51. *n.* 1. *v.* 4. *Will. orn. p.* 156. *Bancr. Guj. p.* 175.
Straubige Henne. *Frisch av. t.* 135.

ecauda-tus. ζ) Gallina cauda s. uropygio carens. *Raj. av. p.* 51. *n.* 1. *v.* 3.
Gallus persicus, Gallina persica. *Briss. av.* 1. *p.* 174. *n.* 5.
Coq sans croupion ou de Perse. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 122. *t.* 16.
Persian Fowl or Rumkin. *Will. orn. p.* 156. *n.* 6. *t.* 26.
Kluthuhn. *Frisch av. t.* 131. 132.

pumilio. η) Gallus et Gallina pedibus brevissimis. *Briss. av.* 1. *p.* 171. *n.* 2.
Coq nain. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 118. *n.* 5.
Creeper or Dwarf Hen. *Raj. av. p.* 51. *n.* 1. *Will. orn. p.* 156. *t.* 26.
Kruphahn. *Frisch. av. t.* 133. 134.

pusillus. ϑ) Gallus tibiis pennatis, pennis posticis elongatis.
Gallus banticus, Gallina bantica. *Briss. av.* 1. *p.* 172. B.
Coq de Bantam. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 119. *n.* 8.
Bantam Cock and Hen. *Alb. av.* 3. *t.* 33. 34. *Brown jam. p.* 471. *Hayes brit. birds t.* 23.

plumipes. ι) Gallus et gallina pedibus ad digitos usque plumosis. *Briss. av.* 1. *p.* 272. A.
Roughfooted Cock and Hen. *Will. orn. p.* 156.
Kleiner Hahn mit rauchen Füssen. *Frisch av. t.* 136. 137.

turcicus. *κ*) Gallus variegatus. *Briss. av.* 1. *p.* 170. D. *Aldrov. orn.* 2. *p.* 314. 315. 316. *Jonst. av. t.* 30.
Coq de Turquie. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 120. *n.* 11.
Turkisch Cock and Hen. *Will. orn. p.* 156.

patavinus. *λ*) Gallus duplo major. *Briss. av.* 1. *p.* 170. C. *Aldr. orn.* 2. *p.* 310. 311. *Jonst. av. t.* 29.
Coq de Caux ou de Padoue. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 125. 19.
Padua Cock and Hen. *Will. orn. p.* 156.

morio. *μ*) Gallus crista et palearibus nigris. *Briss. av.* 1. *p.* 174. *n.* 4.
Gallina carne nigra. *Bont. jav.* 65.
Coq negre ou de Mozambic. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 122.
Blackamoor Pullet. *Fryer it. p.* 53.
Mozambic Hen. *Will. orn. p.* 387.

niger. *ν*) Gallus persicus, epidermide nigricante. *S. G. Gmelin it.* 3. *p.* 285.

tophaceus. *ξ*) Gallina vertice tuberoso. *Pall. spicil. zool.* 4. *p.* 20. *t.* 3.

lanatus. *ο*) Gallus japonicus pennis pilorum aemulis. *Briss. av.* 1. *p.* 175. *n.* 6. *t.* 17. *f.* 2.
Poule à duvet du Japon. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 121. *Pl. enl. n.* 98.

Habitat in Indiae *silvis*, *in* caspicis *desertis*, Soongoria, Bucharia, Chiwa, *hospitatur innumera varietate colorum, cristae, pedum, pennarum, magnitudinis, a pabulo, climate, vitae genere pendente per omnem terrarum orbem, graminum, cerealiumque inprimis jacta semina legit, ruspando humum lumbricos colligit, pullisque ostendit. Gallus pugnax, superbus celsa crista, erecta falcataque cauda, vigil, plaudentibus lateribus canens gallicinia, rusticorum horologium, parit toto anno nisi capis sociata, modo cibi satis, aqua frigida, arena locusque calidus; deposito ovo ovat et gracillat; calidior dum incubat; in frigidam aquam immissa incubare desinit. Pullities artificialis ventre equino chemicorum, aut furno aegyptiorum peragitur; salax mas* 10 *feminis sufficit; cibis experita ova, caro, juscula senioris; laeditur baccis sambuci; a pediculis liberatur pipere.*

Ferus gallus 2 *pedes et* 4 *pollices longus; corpus tertia parte minus, quam domestici;* caruncula *verticis magna, dentata, splendide rubra;* tempora *et* linea *a crista ad oculos ducta nuda incarnata; pone oculos area margaritacea*

unguis humani forma et magnitudine, breviſſimis pennis tecta; reliqui capitis collique *pennae anguſtae, longae, baſi griſeae, medio nigrae, apice albae, ſcapi apice dilatato, nitente, corneo;* corporis *pennae ſuperiores longae anguſtae, ſubgriſeae, ſtria alba, alteraque nigra notatae;* pectoris *pennae in rufum colorem vergentes;* remiges *nigrae;* tectrices *alarum majores rufae in badium colorem vergentes, ſtriis transverſis nigris et albis;* tectrices *caudae violaceae nitentes;* rectrices *intermediae elongatae, falcatae;* pedes 5 *pollices longi, calcari magno, curvato,* $1\frac{1}{3}$ *pollicem longo armati.*

Gallina fera gallo tertia parte minor caruncułis caret; caput *et* cervix *griſea;* genae *cum* gula *albidae;* cervix *inferior fuſceſcens ſtriis transverſis ex rufo albis;* jugulum, pectus *et* abdomen *fuſca, ſtriis exalbidis;* dorſum, tectrices*que alarum dilute fuſcae;* remiges *intus nigricantes, extus fuſceſcentes maculis griſeis;* cauda *ſubgriſea;* pedes *ſquamati, griſei, loco calcaris nodo muniti.*

Motmot. 2. Ph. fuſcus, ſubtus rufeſcens, cauda cuneata, rectricibus lateralibus rufis.

Phaſianus gujanenſis. *Briſſ. av.* 1. *p.* 270. *n.* 3. *t.* 26. *f.* 2.
Motmot braſilienſis. *Seb. muſ.* 1. *p.* 103. *t.* 67. *f.* 2.
Katrakas-katrakas. *Feuill. per.* 285.
Katraka. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 364.
Faiſan de la Gujane. *Buff. pl. enl. n.* 146.
Momot Pheaſant. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 721. *n.* 8.
Habitat in Braſilia *et* Gujana, 18 *pollices longus.*

Roſtrum *rubeſcens;* capitis *fuſci pennae elongatae rufae;* collum *et* corpus *ſupra cum* remigibus *et* rectricibus *duabus intermediis ex olivaceo fuſcum;* pectus *et* abdomen *ex rufo fuſcum;* pedes *nigricantes;* ungues *fuſci.*

Parraka. 8. Ph. fuſcus ſubtus fulvus, vertice fulvo, cauda aequali.

Parraka. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 394. *Bajon Cayenn.* 1. *p.* 378. *t.* 1. 2. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 722. *n.* 9.
Hannaquaw. *Bancr. Guj. p.* 176.
Habitat in Americae *auſtralis interioris ſilvis inacceſſis, mane et veſpere in campos apertos exſpatians, victum quaeſiturus, qui ſeminibus et herbis, in pullitie inſectis quoque minoribus et vermibus conſtat, facile cicurandus, oriente ſole altiſſimum clamorem edens, incubationis praeſertim tempore, in truncis aut humilioribus arborum ramis nidificans, et bis in anno ova* 4-6 *pariens,* 23 *pollices longus; caro ſapida.*

Roſtrum

Roſtrum *et* pedes *obſcure rufi*; oculi *fuſci*; alae *breves*; rectrices 12, *pedem circiter longae*, *pendulae*; mari *aſpera arteria ad introitum in cavum thoracis trans claviculam ſiniſtram per exteriora carnoſa pectoris deſcendit*, *ſola cute tecta*, *et ſurſum retroflexa trans claviculam dextram pulmonibus immergitur.*

mexicanus. 9. Ph. ex fulveſcente albus, cauda longa viridi.
Hoitlallotl. *Fern. nov. Hiſp. c.* 52. *p.* 25. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 395.
Courier Pheaſant. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 723. *n.* 10.
Habitat in novae Hiſpaniae *calidioribus*, 18 *pollices longus*, *tarde volans*, *celerrime currens.*
Alae *breves*; color *circa caudam niger*, *maculis nonnullis albis.*

criſtatus. 10. Ph. ſupra fuſcus, ſubtus ex rufo albus, criſſo rufo, capite criſtato, area oculorum nuda rubra, caudae cuneatae apice flavo.
Crax fuſcus mexicanus. *Briſſ. av.* 1. *p.* 304. *n.* 15.
Hoactzin. *Raj. av. p.* 163. *Will. orn. p.* 389.
Hoazin. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 385.
Faiſan huppé de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 337.
Creſted Pheaſant. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 720. *n.* 7. *t.* 64.
Habitat in novae Hiſpaniae *et adjacentium arboribus ad aquas naſcentibus*, *ſerpentibus*, *vermibus*, *formicis*, *aliisque inſectis victitans*, *ejulans*, *facile cicurandus*, *pedem et* 10 *pollices longus.*
Roſtrum pedes*que mutici nigri*; criſtae *pennae ex fuſceſcente exalbidae*, *ſubtus nigrae*, *ad* 3 *pollices longae*; pennae *ab occipite ad cervicis infimum poſitae ſtria media longitudinali alba notatae*; tectrices *alarum apice*, alae *margine albae*; remiges *rufae*; cauda 10 *pollices longa.*

colchicus. 3. Ph. rufus, capite caeruleo, cauda cuneata, genis papilloſis.
Scop. ann. 1. *n.* 166. *Brünn. orn. n.* 58. *S. G. Gmelin nov. comm. Petrop.* XV. *p.* 451. *n.* 7. *Olin. uccell. p.* 49. *Nozem. nederl. Vog. t.* 82. 83.
Phaſianus. *Geſn. av.* 62. *Aldr. orn.* 2. *p.* 48. *Briſſ. av.* 1. *p.* 262. *n.* 1.
Faiſan. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 328. *t.* 11. *Pl. enl. n.* 121. 122.
Pheaſant. *Raj. av. p.* 56. *n.* 1. *Will. orn. p.* 163. *t.* 28. *Alb. av.* 1. *t.* 25. 26. *Hayes brit. birds t.* 20.

Common Pheaſant. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 712. *n.* 4.
Faſan. *Friſch av. t.* 123. *Günth. Neſt. u. Eyer t.* 16.

torquatus. β) Ph. torque albo.
Ring Pheaſant. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 715.

varius. γ) Ph. albus et rufo varius. *Briſſ. av.* 1. *p.* 267. *t.* 25. *f.* 3.
Faiſan varié. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 352.
Bunter Faſan. *Friſch av. t.* 124.

albus. δ) Ph. albus maculis quibusdam minutis in collo nigris, in humeris rufis. *Briſſ. av.* 1. *p.* 268.
Weiſser Faſan. *Goetz Naturf.* 16. *p.* 127.

hybrida. ε) Ph. ſuperne rufus ex fuſco et albicante varius, rectricibus nigris, margine albidis. *Briſſ. av.* 1. *p.* 268.
Coquar. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 353. *t.* 12.
Pied Pheaſant. *Hayes brit. birds t.* 21.
Faſanhühner. *Friſch av. t.* 125.

gallopavonis. ζ) Ph. area oculorum nuda rubra, reliquo capite pennato.
Faiſan Dindon. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 160.
Turkey Pheaſant. *Edw. glean. t.* 337.
Habitat in Colchide, *hoſpitatur per omnem* orbem antiquum, 2-3 *pedes longus, pruritus tempore ſupra aures utrinque faſciculo pennaceo aureo, corniculorum aemulo ornatus; volatus brevis; vox fere galli; nidus in terra; ova* 12-15 *gallinaceis minora, perdicinis ſimilia, at pallidiora; caro delicioſa.*
Roſtrum *pallide corneum*; irides *flavae*; genae *rubrae, nigro-punctatae, ſenioribus rugoſae pendulae; a naribus infra oculos producta linea plumoſa ex vireſcente nigra; reliquum* caput *cum* collo *viridi-aureum, nitore violaceo et caeruleo*; collum *inferius*, pectus, dorſum *et* uropygium *nitente-ſpadicea*; remiges *fuſcae, maculis ochroleucis*; abdomen *et* criſſum *alba*; rectrices 18 *faſciis transverſis nigris variae, a* 5-20 *pollices longae*; pedes *obſcuri, calcarati.* Femina *minor, fuſca, griſeo, rufo, et nigricante varia, cauda breviore, genis plumoſis diſtincta; aliquando maris ſpeciem induere fertur.*

Argus. 4. Ph. luteus nigro punctatus, facie rubra, occipite criſtato caeruleo.
Argus or Luen. *Act. angl.* 55. *p.* 88. *t.* 3. *Lond. Magaz.* 1766. *tab. p.* 473. *Gentl. Magaz.* 1768. *tab. p.* 521. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 710. *n.* 3.

Habitat

Habitat in Sina *et* Sumatra, *gallopavonis maris magnitudine, difficillime cicurandus, lucem fugiens, voce lugubri.*

Rostrum *flavescens*; frons *et* gula *summa nuda, granulata, coccinea*; irides *fulvae*; area *oculorum et mystaces atrae*; vertex, occiput, *crista furcata ornatum, et* cervix *caerulea*; guttur, pectus, uropygium *et* tectrices *caudae superiores fulvae, guttis obscuris variae*; dorsum *et* tectrices *alarum atrae, spadiceo variae*; remiges 9 *exteriores ex flavescente fuscae, extus atro-intus albo-maculatae, reliquae* 11 *obscure fuscae, maculis rotundis et oblongis, et extus prope scapos serie ocellorum* 12-15 *variae*; rectrices 14, *a* 12 *pollicibus ad* 3 *pedes longae, fuscae, albo-maculatae*; cauda *cuneata*; crissum *atrum, fusco varium*; pedes *ex virescente cinerei, calcarati. Caro sapidissima.*

pictus. 5. Ph. crista flava, pectore coccineo, remigibus secundariis caeruleis, cauda cuneata. *Amoen. acad.* I. *p.* 282. *t.* 13.
Phasianus aureus sinensis. *Briss. av.* I. *p.* 271. *n.* 4.
Faisan doré de la Chine. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 355. *Pl. enl. n.* 217.
China Pheasant. *Alb. av.* 3. *t.* 36. *Edw. av. t.* 68. 69. *f.* 2. *Hayes brit. birds t.* 22.
Painted Pheasant. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 717. *n.* 5.
Goldfasan. *Goetz Naturf.* 14. *p.* 204. *Gümth. Nest. u. Eyer t.* 24.

Habitat in Sina, *colchico minor*, 2 *pedes* 9½ *pollices longus, facile mansuescens et alieno climati assuescens, ova pariens magis rubra, quam colchicus, cui moribus, victu, habitu similis.*

Rostrum, irides, pedes*que calcarati flavi*; pennae *cristae sericeae, retro pendulae*; genae *nudae incarnatae*; occipitis *pennae fulvae, lineis nigris variae, longae, apice quadratae, in cristam erigendae*; *infra has pennae virides apice subrotundo nigrae*; dorsum *et* uropygium *flava*; tectrices *caudae superiores longae, angustae, coccineae*; tectrices *alarum ex badio et fusco variae*; pennae *scapulares caeruleae*; remiges *fuscae, maculis flavicantibus*; rectrices *ex badio et nigro variae, ad* 23 *pollices longae.* Feminae *minori fuscae flavicante-maculatae* cauda *brevior*, pedes *mutici.*

nycthemerus. 6. Ph. albus, crista abdomineque nigris, cauda cuneata. *Scop. ann.* I. *n.* 167.
Phasianus albus sinensis. *Briss. av.* I. *p.* 277. *n.* 5.

Faisan noir et blanc de la Chine. *Buff. hist. nat. des ois. 2. p. 359.*

Faisan blanc de la Chine. *Buff. pl. enl. n. 123. 124.*

Black and white Chinese Pheasant. *Edw. av. t. 66. Alb. av. 3. t. 37.*

Pencilled Pheasant. *Lath. syn. II. 2. p. 719. n. 6.*

Silberfasan. *Goetz Naturf. 16. p. 122. Günth. Nest. u. Eyer t. 49.*

Habitat cum picto, cui satis affinis, facile pariter mansuescens, in Sina, *colchico major*, $2\frac{1}{2}$ *pedes longus.*

Rostrum *et* irides *flavae*; tempora *cute nuda, carunculata, rubra tecta, supra oculos prolongata*; caput *et* corpus *subtus ex purpurascente nigrum, supra album*; rectrices 2 *intermediae totae albae, reliquae striis obliquis nigris pictae*; pedes *rubri calcaribus albis armati.* Femina *paulo minor, potissimum fusca; subtus alba fusco varia, fasciis transversis nigris*; pedes *mutici.*

superbus. 7. Ph. caruncula rotundata frontis, geminaque subulata gulae, et corpore rubris, cauda cuneata. *Mantiss.* 1771. *p.* 526.

Superb Pheasant. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 709. *n.* 2.

Habitat in Sina.

Rostrum *rubrum*; vertex *viridis*; occipitis *crista plicatilis, caerulea*; cervix *viridis, pennis longis variegatis utrinque exstantibus et retrorsum versis*; corpus *ex rufo, viridi et caeruleo varium*; humeri *virides, albo-maculati*; alae *rubrae*; remiges *primores caeruleae*; cauda *longa, cuneata*; rectrices *ex caeruleo et rubro variae*; tectrices *declinatae, versicolores*; pedes *flavi, mutici.*

7

102. NUMIDA. *Rostrum* robustum breve, basi cera carunculata instructum nares recipiente.

Caput cornutum, *collum*que compressum coloratum nuda.

Cauda brevis, deorsum vergens.

Corpus guttatum.

Meleagris. 1. caruncula ad rictum gemina, plica gulari nulla.
Numida. *Mus. Ad. Fr. 2. p. 27.*

Melea-

Meleagris. *Briſſ. av.* I. *p.* 176. *n.* 1. *t.* 18. *Scop. ann.* I. *n.* 165.
Phaſianus vertice calloſo, temporibus carunculatis. *Syſt. nat.* X. *p.* 158.
Gallina vertice corneo. *Haſſelq. it.* 274.
Gallina africana. *Marcgr. braſ.* 78.
Gallina guineenſis. *Aldr. orn.* 2. *p.* 337. *Worm. muſ.* 297. *t.* 297. *Olear. muſ. t.* 15. *f.* 3.
Peintade. *Dodart mém.* 3. *p.* 79. *t.* 47. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 163. *t.* 4. *Pl. enl. n.* 108.
Guinea Hen or Pintado. *Raj. av. p.* 102. *n.* 17. *p.* 528. *Will. orn. p.* 162. *t.* 26. 27. *Sloan. jam. p.* 302. *Brown jam. p.* 470. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 685. *n.* 1.
Perlhuhn. *Friſch av. t.* 126.

β) Meleagris pectore albo. *Briſſ. av.* I. *p.* 180. A.
Guinea-Hen. *Alb. av.* 2. *t.* 35.
White-breaſted Guinea-Hen. *Brown jam. p.* 470.
Habitat in Africa, *ex hac in alias orbis partes translata, Ariſtoteli jam notiſſima, meleagridis nomine a Clyto ejus diſcipulo fide deſcripta, in romanorum vivariis vulgatiſſima, magno gallo major,* 22 *circiter pollices longa, manſuescens, curſitans ſono frequenti ſcurrulo ingrato, ova pariens plurima, gallinaceis minora et magis rotunda ex rubeſcente alba, obſolete maculata; junioris inprimis caro ſapidiſſima.*
Roſtrum *ex rubeſcente corneum*; caput *caeruleum, verticis tubere conico, compreſſo, ex caeruleſcente rubro*; collum *ſuperius pilis potius, quam pennis tectum, cute ex caeruleſcente cinerea, inferius pennatum in violaceum colorem vergens*; corpus *reliquum varius caeruleſcens aut candidum, quam nigrum albo-guttatum*; pedes *ex griſeo fuſci*; *maris* caruncula *gularis caeruleſcens*, feminae *rubens*.

mitrata. 2. N. caruncula ad rictum gemina, plica gulari longitudinali. *Pall. ſpic. zool.* 4. *p.* 18. *t.* 3. *f.* 1.
Mitred Pintado. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 688. *n.* 2.
Habitat rarior in Madagaſcar *et* Guinea, *meleagridis magnitudine.*
Roſtrum *flaveſcens*; verticis *cum* capiſtro *rubri tuber conicum*; collum *ſuperius nudum, caeruleſcens*; *inferioris pennis*

Ordinis hujus aves, poſtremo genere excepto, in frigidioribus exules, in lege ceremoniali moſaica ſolae purae habebantur et in coenis ſalutares.

pennis transversim undulatis; corpus *nigrum*, *guttis majoribus consperſum*, *quam meleagris*; pedes *nigricantes*.

crisſata. 3. N. caruncula nulla, plica utrinque ad rictum longitudinali. *Pall. spic. zool.* 4. *p.* 15. *t.* 2.
Crested Pintado. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 688. *n.* 3. *t.* 62.
Habitat in Africa, *magnitudine inter perdicem et meleagrin media.*
Rostrum *corneum*; caput *cum* collo *superiore pilis tenellis rarissime tectum*, *obscure caeruleum*; guttur *sanguineum*; frontis *crista reflexa atra*; aurium *foramina magis patula*, *margine magis pilosa*; corporis *pluniae atrae*, *guttis ex caerulco albis*, *milii grano vix minoribus*, *in series dispositis*, *variae*; *lanugo fusca*; remiges *primores totae ex nigro fuscae*; cauda *rotundata*, *subcompressa*, *deflexa*, *major*, *quam meleagridi*, *ex fusco nigra undulata*, *rectricibus* 14; pedes *nigricantes*.

103. TETRAO. *Macula* prope oculos nuda, aut papillosa aut plumis rarius tecta.

* *macula supra oculos nuda*, *pedibus hirsutis*, lagopodes:
† *pedibus tetradactylis:*

Urogallus. 1. T. cauda rotundata, axillis albis. *Fn. suec.* 200. *Scop. ann.* 1. *n.* 169. *Brünn. orn. n.* 194. 195. *Kram. el. p.* 156. *n.* 1.
Urogallus major. *Briss. av.* 1. *p.* 182. *n.* 1.
Urogallus s. Tetrao major. *Gesn. av.* 491. *Aldr. orn.* 2. *p.* 59. *t.* 64. 65.
Grand coq de bruyere ou Tetras. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 191. *t.* 5. *Pl. enl. n.* 73. 74.
Mountain Cock and Hen. *Alb. av.* 2. *t.* 29. 30.
Cock of the Wood. *Raj. av. p.* 53. *n.* 1. *Will. orn. p.* 172. *t.* 30.
Wood Grous. *Penn. tour in Scotl. p.* 79. *t.* 15. 16. *Brit. zool.* 1. *n.* 92. *t.* 40. 41. *Artt. zool.* 2. *p.* 312. A. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 729. *n.* 1.
Auerhahn. *Frisch av. t.* 107. *Georg. it. p.* 172. *Bloch Besch. der berl. Naturf.* 4. *p.* 589. *t.* 18. *f.* 2-5. *Günth. Nest. u. Eyer t.* 8.
Habitat in Europae *frigidioris*, *altioris et* Asiae *septentrionalis sylvosis*, *pinetis*, *paludosis*, *gallopavonis magnitudine*, 2 *pedes et* 9 *pollices longus*, *juniperi*, *vaccinii baccis*, *pinuum aliarumque stirpium seminibus victitans*, *solitarius*,

litarius, nisi pruritus tempore, quo, ab initio Februarii, in arbore tanquam ecstasi correptus, expansa cauda, alis ad pedes demissis, protruso collo, capitis pennis quasi inflatis, altissima voce feminas convocat; femina inter muscos in sicca terra ova parit 8-16 *alba, flavo-maculata, gallinaceis majora, et sola incubat; caro multis aestimata.*

Rostrum *corneum*; macula *supra oculos coccinea*; irides *avellanae colore*; nares *plumis brevibus tectae*; menti gulaeque *pennae nigrae, reliquis longiores*; caput collumque *cinerea, lineis subtilibus transversis nigris picta*; corpus *supra cum* alis *badium, lineis nigricantibus*; pectus *ex nigricante splendide viride*; abdomen crissumque *nigrum, albo varium*; rectrices 18, *utrinque albo-maculatae*; pedes *robusti fusci, digitorum margine pectinato.* Femina *multo minor, vix ultra* 26 *pollices longa*; rostrum *obscurum*; gula *rubra*; caput, collum *et* dorsum *fasciis transversis alternis rubris et nigris*; pectori *maculae paucae albae adspersae*; pectus *inferius totum aurantium*; abdomen *pallide aurantio et nigro maculatum, pennarum apice albo*; humeri *nigri, pennarum margine nigro et pallide spadiceo maculato, apice albis*; cauda *ferruginea, nigro-fasciata, apice alba.*

Phasianellus. 7. T. cauda cuneiformi, capite, collo et corpore supra testaceis nigro-fasciatis. *Syst. nat.* X. *p.* 160.
Hudson's Bay Pheasant Grous. *Forster act. angl.* 63. *p.* 396.
Long-tailed Grous from Hudson's Bay. *Edw. av. t.* 107.
Long-tailed Grous. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 732. *n.* 2.
Sharptailed Grous. *Arct. zool.* 2. 306. *n.* 181.
Coq de bruyere à longue queue de la Baye d'Hudson. *Briss. orn. app.* 9. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 286.

Habitat ad sinum Hudsonis *et in* Virginiae *incultis*, 17 *pollices longus, victitans hieme gemmis betulae et laricis, inter quas degit, aestate baccis variis, voce minus alta, quam urogallus, carne fuscescente, rudi, at succulenta; femina* 9-13 *ova parit.*

Caput, genae, cervix, dorsum, tectrices *caudae*, caudaque *ipsa ex spadiceo et nigro varia*; humeri, tectricesque *alarum ferrugineae, maculis nigris et magnis albis*; remiges *primores nigrae albo-maculatae*; pectus *et* hypochondria *alba, maculis sagittatis nigris*; abdomen *album*; rectrices *laterales albo-maculatae*; digitorum *margo pectinatus*; macula *supra oculos multo minor.*

Tetrix. 2. T. cauda bifurcata, remigibus ſecundariis baſin verſus albis.
Fn. ſuec. 202. *Scop. ann.* 1. *n.* 169. *Brünn. orn. n.* 196. 197. *Kram. el. p.* 356. *n.* 2. *Nozem. nederl. Vog. t.* 85. 86.
Urogallus minor. *Briſſ. av.* 1. *p.* 186. *n.* 2.
Tetrao ſ. Urogallus minor. *Geſn. av.* 494. *Aldr. orn.* 2. *p.* 67. *t.* 68.
Petit Tétras, ou Coq de bruyere à queue fourchue. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 210. *t.* 6. *Pl. enl. n.* 172. 173.
Black Cock, Black Game, or Black Grous. *Brit. zool.* 1. *n.* 93. *t.* 42. *Arct. zool.* 2. *p.* 314. C. *Raj. av. p.* 53. *n.* 2. *Will. orn. p.* 173. *t.* 31. *Albin. av.* 1. *t.* 22. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 733. *n.* 3.
Birkhahn. *Friſch av. t.* 109. *Georg. it. p.* 172. *Günth. Neſt. u. Eyer t.* 34.
β) Tetrix alba. *Blom act. Stockh.* 1785. 3. *n.* 13.
γ) Urogallus minor punctatus. *Briſſ. av.* 1. *p.* 191. A.
Tetrao hybridus. *Fn. ſuec. n.* 201.
Tetrao hybridus, cauda bifurca, ſubtus albo maculata. *Sparrm. muſ. Carlſ. t.* 15.
Spurious Grous. *Arct. zool.* 2. *p.* 314. B.
Habitat in Europae *frigidae et* Sibiriae *ericetis, betuletis, populetis, ſilvoſis, hieme nive ſaepe ſepulta,* 24 *pollices longa, ceraſis piſisque occidenda, mas pugnax, exaeſtuat in campis; obmurmurans erecta cauda tumidisque ſuperciliis ſibilo afflans, moribus ceterum urogallo ſimilis; femina* 6-8 *ova parit ochroleuca lituris maculisque ferrugineis varia, quae dum excludit, odore caret, pullos, uti urogallus, pulicibus educans. Caro ſapida.*
Roſtrum *nigrum*; corpus *ipſum ex ſplendido glauco nigrum*; tectrices *alarum ex atro fuſcae*; remiges 4 *primae nigrae, reliquae baſi albae*; tectrices *alarum interiores totae*, remiges *ſecundariae a baſi ad medium et apice albae*; rectrices *nigrae* 16-18, *intermediae* 8-10 *obtuſae, aequales, breviores tectricibus inferioribus albis*, 4 *utrinque laterales longiores extrorſum falcatae, apice quadratae*; pedes *ex atro fuſci*; digiti *pectinati*. Femina *multo minor*.

nemeſianus. 21. T. cauda rufa nigro-maculata, apice nigra, corpore ex nigro et rufo vario. *Scop. ann.* 1. *p.* 118. *n.* 171.
Tetrao nemeſiani poetae. *Aldr. orn. l.* 13. *c.* 8.
Nemeſian Grous. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 735. *n.* 4.
Statura *tetricis*; remiges *primores fuſcae, latere externo rufis maculis variegato, ſecundariae apice albae*; collum *inferius maculis nigris transverſis*; abdomen *ex rufo nigroque*

groque varium; feminae collum, genae *et* pectus *rufa et immaculata*.

betulinus. 22. T. cauda nigra, maculis nigris transversis varia, uropygio albido nigro-fasciato. *Scop. ann.* I. *p.* 119. *n.* 172.
Urogallus minor. *Aldr. orn. l.* 13. *c.* 9.
Birch Grous *Lath. syn.* II. 2. *p.* 735. *n.* 5.
Corpus *ex nigro et rufo varium*; rostrum pedes*que nigri*; pectus *cinerascens*; remiges *apice albae*; supercilia *non rubra*.

canadensis. 3. T. rectricibus nigris, apice fulvis, lituris duabus albis ad oculos.
Bonasia freti Hudsonis. *Briss. av.* I. *p.* 201. *n.* 6. *et app.* 10. *t.* 20. *f.* 1.
Gélinotte du Canada. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 279. *Pl. enl. n.* 131.
Black and spotted Heathcock. *Edw. av. t.* 118.
Spotted Grous. *Arct. zool.* 2. *p.* 307. *n.* 82. *Forster act. angl.* 62. *p.* 389. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 735. *n.* 6.

Canace. b. T. cauda integra, macula alba pone aures naresque. *Syst. nat.* XII. 1. *p.* 275. *n.* 7.
Bonasia canadensis. *Briss. av.* I. *p.* 203. *t.* 20. *f.* 2.
Gélinotte du Canada. *Buff. pl. enl. n.* 132.
Black and spotted Heathcock. *Edw. av. t.* 71.
Habitat ad sinum Hudsonis *perdicis magnitudine*, $13\frac{1}{2}$ *pollices longus, stupidus, hieme juniperi baccis pinusque conis victitans, in terra nidificans, et ova* 5 *pariens; caro sapida.*
Rostrum *nigrum*; caput, collum, corpus*que supra fasciis transversis nigricantibus et ex griseo fuscis varium*; nares *nigris plumis tectae*; gula, pectus *et* abdomen *nigra, hoc albo maculatum*; pedes *ex griseo fusci*, digitis *pectinatis*, unguibus *griseis*: Femina (b) *minor*, $11\frac{1}{2}$ *pollices longa, supra ex rufo, nigricante et griseo-fusco varia*; guttur *rufum, pennis prope apicem nigricante-fasciatis*; pectoris *rufo et nigricante lineatis apice ex rufo exalbidis*; abdomen *lineis nigricantibus et ex rufo albis varium*; cauda *lineis rufis et nigris picta.*

Lagopus. 4. T. cinereus, digitis hirsutis, remigibus albis, rectricibus nigris apice albis: intermediis albis. *Fn. suec.* 203. *Scop. ann.* I. *n.* 170. *Brünn. orn. n.* 59. *Kram. el. p.* 356. *Fabr. fn. groenl. n.* 80. *Forst. act. angl.* 62. *p.* 390.

Tetrao

Tetrao mutus. *Montin act. ſoc. Lund.* 3. *p.* 55.
Lagopus. *Geſn. av.* 577. *Aldr. orn.* 2. *p.* 143. *t.* 147. *Raj. av. p.* 55. *n.* 5. *Briſſ. av.* 1. *p.* 216. *n.* 12.
Lagopede. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 264. *t.* 9. *Lapeirouſe act. Toloſ.* 1. *p.* 111.
Gélinotte blanche. *Buff. pl. enl. n.* 129. 494.
White Game. *Will. orn. p.* 176. *t.* 32.
Ptarmigan. *Gentl. Magaz.* 1772. *tab. p.* 74. *Penn. tour in Scotl.* 1771. *t.* 16. *f.* 1. *Brit. zool.* 1. *n.* 95. *Act. zool.* 2. *p.* 315. D. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 741. *n.* 10.
Schneehuhn. *Friſch av. t.* 110. 111. *Georg. it. p.* 172.

β) Lagopus varia. *Geſn. av.* 578. *Will. orn.* 127.
Lagopodis tertium genus. *Geſn. av.* 579.

γ) Bonaſia ſcotica. *Briſſ. av.* 1. *p.* 199. *n.* 5. *t.* 22. *f.* 1.
Gélinotte d' Ecoſſe. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 242.

δ) Attagen. *Briſſ. av.* 1. *p.* 209. *n.* 9.
Attagas. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 252.
Red Game, Moorcock or Gorcock. *Raj. av. p.* 54. *n.* 3. *Will. orn. p.* 177. *Alb. av.* 1. *t.* 23. 24.
Red Grous. *Brit. zool.* 1. *n.* 94. *t.* 43. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 746. *n.* 13.

Habitat in Sibiria *et ſeptentrionali atque alpina* Europa, 14-15 *pollices longus, gregarius, ſtupidus, in montium cacuminibus obambulans, ſub nive cuniculos agens, loquax, terrefactus cachinnos edens, inſectis, arborum gemmis, pini turionibus, erica, empetro, rhododendro, montanarum ſtirpium fructibus baccisque victitans, velociter currens, graviter volans, ſolis ventique impatiens; non curandus; ova* 6-8-10 *ſpadiceo-maculata aut ruſeſcentia nigro-maculata in nuda terra pariens; caro junioris gratiſſima.*

Hieme fere totus albus, maris *tamen loris*, roſtro, remigum *primarum ſeptem rachi, et rectricibus, exceptis intermediis nigris; aeſtate* abdomen alae*que modo albae; reliquum* corpus *fuſceſcens aut* (*maribus praeſertim*) *cinereum, maculis faſciisque exiguis atris varium*; caput *et* collum *faſciis latis nigris, ferrugineis* (*qui quidem color in feminis et pullis praedominatur*) *et albis pictum, in mare intermixta rubedine lineis albis interrupta*; pedes *ad ungues nigros, longos, uncinatos usque molliſſimis plumis veſtiti, planta nuda.*

albus. 23. T. aurantius, faſciis atris et lituris albis varius, digitis hirſutis, rectricibus atris apice albis: intermediis totis albis.

Lago-

Lagopede de la Baye d'Hudſon. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 276. *t.* 9.
White Partridge. *Ellis hudſ.* 1. *t.* 1. *Edw. av. t.* 72.
White Grous. *Arct. zool.* 2. *p.* 308. *n.* 183. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 743. *n.* 11.
Habitat gregarius in ſeptentrionalis Americae, Europae *et* Aſiae *ſilvis*, Lagopodi *moribus et externa facie*, *hieme praeſertim multum ſimilis, at major*, 16¼ *pollices longus; veſpere et mane victitans betulae nanae ſeminibus, empetro, vacciniorum aliarumque plantarum montanarum baccis, ſingulis mane, nivem excuſſurus, ſemel recta ſurſum volans, ſociosque voce alta interrupta clamans, medio die ad ſolem apricans, accipitrum injuriis expoſitus, in ſicca terra nuda pariens ova* 9-11, *pulvere quaſi nigro conſperſa. Caro exquiſita.*
Roſtrum *nigrum*; macula *coccinea ſupra oculos feminae multo minor*; abdomen pedesque *albi*; ungues *lati, complanati.*

rupeſtris. 24. T. aurantius, faſciis atris et lituris albis varius, digitis plumoſis, rectricibus atris apice albis: intermediis totis albis, loris nigris.
Rock Grous. *Arct. zool.* 2. *p.* 312. *n.* 184.
Habitat frequentiſſimus in borealibus oris ad ſinum Hudſonis, *in rupibus et laricetis campeſtribus, collo extenſo vocem ſtertentis edens et ſummitatibus betulae victitans, albo tertia parte minor, et carnis ſapore inferior; an vere diſtincta ſpecies?*

lapponicus. 25. T. digitis nudis ſquamatis, linea ſuperciliari coccinea membrana concolore tecta, remigibus primoribus et rectricum apice albis.
Tetrao lagopus. *Montin act. ſoc. Lund. Goth.* 8 *p.* 155. *n.* 1.
Rehuſak. *Arct. zool.* 2. *p.* 316. F.
Habitat in Lapponiae *ſilvis et alpibus, turbatus voce cachinnantis aufugiens*, 13-14 *pariens ova rubeſcentia maculis magnis fuſcis varia, gallinae minoris magnitudine.*
Collum *ferrugineum, nigro-maculatum*; dorſum *et* tectrices *caudae nigrae, virgis ferrugineis*; pectus *inferius et* criſſum *alba*; cauda *nigra*; feminae *flavo-maculatae* pedes *mutici.*

Cupido. 5. T. alis ſuccenturiatis cervicalibus.
Urogallus minor fuſcus, vertice plumis alas imitantibus donato. *Catesb. car.* 3. *p.* 1. *t.* 1.

Attinga

Attinga americana. *Briſſ. av.* 1. *p.* 212. *n.* 10.
Pinnated Grous. *Arct. zool.* 2. *p.* 305. *n.* 180. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 740. *n.* 9.
Habitat gregarius in America *ſeptentrionali, frequentiſſimus in inſula longa, perdice tertia parte minor, glandibus praeſertim victitans; mas, erectis alis ſuccenturiatis oriente ſole per dimidiam horam canit, femina numeroſa parit ova.*;
Roſtrum *nigrum*; irides *avellanae colore*; color *ſpadiceus nigro alboque undulatus; pennae* capitis *in criſtam elongatae*; ala *ſuccenturiata utraque pennis* 5, *quarum longiſſima* 3 *pollices aequat*; remiges *majores nigricantes extus rufo-maculatae*; cauda *ſubtus et faſcia terminali nigra*; digiti *flavi*; feminae *minori alae ſuccenturiatae nullae.*

Umbellus. 6. T. cervicali umbone exſtante.
Attagen Penſylvaniae. *Briſſ. av.* 1. *p.* 214. *n.* 11.
Coq de bruyere à fraiſe. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 281.
Ruffed Heathcock. *Act. angl.* 48. *p.* 499. *t.* 15. *Edw. gleau. t.* 248.
Ruffed Grous. *Arct. zool.* 2. *p.* 301. *n.* 179. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 738. *n.* 8.
Habitat in America *ſeptentrionali, magnitudine inter phaſianum et perdicem media,* 12 *pollices longus, ſeminibus et fructibus, hederae inprimis ſemine victitans; femina* 12-16 *ova media inter folia in terra ſicca parit; mas ut galli more exaeſtuat, ecſtaſi correptus, capitis collique pennis erectis; caro ſapida.*
Roſtrum *ex fuſceſcente corneum*; caput *criſtatum et* corpus *ſupra multiplici colore fuſco et nigro varium, ſubtus ochroleucum*, pectoris *et* hypochondriorum *lunulis paucis nigris*; guttur *ex fulvo fuſcum*; cervicis *pennae longae et laxae, ut erigi poſſint*; tectrices *caudae inferiores fulveſcentes albo-maculatae*; remiges *maculis fuſceſcentibus*; rectrices 18, *lineis faſciaque prope apicem nigra, apice ipſo cinereo*; pedes *albidi*; digiti *incarnati, pectinati.*

togatus. 8. T. pennis axillaribus majoribus nigris azureis.
Bonaſia major canadenſis. *Briſſ. av.* 1. *p.* 207. *n.* 8. *t.* 21. *f.* 1.
Groſſe Gélinotte de Canada. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 281. *Pl. enl. n.* 104.
Shoulder-knot Grous. *Forſter act. angl.* 62. *p.* 393. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 737. *n.* 7.

Habitat

Habitat ad ſinum Hudſonis, 15½ *pollices longus, hieme juniperо, aeſtate baccis victitans; caro alba, ſapida, ſed ſicca.*

Mas feminae ſimilis; roſtrum digitique *nudi fuſci*; caput *et* corpus *ſupra ex rufo, fuſco, nigro et cinereo varium*; guttur *rufum maculis minutis et faſciis fuſcis*; pectoris *pennae laterales, quae ſcapulas ambiunt, alis complicatis longiores, nitentes*; pectus *inferius et* abdomen *lineis fuſcis, rufis et exalbidis varium*; rectrices *faſciis nigris anguſtis* 5-6 *unaque latiore prope apicem, apice ipſo griſeo*; pedes *griſei.*

Bonaſia. 9. T. rectricibus cinereis punctis nigris faſcia nigra: exceptis intermediis duabus. *Fn. ſuec.* 170. *Scop. ann.* 1. *p.* 173. *Brünn. orn. p.* 59. *Kram. el. p.* 356. *n.* 4.
Bonaſia. *Briſſ. av.* 1. *p.* 191. *n.* 3.
Gallina corylorum. *Geſn. av.* 229. *Aldr. orn.* 2. *p.* 80. *t.* 82. *c.* 11.
Gélinotte. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 233. *t.* 7. *Pl. enl. n.* 474. 475.
Haſelhuhn. *Raj. av. p.* 55. *n.* 6. *Will. orn. p.* 175. *t.* 31. *Georg. it. p.* 173.
Hazel Grous. *Arct. zool.* 2. *p.* 317. F. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 744. *n.* 12.

Habitat in Europae *et occidentalis* Sibiriae *coryletis, perdicis circiter magnitudine,* 14 *pollicis longus, baccis, fructibus, praeſertim coryli, betulaeque amentis, his deficientibus juniperi baccis et ſummitatibus, betulae, pinuum &c. gemmis, cicuratus etiam ſeminibus victitans,* 12-15 *ova, columbinis majora, pariens in terra ad coryli radicem, ex quibus poſt* 3 *ſeptimanas prodeunt pulli; caro exquiſita. Fiſtula dulce canit, volucrem dum decipit auceps, terrefactus erigit pennas verticis.*

Roſtrum *breve, nigrum*; caput *ſubcriſtatum*; area *oculorum rugoſa, rubra, feminae minor*; pennae *ad baſin mandibulae ſuperioris nigrae*; caput, collum *et* corpus *ſupra ſtriis transverſis rufis, fuſcis et cinereis varium*; maculae *tres albae utrinque, prima ad narium latus, altera inter roſtrum et oculos, tertia pone oculos*; mentum *et* gula *mari nigra, linea alba circumſcripta*; abdomen *cinereaſcens lunulis nigris*; pedes *cum unguibus griſei.*

canus. 26. T. corpore cano, fuſco undulato; roſtro pedibusque nigris. *Sparrm. muſ. Carlſ. t.* 16.

Habitat

Habitat in Helsingia Sueciae, *Bonasiae affinis.*

Plumae *fere omnes canae apice fuscae*; tectrices *alarum fuscae, extremi apicis macula albida*; crissum *candidum*; cauda *complicata supra ex albo, fusco et cano nebulosa, subtus ad latera fusca, medio autem macula triangulari candida notata.*

Alchata. 11. T. supra varius, rectricibus duabus intermediis duplo longioribus subulatis.

Bonasia pyrenaica. *Briss. av.* I. *p.* 195. *n.* 4. *t.* 19. *f.* 1. 2.
Alchata s. Filacotona. *Gesn. av.* 311. *t.* 307. *Aldr. orn.* 2. *p.* 148. 501. *Charlet. onom.* 77. *t.* 77.
Ganga. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 244. *t.* 8. *Pl. enl. n.* 105. 106.
Partridge of Damascus. *Will. orn. p.* 178. *t.* 29. *Raj. av. p.* 55. *n.* 7.
Kitiwiah or african Lagopus. *Shaw it. tab. p.* 253.
Kata. *Russel Alepp. p.* 64. *t.* 9.
Little Pin-tailed Grous. *Edw. gleam. t.* 249. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 748. *n.* 14.

β) Tetrao senegallus. *Mantiss.* 1771. *p.* 526.
Gélinotte de Sénégal. *Buff. pl. enl. n.* 130.

γ) Tetrao caudatus. *S. G. Gmelin it.* 3. *p.* 93. *t.* 18.

Habitat in Europa *australi*, Africa, Arabia, Syria, Persia, *perdicis magnitudine*, 13½ *pollices longus, carne dura, sicca.*

Supercilia, orbita *oculorum posterius producta, et* gula (*mari*) *nigra*; pectorale *lunatum, latum, fulvum, margine nigrum*; remiges *primores cinereae*; tectrices *ferrugineae, margine albae*; cauda *cuneiformis lutea, fasciis fuscis, apice alba*; pedes *cinerei, posterius nudi*; digiti *margine pectinati*: Femina *supra pallidior et magis variegata, rectricibus intermediis paulo brevioribus.*

Namaqua. 27. T. supra spadiceus, rectricibus duabus intermediis longioribus subulatis.

Namaqua Grous. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 750. *n.* 15.

Habitat in partis Africae, *a* Namaquis *habitatae desertis aridis, gregatim ad fontes volans, potandi causa, seminibus, frumenti quoque, victitans, perdice minor*, 9 *pollices longus, Alchatae affinis.*

Rostrum *glaucum*; caput, collum *et* pectus *cinerea*; *ad* pectus *superius lunula alba, infra hanc latior spadicea, ab hac ad femora tertia ex atro cinerea*; pedes *glauci, posterius nudi, calcarati*; digiti *nigri,*

28. T.

indicus. 28. T. fronte alba; taenia posterius nigra cincta; corpore supra ex flavo rufo, lunulis nigris vario.

Gelinote des Indes. *Sonner. it.* 2. *p.* 164. *t.* 96.

Indian Grous. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 752. *n.* 17.

Habitat in Coromandel, *alchatae magnitudine.*

Rostrum *flavicans*; occipitis *pennae rufescentes*, *linea media longitudinali nigra*; collum *ex rufo griseum*; pectus *spadiceum*; remiges *primores ex fuscescente nigrae*, *secundariae griseae*, *altera parte fasciatae*; abdomen *griseum*, *fasciis transversis nigris*; pedes *fusci.*

arenarius. 29. T. torque, abdomine et crisso atris, rectricibus fusco et griseo fasciatis apice albis, intermediis duabus fulvescentibus. *Pall. nov. comm. Petr.* 19. *p.* 418. *t.* 8. *it.* 3. *p.* 699.

Sand-Grous. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 751. *n.* 16.

Habitat in sabuletis fluctuantibus medio deserto inter Rhymnum *et* Volgam *extensis*, *circaque* Volgam *versus* Astracaniam *late patentibus*, *aliquoties interdiu cum socia femina ad aquam migrans*, *leniter et continenter*, *columbae instar volans*, *et volando stridulam*, *amoenam altamque vocem edens*, *perdice major*, *alchatae affinis*, *ultra* 19 *pollices longus*, *ova pariens columbinis majora ex albo pallida.*

Caput *ex albido cinereum*, gula *ex ferrugineo fulva*, cervix *et* jugulum *ex cano albidum*, *plumis truncatis*, *elasticis*, *nitidis vestitum*, *in* femina *majore praeter* gulam *pallide flavescentia nigro-guttata*; corporis *pennae superiores ex testaceo albidae*, *annulo fusco*, *maculam ovatam lutescentem cingente terminatae*; alae *acutissimae*, *speculo ex luteo fulvescente*; cauda *acuta*; pedes *exiles*, *posterius nudi*; ungues *crassi*, *obtusi*, *nigri.*

†† *pedibus tridactylis.*

paradoxus. 30. T. pedibus tridactylis: digitis hirsutis ad apicem fere connexis. *Pall. it.* 2. *p.* 712. *n.* 25. *t.* 5.

Heteroclitous Grous. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 753. *n.* 18.

Habitat in deserto Tatarico *australiore*, *inter otides et tetraones ambiguus.*

Rostrum *tenuius*, *quam congeneribus*, *mandibula superiore nec fornicata*, *nec inferiorem suscipiente*; caput collumque *canescunt*, gula *tamen fulvescente*, *et macula utrinque colli aurantia*; dorsum *grisco nigroque squamatum*; pectus *ex cinereo rubescente pallidum*; abdomen, hypochon-

chondria *et* criſſum *atra*; alae *maxime elongatae acuminatae, ſubtus albae, ſupra nigro-guttatae.*

* * *cute circa oculos papilloſa, pedibus nudis:*

†) *pedibus maris calcaratis:* Perdices.

Francolinus. 10. T. abdomine gulaque atris, cauda cuneata.
Tetrao orientalis. *Haſſelq. it. p.* 278. *n.* 43.
Francolinus. *Briſſ. av.* I. *p.* 245. *n.* 13. *t.* 23. *f.* 2.
Francolin. *Gentlem. Mag* 42. *tab. p.* 112. *Geſn. av.* 228. *Tournef. it. p.* 158. *t.* 158. *Raj. av. p.* 54. *n.* 4. *Will. orn. p.* 174. *t.* 31. *Olin. ucc. tab. p.* 33. *Edw. glean. t.* 246. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 438. *Pl. enl. n.* 147. 148. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 759. *n.* 6.
Habitat in auſtrali Aſia *atque* Europa, *et in* Africa, *perdicis magnitudine,* 12¼ *pollices longus, ſeminibus victitans, altam, ſibilantem vocem edens, carne exquiſita.*
Supercilia *ſubnuda, ciliis breviſſimis*; remiges 1-4 *breves*; pedes *rubri:* Femina *minor per totum corpus colorem nigricantem et ex ferrugineo flavum intermiſtum habet.*

madagaſcarienſis. 31. T. abdomine nigro, maculis magnis rufis vario, gula alba, rectricibus duabus intermediis rufeſcentibus nigro-faſciatis.
Francolin de l'isle de France. *Sonner. it.* 2. *p.* 166. *t.* 97.
Pintado Partridge. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 761. *n.* 7.
Habitat in Madagaſcar, *hoſpitatur in* Franciae *inſula, ruſi magnitudine.*
Faſcia *duplex utrinque ad latera capitis*; occiput, gutturis pectorisque *nigri ſex maculae*, remigumque *primorum nigrarum ſtrigae albae*; dorſum *rubeſcens*; pedes *rufeſcentes.*

rufus. 12. T. pedibus roſtroque ſanguineis, gula alba cincta faſcia nigra albo-punctata. *Kram. el. p.* 357. *n.* 5.
Tetrao rectricibus cinereis, ſuperiore medietate hinc inde rufis. *Fn. ſuec.* 171.
Perdix graeca. *Briſſ. av.* I. *p.* 241. *n.* 12. *t.* 23. *f.* 1.
Perdix graeca ſ. rufa major. *Raj. av. p.* 57. *n.* 5.
Bartavelle. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 420. *Pl. enl. n.* 231.
Red Partridge. *Alb. av.* I. *p.* 27.
Greek Partridge, or Great red Partridge. *Will. orn. p.* 169.
Greek Partridge. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 767. *n.* 12.
β) Tetrao rufus. *S. G. Gmelin nov. comm. Petrop.* 15. *p.* 448. *t.* 13. *Scop. ann.* I. *n.* 174. *Kram. el. p.* 357. *n.* 5.
Perdix rubra. *Briſſ. av.* I. *p.* 236. *n.* 10.

Perdix

Perdix rufa f. major. *Gesn. av.* 682. *Jonst. av.* 68. *t.* 27.
Perdrix rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 431. *t.* 15. *Pl. enl. n.* 150.
Red legged Partridge. *Raj. av. p.* 57. *n.* 5. *Will. orn. p.* 167. *t.* 29. *Alb. av.* 1. *t.* 29.
Guernsey Partridge. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 768. A.

γ) Perdix rufo alba. *Briss. av.* 1. *p.* 238. A.

δ) Perdix rubra barbarica. *Briss. av.* 1. *p.* 239. *n.* 11.
Perdrix rouge de Barbarie. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 445.
Red legged Partridge from Barbary. *Edw. av. t.* 70.
Barbary Partridge. *Shaw it. p.* 300.

Habitat gregariis in Europae *et* Asiae, *potissimum australis, et* Africae *montanis silvaticis, perdice multo major,* 13 *pollices longus, in arboribus aliquando quiescens, ova sapidissima* 16-18 *alba, maculis exiguis numerosissimis rubris varia in nuda terra infra lapidem ponens, carne delicioſa.*

Pectus *cinereum, rufo interdum tinctum;* cauda *cinerea, vel ex griseo fusca.*

Perdix. 13. T. macula nuda coccinea sub oculis, cauda ferruginea, pectore brunneo, pedibus albidis. *Fn. suec.* 205. *Scop. ann.* 1. *n.* 176. *Brünn. orn. n.* 201. *Kram. el. p.* 357. *n.* 6.
Perdix cinerea. *Aldr. orn.* 2. *p.* 140. *t.* 141. *Jonst. av.* 68. *t.* 27. *f.* 1. *Briss. av.* 1. *p.* 219. *n.* 1.
Perdrix grise. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 401. *Pl. enl. n.* 27.
Common Partridge. *Brit. zool.* 1. *n.* 96. *Arct. zool.* 2. *p.* 319. A. *Raj. av. p.* 57. *n.* 2. *Will. orn. p.* 166. *t.* 28. *Alb. av.* 1. *t.* 27. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 762. *n.* 8.
Feldhuhn. *Frisch av. t.* 114. *Georg. it. p.* 173. *Günth. Nest. u. Eyer t.* 46.

β) Perdix cinereo-alba. *Briss. av.* 1. *p.* 223. A. *Frisch av. t.* 115.
Perdrix grise blanche. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 415.

γ) Perdix tota alba. ~~*Faſt. Teng.*~~

δ) Perdix torque albo.

ε) Perdix brunnea.

ζ) Perdix mento gulaque rufis.

Habitat per familias in Europae Sibiriae*que temperatae agris et pascuis,* 13 *pollices longa, frumento viridi, seminibus, insectis, formicarum praesertim chrysalidibus victitans, utplurimum semel per annum in fovea paucis foliis siccis instrata pariens ova* 15-18, *ex virescente grisea, quibus*

per tres ſeptimanas incubat mater; hiente habitat intra foſſas nivis utraque extremitate apertas.

Pedes *ex virescenti albi, feminae mutici*; area *nuda ſanguinea papilloſa ſub palpebra inferiore pone oculos ducta*; facies *luteſcens*; pileus collum*que cinereo-undulata*; remiges *fuſcae, faſciis ferrugineis*; rectrices 18.

damaſcenus. 32. T. macula nuda coccinea ſub oculis, cauda ferruginea, pectore brunneo, pedibus flavis.

Perdix damaſcena. *Briſſ. av.* 1. *p.* 223.
Petite perdrix griſe. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 417.
Damaſcus Partridge. *Raj. av. p.* 57. *n.* 3. *Will. orn. p.* 167. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 764. *n.* 9.

Migrat gregatim per Europam *mediam, perdici ſatis affinis, at minor, roſtro longiore.*

montanus. 33. T. pedibus roſtroque rubris, gula ex rufeſcente luteſcente.

Perdix montana. *Briſſ. av.* 1. *p.* 224. *n.* 2. *t.* 21. *f.* 2.
Pardrix de montagne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 419. *Pl. enl. n.* 136.
Braunes Feldhuhn. *Friſch av. t.* 114. B.

Habitat, aliquando cum perdice, in Europae *montanis, ejusdem magnitudinis,* $10\frac{3}{4}$ *pollices longus.*

Corpus *ſubtus et* cauda *badia*; rectrices 20.

rubricollis. 34. T. pedibus, roſtro, mento gulaque nudis rubris.

Perdrix rouge d'Afrique. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 444. *Pl. enl. n.* 180.
Red-necked Partridge. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 771. *n.* 13.

Habitat in Africa, 13 *pollices longus.*

Color *fuſcus*; ſupercilia *et* criſtum *alba*; cauda *brevis, expanſa.*

petroſus. 35. T. roſtro pedibusque rubris, corpore fuſco, macula pectoris ferruginea.

Perdrix de roche ou de la Gambia. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 446.
Rufousbreasted Partridge. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 771. *n.* 14.

Habitat in rupeſtribus et montanis ad Gambiam, *rufo minor, cui ſatis affinis, carrendo caudam deorſum flectens; caro exquiſita.*

perlatus. 36. T. pedibus ſuperciliisque rufis, roſtro nigricante, gula alba, corpore fuſco vario.

Perdix chinenſis. *Briſſ. av.* 1. *p.* 234. *n.* 9. *t.* 28. A. *f.* 1.

Tetrao chinenſis. *Osb. it.* 2. *p.* 326.
Perdrix de la Chine. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 446.
Pearled Partridge. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 772. *n.* 15.
β) Perdix roſtro pedibusque fuſcis, ſuperciliis albo nigroque maculatis.
Habitat in Sina, β) *ad* caput bonae ſpei, 12½-13 *pollices longus.*
Faſcia *ocularis nigra, infraocularis alba, maxillae inferioris nigra;* cauda *fuſca, faſciis transverſis et apice nigris.*

capenſis. 37. T. pedibus ſesquicalcaratis rubris, corpore cinereo griſeo-undulato.
Cape-Partridge. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 756. *n.* 1.
Habitat ad caput bonae ſpei, *lagopodis magnitudine,* 19 *pollices longus, hominem non fugiens.*
Roſtrum *ex pallide rubeſcente corneum;* ungues *nigri.*

bicalcaratus. 15. T. pedibus bicalcaratis, ſuperciliis nigris.
Perdix ſenegalenſis. *Briſſ. av.* 1. *p.* 231. *n.* 8. *t.* 24. *f.* 1.
Bis-ergot. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 443.
Perdrix du Sénégal. *Buff. pl. enl. n.* 137.
Senegal Partridge. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 757. *n.* 2.
Habitat ad fluvium Senegal, *rufo paulo major,* 13 *pollices longus.*
Corpus *ex fuſco, muſtelino et exalbido varium;* cauda *muſtelino et fuſco faſciatum;* calcar *utrumque obtuſum.*

zeylonenſis. 38. T. pedibus bicalcaratis, roſtro et area oculorum nuda rubris, cauda rotundata fuſca.
Perdix bicalcarata. *Ind. zool. t.* 14.
Ceylon Partridge. *Lath. ſyn.* II. *p.* 758. *n.* 3.
Habitat in Zeylon.
Mari *caput ex albo et nigro,* feminae *ex cinereo et nigro varium,* pedesque *mutici.*

ſpadiceus. 39. T. pedibus bicalcaratis rubris, roſtro flavo, corpore ſpadiceo.
Perdrix rouge de Madagaſcar. *Sonner. it.* 2. *p.* 169.
Brown african Partridge. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 759. *n.* 4.
Habitat in Madagaſcar, *perdicis magnitudine.*

nudicollis. 40. T. pedibus bicalcaratis et gutture nudo rufis.
Gorge-nue. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 444.
Bare-necked Partridge. *Lath. ſyn.* II. *p.* 759. *n.* 5.

gingicus. 41. T. roſtro nigro, uropygio caudaque ex rufo griſeis nigro variis, ſuperciliis albis.

Perdrix de Gingi. *Sonner. it.* 2. *p.* 167.
Gingi Partridge. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 773. *n.* 16.
Habitat prope Gingi *in* Coromandel, *perdice minor.*
Rectrices *ſingulae macula nigra notatae*; abdomen *album, pennis ſingulis faſcia duplici longitudinali dilute badia notatis*; pedes *ex rufo flavi*; feminae *minori rectrices lineis nigris pictae*; abdomen *rufeſcens*; pedes *ſordide griſei.*

pondicerianus. 42. T. roſtro atro, rectricibus duabus intermediis rufis, numerosis lineis angulatis fuſcis, faſciisque quatuor ochroleucis pictis.

Perdrix de Pondichery. *Sonner. it.* 2. *p.* 165.
Pondichery Partridge. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 774. *n.* 17.
Habitat in Coromandel, *perdicis magnitudine.*
Capitrum *et* gula *flavicans*; nucha *griſea, faſciis nigris*; cervix dorſumque *rufa*, *faſciis albis*; pectus *rufeſcens, nigro-undulatum*; abdomen *album*, *arcubus nigris pictum*; uropygium *griſeum*, *faſciis exalbidis*, *margine utrinque nigrum*; rectrices *ſpadiceae, intus nigro faſciatae.*

naevius. 43. T. pedibus roſtroque rubeſcentibus, corpore ex fuſco, flavicante et fulvo vario.

Perdrix montana mexicana. *Briſſ. av.* 1. *p.* 226. *n.* 3.
Galgulus mexicanus criſtatus. *Briſſ. av.* 2. *p.* 84. *n.* 10.
Ococolin ſeu Perdix montana. *Raj. av. p.* 57. *n.* 1. *Seb. theſ.* 1. *p.* 100. *t.* 64. *f.* 1.
Ococolin. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 489.
Mexican Partridge. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 775. *n.* 19.
Habitat in novae Hiſpaniae *temperatioribus*, *perdice multo major*, 21 *pollices longus*, *carne exquiſita.*

Caput

Tetraonum *pulli utprimum excluſi, cum teſtae non raro adhaerentibus fruſtulis, matrem ſequuntur*; *roſtrum convexum robuſtum*; *caro*, *plurimorum etiam ova ſapida*; lagopodes, perdices *et* coturnices, *roſtro convexo, brevi conveniunt*; lagopodes, *regionum frigidiorum potiſſimum incolae*, *natura ipſa curante contra frigoris injurias muniti*, *nares exiguas in pennis abſconditas*, *linguam apice acutam*, *pedes robuſtos*, *caudam longiorem habent*; perdicibus *et* coturnicibus *ſtatura minor*, *cauda brevis*, *nares ſupra margine calloſo prominente tectae*, *patria ſub caelo temperatiori, et torrido.* Tinamon *Gujanae propria tribus, moribus phaſiano propior*, *roſtro longiore apice obtuſo*, *naribus in medio poſitis*, *victu ampliſſimo*, *gula plumis rarioribus veſtita*, *cauda breviſſima*, *digito poſteriore brevi*, *in curſu inutili*, *unguibus ſubtus concavis gaudet*; *femina in hac tribu mare craſſior*: Coturnicibus *roſtrum longius*, *quam perdicibus.*

Caput *et* collum *fulvum*, *maculis griseis et albis*, vertex, gula *et* hypochondria *maculis nigris*; alae *supra griseae*, *fulvo alboque maculatae*, *subtus cinereae*.

†† *pedibus muticis*, Coturnices.

*) *tetradactylis*.

ferrugineus. 44. T. pedibus rostroque fuscis, corpore subtus dilute spadiceo, supra ex ferrugineo fusco, nuchae cervicisque pennis longioribus apice acutis.
Grande Caille de la Chine. *Sonner. it.* 2. *p.* 171.
Hackled Partridge. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 766. *t.* 66.
Habitat in Sina, 12 *pollices longus*.
Cervicis *pennae erectae umbonem referunt*; remiges *fuscae*, *margine nigro-maculatae*; cauda *ex fusco nigra*.

javanicus. 45. T. pedibus incarnatis, fronte, occipitis macula et abdomine aurantiis, dorso, pectore et cauda cinereis nigro-variis.
Javan Partridge. *Brown illust. p.* 40. *t.* 17. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 775. *n.* 18.
Habitat in insula Java.
Vertex *cinereus*; genae *nigrae linea aurantia circumscriptae*; crissum *rubrum*, *fascia cinerea et nigra varium*.

viridis. 46. T. viridis, pedibus rostroque rubescentibus, area oculorum rubra, alis spadiceis.
Green Partridge. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 777. *n.* 21. *t.* 67.
Magnitudine *inter perdicem et coturnicem medius*, 11½ *pollices longus*; rostrum *apice parumper flexum*; cauda *et* crissum *atra*; digitus *posterior muticus*.

virginianus. 16. T. fascia nigra supra et infra oculos, linea verticali fulva.
Perdix americana. *Briss. av.* 1. *p.* 230. *n.* 7.
American Partridge. *Catesb. Carol.* 3. *t.* 12.
Virginian Partridge. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 777. *n.* 22.
Habitat in Americae *arboribus*, *potissimum silvaticis*, *perdice minor*.
Rostrum *et* torques *niger*; tempora *et* gula *ochroleuca*; vertex, collum, dorsum *et* uropygium *ex rufo fuscum*, *nigro-varium*; pedes, cauda, remigesque *fuscae*; *hae margine rufae*.

marilandus. 17. T. superciliis albis, cervice albo nigroque punctata.
Perdix novae Angliae. *Briss. av.* 1. *p.* 229. *n.* 6.

Perdrix de la nouvelle Angleterre. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 447.
New England Partridge. *Alb. av.* 1. *t.* 28. *Brown jam. p.* 471.
Maryland Partridge. *Arct. zool.* 2. *p.* 318. *n.* 185. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 778. *n.* 23.
Habitat in America *ab* Acadia *ad* Floridam *usque*, *in dumetis potiſſimum et ſepibus*, *et ſi ſaepius turbatur*, *in arboribus*, *migrans*, *mays*, *baccisque victitans*, *perdice minor*, *voce ſibilante bis repetita feminae acclamans*, *fertiliſſimus*, *inſtratis terrae paucis herbis ſiccis* 22-25 *ova alba pariens.*
Roſtrum *nigrum*; caput *et* corpus *ſupra ex rufo fuſcum*, *maculis minutis nigris*; frons, mentum *et* gula *alba lunula nigra terminata*; pectus *et* abdomen *ſordide ochroleuca*, *lunulis nigris*; pedes *fuſci*; feminae *gula luteſcens.*

Kakelik. 47. T. roſtro, palpebris, pedibusque coccineis, pectore cinereo, dorſo albo et cinereo undulato. *Falk it.* 3. *p.* 390.
Habitat gregarius in Bucharia, Chiwa, Songoria, *columbae gutturoſae magnitudine*; *vox Kakerlik.*

caſpius. 48. T. cinereus, ſpadiceo-maculatus, naribus, orbitis et temporibus calvis pedibusque luteis. *S. G. Gmelin it.* 4. *p.* 67. *t.* 10.
Habitat prope Aſtrabat *in* Perſia.

mexicanus. 14. T. pedibus roſtroque ſanguineis, linea ſuperciliari alba.
Coturnix ludoviciana. *Briſſ. av.* 1 *p.* 258. *n.* 20. *t.* 22. *f.* 2.
Colcuicuiltu. *Hern. mex.* 19. *Raj. av. p.* 158. *Will. orn. p.* 399.
Colenicui. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 487.
Caille de la Louiſiane. *Buff. pl. enl. n.* 149.
Louiſiane Quail. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 785. *n.* 27.
Americaniſches Haſelhuhn. *Friſch av. t.* 113.
Habitat in Luiſiana, nova Hiſpania, *coturnicis magnitudine*, 8 *pollices longus.*
Roſtrum *et* pedes *cum* unguibus *rubri*; capitis *pennae nigrae*, *apice badiae*; gula *alba*; cervix *ex badio*, *nigro et albo varia*; corpus *ſupra cum* uropygio *et* alis *badium*, *nigro undulatum*, *ſubtus exalbidum ſtriis nigricantibus*; rectrices 2 *intermediae badiae lineolis nigris pictae*, *reliquae cinereae.*

falklandicus. 49. T. maculis ſtriisque curvatis fuſcis varius, ſubtus albus, roſtro plumbeo, pedibus fuſcis, temporibus albo-maculatis.

Caille

Caille des isles Malouines. *Buff. hist. nat. des oif. 2. p. 477. Pl. enl. n. 222.*
Malouine Quail. *Lath. fyn.* II. 2. *p.* 786. *n.* 28.
Habitat in insulis Falkland, *coturnicis magnitudine et longitudine.*
Pennae corporis *superiores fuscescentes, medio fuscae, versus apicem lineis* 2-3 *curvis notatae*; mentum, guttur *et* pectus *ex fuscescente flavum, fusco varium*; remiges *atrae*; cauda *fusca, fasciis dilutioribus.*

novae Hispaniae. 50. T. pedibus rostroque nigris, capite cristato colloque albo et nigro variis, corpore remigibusque fulvis, his apice albis.
Coturnix major mexicana. *Briss. av.* I. *p.* 257. *n.* 19.
Grand Colin. *Buff. hist. nat. des oif.* 2. *p.* 485.
Mexican Quail. *Lath. fyn.* II. 2. *p.* 786. *n.* 29.
Habitat in nova Hispania, *coturnice major.*

Coyolcos. 51. T. pedibus fulvis, vertice colloque albo et nigro fasciatis, corpore supra fulvo albo vario.
Coturnix mexicana. *Briss. av.* I. *p.* 256. *n.* 18.
Coyolcozque seu Coli sonalis. *Raj. av. p.* 158. *Will. orn. p.* 393.
Coyolcos. *Buff. hist. nat. des. oif.* 2. *p.* 486.
Lesser mexican Quail. *Lath. fyn.* II. 2. *p.* 786. *n.* 30.
Habitat in novae Hispaniae *campis.*
Oculi *nigri.*

Suscitator. 52. T. ex flavicante, rufo, nigro et griseo varius, rostro longiore.
Coturnix javensis. *Briss. av.* I. *p.* 251. *n.* 15.
Coturnix indica Bontii. *Raj. av. p.* 58. *n.* 7. *Will. orn. p.* 171. *t.* 29.
Réveil-matin ou Caille de Java. *Buff. hist. nat. des oif.* 2. *p.* 479.
Noisy Quail. *Lath. fyn.* II. 2. *p.* 787. *n.* 31.
Habitat in insulae Javae *silvis, coturnici satis similis, ejus more per intervalla, at vocem potius ardeae stellaris edens, turturis magnitudine, frigoris impatiens, facile cicurandus et frequenter cicuratus, oriente sole sonorus: Mas pugnacissimus.*

striatus. 53. T. pedibus rufescentibus, superciliis albis, rostro, gula, pectore inferiore et abdomine nigris albo-guttatis.

Grande Caille de Madagaſcar. *Sonner. it.* 2. *p.* 169. *t.* 98.
Madagaſcar Quail. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 788. *n.* 32.
Habitat in Madagaſcar, *coturnice duplo major.*
Color *ſupra ex fuſceſcente rufus*; vertice dorſoque *ſtriis albis pictо, hoc etiam faſciis transverſis nigris vario*; linea *a rictu incipiens, ſuperciliis pene parallela, alba*; pectus *ſuperius badium*; hypochondriorum *pennae longae anguſtae, badiae*; remiges *ſordide fuſcae*; *ſecundariae nigrae, faſciis flavicantibus*; cauda *nigra, lineis ochroleucis.*

griſeus. 54. T. pedibus roſtroque nigris, corpore dilute et ſordide griſeo, nigro-faſciato.
Caille brune de Madagaſcar. *Sonner. it.* 2. *p.* 171.
Grey throated Quail. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 788. *n.* 33.
Habitat in Madagaſcar, *coturnicis magnitudine.*
Vertex *et* cervix *ex nigro et rufo varia*; gula *dilute ſordideque griſea*; *pennae* corporis *inferiores ſingulae faſciis duabus nigris margini parallelis*; alae *fuſcae.*

coromandelicus. 55. T. capite nigro; vertice faſciaque oculari ex rufo flavis, gula alba ſtria nigra circumſcripta, corpore ſtriato, remigibus fuſcis.
Petite caille de Gingi. *Sonner. it.* 2. *p.* 172.
Coromandel Quail. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 789. *n.* 34.
Habitat in Coromandel, *coturnice tertia parte minor.*
Corpus *ſubtus faſcia longitudinali angulata nigra notatum, pennis ex rubeſcente flavis, nigro ſtriatis, ſingulis ſtriis margine albis, (feminae juguli pennae albo ſtriatae, maculis ad latera duabus rotundis, abdominis faſciis duabus nigris)*; cervicis *pennae rufeſcentes, ſtria longitudinali flavicante ad latera nigra*; *pennae* corporis *ſuperiores ex rufo badiae, ſtria flavicante lineis ejusdem coloris decuſſata, nigro-marginata.*

novae Guineae. 56. T. fuſcus, pedibus ſubgriſeis, remigibus nigris, tectricibus alarum obſolete flavis.
Caille de la nouvelle Guinée. *Sonner. it. p.* 170. *t.* 105.
New Guinea Quail. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 789. *n.* 35.
Habitat in nova Guinea, *coturnice dimidio minor.*
Irides *ſubgriſeae*; *color* capitis *et* abdominis *ſplendidior.*

manillenſis. 57. T. ſupra niger, pedibus roſtroque atris, gula alba, pectore griſeo, nigro-maculato, abdomine flavo nigro-faſciato.
Petite caille de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p.* 54. *t.* 24.
Manilla Quail. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 790. *n.* 36.

Habitat

Habitat in insula Manilla, *fringillae domesticae magnitudine, 4 pollices longus.*

Alae *lineis griseis insignitae*; hypochondria *rufo-tincta.*

cristatus. 18. T. crista dependente, gulaque fulvis.

Coturnix mexicana cristata. *Briss. av.* 1. *p.* 260. *n.* 21. *t.* 35. *f.* 2.

Quauhtzoneeolin. *Hern. mex.* 22. *Raj. av. p.* 158. *Will. orn. p.* 393.

Zonécolin. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 485.

Caille huppée du Mexique. *Buff. pl. enl. n.* 126.

Crested Quail. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 784. *n.* 26.

Habitat in Guiana *et* nova Hispania, *coturnicis magnitudine*, $6\frac{3}{4}$ *pollices longus.*

Rostrum, remiges, pedes*que fusci*; crista *angusta pollicem longa*, vertex mentum*que fulva*; corpus *reliquum ex rufo, fusco, nigro, et sordide ochroleuco varium*; cauda *ex fusco et griseo varia.*

sinensis. 19. T. corpore griseo-maculato, jugulo nigro arcu albo.

Coturnix philippensis. *Briss. av.* 1. *p.* 254. *n.* 17. *t.* 25. *f.* 1.

Fraise ou Caille de la Chine. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 478.

Caille des Philippines. *Buff. pl. enl. n.* 126.

Chinese Quail. *Edw. glean. t.* 247. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 783. *n.* 25.

Habitat in Sina *et insulis* Philippinis, 4 *pollices modo longus; vivus portatur hieme a Sinensibus, ut manus calefaciant; caro eximia; mas multo major femina, et pugnax.*

Rostrum *nigrum*; corpus *supra ex nigricante et fuscescente varium*; genae jugulum*que alba*; pectus *fascia nigra a jugulo seclusum, cinereum, maculis nonnullis badiis*; abdomen, crissum, *et brevissima* cauda *badia*; remiges *fuscescentes*; pedes *flavi*; unguibus *fuscis.*

Coturnix. 20. T. corpore griseo-maculato, superciliis albis, rectricum margine lunulaque ferruginea. *Fn. suec.* 206. *Scop. ann.* 1. *n.* 176. *Brünn. orn. n.* 202. *Kram. el. p.* 357. *n.* 7. *Nozem. nederl. Vogel t.* 73.

Tetrao israëlitarum. *Hasselq. it. p.* 279. *n.* 44.

Coturnix. *Gesn. av.* 353. *Aldr. orn.* 2. *p.* 150. *t.* 153. *Jonst. av.* 69. *t.* 28. *Briss. av.* 1. *p.* 247. *n.* 14.

Caille. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 449. *t.* 16. *Pl. enl. n.* 170.

Quail.

Quail. *Brit. zool.* 1. *n.* 97. *Arct. zool.* 2. *p.* 320. B. *Raj. av. p.* 58. *n.* 6. *Will. orn. p.* 169. *t.* 29. *Alb. av.* 1. *t.* 30. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 779. *n.* 24.
Wachtel. *Frisch av. t.* 117. *Georg. it. p.* 173. *Günth. Nest. u. Eyer t.* 35.

β) Coturnix major. *Briss. av.* 1. *p.* 251. A.
Chrokiel ou grande Caille de Pologne. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 476.

γ) Coturnix tota alba.

Habitat per omnem orbem antiquum, *gregatim migrans, vere boream, autumno austrum versus*, $7\frac{1}{2}$ *pollices longa, frumento victitans, tota nocte intercepta voce clamitans, semel in anno perdicis more nidificans, ovaque pariens* 6-7 *albida, maculis ferrugineis irregularibus varia; mas pugnax ludi gratia eum in finem, et avis generatim pariter viva ad calefaciendas manus a Sinensibus adhibita; caro sapida, hellebori seminibus pastae convulsiones ciere fertur.*

Rostrum *atrum*; caput *nigrum, rufo varium; per medium* verticem *et* cervicem *stria flavicans*; dorsi *pennae ex ferrugineo fuscae, mustelino et griseo variae, stria rachidis longitudinali media flavicante*; corpus *subtus sordide ochroleucum*; jugulum *et* pectus *rufescentia maculis* (*in mare*) *nigricantibus paucis*; remiges *ex griseo fuscae, extus fasciis rufis*; rectrices 12 *lineis nigris et rufescentibus*; pedes *fuscescentes.*

* * *pedibus tridactylis.*

gibraltaricus. 58. T. pedibus pallidis, rostro nigro, remigibus caudaque atris.
Gibraltar Quail. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 790. *n.* 37.
Habitat circa Gibraltar, $6\frac{1}{3}$ *pollices longus.*
Vertex *fuscus, margine albo cinctus*; dorsum *fuscum nigro lineatum*; tectrices *alarum ferrugineae apice albae, media macula nigra, annulo albo cincta*; mentum *et* gula *nigro et exalbido lineata*; pectoris *pennae albae macula nigra, medio ferrugineae*; cauda *margine alba, striis nigris fuscisque picta.*

andalusicus. 59. T. rufus nigro-varius, subtus ex rufescente albus, pedibus rostroque incarnatis.
Andalusian Quail. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 791. *n.* 38. *tab. in rubr.*
Habitat in Andalusia.
Jugulo pectoriq*ue tinctus flavus intermistus*; remiges *atrae.*

60. T.

nigricollis. 60. T. corpore supra ex cinereo, rufo et nigro vario, subtus, pedibus roſtroque cinereis, mento et gutture nigris, remigibus fuſcis.

Coturnix madagaſcarienſis. *Briſſ. av.* I. *p.* 252. *n.* 16. *t.* 24 *f.* 2.

Caille de Madagaſcar. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 479. *Pl. enl. n.* 171.

Blacknecked Quail. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 791. *n.* 39.

Habitat in Madagaſcar, *coturnicis magnitudine*, 6½ *pollices longus.*

Caput *ſupra et lateraliter*, *cum* colli *lateribus ex albo nigroque varium.*

luzonienſis. 61. T. capite, cervice et gula ex albo nigroque variis, jugulo et pectore badiis, abdomine flaveſcente, pedibus roſtroque dilute griſeis.

Caille de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p.* 54. *t.* 23.

Luzonian Quail. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 792. *n.* 40.

Habitat in inſula Manilla, *coturnice tertia parte minor.*

Dorſum *ex nigricante griſeum*; remiges *griſeae*; *minores verſus apicem flavae*, *macula in flavedine nigra rotunda ſemicirculo badio cincta.*

**** area circa oculus plumis rarioribus tecta*, *pedibus nudis muticis tetradactylis:* Tinamou.

gujanenſis. 62. T. pedibus roſtroque fuſcis, dorſo ex cinereo fuſco lituris nigricantibus vario, gula cinerea, abdomine ex pallide aurantio fuſco.

Tocro ou Perdrix de la Guayne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 513.

Partridge of Gujana. *Bancr. Guj. p.* 177. *Lath. ſyn.* II. *p.* 776. *n.* 20.

Habitat in Cayenna *et* Gujana, *perdicis magnitudine*, 11 *pollices longus*, *obſcurus adhuc*, *et medius inter perdices et tinamos.*

Verrucae *rubrae circa oculos*; faſcia *ocularis rufeſcens*; plumae *ſupra ex rufo fuſcae*; pectus *ex cinereo fuſcum*, *lineis obſoletioribus*; remiges *extus rufo-maculatae.*

major. 63. T. pedibus ex flavicante fuſcis, roſtro nigro, vertice rufo, corpore olivaceo, maculis dorſi caudaeque atris.

Perdix braſilienſis. *Briſſ. av.* I. *p.* 227. *n.* 4.

Macucagua. *Marcgr. braſ.* 213. *Piſ. braſ.* 88. *Raj. av. p.* 53. *n.* 9. *Will. orn. p.* 163. *t.* 26.

Magoua.

Magoua. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 507. *t.* 24.
Tinamou de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 476.
Groſſe Perdrix de la Gujane. *Bajon Cayenn.* 2. *p.* 269.
Grande Perdrix. *Ferm. Surin.* 2. *p.* 188.
Great Tinamou. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 724. 1.
Habitat in Americae *auſtralis*, *praeſertim* Cayennae *et* Gujanae *ſilvis*, *in arborum ramis inferioribus*, 2-3 *pedes a terra elatis quieſcens*, 18 *pollices longus*, *vermibus*, *inſectis*, *ſeminibus*, *fructibusque victitans*, *bis in anno ad truncum magnae arboris nidificans*, *et* 12-15 *ova*, *gallinaceis aequalia*, *viridia*, *ſapida pariens*, *vox alta ſiſtulans*, *oriente et occidente ſole frequentiſſima*; *caro exquiſita.*
Abdominis *parti ſuperiori et lateribus albedo*, collo *viror adſperſus*; remigibus *ſecundariis color rufus*; remiges *majores cinereae*; pedes *ſquamis exſtantibus poſterius aſperi.*

cinereus. 64. T. ex cinereo fuſcus.
Tinamou cendré. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 510.
Cinereous Tinamou. *Lath. ſyn.* II. 2. *p* 726. *n.* 2.
Habitat cum majore, *ſed rarior*, 12 *modo pollices longus.*
Capiti cervicique *tinctura rufa adſperſa.*

variegatus. 65. T. pedibus roſtroque fuſcis, capite et cervice nigris, corpore ſupra lineis transverſis ſpadiceis et nigris vario, ſubtus rufo, gula medioque abdominis albis.
Tinamou varié. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 511. *Pl. enl. n.* 828. *Bajon Cay.* 2. *p.* 272.
Variegated Tinamou. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 726. *n.* 3. *t.* 65.
Habitat in Gujana, 11 *pollices longus*, 10-12 *ova pariens*, *phaſiani ovis paulo minora*, *colore florum ſyringae*
Mandibula *inferior flavicans*; area *oculorum pallida*; remiges *fuſcae.*

Sovi. 66. T. pedibus roſtroque flavis, capite et cervice nigris, corpore ſupra fuſco, ſubtus rufo.
Souï. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 512.
Souï ou petit Tinamou de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 829.
Little Tinamou. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 727. *n.* 4.
Habitat in Gujana, 9 *pollices longus*, *ex foliis in bifurcationibus inferioribus arborum nidum hemiſphaericum* 6 *circiter pollices latum*, *et* 5 *profundam ſtruens*, *et* 3-6 *ova alba ſubgloboſa*, *columbinis aequalia pariens*; *caro exquiſita.*
Gulae *adſperſus candor*; remiges *fuſcae.*

VI. PAS-

VI. PASSERES.

Roſtrum conicum, acuminatum.
Nares ovatae, patulae, nudae.

104. COLUMBA. *Roſtrum* rectum, verſus apicem deſcendens.

Nares oblongae, membrana molli tumida ſemitectae.

Lingua integra.

* *Cauda aequalis modica.*

Oenas. 1. C. cinerea, cervice viridi-nitente, faſcia alarum apiceque caudae nigricante. *Fn. ſuec.* 207.
Oenas ſ. Vinago. *Aldr. orn.* 2. *p.* 497. *Will. orn. p.* 185. *t.* 35. *Raj. av. p.* 62. *Alb. av.* 3. *p.* 39. *t.* 46. *Briſſ. av.* 1. *p.* 86. *n.* 5. *Nozem. nederl. Vogel t.* 7.
Stockdove. *Brit. zool.* 2. *app. Arct. zool.* 2. *p.* 329. A.
Holztaube. *Friſch av. t.* 139. *Georg. it. p.* 173.
Habitat in Europae *et* Sibiriae *turribus ripisque rupeſtribus, hieme adventante verſus auſtrum migrans,* 14 *circiter pollices longus.*
Jugulum *et* pectus *vinaceum*; ungues *nigri.*

domeſtica. 2. C. cinerea, uropygio albo, alarum faſcia, caudaeque apice nigricante. *Fn. ſuec. n.* 207. *Scop. ann.* 1. *n.* 177.
Columba domeſtica. *Briſſ. av.* 1. *p.* 68. *n.* 1.
Commun Pigeon. *Brit. zool. n.* 101. *t.* 45. *Raj. av. p.* 59. *n.* 1. *p.* 183. *n.* 21. *Will. orn. p.* 180. *Sloan. jam. p.* 302. *Brown jam. p.* 468. *Alb. av.* 3. *t.* 42.
White-rumped Pigeon. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 605. *n.* 2.

livia. β) C. alarum faſcia duplici. *Briſſ. av.* 1. *p.* 82. *n.* 3. *Raj. av. p.* 62. *n.* 8. *Will. orn. p.* 186.
Bilet. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 498. *Pl. enl. n.* 510.
Stock dove. *Alb. av.* 3. *t.* 44.

ſaxatilis. γ) C. remigibus fuſcis. *Briſſ. av.* 1. *p.* 84. *n.* 4.
Columba rupicola. *Raj. av. p.* 63. *n.* 11.
Rock Pigeon. *Will. orn. p.* 186. *n.* 9.

δ) C.

hiſpanica. δ) C. cera albido-furfuracea. *Syſt. nat.* XII. *p.* 279. *n.* 2. *it. wgotl.* 8.
Columba romana. *Briſſ. av.* 1. *p.* 71. *n.* 2.
Columba domeſtica major. *Raj. av. p.* 60. *n.* 1.
Pigeon romain. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 510. *Pl. enl. n.* 110.
Greater tame pigeon. *Will. orn. p.* 181. *t.* 33. 34.

daſypus. ε) C. pedibus hirſuto-pennatis. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 279. *n.* 3. *Briſſ. av.* 1. *p.* 73. A. *Aldr. orn.* 2. *p.* 466. 467. 468.
Roughfooted Dove. *Will. orn. t.* 34.
Rauchfüſige Taube. *Friſch av. t.* 145.

criſtata. ζ) capite criſtato, pedibus hirſutis, cinerea. *Briſſ. av.* 1. *p.* 73. B. *Friſch av. t.* 144.
Pigeon huppé. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 510.

norwegica. η) C. capite criſtato, pedibus hirſutis, nivea. *Briſſ. av.* 1. *p.* 74. C.

barbarica. ϑ) C. palpebris nudis papilloſis, alarum ſingularum macula duplici nigra. *Briſſ. av.* 1. *p.* 74. D.
Pigeon de Barbarie. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 519. *n.* 2.
Barbary Pigeon. *Raj. av. p.* 60. *n.* 8. *Will. orn. p.* 182. *n.* 8. *t.* 34.

cucullata. ι) C. occipitis pennis reflexo-erectis. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 280. *n.* 5. *Briſſ. av.* 1. *p.* 74. E.
Columba anglica ſ. ruſſica. *Geſn. av.* 279.
Pigeon nonain. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *t.* 19.
Jacobine. *Raj. av. p.* 60. *n.* 6. *Will. orn. p.* 181. *n.* 6. *t.* 33. *Friſch. av.* 3. *t.* 43.
Zahme Kuttelgraube. *Friſch av. t.* 150.

hiſpida. κ) C. plumis minimis erectis, per dorſum alasque diſperſis. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 280. *n.* 6.
Columba criſpa. *Aldr. orn.* 2. *p.* 470. *Briſſ. av.* 1. *p.* 76. G.
Pigeon friſé. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 519. *n.* 3.

turbita. λ) C. pennis in pectore recurvatis. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 280. *n.* 7. *Briſſ. av.* 1. *p.* 75. F. *Friſch av. t.* 147.
Pigeon à cravate. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 513. *t.* 23.
Turbit. *Raj. av. p.* 60. *n.* 7. *Will. orn. p.* 182.

laticauda. μ) C. cauda erecta multipenni patula. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 280. *n.* 8. *Briſſ. av.* 1. *p.* 80. P.

Pigeon

Pigeon-Paon. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 512. *t.* 22.
Broad- and narrow-tailed Shaker. *Raj. av. p.* 60. *n.* 3. 4. *Will. orn. p.* 181. *n.* 3. 4. *t.* 34.
Pfauentaube. *Friſch av. t.* 151.

gyratrix. *ν*) C. ſub volatu ſe gyrans. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 280. *n.* 9. *Briſſ. av.* 1. *p.* 99. N.
Pigeon culbutant. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 517.
Tumbler. *Raj. av. p.* 61. *n.* 10. *Will. orn. p.* 182.
Tummeltaube. *Friſch av. t.* 148.

galeata. *ξ*) C. capite, remigibus rectricibusque concoloribus a corpore diverſicoloribus. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 280. *n.* 10. *Briſſ. av.* 1. *p.* 80. O.
Pigeon cuiraſſé. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 515.
Helmet Pigeon. *Raj. av. p.* 61. *n.* 11. *Will. orn. p.* 182. *n.* 11.

turcica. *o*) C. cera papilloſa rubra. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 281. *n.* 11. *Briſſ. av.* 1. *p.* 76. H.
Turkiſh or perſian Pigeon. *Will. orn. t.* 33.
Türkiſche Taube. *Friſch av. t.* 149.

tabellaria. *π*) C. cera lata carunculata albida, palpebris nudis. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 281. *n.* 12. *Briſſ. av.* 1. *p.* 77. I.
Carrier Pigeon. *Raj. av. p.* 60. *n.* 5. *Will. orn. p.* 181. *n.* 5. *t.* 34. *Alb. av.* 2. *t.* 45. *Hayes brit. birds t.* 16.

gutturoſa. *ρ*) C. pectore inflato. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 280. *n.* 4. *Briſſ. av.* 1. *p.* 78. K.
Pigeon groſſe-gorge. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 505. *t.* 17. 18.
Cropper Pigeon. *Raj. av. p.* 60. *n.* 2. *Will. orn. p.* 181. *n.* 2. *t.* 34.
Kropftaube. *Friſch av. t.* 146.

eques. *σ*) C. cera carunculata, pectore inflato. *Briſſ. av.* 1. *p.* 78. L.
Light Horſeman Pigeon. *Raj. av. p.* 61. *n.* 5. *Will. orn. p.* 182. *n.* 12. *Albin. av.* 2. *t.* 45.

percuſſor. *τ*) C. volando alas fortiter percutiens. *Briſſ. av.* 1. *p.* 79. M.
Smiter Pigeon. *Raj. av. p.* 60. *n.* 9. *Will. orn. p.* 182. *n.* 9.

jubata. *υ*) C. criſta jubae inſtar a vertice pendula.
Turner Pigeon. *Will. orn. p.* 182. *n.* 14.

maculata. φ) C. alba, macula frontis colore caudae.
Spot Pigeon. *Will. orn. p.* 182. *n.* 17.
Habitat et hoſpitatur innumera varietate in Europa, Aſia, Barbaria, 14-15 *pollices longa, migrans, bis, cicurata* 9-11*ies in anno pariens ova, unum plerumque maſculum, alterum femineum, quibus mas et femina alternatim incubant, altero alteram compellente; intra ingluviem macerata grana in os pulli evomens; caro egregia vetita melancholicis; tabellaria olim ad transportandas literas adhibita.*

montana. 13. C. orbitis nudis ſanguineis, corpore rufo ſubtus flavo.
Columba rufa cayennenſis. *Briſſ. av.* 1. *p.* 131. *n.* 29. *t.* 12. *f.* 2.
Perdix montana. *Raj. av. p.* 183. *n.* 20.
Mountain Partridge. *Sloan. jam.* 2. *p.* 304. *t.* 261. *f.* 1. *Brown jam. p.* 469. *Edw. av.* 2. *t.* 119.
Partridge Pigeon. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 615. *n.* 3.
Habitat in Cayenna *et* Jamaica, $8\frac{1}{2}$ *pollices longa, perdicis facie, in arboribus, quarum rami humiles ſunt, nidum ſtruens, et pilis goſſypioque ſternens.*
Color *rufus*; mentum, guttur *et* pectus *incarnata*; abdomen *et* criſſum *rufeſcentia.*

tetraoides. 3. C. capite colloque nigris, margine albo cinctis. *Scop. ann.* 1. *p.* 125. *n.* 180.
Magnitudo *et* facies *tetraonis rufi.*

leucocephala. 14. C. orbitis et vertice albis, corpore caeruleſcente.
Columba ſaxatilis jamaicenſis. *Briſſ. av.* 1. *p.* 137. *n.* 33.
Columba minor, capite albo. *Raj. av. p.* 63. *n.* 18. *p.* 184. *n.* 24.
Baldpated Pigeon. *Sloan. jam. p.* 303. *t.* 261. *f.* 2. *Brown jam. p.* 468.
White-crowned Pigeon. *Act. zool.* 2. *p.* 327. *n.* 189. *Catesb. Car.* 1. *t.* 25. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 617. *n.* 5.
Habitat in inſulis Jamaica, S. Dominici, Bahamenſibus, $10\frac{1}{2}$ *pollices longa, numeroſiſſima, inter rupes pariens, coffeae aliisque baccis victitans; caro eſculenta, pro anni tempore, pabulique indole, nunc dulcis, nunc amara.*
Roſtrum *baſi purpureum, apice album*; cervix *viridi-nitens, margine nigra.*

15. C.

leucoptera. 15. C. orbitis nudis caeruleis, rectricibus cinereis apice albis: intermediis fuscis.
Columba indica. *Briss. av.* 1. *p.* 105. *n.* 15.
Brown indian Dove. *Edw. av.* 2. *t.* 76.
White-winged Dove. *Brown jam. p.* 468. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 617. *n.* 6.
Habitat in India, *et* Carthagenae *in* America, *turturis magnitudine, 8-9 pollices longa, caudam motacillae instar motitans.*
Rostrum *nigrum*; irides *fulvae*; frons, genae, jugulum *et* pectus *ex rufo fuscescunt, infra aures utrinque stria transversa nigra; infra hanc pennarum nitor viridi-aureus, in violaceum tandem abiens*; occiput, cervix *et* corpus *supra fusca*; abdomen *et* uropygium *cinerea*; remiges *nigrae*; ungues *fusci.*

fusca. 4. C. fusca, oculis nigris, collo et pectore albo nigroque undulatis. *Jacq. Beytr. p.* 33. *n.* 27.
Habitat Carthagenae *in* America, *turturis magnitudine.*

novae Seelandiae. 5. C. orbitis rubris, corpore supra rubineo, subtus albo, uropygio caeruleo, cauda nigra.
New Zealand Pigeon. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 640. *n.* 34.
Habitat in nova Seelandia, 18 *pollices longa.*
Rostum irides*que rubrae*; juguli *nitor viridis*; remiges *obscurae*; crissum *caerulescens.*

caribaea. 6. C. capite, collo et pectore purpurascentibus, abdomine albido, dorso, uropygio et cauda caerulescente, hac fascia nigra notata.
Columba cauda cuneata, orbitis denudatis flavescentibus, corpore caerulescente. *Jacq. Beytr. p.* 30. *n.* 24.
Columba cauda annulo cincta jamaicensis. *Briss. av.* 1. *p.* 138. *n.* 34.
Columba cauda fascia notata. *Raj. av. p.* 63. *n.* 17. *p.* 183. *n.* 22.
Pigeon à queue annelée de la Jamaïque. *Buff. hist. nat. des oif.* 2. *p.* 539.
Ringtailed Pigeon. *Sloan. jam. p.* 302. *Brown jam. p.* 468. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 639. *n.* 33.
Habitat in insulis caribaeis, *palumbi magnitudine*, 15 *pollices longa, ferox; carne esculenta.*
Cera *gibba*; rostrum *virescens basi rubrum*; irides *rubrae*; alae *fuscescentes.*

guinea. 16. C. orbitis nudis rubris, alis maculis albis triquetris, rectricibus apice nigris.

Columba guineenſis. *Briſſ. av.* 1. *p.* 132. *n.* 30.
Pigeon de Guinée. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 538.
Tourterelle du Cap de bonne eſperance. *Sonner. it.* 2. *p.* 179.
Triangular-ſpotted Pigeon. *Edw. av.* 2. *t.* 75. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 639. *n.* 32.

Habitat in Africae *auſtralis rupeſtribus, palumbi magnitudine.*

Roſtrum *nigricans*; irides *flavae*; caput, collum *et* corpus *ſubtus cinereum*, *ſupra ex purpuraſcente fuſcum*, *nitore violaceo*; abdomen, criſſum *et* uropygium *alba*; ungues *fuſci.*

coronata. 17. C. caeruleſcens, ſupra cinerea, orbitis nigris, criſta erecta, humeris ferrugineis. *Mill. illuſtr. t.* 16. A.

Columba indica criſta magna. *Pall. adumbr.* 78. *Damp. it.* 3. *p.* 2. *p.* 83. *t.* 3.
Columba mugiens. *Scop. ann.* 1. *n.* 179.
Phaſianus criſtatus indicus. *Briſſ. av.* 1. *p.* 279. *n.* 6. *t.* 26. *f.* 1.
Faiſan couronné des Indes. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 354. 542. *Pl. enl. n.* 118.
Goura de la nouvelle Guinée. *Sonner. it. p.* 169. *t.* 104.
Great crowned indian Pigeon. *Edw. glean. t.* 338. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 620. *n.* 9.
Kronvogel. *Goetz Naturf.* 17. *p.* 32.

Habitat in inſulis Moluccis, *et* nova Guinea, *gallopavonis magnitudine, voce et moribus congenerum, frigoris impatiens, in arboribus nidificans.*

Roſtrum *et* lora *nigra*; irides *rubrae*; criſtae *compreſſae pennae ex cinereo caeruleae*, *diſcretae*, 5 *fere pollices longae*; tectrices *alarum apice ferrugineae*; remiges rectricesque *ex nigricante cinereae*, *hae apice dilutiores*; pedes *nunc albidi*, *nunc cinerei*, *nunc fuſci*, *nunc nigricantes.*

criſtata. 7. C. palpebris albis, occipitis criſta rubro-aurea, pectore et abdomine violaceis, dorſo, uropygio caudaque viridibus, pedibus flavis, digito poſteriore mutico.

Rouloul de Malacca. *Sonner. it.* 2. *p.* 174. *t.* 100.
Leſſer crowned Pigeon. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 622. *n.* 10.

β) Columba roſtro flavicante, orbitis nudis rubeſcentibus, palpebris rubris, capite colloque ſpadiceis. *Lath. ſyn.* II. 2. *t.* 58.

Habitat in Malacca, *domeſticae magnitudine.*

Collum,

Collum, caput *et* roſtrum *nigra*; mandibulae *ſuperioris baſis* irides*que flavae*; frons *pilis* 6 *longiſſimis, nigris, ſetoſis, erectis munita*; capillitium *album*; tectrices *alarum minores fuſcae, reliquae cum remigibus minoribus ex rufo albae, nigro-undulatae*; remiges *majores rufae.*

albicapilla. 8. C. viridis vertice exalbido, remigibus majoribus caudaque nigris, macula axillari ſemicirculari partim viridi, partim griſea.

Pigeon verd à tête griſe d'Antigua. *Sonner. it. p.* 112. *t.* 66.
Grey-headed Pigeon. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 623. *n.* 11.
Habitat in inſula Panay, *domeſticae magnitudine.*
Roſtrum *rubrum*; irides *flavae*; colli *latera ſpadicea, nitore aeneo*; remiges *minores virides, nitore metallico.*

Pompadora. 9. C. vireſcens, genis mentoque flaveſcentibus, tectricibus alarum purpureis, remigibus nigris, margine flavis.

Pompadour Pigeon. *Brown illuſtr. t.* 19. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 624. *n.* 12.
b) Yellow faced Pigeon. *Brown illuſtr. t.* 20.
Habitat in Zeylonae *arboribus, turture minor, viſci glutine capta; caro edulis.*
Roſtrum *caeruleſcens*; cauda *longior, quam reliquis hujus tribus.*

erythroptera. 10. C. nigra, ſuperciliis et fronte albis, cervice, humeris et tectricibus alarum ruberrimis, cauda a baſi ad medium cinerea, pedibus fuſcis.

Garnet winged Pigeon. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 624. *n.* 13.
β) C. gutture et pectore albis, ſuperciliis ferrugineis, remigibus caudaque nigricantibus.
γ) C. ex rubeſcente nigra, ſuperciliis et pectore albis, pedibus rubris.
Habitat in inſulis Eimeo, *β*) Tahiti, *γ*) Tanna, $9\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum *flavum aut nigrum.*

ſtriata. 18. C. orbitis lorisque candidis, corpore cinereo nigro-faſciato ſubtus rufo. *Jacq. Beytr. p.* 34. *n.* 28. *t.* 15.

Turtur indicus ſtriatus. *Briſſ. av.* I. *p.* 109. *n.* 17.
Tourterelle rayée des Indes. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 557.
Transverſe ſtriped or barred Dove. *Edw. av. t.* 16.
Barred Turtle. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 650. *n.* 44.
Habitat in India, Sina, *et* Venezuela *Americae, turture paulo minor,* $9\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

Roſtrum *pallide corneum aut caeruleſcens*; nares *caeruleſcentes*; oculi *nigri*, iridibus *ex caeruleo cinereis*; frons, genae, gula, colli corporis*que latera caeruleſcentia*; vertex *et* occiput *in rufum colorem vergunt*; cervix, dorſum, uropygium *et* tectrices *alarum dilute fuſcae*, *lunulis nigris*; jugulum, pectus *et* abdomen *roſeo tinctu perfuſa.*

Palumbus. 19. C. rectricibus poſtice atris, remigibus primoribus margine exteriore albidis, collo utrinque albo. *Fn. ſuec. n.* 208. *Scop. ann.* 1. *n.* 178. *Brünn. orn. n.* 204. *Kram. el. p.* 359. *n.* 2. *Nozem. nederl. Vogel t.* 4. 5.

Columba collo utrinque albo, poſtice macula fuſca. *Fn. ſuec.* 1. *n.* 175.

Palumbus. *Briſſ. av.* 1. *p.* 89. *n.* 6.

Palumbus torquatus. *Aldr. orn.* 2. *p.* 484.

Pigeon-ramier. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 531. *t.* 24. *Pl. enl. n.* 316.

Ring Dove. *Brit. zool.* 1. *n.* 102. *Arct. zool.* 2. *p.* 329. B. *Raj. av. p.* 62. *n.* 9. *Will. orn. p.* 185. *t.* 35. *Alb. av.* 2. *p.* 42. *t.* 46. *Hayes brit. birds t.* 15.

Ring Pigeon. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 635. *n.* 29.

Ringeltaube. *Friſch av. t.* 138. *Georg. it. p.* 173. *Günth. Neſt. u. Eyer t.* 32.

Habitat in Europae *ſilvis*, *rarior in* Sibiria, *ab exſiccatione amnis Trojani in ejus impletionem in* Aegypto *exulans*, 17½ *pollices longus*, *gregatim migrans*, *in arborum cacumine ex ſiccis bacillis nidum magnum*, *laxum*, *planum ſtruens*, *et ova majora*, *quam c. domeſtica*, *ceterum ſimilia pariens*, *ex quibus poſt* 14 *dies prodeunt pulli.*

Roſtrum *flavicans*; cera *farinacea*, *rubra*, *carnoſa*; irides *flaveſcentes*; caput, dorſum *et* tectrices *alarum ex caeruleſcente*, uropygium *et* jugulum *dilute cinerea*; jugulum *inferius et* pectus *vinacea*; abdomen *et* criſſum *exalbida*; cervix collique *latera viridi-aurea*, *utrinque lunula alba notata*; pedes *ad digitos usque hirſuti*; ungues *nigri.*

caerulea. 11. C. caerulea, ſubtus, roſtro, pedibus, et tectricibus alarum rubra.

Columba caerulea mexicana. *Briſſ. av.* 1. *p.* 139. *n.* 35.

Tlacahoilotl. *Raj. av. p.* 63. *n.* 15.

Pigeon bleu du Mexique. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 525.

Blue Pigeon. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 634. *n.* 28.

Habitat in nova Hiſpania, *domeſticae magnitudine.*

Irides *rubrae.*

12. C.

Hoilotl. 12. C. ex purpurascente rufa, tectricibus alarum minoribus albis, pedibus roſtroque coccineis.
Columba montana mexicana. *Briſſ. av.* I. *p.* 130. *n.* 28.
Hoilotl. *Raj. av. p.* 63. *n.* 13.
Pigeon de montagne du Mexique. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 525.
White-ſhouldered Pigeon. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 634. *n.* 27.
β) Columba dilute fulva.
Habitat in nova Hiſpania, *romanae magnitudine.*

maevia. 42. C. fuſca nigro-maculata, pectore et abdomine dilute fulvis, remigibus caudaque fuſcis.
Oenas mexicana. *Briſſ. av.* I. *p.* 100. *n.* 11.
Hoilotl. *Raj. av. p.* 63. *n.* 12.
Pigeon ſauvage du Mexique. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 525.
Habitat in novae Hiſpaniae *frigidioris ſilvis, oenadis magnitudine.*
Roſtrum *nigrum*; tectrices *caudae inferiores cinereae.*

mexicana. 43. C. fuſca, orbitis rubris, pectore et alarum apice albis.
Columba mexicana. *Briſſ. av.* I. *p.* 99. *n.* 10.
Cehoilotl. *Raj. av. p.* 63. *n.* 14.
Pigeon du Mexique. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 525.
Mexican Pigeon. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 633. *n.* 25.
Habitat in nova Hiſpania.
Irides *nigrae.*

pacifica. 44. C. cinerea, corpore ſupra fuſco viridi-nitente, criſſo ferrugineo, roſtro caudaque nigris.
Ferruginous vented Pigeon. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 633. *n.* 24.
Habitat in inſulis amicis, 13½ *pollices longa.*
Nares *gibbae*; mentum *albicans*; pectus *in vinaceum colorem vergens*; remiges *fuſcae*; caudae *nitor virens*; pedes *rubri, interdum fuſci aut atri.*

curvirostra. 45. C. viridis, ſubtus flavicans criſſo albo, dorſo humerisque badiis, alarum faſciis duabus flavis, rectricibus intermediis viridibus, lateralibus cinereis faſcia nigra.
Hookbilled Pigeon. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 632. *n.* 23. *t.* 59.
β) Columba dorſo humerisque viridibus.
Habitat in inſula Tanna, 7½ *pollices longa.*
Roſtrum *acute carinatum, apice valde inflexum, flavum, baſi rubrum*; cauda *rotundata.*

S. Thomae. 46. C. viridis, criſſo flavo, pedibus croceis, roſtro inflexo caeruleo, baſi ſanguineo.
Columba viridis inſulae S. Thomae. *Briſſ. av.* I. *p.* 147. *n.* 40.
Pigeon verd de l'isle de S. Thomas. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 528.
Wild Pigeon from S. Thomas island. *Will. orn. p.* 183. *Raj. av. p.* 62. *n.* 7.
S. Thomas's Pigeon. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 631. *n.* 22.
Habitat in inſula S. Thomae, *domeſticae magnitudine.*
Oculi *nigri*; orbitae *caeruleae*; rectricum *apex*, remiges, *et* ungues *futſci.*

aromatica. 47. C. olivacea, dorſo badio, alarum faſcia duplici flavicante et nigra, remigibus nigris margine flavis.
Columba viridis Amboinenſis. *Briſſ. av.* I. *p.* 145. *n.* 39. *t.* 10. *f.* 2.
Pigeon verd d'Amboine. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 528. *Pl. enl. n.* 163.
Habitat in Amboina, *turturis magnitudine*, 10½ *pollices longa.*
Roſtrum *vireſcens*; vertex *griſeus*; cauda *ſubtus baſi nigra, apice exalbida*; tectrices *caudae ſuperiores ſordide ochroleucae*; tectrices *alarum badiae, quaedam apice flavicantes*; pedes *griſei aut rubri.*

cyanocephala. 20. C. capite caeruleo, faſcia ſuboculari alba. *Jacq. Beytr. p.* 36. *n.* 30. *t.* 17.
Turtur jamaicenſis. *Briſſ. av.* I. *p.* 135. *n.* 32. *t.* 13. *f.* 1.
Tourterelle de la Jamaique. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 558. *Pl. enl. n.* 174.
Turtle Dove from Jamaica. *Alb. av.* 2. *t.* 49.
Blue headed Turtle. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 651. *n.* 45.
Habitat in inſulis Jamaica, Cuba, *et calidioribus* Americae, *domeſticae magnitudine, frequenter edulis.*
Roſtrum *baſi rubrum, apice nigricans*; oculi unguesque *nigri*; guttur *caeruleum arcu albo aut nigro circumſcriptum*; cervix, dorſum, uropygium, cauda, *ejusque et alarum* tectrices *fuſca*; juguli *pars inferior*, pectus *et* abdomen *vinacea, hoc in rufum colorem vergens*; cauda *ſupra cinerea, ſubtus nigricans.*

furatenſis. 48. C. ex vinaceo griſea, nuchae cervicisque pennis nigris, illis taenia alba, his rufa pictis, remigibus nigris, dorſo, uropygio caudaque ſordide griſeis.

Tourte-

Tourterelle de Surate. *Sonner. it.* 2. *p.* 179.
Surat Turtle. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 652. *n.* 46.
Habitat circa Surate, *risoriae magnitudine.*
Rostrum *nigrum*; irides *rubrae*; tectrices *alarum cinereae, stria media longitudinali nigra*; caudae *inferiores albae.*

cambayensis. 49. C. grisea, abdomine albo, rectricibus lateralibus parte dimidia nigris, altera griseis, remigibus nigris.
Tourterelle grise de Surate. *Sonner. it.* 2. *p.* 180.
Cambayan Turtle. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 652. *n.* 47.
Habitat in Cambaya, *risoriae magnitudine.*
Rostrum *nigrum*; irides *rubrae*; gutturis *pennae nigrae, extrema tertia parte rufescentes.*

malabarica. 50. C. grisea, abdomine albo, tectricibus alarum mediis maculis ovalibus notatis, rectricibus lateralibus nigris, extima tertia parte albis.
Tourterelle de la côte de Malabar. *Sonner. it.* 2. *p.* 180.
Malabar Turtle. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 652. *n.* 48.
Habitat in Malabar, *risoriae magnitudine.*
Rostrum *et* irides *rubrae.*

madagascarienſis. 21. C. pedibus plumosis, cauda violacea, corpore caeruleonigricante.
Palumbus caeruleus madagascarienſis. *Briss. av.* I. *p.* 140. *n.* 36. *t.* 14. *f.* 1.
Founingo. *Buff. hist. nat. desois.* 2. *p.* 539.
Pigeon-ramier bleu de Madagascar. *Buff. pl. enl. n.* 11.
Madagascar Pigeon. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 640. *n.* 35.
β) Columba australis. *Mont.* 1771. *p.* 526.
Palumbus viridis Madagascarienſis. *Briss. av.* I. *p.* 142. *n.* 37. *t.* 14. *f.* 2.
Pigeon-ramier verd de Madagascar. *Buff. hist. nat. desois.* 2. *p.* 540. *Pl. enl. n.* 111.
Habitat in Madagascar, *domesticae magnitudine*, 11½-12 *pollices longa.*
Rostrum *nudaeque* orbitae *rubrae*; colli *pennae reliquis angustiores, in cinereum colorem vergentes*; ungues *nigri.*

Franciae. 51. C. caerulea, orbitis nudis uropygio caudaque rubris, capitis, colli, pectorisque pennis longis, angustis et acuminatis.
Pigeon Hollandois. *Sonner. it.* 2. *p.* 175. *t.* 101.
Hackled Pigeon. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 641. *n.* 36.

Habitat in insula Franciae, *ab incolis virosa habita, palumbo multo major.*
Rostrum *et* irides *rubrae*; pedes *nigri.*

maculata. 52. C. viridis, abdomine crissoque nigris, pedibus fuscis semiplumosis, colli pennis angustis et longis, scapularibus macula exalbida ad apicem notatis, remigum rectricumque margine exalbido.
Spotted green Pigeon. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 642. *n.* 38.
Longitudo *pollicum* 12; rostrum *et* ungues *nigri.*

aenea. 22. C. pedibus plumosis, rostro pedibusque virescentibus, corpore aeneo.
Palumbus moluccensis. *Briss. av.* 1. *p.* 148. *n.* 41. *t.* 13. *f.* 2.
Pigeon-ramier des Moluques. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 538. *Pl. enl. n.* 164.
Nutmeg Pigeon. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 636. *n.* 30.
β) Columba capite ex caeruleo griseo.
Pigeon cuivré Mangeur de muscade. *Sonner. it. p.* 168. *t.* 102.
Habitat in insulis Moluccis; *β*) *in insulis maris australis* Amsterdam *et* nova Seelandia, 17 *pollices longa, palumbi magnitudine, myristica victitans.*
Ungues *virescentes*; caput collum*que exalbida*, *vinaceo colore admisto*; remiges *cinereae*; cauda *aequalis.*

alba. 53. C. alba, remigibus et extrema caudae parte nigris, pedibus rostroque dilute griseis.
Pigeon blanc mangeur de muscade de la nouvelle Guinée. *Sonner. it. p.* 109. *t.* 103.
White Nutneg pigeon. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 638. *n.* 31.
Habitat in nova Guinea, *mediae magnitudinis, myristica, potissimum macere victitans, semina aromatis cum excrementis spargens.*

viridis. 23. C. aenea, corpore subtus purpuro-violaceo.
Turtur viridis amboinensis. *Briss. av.* 1. *p.* 152. *n.* 43. *t.* 15. *f.* 2.
Turvert. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 555. *n.* 1.
Tourterelle à gorge pourprée d'Amboine. *Buff. pl. enl. n.* 142.
Green Turtle. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 653. *n.* 49.
Habitat in Amboina, 8 *fere pollices longa.*
Rostrum *rubrum*; frons *et* gula *cinerea*; tectrices *alarum majores supra et extus apice sulphureae, inferiores cinereae;*

reae; remiges *nigricantes*, *exteriori margine et apice viridi-aeneae*; cauda *ex caeruleo viridis*; rectrices *laterales apice sulphureae*, *subtus nigricantes apice exalbidae*; tectrices *caudae inferiores ex virescente albae*; ungues *ex griseo fusci.*

melanocephala. 54. C. viridis, capite ex caerulescente cinereo, occipite nigro, mento gulaque flavis, crisso aurantio, rectricibus 6 mediis viridibus, ceteris ruberrimis. *Ind. zool. t.* 7.
Turvert. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 555. *n.* 2.
Tourterelle de Batavia. *Buff. pl. enl. n.* 214.
Black capped Pigeon. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 654. *n.* 50.
Habitat in Java, $9\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Rostrum *nigrum*, *apice flavum*; cauda *subcuneata.*

javanica. 55. C. viridis, capite, collo et pectore ex vinaceo rubris, remigibus majoribus fuscis, abdomine atro.
Turvert. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 556. *n.* 3.
Tourterelle de Java. *Buff. pl. enl. n.* 177.
Javan Turtle. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 654. *n.* 51.
Habitat in Java, *melanocephalae magnitudine.*
Rostrum *rubescens*, *cera alba tectum*; frons *et* tempora *reliquo capite pallidiora.*

cyanocephala. 56. C. supra viridis, subtus rubescens, vertice caeruleo, remigibus caudaque ex caeruleo nigris.
Blue-crowned Turtle. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 655. *n.* 52.
Habitat in Sina, *javanicae magnitudine.*
Rostrum *rubrum.*

martinica. 24. C. subviolacea, abdomine rufescente, remigibus interius rufis.
Columba violacea martinicana. *Briss. av.* 1. *p.* 129. *n.* 27. *t.* 12. *f.* 1.
Pigeon violet de Martinique. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 525. *Pl. enl. n.* 162.
Martinico Pigeon. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 618. *n.* 7.
β) Columba martinicana. *Briss. av.* 1. *p.* 103. *n.* 14.
Pigeon roux de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 526. *Pl. enl. n.* 141.

Habitat

Columbae *rostro debili gracili*, *pedibus brevibus*, *plurimae rubris digitis ad originem usque divisis conspicuae*, *ex regione arctica exules*, *inter* gallinas *et* passeres *mediae*, *monogamia tamen*, *ossulis*, *incubatione alterna*, *nutritione pulli*, *ovis paucis*, *nidificatione*, *loco in altis his propiores.*

Habitat in insula Martinica, *turturis circiter magnitudine, 9¼ pollices longa.*
Rostrum, verrucae *in area oculorum*, irides *ipsae rubrae*; caput, collum *et* corpus *supra badia*, *nitore violaceo*; ungues *fuscescentes*.

jamaicensis. 25. C. rectricibus caeruleis linea alba terminatis.
Columba jamaicensis. *Briss. av.* 1. *p.* 134. *n.* 31.
Columba minor ventre candido. *Raj. av. p.* 63. *n.* 16.
Pigeon de la Jamaïque. *Buff. hist. nat. desois.* 2. *p.* 529. *t.* 21.
White-bellied Dove. *Sloan. jam.* 2. *p.* 303. *t.* 262. *f.* 1. *Brown jam. p.* 469.
White-bellied Pigeon. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 619. *n.* 8.
Habitat in Jamaicae *arboribus*, 9 *pollices longa*, *baccis victitans*, *sono lugubri et ingrato vociferans*; *caro grata.*
Nares *gibbae*; irides, vertex, *et* corpus *subtus alba*; cervix *ex caeruleo et purpureo varia*; dorsum *et* uropygium *ex purpurascente fusca.*

senegalensis. 26. C. rectricibus tribus extimis ultima medietate albis, collo subtus nigro-maculato.
Turtur gutture maculato senegalensis. *Briss. av.* 1. *p.* 125. *n.* 25. *t.* 8. *f.* 3.
Tourterelle à gorge tachetée du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 552.
Senegal Turtle. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 655. *n.* 53.
Habitat ad fluvium Senegal, 10 *fere pollices longa.*
Rostrum *nigricans*; caput, collum *et* pectus *vinacea*; dorsum *superius fuscum*, *inferius cinereum*; abdomen *album*; remiges *extus cinereae*, *intus et subtus fuscae*; rectrices *sex mediae ex cinereo fuscae*, *subtus a basi ad medium nigrae*, *cetera cinereae*; ungues *fusci.*

vinacea. 57. C. rectricibus intermediis duabus ex griseo fuscis, reliquis ad ⅔ nigris, ultima parte griseis, torque nigro.
Turtur torquatus senegalensis. *Briss. av.* 1. *p.* 124. *n.* 24. *t.* 11. *f.* 1.
Tourterelle à collier du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. *p.* 553. *Pl. enl. n.* 161.
Collared Senegal Turtle. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 656. *n.* 54.
Habitat ad fluvium Senegal, *senegalensis magnitudine.*
Rostrum *nigricans*; caput, collum *et* pectus *vinacea*; dorsum *et* uropygium *ex griseo fusca*; abdomen *exalbidum*; remiges

remiges *ex nigricante fuscae margine exalbidae*; ungues *fusceſcentes*.

nicobarica. 27. C. cauda alba, corpore nigro, remigibus caeruleis, dorso viridi-nitente, pennis colli elongatis.
Columba nicombarienſis. *Briſſ. av.* I. *p.* 153. *n.* 54.
Pigeon de Nincombar. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 541. *Pl. enl. n.* 491.
Nicobar Pigeon. *Alb. av.* 3. *t.* 47. 48. *Edw. glean. t.* 339. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 642. *n.* 38.
Habitat in inſula Nicobar, *domeſticae magnitudine.*
Roſtrum *atrum*; irides *avellanae colore*; corpus *ex caeruleo obſcure purpureum*; colli *pennae acuminatae nitore caeruleo, rubro, aureo et aeneo, feminae breviores.*

ſpecioſa. 58. C. dorſo, capite et alis ferrùgineis; cauda rotundata nigra, colli pectorisque pennis undulatis rufis, dein albis, margine caeruleis.
Ramiret. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 541.
Pigeon-ramier de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 213.
Scallop necked Pigeon. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 643. *n.* 39.
Habitat in Cayenna, *turture major.*
Roſtrum *rubrum*; cera *alba.*

corenſis. 59. C. cauda aequali, orbitis denudatis atro-punctatis, corpore griſeo. *Jacq. Beytr. p.* 31. *n.* 25.
Habitat prope Coro *in* Venezuela Americae, *domeſticae magnitudine, junior facile cicuranda, carne eduli.*
Oculi *rubri*; cervicis *pennae elegantiſſimae, ſquamarum forma.*

ſinica. 28. C. fuſca nigro-faſciata, abdomine ſubſanguineo, alis flavis, remigibus roſtroque nigris.
Turtur ſinenſis ſtriatus. *Briſſ. av.* I. *p.* 107. *n.* 16.
Tourterelle rayée de la Chine. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 556.
Dove from China. *Alb. av.* 3. *t.* 46.
Striated Turtle. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 650. *n.* 43.
Habitat in Sina, *riſoriae magnitudine.*
Roſtrum *ex caeruleſcente cinereum*; irides *albae*; vertex *cinereus*; genarum colli*que laterum pennae flavae apice rubrae*; faſcia *colli longitudinalis caerulea*; pectus *et* abdomen *roſea*; tectrices *alarum fuſceſcentes, macula transverſa alba et nigra ad apicem, reliquae nigrae apice albae*; ungues *nigri.*

60. C.

eimeensis. 60. C. fronte et gutture vinaceis, vertice et cervice fuscis, pectoris fascia duplici purpurea et alba.
Purple-breasted Pigeon. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 629. *n.* 19.
Habitat in Eimeo, 14 *pollices longa.*
Rostrum *et* ungues *nigri*; genae *atrae*; colli *latera spadicea, colore sensim in purpureum abeunte.*

purpurea. 61. C. virescens, capite colloque dilute purpureis, pectore aurantio, crisso coccineo.
Purple Pigeon. *Brown illustr. p.* 42. *t.* 18. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 628. *n.* 18.
Habitat in Java, *oenadis magnitudine.*
Remiges *obscurae.*

rubricapilla. 62. C. nigra violaceo et caeruleo nitens, pileo rubro, collo, dorso superiore et pectore ex caerulescente griseo.
Pigeon violet à tête rouge d'Antigue. *Sonner. it. p.* 112. *t.* 67.
Red-crowned Pigeon. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 628. *n.* 17.
Habitat in insula Panay, *cucullatae magnitudine.*
Rostrum *griseum, cera carnosa, rubra tectum, ad oculos usque producta*; pedes *grisei.*

Jambu. 63. C. viridis, fronte caryophylli colore, jugulo et pectore albis.
Pooni Jamboo. *Marsd. Sumatr. p.* 84.
Jamboo-Pigeon. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 627. *n.* 16.
Habitat in Java, *congeneribus minor.*
Rostrum oculi*que flavi*; stria *altero latere viridis, altero caryophylli colore, medio alba a pectore ad orbitas producta.*

purpurata. 64. C. viridis, subtus in cinereum vergens, fronte et verticis parte purpureis, crisso flavo, remigibus nigris.
Purple crowned Pigeon. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 626. *n.* 15.
Habitat in insulis maris australis *intra tropicos inclusis, turturis magnitudine*, 9 *pollices longa, facile cicuranda, musae fructibus victitans.*
Rostrum *flavicans, nonnunquam atrum*; irides *flavae*; frons *et* vertex *varius concolor, aut flava linea circumscriptus*; caput collum*que ex cinereo virescentia*; remiges *primores, praeter* 2 *primas, margine virides, secundariae exteriori margine flavae*; rectrices *aequales subacutae, margine exteriori virides, fascia interrupta grisea notatae*; pedes *asperi, utplurimum nigri*; ungues *nigri.*

indica. 29. C. corpore purpureo, humeris viridibus, pileo caerulescente.

Palumbus amboinensis. *Briss. av.* I. *p.* 150. *n.* 42. *t.* 15. *f.* 1.
Green winged Dove. *Edw. av. t.* 14. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 625. *n.* 14.

β) Columba tectricibus alarum violaceis, remigibus viridibus, uropygio caeruleo. *Jacq. Beytr. p.* 35. *n.* 29. *t.* 16.

Habitat in Amboina, *turturis magnitudine*, 10 *pollices longa.*

Rostrum *coccineum*; nares *et* cera *caerulescentes*; frons *et* fascia *ocularis albae*; dorsum *superius viridi-aureum et aeneum*; *inferius cum uropygio cinereum*; alarum *flexura alba maculata*; abdomen *spadiceum*; remiges *fuscescentes*; rectrices 2 *intermediae totae nigrae*, *reliquae cinereae, apice nigrae*; ungues *nigri.*

canadensis. 30. C. remigibus primoribus apice flavicantibus, rectricibus subcinereis; extimis albis.

Turtur canadensis. *Briss. av.* I. *p.* 118. *n.* 21.
Tourterelle de Canada. *Buff. hist. nat. desois.* 2. *p.* 552. *Pl. enl. n.* 176.
Canada Turtle. *Arct. zool.* 2. *p.* 327. *n.* 190. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 658. *n.* 58.

Habitat in Canada, *turture paulo major*, 13 *pollices longa, carolinensi affinis.*

Color *ex griseo fuscus*, *subtus flavicante adspersо*; rostrum unguesque *nigricantes*; uropygium *cinereum*; abdomen *exalbidum*; tectrices *caudae inferius niveae*, *alarum fusco-maculatae*; remiges *fuscae*; rectrices *intermediae intus versus basin macula magna rufa*, *et infra hanc altera fusca notatae*; feminae *pennae capitis*, *colli*, *pectoris, dorsi superioris et tectrices alarum apice exalbidae.*

sanguinea. 65. C. alba, jugulo et pectore sanguinolentis.

Tourterelle blanche ensanglantée. *Sonner. it. p.* 51. *t.* 20.
Sanguine Turtle. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 657. *n.* 57.

Habitat in Manilla, *turturis magnitudine.*

Rostrum *rubrum*; irides *ex rubescente purpureae.*

cruenta. 66. C. vertice, abdomine et alarum fasciis tribus transversis griseis, gutture albo, pectoris macula sanguinea.

Tourterelle grise ensanglantée. *Sonner, it. p.* 52. *t.* 21.
Red-breasted Turtle. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 657. *n.* 56.

Habitat in Manilla, *asrae magnitudine.*

Rostrum

Roſtrum *nigrum*; irides *ferrugineae*; cervix *violacea*; alarum *faſciae transverſae*, 3 *griſeae et* 2 *nigrae*; remiges *nigrae*; cauda *baſi griſea*, *apice nigra*; pedes *ex rubeſcente violacei.*

afra. 31. C. rectricibus extimis baſi exteriore maculaque apicis albis, maculis tectricum alarum violaceo-azurcis.
Turtur ſenegalenſis. *Briſſ. av.* 1. *p.* 122. *n.* 23. *t.* 10. *f.* 1.
Tourterelle du Sénégal. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 553. *Pl. enl. n.* 160.
African Turtle. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 655. *n.* 55.
Habitat ad fluvium Senegal, *vinacea minor*, 8 *pollices longa.*
Roſtrum *rubeſcens*; vertex *cinereus*; cervix, dorſum, tectrices alarum *et* uropygium *ex griſeo fuſca*; gula *albicans*; jugulum *et* pectus *dilute vinacea*; abdomen *exalbidum*; remiges *fuſcae*; rectrices *intermediae* 2 *ex nigricante fuſcae*, *reliquae ex griſeo fuſcae*, *apice nigricantes*, *ſubtus albae*; ungues *fuſci.*

Turtur. 32. C. rectricibus apice albis, dorſo griſeo, pectore incarnato, macula laterali colli nigra lineolis albis. *Scop. ann.* 1. *n.* 181. *Kram. el. n.* 359. *n.* 3.
Turtur. *Olin. ucc.* 34. *Briſſ. av.* 1. *p.* 92. *n.* 7. *Nozem. nederl. Vogel t.* 6.
Tourterelle. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 545. *t.* 25. *Pl. enl. n.* 394.
Turtle or Turtle Dove. *Brit. zool.* 1. *n.* 103. *t.* 45. *Raj. av. p.* 61. *n.* 2. *Will. orn. p.* 183. *t.* 35. *Albin. av.* 2. *t.* 47. *Hayes brit. birds t.* 13.
Common Turtle. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 644. *n.* 40.
β) Turtur pennis ad colli latera omnibus nigris, macula prope apicem rotunda alba notatis.
γ) Turtur luſitanus. *Briſſ. av.* 1. *p.* 98. *n.* 9.
Tourterelle de Portugal. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 556.
Portugal Dove. *Alb. av.* 2. *t.* 48.
δ) Turtur luzonienſis.
Tourterelle griſe de l'isle de Luçon. *Sonner. it.* 2. *p.* 52. *t.* 22.
ε) Turtur ſinenſis fuſcus.
Tourterelle brune de la Chine. *Sonner. it.* 2. *p.* 177.
Columba teſtaceo-incarnata. *Forſt. fn. arab. p.* 5.
Habitat in Europa, Sina, India, *inſulisque* oceani indici *et* auſtralis, *gregatim migrans*, *in ſilvarum denſarum arboribus altiſſimis nidificans*, *et* 2 *ova columbinis ſimilia pariens*, *piſi agris infeſta*, *ultra* 12 *pollices longa.*

Roſtrum

Roſtrum *fuſcum*, γ) *nigrum*, δ) *et* ε) *rubrum*; irides *flavae*, δ) *et* ε) *rubrae*; vertex *ex cinereo olivaceus*; frons *et* mentum *fere alba*; remiges *fuſcae*; guttur *et* pectus *vinacea*; abdomen *et* criſſum *alba*; rectrices 2 *intermediae totae fuſcae*; *extima utrinque exteriori margine alba.*

ſurinamenſis. 67. C. cinerea, ſubtus albida, gula ex nigro viridique varia, remigibus exterioribus fuſcis, mediis cinereis.
Tourterelle. *Fermin ſurin.* 2. *p.* 165.
Surinam Turtle. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 647. *n.* 41.
Habitat in Surinam, 10 *pollices longa, in remotiorum ſilvarum altiſſimis arboribus bis in anno nidificans, carne exquiſita ſucculenta.*
Roſtrum *longum, extus caeruleum, intus rubrum.*

riſoria. 33. C. ſupra luteſcens, lunula cervicali nigra. *Scop. ann.* I. *p.* 125. *n.* 182.
Turtur torquatus. *Briſſ. av.* I. *p.* 95. *n.* 8.
Turtur indicus. *Aldr. orn. t.* 15. *c.* 9. *Raj. av. p.* 61. *n.* 3.
Tourterelle à collier. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 550. *t.* 26. *Pl. enl. n.* 244.
Indian Turtle. *Will. orn. p.* 184. *Alb. av.* 3. *t.* 45.
Turtle dove. *Hayes brit. birds t.* 14.
Collared Turtle. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 648. *n.* 42.
Ringeltaube. *Friſch av. t.* 141.
β) Turtur fuſcus ſinenſis.
Tourterelle griſe de la Chine. *Sonner. it.* 2. *p.* 176. *t.* 102.
γ) Turtur hybridus. *Briſſ. av.* I. *p.* 97. A.
Habitat in India *et* Sina, *hoſpitatur in* Europa, *turture paulo major.*
Roſtrum *nigricans*; irides *rubrae*; color *ſupra rufus, aut ex rubeſcente albus, ſubtus albus*; uropygium *et* remiges *ex griſeo fuſcae*; cauda *cinerea*; rectrices *laterales apice albae*; ungues *fuſci.*

paſſerina. 34. C. rectricibus remigibusque obſcurioribus, corpore purpuraſcente, roſtro pedibusque rubris. *Jacq. Beytr. p.* 32. *n.* 26.
Columba ſylveſtris minima braſilienſis, Turtur barbadenſis minimus, Turtur indicus ſ. Cocotzin, Turtur minimus, alis maculoſis. *Raj. av. p.* 61. 62. *n.* 4. 5. 6. *p.* 184. *n.* 25.
Turtur parvus americanus. *Briſſ. av.* I. *p.* 113. *n.* 19. *t.* 9. *f.* 1.
Picuipinima. *Marcgr. braſ. p.* 204.

Cocotzin. *Fern. nov. hiſp.* 24. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 559.
Petite Tourterelle de ſ. Domingue, et Petite Tourterelle de la Martinique. *Buff. pl. enl. n.* 243. *f.* 1. 2.
Indian Turtle, Cocotzin, or leaſt Barbadoes Tourtle. *Will. orn. p.* 184. *t.* 36.
Ground Dove. *Catesb. Car.* 1. *t.* 26. *Sloan. jam.* 2. *p.* 305. *n.* 32. *t.* 261. *f.* 1. *Brown jam. p.* 469.
Ground Pigeon. *Arct. zool.* 2. *p.* 328. *n.* 191. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 659. *n.* 59.
β) Columba paſſerina maculis pauciſſimis.
γ) Columba paſſerina oculis ſpadiceis, colli pectorisque pennis diverſicoloribus.
δ) Columba paſſerina oculis ſpadiceis, corpore magis rubeſcente.
Habitat in Americae *calidioribus ad* Carolinam *usque, atque inſulis contiguis, in montanis et ſaxoſis inter dumeta gregaria, vegetabilium victitans ſeminibus, alauda criſtata non major,* $6\frac{1}{4}$ *pollices longa, volatu brevi, voce lugubri turturis; carne eximia.*
Roſtrum *apice et* ungues *nigricantes;* irides *aurantiae;* caput, cervix *et* corpus *ſupra cinereum, ſubtus cum fronte vinaceum;* guttur *et* pectus *fuſco-maculatum;* remiges *rufae margine exteriore et apice nigricantes;* rectrices 2 *intermediae obſcure cinereae, reliquae nigricantes.*

minuta. 35. C. fuſca, alis punctis 5 chalybeis, rectricibus extimis apice albis.
Turtur parvulus fuſcus americanus. *Briſſ. av.* 1. *p.* 116. *n.* 20. *t.* 8. *f.* 2.
Tlapalcocotli. *Will. orn. p.* 184.
Habitat in inſula S. Dominici, *paſſerina minor, an varietas?* $5\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum pedes*que fuſci;* color *ſubtus ex rufo albus;* tectrices *alarum maculis* 7 *chalybeis;* rectrices 2 *intermediae totae fuſcae, reliquae baſi cinereae, medio nigrae, apice fuſcae.*

malaccenſis. 68. C. cinerea, occipite nigro lineato, remigibus fuſcis, rectricibus lateralibus fuſcis, vertus apicem albis, pedibus flavis.
Petite tourterelle de Quéde. *Sonner. it.* 2. *p.* 177.
Malacca Turtle. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 661. *n.* 60.
Habitat in Malacca, *hoſpitatur in inſula* Franciae, *fringillae domeſticae magnitudine, tamen longior; carne exquiſita.*

Roſtrum

Roſtrum *nigrum*, *baſi et apice flavum*; irides *flavae*; pectus *et* abdomen *ex vinaceo pallide griſea.*

vernans. 69. C. viridis, ſubtus flavens, alarum margine exteriore luteo.
Mantiſſ. pl. 2. *p.* 525.
Columba viridis philippinenſis. *Briſſ. av.* I. *p.* 143. *n.* 38. *t.* II. *f.* 2.
Pigeon vert des philippines. *Buff. pl. enl. t.* 138.
Habitat in inſulis Philippinis.
Roſtrum pedes*que rubri*; pectus *azureum.*

** *cauda longiore cuneata.*

migratoria. 36. C. orbitis denudatis ſanguineis, pectore rufo.
Columba americana. *Kalm. it.* 2. *p.* 527.
Oenas americana. *Briſſ. av.* I. *p.* 100. *n.* 12.
Pigeon de paſſage. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 527.
Pigeon of paſſage. *Catesb. Car.* I. *t.* 23.
Migratory or paſſenger Pigeon. *Arct. zool.* 2. *p.* 322. *n.* 187. *t.* 14. *Forſt. act. angl.* 62. *p.* 398. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 661. *n.* 61.
Americaniſche Taube. *Friſch av. t.* 142.
Habitat in America *ſeptentrionali, numeroſiſſimis gregibus migrans, in arboribus nidificans, et more congenerum* 2 *ova pariens, aceris, ulmi, mori, nyſſae, fagopyri, fagi, quercus, tritici, non zeae fructibus victitans, ſegetibus etiam et agris oryza conſitis infeſta, domeſticae magnitudine,* 14 *pollices longa; caro eximia.*
Roſtrum *et* ungues *nigri*; irides *aurantiae*; color *princeps cinereus, ſubtus vinaceus*; tectrices *alarum nigro-maculatae*; colli *latera purpureo-nitentia*; remiges *ex atro fuſcae, margine albidae*; rectrices 2 *intermediae ex nigricante fuſcae, reliquae canae.*

carolinenſis. 37. C. orbitis caeruleis, ſubtus rufeſcens.
Turtur carolinenſis. *Briſſ. av.* I. *p.* 110. *n.* 18. *t.* 8. *f.* 1.
Picacuroba. *Marcgr. braſ.* 204.
Tourte. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 557.
Tourterelle de la Caroline. *Buff. pl. enl. n.* 175.
Turtle of Carolina. *Catesb. Carol.* I. *t.* 24.
Carolina Pigeon. *Arct. zool.* 2. *p.* 326. *n.* 188. *t.* 14. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 663. *n.* 62.
Habitat in inſula S. Dominici, Carolina, Braſilia, *aliisque* Americae *partibus, piſis, pedophylli peltati ſeminibus et phyto-*

phytolaccae decandrae baccis victitans, turture paulo major, 10½ pollices longa.

Roſtrum *nigricans*; irides unguesque *nigri*; frons, guttur *et* pectus *rubeſcens*, *nitore* (*in mare*) *viridi-aureo et violaceo*; occiput, cervix *et* corpus *ſupra ex fuſceſcente cinerea*; alae *nigro-maculatae*; remiges *ex nigricante cinereae*; rectrices 6, 6 *totae ex cinereo fuſcae*; 5, 5 *cinereae, medio nigrae*; *reliquae dilute cinereae, apice albae, macula in medio nigra.*

melanoptera. 70. C. corpore livido, remigibus nigris. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 308.
Habitat in Chili.

amboinenſis. 38. C. corpore rufo, collo undulato-nigricante.
Turtur amboinenſis. *Briſſ. av.* I. *p.* 127. *n.* 26. *t.* 9. *f.* 3.
Tourterelle d'Amboine. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 557.
Amboina Turtle. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 665. *n.* 64.
Habitat in Amboina, *turturis magnitudine*, 14 *pollices longa.*
Roſtrum *nigrum*; verticis, colli, pectoris*que pennis prope apicem faſcia transverſa nigricans*; pennae dorſi *ſuperioris et* tectrices *alarum fuſcae apice rufae*; remiges *et* ungues *fuſci*; cauda 8 *pollices longa*, *ex rufo fuſca.*

capenſis. 39. C. remigibus primoribus latere interiore rufis.
Turtur capitis bonae ſpei. *Briſſ. av.* I. *p.* 120. *n.* 22. *t.* 9. *f.* 2.
Tourtelette. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 554.
Tourterelle à cravate noire du cap de bonne eſpérance. *Buff. pl. enl. n.* 140.
Cape pigeon. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 666. *n.* 65.
Habitat in Africa *auſtrali*, *alauda non major*, *quamvis ob caudam longam* 9½ *pollices longa.*
Roſtrum *rubrum*; color *princeps ex griſeo fuſcus:* abdomen *exalbidum*; guttur (*mari*) *nigrum*; alarum *ſpeculum chalybeum*; remiges *ſecundariae fuſcae*, *exteriori margine griſcae*; cauda *ultra* 5 *pollices longa*, *ſubtus atra*; rectrices *laterales baſi ex griſeo fuſcae*, *apice nigricantes.*

macroura. 71. C. cinnamomea, ſubtus exalbida, cauda apice alba.
Tourocco. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 553.
Tourterelle à large queue du Sénégal. *Buff. pl. enl. n.* 329.
Great-tailed Turtle. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 667. *n.* 66.
Habitat ad fluvium Senegal, 6 *pollices longa.*
Roſtrum *rubrum*; cera *alba*; cauda 6 *pollices longa.*

40. C.

margina- 40. C. pectore rubro, rectricibus apice nigris albo marginatis.
ta. Turtur americanus. *Briſſ. av.* 1. *p.* 101. *n.* 13.
Tourterelle d'Amérique. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 2. *p.* 552.
Longtailed Dove. *Ed. av. t.* 15.
Marginated Turtle. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 664. *n.* 63.
Habitat in America, *turturis magnitudine*, 10 *pollices longa.* Roſtrum *corneum*; irides *rufae*; lora *alba*; frons *et* gula *ex rufo fuſca*; occiput *ex caeruleſcente cinereum*; macula *ſub auribus nigra*; corpus *ſupra fuſcum*, *humeris nigro-maculatis*, uropygio *cineraſcente*; guttur *et* pectus *roſcum*; abdomen *cum remigibus fuſcum*; rectrices 2 *intermediae nigricantes*, *reliquae cinereae*; ungues *nigri.*

105. ALAUDA. *Roſtrum* cylindrico-ſubulatum, rectum, recta protenſum: Mandibulis aequalibus baſi deorſum dehiſcentibus.

Lingua bifida.

Unguis poſticus rectior, digito longior.

arvenſis. 1. A. rectricibus extimis duabus extrorſum longitudinaliter albis: intermediis interiori latere ferrugineis. *Fn. ſuec.* 209. *Scop. ann.* 1. *n.* 84. *Brünn. orn. n.* 221. *Kram. el. p.* 362. *n.* 2.
Alauda. *Briſſ. av.* 3. *p.* 335. *n.* 1. *Nozem. nederl. Vogel t.* 15.
Alauda non criſtata. *Geſn. av.* 78. *Aldr. orn.* 2. *p.* 844. *t.* 845.
Alauda vulgaris. *Olin. av.* 12.
Alauda caelipeta. *Klein av.* 71.
Alouette. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 1. *t.* 1. *Pl. enl. n.* 363. *f.* 1.
Field-lark or Sky-lark. *Brit. zool.* 1. *n.* 136. *t.* 55. *Arct. zool.* 2. *p.* 394. A. *Raj. av. p.* 69. *n.* 1. *Will. orn.* 203. *Albin. av.* 1. *t.* 41. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 368. *n.* 1.
Feldlerche. *Friſch av. t.* 15. *f.* 1.
β) Alauda alba. *Briſſ. av.* 3. *p.* 339. A. *t.* 19. *f.* 1.
Alouette blanche. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 20.
Weiſſe Lerche. *Friſch av. t.* 16.
γ) Alauda nigra. *Briſſ. av.* 3. *p.* 340. B.
Alouette noire. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 22. *Pl. enl. n.* 650. *f.* 1.
Black

Black Lark. *Alb. av.* 3. *t.* 51.

δ) Alauda longipes.

Longlegged Lark. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 370. C.

Habitat per omnem Orbem antiquum, *in arvis apricis*, δ) *in* Russiae *finibus* mongolicis, 7 *circiter pollices longa*, *fringilla domestica vix major*, *frugibus*, *formicis*, *aliisque insectis victitans*, *volatu perpendiculari in aëre suspensa* (δ. *sedens*) *cantillans in Creatoris laudem. Ecce suum tirile*, *tirile*, *suum tirile tractat*; *auctumno sole occidente in retia compellitur*, *pinguescens*; *carne in australioribus sapidissima*, *calculosis noxia habita.*

Rostrum pedes*que atri*; corpus *subtus ochroleucum*; jugulum *ex rufo album*, *maculis nigricantibus.*

rufa. 7. A. ex nigricante fusca, cervice dorsoque ex rufo aurantiis, rectrice utrinque extima margine rufa, tectricibus alarum minoribus et mediis nigricantibus margine fulvis.

Alouette noire à dos fauve. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 23.

Alouette noire de la Encenada. *Buff. pl. enl. n.* 738. *f.* 2.

Rufous backed Lark. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 371. *n.* 2.

Habitat in Bonaria, *arvensi multo minor*, *vix* 5 *pollices longa.*

pratensis. 2. A. supra ex virescente fusca, rectricibus extimis duabus extrorsum albis, linea superciliorum alba. *Fn. suec.* 210. *Brünn. orn. n.* 223. *Olin. ucc.* 27. *Briss. av.* 3. *p.* 344. *n.* 3.

Alauda pratorum. *Aldr. orn.* 2. *p.* 849.

Spipola altera. *Aldr. orn.* 2. *p.* 730. *t.* 731. *Will. orn. p.* 110.

Alouette de prés ou Farlouse. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 31. *t.* 3. *Pl. enl. n.* 660. *f.* 1.

Tit-Lark. *Brit. zool.* 1. *n.* 138. *Arct. zool.* 2. *p.* 395. C. *Raj. av. p.* 69. *n.* 3. *Will. orn. p.* 206. *Alb. av.* 1. *t.* 43. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 374. *n.* 5.

β) Alauda pratensis candida. *Briss. av.* 3. *p.* 346. A.

Weisse Wiesenlerche. *Sander Naturf.* XI. *p.* 24.

γ) Alauda pratensis pedibus atris.

Habitat in Europae *pratis*, *ubi sedens cantillat*, *in terra nidum*, *interdum cuculo suum substernente ovum*, *struit*, *pilisque equinis firmat*, *ova* 5-6 *fusca pariens*, *insectis et seminibus victitans*, *arvensi minor*, $5\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

Rostrum *nigrum*; corpus *subtus album*; pectus *ochroleucum*, *maculis oblongis nigris*; pedes *flavicantes*; ungues *fusci.*

12. A.

minor. 12. A. ex rufescente fusca, rectricibus extimis duabus extrorsum albis.

Lesser Field-Lark. *Will. orn. n.* 207.
Field Lark. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 375. *n.* 6.
Habitat in Europa, *pratensi multum affinis, et aequalis.*
Gula *et* pectus *pallide lutescens maculatum*; gula *et* abdomen *album*; tectrices *alarum margine exalbidae*; pedes *fuscescentes.*

italica. 13. A. rectricibus mediis badiis, penultimis apice albis, extimis duabus totis albis.

Alauda italica. *Briss. av.* 3. *p.* 355. *n.* 7.
Giarola. *Raj. av. p.* 70. *n.* 10. *Will. orn. p.* 209. §. 9.
Girole. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 47.
Italian Lark. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 373. *n.* 4.
Habitat in Italia, 8 *pollices longa, arboreae affinis.*
Rostrum *rubrum*; color *supra badius, pennarum margine ex rubescente albo, subtus albus*; pedes *incarnati*; ungues *albidi.*

arborea. 3. A. capite vitta annulari alba cincto. *Fn. suec.* III. *Scop. ann.* I. *n.* 186. *Brünn. orn. p.* 224. *Kram. el. p.* 362. *n.* 3. *Olin. ucc. p.* 27.
Alauda rectricibus fuscis: prima oblique dimidiato-alba, secunda, tertia quartaque macula alba cuneiformi. *Fn. suec.* I. *n.* 192.
Alauda arborea. *Briss. av.* 3. *p.* 340. *n.* 2. *t.* 20. *f.* 1.
Alouette de bois ou Cujelier. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 25. *Pl. enl. n.* 660. *f.* 2.
Woodlark. *Brit. zool.* I. *n.* 137. *Arct. zool.* 2. *p.* 395. B. *Raj. av. p.* 69. *n.* 2. *Will. orn. p.* 204. *Albin. av.* I. *t.* 42. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 371. *n.* 3. Frisch. tab. 13. Linn.
Habitat in Europa *et* Sibiria *ad* Camtschatcam *usque, etiam in* Madera, *arvensi minor et brevior, in arboribus degens, gregaria volitans, et volando cantillans etiam noctu, nidum, arvensis more, bis in anno ex gramine sicco struens, et mollibus pilis sternens, ovaque* 5 *atra fusco-maculata pariens.*
Remigum *prima secunda brevior*; pedes *incarnati*; unguis *posterior paulisper curvatus.*

ludoviciana. 14. A. rectricibus penultimis apice albis, extimis altera parte fuscis, altera albis.

Farlouzanne. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 38.
Louisiana Lark. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 376. *n.* 7.

Habitat in Louisiana, *minori affinis, longior tamen, ut 7 pollices aequet.*

Color *supra fuscus ex virescente et nigricante mistus*; remiges *ex nigricante fuscae*; cauda *fusca*; guttur *et* pectus *ex flavicante griseum, fusco-maculatum*; abdomen *fulvum.*

✓ **rubra.** 15. A. fusca, area oculorum nigra, rectricibus duabus extimis albis.

Alauda pensylvanica. *Briss. av. app. p.* 94. *n.* 13.
Alouette aux joues brunes de Pensilvanie. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 58.
Lark from Pensylvania. *Edw. glean. t.* 297.
Red Lark. *Brit. zool.* I. *n.* 140. *Arct. zool.* 2. *p.* 393. *n.* 279. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 377. *n.* 8.
Habitat in America *septentrionali et* Anglia, *arvensis magnitudine.*
Rostrum *nigricans*; macula *testacea supra oculos*; corpus *subtus dilute spadiceum, maculis atris*; pedes *fusci*; unguis *posticus paulisper curvus.*

✓ **mosellana.** 16. A. rufa, subtus ex rufo alba, genis et pectore lineis fuscis, cauda atra margine rufa.

Rousseline ou Alouette de marais. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 60. *Pl. enl. n.* 661. *f.* 1.
Marsh Lark. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 377. *n.* 9.
Habitat in Germania, Alsatia *et* Lotharingia, *ad* Mosellam, *arvensi gracilior et minor*, $6\frac{1}{4}$ *pollices longa, egregie cantans.*
Rostrum *et* pedes *cum* unguibus *flavicantes.*

✓ **campestris.** 4. A. rectricibus fuscis: inferiori medietate, exceptis intermediis duabus albis, gula pectoreque flavescente. *Fn. suec.* 212. *Brünn. orn. n.* 224. 225. *Georg. it. p.* 173.
Alauda campestris. *Briss. av.* 3. *p.* 349. *n.* 5.
Alauda minor campestris. *Raj. av. p.* 70. *n.* 6. *Will. orn.* 150.
Glareana (Gickerlin). *Gesn. av.* 795. *Aldr. orn.* 2. *p.* 736. *Will. orn.* 154. *Raj. av. p.* 81. *n.* 8.
Spipolette. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 43.
Meadow Lark. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 378. *n.* 10.
Brachlerche. *Frisch av. t.* 15.
Krautlerche. *Günth. Nest. u. Eyer t.* 19. *f. inf.*

Spinoletta. β) A. rectricibus fuscis: extimis duabus oblique dimidiatoalbis. *Syst. nat.* XII. 1. *p.* 288. *n.* 7. *Scop. ann.* 1. *n.* 187.

Spino-

Spinoletta Florentinis. *Raj. av. p.* 70. *n.* 9.
Spipolette or Tordino. *Will. orn. p.* 209. §. 10.
Habitat in Germania, β) *in* Carniolia, Italia, Sardinia, Ruſſia *auſtrali, pratenſis magnitudine*, β) *ultra* 7 *pollices longa, et in humidis nidificans.*
Mandibula *ſuperior nigricans, inferior incarnata*; pedes *fuſci*; *in* β) roſtrum pedes*que nigri.*

malabarica. 17. A. remigibus caudaque ſordide fuſcis, margine rufeſcentibus.
Alouette huppée de la Côte de Malabar. *Sonner. it.* 2. *p.* 203. *t.* 113. *f.* 1.
Malabar Lark. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 379. *n.* 11.
Habitat in Malabar, $5\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum *nigrum*; verticis *pennae in criſtam elongatae fuſcae apice albae*; cervicis *rufeſcentes, ſtria per mediam rachin longitudinali nigra*; gula *et* abdomen *ex rufo alba*; dorſi *pennae et* tectrices *alarum fuſcae, verſus apicem margine rufeſcentes, et macula alba notatae*; pedes *rufeſcentes.*

gingica. 18. A. ſupra ex cinereo fuſca, ſubtus faſciaque oculari nigra.
Petite alouette griſe de Gingi. *Sonner. it.* 2. *p.* 203. *t.* 113. *f.* 2.
Gingi Lark. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 380. *n.* 12.
Habitat in Coromandel, *carduelis magnitudine*, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum pedes*que ex rufeſcente griſei.*

tatarica. 19. A. cauda ſubbifurca, rectricibus intermediis duabus limbo tenuiſſime albis, proximis apicis limbo albicante, lateralibus aterrimis. *Pall. it.* 2. *p.* 707. *n.* 15. *t.* C.
Alauda nigra. *Falck it.* 3. *p.* 393. *t.* 27.
Black Lark. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 380. *n.* 13.
Habitat in deſertis aridiſſimis ſalſis inter fluvios Volgam *et* Ural *intermediis, in deſertis* caſpiis, *et toto deſerto* tatarico *auſtraliore, hieme gregaria ad loca habitata accedens, aeſtate ſolitaria, deſertiſſimos campos colens, vix canora, ſturni magnitudine.*
Roſtrum *craſſius et magis convexum, quam congeneribus, ex corneo flaveſcens, apice fuſcum*; color *ſeniori per totum corpus, ne pedibus quidem exceptis, aterrimus; feminae et annotinae avi, etiam quoad pedes, fuſcus*; remiges *ſummo apice exſoletae,* 10-19 *cordatim emarginatae.*

mutabilis. 20. A. cauda subforficata, nigra: rectricibus extimis utrinque immaculatis, reliquis apice canis, rostro albido. *S. G. Gmelin nov. comm. Petrop.* 15. *p.* 473. *n.* 20. *t.* 23. *f.* 2.
Mutable Lark. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 381. *n.* 14.
Habitat in desertis Astracanicis, *hieme* Astracaniae *frequentissima, appropinquante vere loca* Volgae *superiora gregatim petens, vix ultra* 7 *pollices longa; an vere diversa a tatarica?*
Rostrum *apice nigricans;* oculi *minuti, iride pupillaque lividis;* color *avis adultae totus ater, pennarum tamen cervicalium et dorsalium apice, et feminis fronte cana; junior avis tota cinerea, colore sensim in atrum abeunte.*

trivialis. 5. A. rectricibus fuscis: extima dimidiato-alba, secunda apice cuneiformi alba, linea alarum duplici albida.
Alauda sepiaria. *Briss. av.* 3. *p.* 347. *n.* 4.
Spipola s. Anthus. *Aldr. orn.* 2. *p.* 750. *t.* 751.
Alouette Pipi. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 39. *t.* 4. *Pl. enl. n.* 661. *f.* 2.
Pipit Lark. *Albin. av.* 1. *t.* 44?
Small Lark. *Raj. av. p.* 70. *n.* 7. *Will. orn. p.* 151.
Grashopper. *Brit. zool. n.* 156. *Arct. zool.* 2. *p.* 419. L. *Raj av. p.* 70. *Will. orn. p.* 209. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 419. *n.* 20.
Piplerche. *Frisch av. t.* 16.
Habitat in Europa, *in arborum cacumine inter volandum cantans; an motacillae species?*

cristata. 6. A. rectricibus nigris: extimis duabus margine exteriore albis, capite cristato, pedibus atris. *Scop. ann.* 1. *p.* 128. *n.* 185. *Brünn. orn. p.* 64. *n.* 228. *Kram. el. p.* 362. *Georg. it. p.* 173.
Alauda cristata. *Briss. av.* 3. *p.* 357. *n.* 8.
Alauda cristata major. *Raj. av. p.* 69. *n.* 4. *Aldr. orn.* 2. *p.* 841. *t.* 842. *Gesn. av.* 18.
Cochevis ou grosse Alouette huppée. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 68. *Pl. enl. n.* 503. *f.* 1.
Lodola cappelluta. *Olin. ucc. t.* 13.
Crested Lark. *Will. orn. p.* 208. *t.* 40. *Albin. av.* 3. *t.* 52. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 389. *n.* 23.
Heidelerche. *Frisch av. t.* 15. *Günth. Nest. u. Eyer t.* 9. *f. sup.*
Habitat in Italia, Gallia, Germania, Dania *et* Russia *ad vias et aquas, arvensi major,* $6\frac{3}{4}$ *pollices longa, canora, bis in anno ova* 4-5 *pariens; solitaria.*

Rostrum

Roſtrum *fuſcum*; criſta *reliquo corpore obſcurius tincta, pollicem fere longa*; dorſum *magis cinereum et minus maculatum, quam pratenſi*; pectus *et* abdomen *album, litura flava.*

nemoroſa. 21. A. rectricibus nigris, extimis duabus margine exteriore albis, capite criſtato, pedibus rubris.
Alauda criſtata minor. *Raj. av. p.* 69. *n.* 5. *Briſſ. av.* 3. *p.* 361. *n.* 9.
Lalu ou petite Alouette huppée. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 74. *Pl. enl. n.* 503. *f.* 2.
Leſſer creſted Lark. *Brit. zool.* I. *n.* 141. *Will. orn. p.* 207. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 391. *n.* 24.
Habitat in Italia, Auſtria, Sileſia, Polonia, Anglia, *ſolitaria, criſtata minor, in ſilvis et dumetis nidificans.*

undata. 22. A. rectricibus fuſcis margine rufeſcentibus, pedibus flavicantibus, criſtae verticis pennis nigris margine albis.
Coquillade. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 77. *Pl. enl. n.* 662.
Undated Lark. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 391. *n.* 25.
Habitat in Galloprovincia, $6\frac{3}{4}$ *pollices longa, mane canora, larvis, locuſtis, ſerpentibus victitans; mas et femina in-divulſi ſocii.*
Roſtrum *ſupra fuſcum, ſubtus albidum*; criſta *mobilis*; color *ſupra ex nigricante et rufeſcente miſtus, ſubtus albus*; tectrices *alarum majores apice albae*; remiges *fuſcae, margine rufeſcentes, nonnullae margine aut apice albae*; collum pectusque *maculis nigricantibus varium.*

ſenegalenſis. 23. A. rectricibus duabus intermediis griſeis, reliquis fuſcis, extimis exteriore latere ex rufo albis, capite ſubcriſtato.
Alauda ſenegalenſis criſtata. *Briſſ. av.* 3. *p.* 362. *n.* 10. *t.* 19. *f.* 2.
Griſette ou Cochevis du Sénégal. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 79. *Pl. enl. n.* 504. *f.* 1.
Senegal Lark. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 392. *n.* 26.
Habitat ad fluvium Senegal, $6\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum *corneum*; tinctus *ſupra ex griſeo et fuſco miſtus, ſubtus albidus, gulae maculis minutis fuſcis*; remiges *ex griſeo fuſcae, margine griſeae, baſi intus rufae*; pedes *cum* unguibus *griſei.*

teſtacea. 24. A. rectricibus quatuor intermediis atris, reliquis ex teſtaceo albis, corpore ſupra teſtaceo, ſubtus ex teſtaceo albo.
Teſtaceous Lark. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 393. *n.* 27.

Habitat

Habitat circa Gibraltariam.
Roſtrum *nigrum*; vertex *et* tectrices *alarum nigro-maculatae*; remiges *atrae*; *ſecundariae margine teſtaceae*; pedes *flavi*.

✓ lusitana. 25. A. rectricibus ex rufeſcente luteſcentibus, exterioribus ochroleucis, pedibus incarnatis, roſtro albo.
Portugal Lark. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 393. *n.* 28.
Habitat in Luſitania.
Corpus *ſupra ex rufeſcente pallide luteſcens*, *ſubtus ochroleucum*; tectrices *alarum* remigesque *margine griſeae*; roſtri *apex et* ungues *atri*.

✓ africana. 26. A. cauda, remigibus et tectricibus alarum fuſcis margine albis, corpore ſubtus albo, maculis oblongis fuſcis vario.
Sirli du cap de bonne eſpérance. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 65. *Pl. enl. n.* 712.
African Lark. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 389. *n.* 22.
Habitat ad caput bonae ſpei, 8 *pollices longa*.
Roſtrum *nigrum*; corpus *ſupra ex fuſco*, *rufo et albo varium*; pedes *fuſci*.

✓ cinerea. 27. A. cinerea, abdomine criſſoque albis, remigibus rectricibusque fuſcis: extimis extus prope apicem albis.
Cendrille. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 64?
Cinereous Lark. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 388. *n.* 25.
Longitudo 6 *pollicum*; nares *in ſulco molli membranaceo exiguae*, *rotundae*; pedes *atri*.

✓ rufa. 28. A. rectricibus fuſcis, 8 intermediis margine rufeſcentibus, extimis margine albis.
Variole. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 63.
Petite alouette de Buenos Ayres. *Buff. pl. enl. n.* 738. *f.* 1.
Rufous Lark. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 388. *n.* 20.
Habitat in Bonaria, *ut generatim ad fluvium* Plata, $5\frac{1}{4}$ *pollices longa*.
Roſtrum *fuſcum*; corpus *ſupra nigricans*, *rufo vario tinctum*, *ſubtus album*; remiges *margine rufae*, *majores griſeae*, *minores fuſcae*; pedes *flavicantes*.

✓ capenſis. 8. A. rectricibus tribus lateralibus apice albis, gula lutea nigro-marginata, ſuperciliis flavis.
Alauda capitis bonae ſpei. *Briſſ. av.* 3. *p.* 364. *n.* 11. *t.* 19. *f.* 3.

Cravate

Cravate jaune ou Calandre du cap de bonne eſpérance. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 54. *Pl. enl. n.* 504. *f.* 2.
Cape Lark. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 384. *n.* 18.
Habitat ad caput bonae ſpei, 8 *pollices longa.*
Roſtrum *ex flavicante fuſcum*; corpus *ſupra cum* cauda *fuſcum*, *ſingulis pennis medio obſcurioribus*; mentum *aurantium*; corpus *ſubtus ochroleucum*; pedes *atri*; unguis *poſterior pauliſper curvatus.*

novae Seelandiae. 29. A. ſuperciliis albis, faſcia oculari nigra, criſſo cineraſcente, pedibus ex rubeſcente cinereis.
New Zealand Lark. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 384. *n.* 17. *t.* 51.
Habitat in nova Seelandia, $7\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum *cineraſcens ſupra nigrum*; corpus *ſupra atrum*, *pennis margine cineraſcentibus*, *ſubtus album*; ungues *nigri*, *poſterior fere rectus.*

mongolica. 30. A. vertice ferrugineo vitta alba annulari cincto, media macula alba. *Pall. it.* 3. *p.* 697. *n.* 19. *Act. Stockh.* 1778. 3. *n.* 6.
Mongolian Lark. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 384. *n.* 16.
Habitat in campis ſalſis inter fluvios Ononem *et* Argunum *interjectis*, *humi cantillans ſuaviter*, *calandra major*, *cui affinis.*
Roſtrum *craſſum*; cervix *ferruginea*; jugulum *area magna*, *biloba*, *nigra pictum*; unguis *poſterior digito fere brevior*, *ſed craſſus*, *rectus*, *triqueter.*

ſibirica. 31. A. remigibus ſecundariis albis, vertice, auribus humeriſque ferrugineis, rectrice extima exterius tota alba. *Pall. it.* 2. *p.* 708. *n.* 15.* 3. *p.* 697.
Habitat in Sibiriae *campis apricis ad* Irtim, *humi nidificans*, *volatu cantuque arvenſi inferior*, *ſtatura plurimis congeneribus major*, *calandrae affinis.*
Roſtrum *lividum apice fuſcum*; juguli *maculae*, *et* tectrices *caudae ex luteo ferrugineae*; corpus *ſubtus exalbidum*; remigum *primorum extima margine alba*; pedes *griſei.*

Calandra. 9. A. rectrice extima exterius tota alba, ſecunda tertiaque apice albis, faicia pectorali fuſca.
Alauda major ſ. Calandra. *Briſſ. av.* 3. *p.* 352. *n.* 6. *t.* 20. *f.* 2.
Alauda non criſtata major. *Geſn. ic.* 70.
Tetrax parva. *Geſn. av.* 650.

Calandra.

Calandra. *Arct. zool.* 2. *p.* 393. *n.* 280. *Gesn. av.* 80. *Aldr. orn.* 2. *p.* 846. *t.* 847. *Will. orn. p.* 208. *Olin. ucc. p.* 30. *Edw. glean. t.* 268.

Grosse Alouette ou Calandre. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 49. *Pl. enl. n.* 363. *f.* 2.

Calandre Lark. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 382. *n.* 15.

Habitat in Sardinia, Italia, Galloprovincia, Pyrenaeis, Syria, Russia *australi*, Tatariae *desertis* Tanai *et* Volgae *interjectis*, *ipsa* America, *cristatae magnitudine*, $7\frac{1}{4}$ *pollices longa*, *egregie cantans*, *vocemque aliarum avium imitans*, *in terra nidificans*, 4-5 *ova pariens.*

Rostrum pedes*que pallide grisei*; corpus *supra ex fusco et griseo varium*; gula *alba*; jugulum *luna alba notatum*, *infra quam fascia exalbida nigro-maculata*; abdomen *album*; remiges *obscurae*, *margine*, *minores apice quoque albae*; cauda *nigra.*

✓ **alpestris.** 10. A. rectricibus dimidio interiore albis, gula flava, fascia suboculari pectoralique nigra. *Georg. it. p.* 173. *S. G. Gmelin it.* 1. *t.* 12.

Alauda virginiana. *Briss. av.* 3. *p.* 367. *n.* 12.

Hausse-col noir ou Alouette de Virginie. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 55.

Lark. *Catesb. Car.* 1. *t.* 32.

Shore Lark. *Arct. zool.* 2. *p.* 392. *n.* 278. *Forst. act. angl.* 62. *p.* 398. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 385. *n.* 19.

Schneelerche. *Frisch av. t.* 16.

Habitat in America *septentrionali*, Sibiria, Russia, Polonia, *arvensis magnitudine et habitu*, $6\frac{1}{2}$ *pollices longa*, *gregatim migrans*, *avena aliisque frumentis et graminibus vititans*, *in terra degens*, *vix cantans*; *caro delicioſa.*

Rostrum *et* pedes *cum* unguibus *nigri*; area *oculorum flava*; corpus *supra cum* remigibus *et* cauda *spadiceum*, *striis obscuris*, *subtus flavescens*; tectrices *caudae ferrugineae*; *mari* vertex *fere niger*, feminae *ater*, *huic etiam* dorsum *griseum*, *striis obscurioribus.*

(**flava.** 32. A. supra ex rufo et griseo fusco varia, subtus albida, fronte, mento gulaque flavis, rectricibus nigris margine griseis, extimis margine albis.

Ceinture de Prêtre ou alouette de Sibérie. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 61. *Pl. enl. n.* 650. *f.* 2.

Habitat rarior in Sibiria, $5\frac{3}{4}$ *pollices longa*, *an propria species?*

Rostrum

Roſtrum pedes*que plumbei*; faſcia *ſubocularis et pectoralis nigra*; remiges *griſeae*, *margine obſcuriores.*

obſcura. 33. A. ſubtus alba immaculata, ungue poſteriore digito minore. *Cetti ſtor. nat. di ucc. di Sard. p.* 150.
Habitat in Sardinia, *cum alauda arvenſi magnitudine et fere etiam colore conveniens, at unguis poſterior, quamvis reliquis unguibus longior, digito tamen ipſo brevior; an alauda?*

magna. 11. A. ſubtus flava, faſcia pectorali curva nigra: rectricibus tribus lateralibus albis.
Merula americana torquata. *Briſſ. av.* 2. *p.* 242. *n.* 15.
Fer à cheval ou Merle à collier d'Amérique. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 371.
Large Lark. *Catesb. Car.* 1. *t.* 33.
Creſcent Stare. *Arct. zool.* 2. *p.* 330. *n.* 192.
Habitat in America *ſeptentrionali*, 11 *pollices longa, in arbuſtis et fruticibus ſedens, graminum ſeminibus victitans, canora, caudam motacillae inſtar motitans, in gramine ova* 5 *alba, maculis ferrugineis rarioribus varia pariens, an mera ſturni ludoviciani varietas?*
Roſtrum *nigricans*; vertex, collum, remiges *et* pedes *cum* unguibus *fuſci*; ſtria *a baſi roſtri per verticem ad occiput decurrens pallide griſea*; *inter* roſtrum *et* oculos *macula lutea*; *pone* oculos *utrinque ſtria fuſca*; corpus *ſupra cum* alis *et* cauda *fuſcum, rufo et nigricante varium*; faſcia *pectoralis juniori avi vix conſpicua.*

106. STURNUS. *Roſtrum* ſubulatum, angulato-depreſſum, obtuſiuſculum: Mandibula ſuperiore integerrima, marginibus patentiuſculis. *Nares* ſupra marginatae. *Lingua* emarginata, acuta.

vulgaris. 1. St. roſtro flaveſcente, corpore nigro punctis albis. *Fn. ſuec.* 213. *Scop. ann.* 1. *n.* 189. *Kram. el.* 162. *Brünn. orn. p.* 64. *n.* 229. *Haſſelq. it. p.* 287. *n.* 47. *Müll. zool. dan.* 28.
Sturnus. *Geſn. av.* 747. *Bell. av.* 81. a. *Aldr. orn.* 2. *p.* 631. *Briſſ. av.* 2. *p.* 439. *n.* 1.

Storno.

Storno. *Ol. uec. t.* 18.
Etourneau. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 176. *t.* 15. *Pl. enl. n.* 75.
Stare or Starling. *Brit. zool.* I. *n.* 104. *Raj. av. p.* 67. *n.* I. *Will. orn. p.* 196. *t.* 37. *Alb. av.* I. *t.* 40. *Hayes brit. birds t.* 32.
Common Stare. *Lath. ſyn.* II. I. *p.* 2. *n.* I.
Staar. *Friſch av. t.* 217. *Georg. it.* I. *p.* 173. *Günth. Neſt. u. Eyer t.* 10.

β) Sturnus albus. *Aldr. orn.* 2. *p.* 636. *Briſſ. av.* 2. *p.* 444. A.
White Starling. *Will. orn. p.* 196.

γ) Sturnus leucomelas. *Briſſ. av.* 2. *p.* 444. B.
Black and white Starling. *Will. orn. p.* 156.

δ) Sturnus leucocephalus. *Briſſ. av.* 2. *p.* 444. C.
Sturnus capite albo. *Aldr. orn.* 2. *p.* 637.
Etourneau à tête blanche. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 189.

ε) Sturnus cinereus. *Aldrov. orn.* 2. *p.* 638. *Briſſ. av.* 2. *p.* 446. D.

Habitat per omnem Orbem antiquum, 9 *fere pollices longus, inſectis, lumbricis, ſeminibus, baccis &c. victitans, gregatim migrans, garrulus, imitator, in cavis arborum aut rupium, in ruderibus, columbariis ex foliis aliisque ſiccis materiis nidum ſternens, aut aliarum avium occupans nidum, et ova pariens ex vireſcente cinerea* 5-6, *ex quibus excluſi pulli fuſcum colorem prae ſe ferunt.*

capenſis. 2. St. nigricans, capitis lateribus ſubtusque albus.
Sturnus capitis bonae ſpei. *Briſſ. av.* 2. *p.* 446. *n.* 2. *t.* 41. *f.* 3.
Etourneau-Pie. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 191.
Etourneau du Cap de bonne eſpérance. *Buff. pl. enl. n.* 280.
Cape Stare. *Lath. ſyn.* II. I. *p.* 5. *n.* 2.
Habitat ad caput bonae ſpei, *vulgaris magnitudine.*
Roſtrum *flavicans*; pennae *ſcapulares apice*, alae *margine albae*; pedes *flavi.*

ludovicianus. 3. St. griſeo fuſcoque maculatus, linea capitis ſuperciliisque albis, gula nigra.
Sturnus ludovicianus. *Briſſ. av.* 2. *p.* 449. *n.* 4. *t.* 41. *f.* I.
Etourneau de la Louiſiane ou le Stourne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 192. *Pl. enl. n.* 256.
Louiſiane Stare. *Lath. ſyn.* II. I. *p.* 6. *n.* 3.
Habitat in America *ſeptentrionali, turdi magnitudine*, 9½ *pollices longus.*

Roſtrum

Roſtrum *albidum*, *apice fuſcum*; genae, jugulum, pectus *et* abdomen *flava*; remiges rectrices*que ex rufo griſeae*; pedes *cum* unguibus *griſei*.

Contra. 4. St. fuſcus, macula oculari, faſcia alari, abdomineque albis.
Ictterus bengalenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 94. *n.* 9. *ſuppl. p.* 94.
Contra from Bengal. *Alb. av.* 3. *t.* 21.
Black and white indian Starling. *Edw. av. t.* 187.
Habitat in India, *et ad* caput bonae ſpei, *annon varietas capenſis?*
Color *potius niger*, *quam fuſcus*; ſtria *oculari*s, *et* annulus *colli ſuperioris albus*; tectrices *alarum ſuperiores maculis* 6 *albis*; pedes *ex flavo fuſci*.

Cinclus. 5. St. niger, pectore albo. *Fn. ſuec.* 214. *Brünn. orn. n.* 230. *Müll. zool. p.* 29. *n.* 236.
Motacilla Cinclus. *Scop. ann.* 1. *n.* 223. *Kram. el. n.* 374. *n.* 3.
Motacilla pectore albo, corpore nigro. *Fn. ſuec. p.* 216.
Cinclus. *Nozem. nederl. Vogel t.* 14. *f. ſup.*
Turdus aquaticus. *Geſn. av.* 501.
Merula aquatica. *Geſn. av.* 608. *t.* 609. *Aldr. orn.* 2. *p.* 185. *t.* 186. *Briſſ. av.* 5. *p.* 252. *n.* 19. *Nozem. nederl. Vogel t.* 50.
Merle d'eau. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 8. *p.* 134. *t.* 11. *Pl. enl. n.* 940.
Water-Ouzel or Water-Crake. *Brit. zool.* 1. *n.* 111. *Arct. zool.* 2. *p.* 332. B. *Raj. av. p.* 666. *n.* 7. *Will. orn. p.* 149. *t.* 24. *Alb. av.* 2. *t.* 39. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 48. *n.* 50.
Habitat in Europa, Sibiria, Perſia*que boreali ad aquas, hieme ad cataractas fontesque non congelandos, ubi mire deſcendit per rapidas voragines, voraturus oniſcos aquaticos aliaque inſecta, emergitque non palmipes, hieme ſolitarius, aeſtate plerumque geminus, mere inſectivorus nec granivorus, naribus laminula fere clauſis diſtinctus a motacillis, caudam motitat, in terra ad ripas ex foeno ſiccisque fibris nidum ſtruens, ſiccis quercus foliis ſternens et muſcis portam ſatis amplam muniens, ova pariens* 5 *alba, rubore quodam tincta.*
Gula *alba*; cauda *nigra*; abdomen *ferrugineum*, *juniori avi album*.

milibaris. 6. St. fuſcus, ſubtus ruber. *Mantiſſ.* 1771. *p.* 527.
Etourneau des terres magellaniques, ou Blanche-Raie. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 196. *Pl. enl. n.* 113.

Magellanic Stare. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 7. *n.* 4.
Habitat in insulis Falkland, *vulgaris magnitudine*, 11½ *pollices longus, in terra degens, insectis victitans.*
Ad basin mandibulae *inferioris macula, et pone* oculos *stria alba;* lora *rubra; area ad utrumque* colli *latus nigra;* crissum *et* cauda *subfurcata nigra;* pedes *fusci.*

morita-nus. 7. St. cinereus, capitis parte inferiore et gula ex cinereo et albo variis, ventre cano rufescente-maculato, rostri apice nigro. *Hablizl apud S. G. Gmelin it.* 4. *p.* 174. *et apud Pall. n. nord. Beytr.* 4. *p.* 52.
Habitat in alpibus Persiae funamificis, *alaudae arvensis magnitudine, in rupibus excavatis nidificans, insectis victitans.*

Loyca. 8. St. fusco alboque maculatus, gula et pectore coccineus. *Molin. hist. nat. Chil. p.* 225.
Habitat in Chili, *canorus, facile cicurandus;* femina *dilutius tincta ova* 3 *cinerea, et fusco varia in fovea terrae impressa parit; perpendiculariter cum mare in aërem adscendens et descendens.*

mexica-nus. 9. St. caeruleus nigro varius.
Cotinga mexicana. *Briss. av.* 2. *p.* 347. *n.* 4.
Caxcaxtototl. *Raj. av. p.* 167. *n.* 16.
Cacastol. *Buff. hist. nat. desois.* 3. *p.* 195.
Mexican Stare. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 12. *n.* 13.
Habitat in temperatioribus Americae *australis, vulgaris magnitudine.*
Rostrum *et* oculi *nigri;* irides *luteae;* caput *minutum.*

obscurus. 10. St. niger, capite fusco.
Sturnus novae Hispaniae. *Briss. av.* 2. *p.* 448. *n.* 3.
Tolocatzanatl. *Raj. av. p.* 168. *n.* 3.
Tolcana. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. *p.* 193.
Brown headed Stare. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 11. *n.* 12.
Habitat in nova Hispania, *vulgari minor.*

zeylani-cus. 11. St. linea oculari et altera capitis laterali nigra, corpore griseo maculis lunulisque ochroleucis et albis vario, remigibus viridibus, cauda viridi-nigroque lineata.
Ceylonese Stare. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 11. *n.* 11.
Habitat in Zeylon, *aliarum avium cantum imitans.*
Rostrum *nigrum;* caput *flavescens;* pedes *ex caerulescente grisei.*

12. St.

fuſcus. 12. St. olivaceus, faſcia oculari caeruleſcente, roſtro pedibusque rubeſcentibus.
Brown Stare. *Osb. it.* 2. *p.* 328. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 11. *n.* 10.
Habitat in Sina.
Color ventris *in flavum vergens*; cauda *longa.*

viridis. 13. St. viridis ſubtus caeruleſcens, faſciculo pennarum albarum nigrarumque ad frontem et mentum.
Green Stare. *Osb. it.* 2. *p.* 327. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 10. *n.* 9.
Habitat in Sina.
Supra frontem *ut pone* oculos *macula alba*, *ad* humeros *duae*; remigum rectricumque *rachis alba*; pedes *ex cinereo caerulei.*

ſericeus. 14. St. pallide griſeus, cauda alisque nigris, alarum faſcia transverſa alba, capite ochroleuco.
Silk Starling. *Brown illuſtr. t.* 21.
Silk Stare. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 10. *n.* 8.
Habitat in Sina, *vulgaris magnitudine.*
Roſtrum pedesque *aurantii aut rubri*; plumae *ſericeae.*

caruncu-latus. 15. St. roſtro pedibusque nigris, caruncula ad utrumque oris angulum pendula aurantia.
Wattled Stare. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 9. *n.* 6. *t.* 36.
Habitat in nova Seelandia, *vulgaris magnitudine*, 10 *fere pollices longus*, *voce debili.* Forſter.
Femina *ex ferrugineo fuſca*, *carunculis longe minoribus*; mas *niger*, dorſo *et* tectricibus *alarum ferrugineis.*

collaris. 16. St. cineraſcens, fuſco-maculatus, hypochondriis rufis, gula alba fuſco-maculata. *Scop. ann.* 1. *p.* 131. *n.* 192.
Fringilla gularis. *Sprüngli apud Andreae Briefe aus der Schweiz p.* 202. *t.* 13.
Fringilla ſ. Paſſer in Etruria Sordone dicta. *Manett. orn. t.* 338. *f.* 1.
Fauvette des alpes. *Buff. pl. enl. n.* 668.
Collared Stare. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 8. *n.* 5.
Habitat in Carnioliae, Carinthiae, Helvetiae, Italiae *montibus*, *hieme in valles et pagos deſcendens*, *collurionis magnitudine*, *ſolitarius*, *rarior*, *ſeminibus victitans*, *caudam motitans*, *ſubmiſſa tenuique voce cantillans*, *latebras quaerens*, *dormiturus*, *in terra aut fiſſuris rupium nidificans*, *cicuratus vix diu vivens*, *canorus*, *carne ſapida*; *an ad motacillas relegandus?*

Roſtri *mandibula ſuperior fuſca, inferior flaveſcens apice fuſca*; pectus *ex fuſco cinereum*; abdomen *rufum*; remiges *nigricantes, apicis margine et latere interiore rufeſcentes*; rectrices *fuſcae*; pedes *cornei*.

dauuricus. 17. St. corpore ſupra ex atro violaceo, ſubtus ex cineraſcente albo, capite et cervice ex caeruleſcente canis, verticis litura violaceo-atra (feminis fuſca). *Pall. act. Stockh.* 1778. 3. *p.* 198.

Habitat in Dauuriae *ſalicetis, ultra* 6 *pollices longus, vegetabilibus inſectisque victitans, ova* 3 *ferruginea, turcoſae virore tincta pariens.*

Roſtrum *nigrum, brevius et magis convexum, quam congeneribus*; lingua *nigricans*; irides *fuſcae*; palpebrae *plumoſae et* lora *alba*; caput *feminae cinereum*; dorſum *ex griſeo fuſcum*; tectrices *alarum mari atrae, viridi-ſericeae*; *ſecundariae apice albae*; remiges *nigrae intimae* 2 *apice albae, ſecundariae extus, primores apice viridinitentes*; cauda *ſubfurcata, tectricibus violaceis, rectricibus ex viridante atris*; pedes *ex caeruleſcente nigri*.

107. TURDUS.

Roſtrum tereti-cultratum: mandibulae ſuperioris apice deflexo, emarginato.

Nares nudae, ſuperne membranula ſemitectae.

Faux ciliata.

Lingua lacero-emarginata.

viſcivorus. 1. T. dorſo fuſco, collo maculis albis, roſtro flaveſcente. *Scop. ann.* 1. *p.* 132. *n.* 193. *Brünn. orn. p.* 65. *n.* 231. *Kram. el. p.* 361. *n.* 6.

Turdus viſcivorus. *Geſn. av.* 759. *t.* 760. *Aldr. orn.* 2. *p.* 593. *t.* 582.

Turdus viſcivorus major. *Raj. av. p.* 64. *n.* 1.

Turdus major. *Briſſ. av.* 1. *p.* 200. *n.* 1.

Tordo. *Olin. ucc. t.* 25.

Draine. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 295. *t.* 19. *f.* 1. *Pl. enl. n.* 489.

Miſſel Bird or Shrite. *Will. orn. p.* 187. *Alb. av.* 1. *t.* 33.

Miſſel

Miſſel Thruſh. *Brit. zool.* 1. *n.* 105. *Arct. zool.* 2. *p.* 341. B. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 16. *n.* 1.
Groſe Miſteldroſſel. *Friſch av. t.* 25.
Miſtler. *Günth. Neſt. u. Eyer t.* 42.
Habitat in Europae *ſilvis*, 11 *pollices longus*, *ſibimet ipſi malum cacans diſſeminator viſci ilicisque*, *taxi etiam et oxyacanthae baccis*, *larvis inſectisque victitans*, *verno tempore a cacuminibus ſilvarum egregie cantillans*, *cumque femina volitans*, *in dumetis et arbuſtis bis in anno nidum ex muſcis*; *lichenibus*, *foliis ſtruens*, *gramine marcido ſternens*, *et extus bacillis muniens*, *ovaque* 4-5 *ſordide incarnata*, *maculis ſanguineis varia pariens*: *Caro ſapida.*

Roſtrum *baſi et angulis flavum*, *cetera fuſcum*; corpus *ſubtus ochroleucum*, *maculis in gula fuſcis*, *inferius nigris*; remiges rectricesque *fuſcae*, *margine pallidiores*, 3 *extimae apice albae*; pedes *flavi*; ungues *nigri.*

pilaris. 2. T. rectricibus nigris: extimis margine interiore apice albicantibus, capite uropygioque cano. *Fn. ſuec.* 215. *Scop. ann.* 1. *p.* 133. *n.* 194. *Brünn. orn. p.* 65. *n.* 232. *Müll. zool. dan. p.* 29. *n.* 238. *Kram. el. p.* 361. *n.* 7.
Turdus pilaris. *Geſn. av.* 753. *Aldr. orn.* 2. *p.* 595. *t.* 596.
Turdus pilaris ſive Turdela. *Briſſ. av.* 2. *p.* 214. *n.* 5.
Litorne ou Tourdelle. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 301. *t.* 19. *f.* 2. *Pl. enl. n.* 490.*
Fieldfare or Feldefare. *Brit. zool.* 1. *n.* 106. *Arct. zool.* 2. *p.* 340. A. *Raj. av. p.* 64. *n.* 3. *Will. orn. p.* 188. *t.* 37. *Alb. av.* 1. *t.* 36. *Hayes brit. birds t.* 31. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 24. *n.* 11.
Krametsvogel. *Friſch av. t.* 26.
β) Turdus pilaris minor. *Nozem. nederl. Vogel t.* 13.
γ) Turdus pilaris naevius. *Briſſ. av.* 2. *p.* 218. B.
Pied Fieldfare. *Alb. av.* 2. *t.* 36.
δ) Turdus pilaris leucocephalus. *Briſſ. av.* 2. *p.* 217. A.
ε) Turdus pilaris, capite colloque albis, corpore ex albo et fuſco vario.
Habitat in Europae, Sibiriae, Syriae *ſilvis aceroſis*, 10 *pollices longus*, *gregatim migrans*, *in arboribus altis nidificans*, *ilicis*, *oxyacanthae aliisque baccis victitans*; *romani in ornithone maxima diligentia alebant turdos*, *altiles reddebant*, *chare pendebant*, *quamvis caro interdum amara ſit*, *teſte* Varrone, Plutarcho: *Nil melius turdo*, *nil vulva pulcrius ampla*, Horat. *Autumno gregarius gallos adit.*

Roſtrum *flavicans apice nigrum*; vertex *et* cervix *ex cinereo olivacea*; corpus *ſupra badium*; remiges *cinereae*; guttur *et* pectus *ex rufo flavicans*; abdomen *et* criſſum *exalbida*; pedes *nigricantes*.

africanus. 14. T. nigricans, pectore pennis nigris rufo-marginatis tecto, roſtro flavo, pedibus cinereis. *Jacq. Beytr. p.* 29. *n.* 23. *t.* 14.
Habitat in Africa.
Caput *et* gula *nigra*; roſtri *apex nigricans*; oculi *nigri*; colli *etiam* abdominis*que anterioris pennae margine rufae, poſterioris margine albae*; pedes *nigro-annulati*.

tripolitanus. 29. T. ex olivaceo flavus ſubtus exalbidus, remigibus nigris, cauda aequali nigricante, apice flava.
Merle olivâtre de Barbarie. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 404.
Tripoli Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 23. *n.* 10.
Habitat in Barbaria.

barbaricus. 30. T. viridis, pectore albo maculato, uropygio caudaeque apice flavo.
Grive Baſſette de Barbarie. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 313.
Green Thruſh. *Shaw it. p.* 253.
Barbary Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 23. *n.* 9.
Habitat in Barbaria, *viſcivori magnitudine, alis alaudae, pedibus robuſtis*.

Aonalaſchkae. 31. T. fuſcus atro-maculatus, pectore flavo nigro-maculato, tectricibus alarum, remigibus primoribus, rectricibusque atris, margine teſtaceis.
Unalaſha Thruſh. *Arct. zool.* 2. *p.* 338. *n.* 202.
Aoonalaſhka Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 23. *n.* 8.
Habitat in Aunalaſhca, *alaudae magnitudine*.

iliacus. 3. T. alis ſubtus ferrugineis, ſuperciliis albicantibus. *Fn. ſuec.* 218. *Scop. ann.* 1. *n.* 196. *Müller zool. p.* 29. *n.* 239. *Kram. el. p.* 361. *n.* 9.
Turdus ilias. *Geſn. av.* 760. *t.* 761. *Aldr. orn.* 2. *p.* 597. *t.* 598.
Turdus iliacus. *Nozem. nederl. Vogel t.* 12. *Klein av.* 66. *Briſſ. av.* 2. *p.* 208. *n.* 3. *t.* 20. *f.* 1.
Mauvis. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 309. *Pl. enl. n.* 51.
Redwing, Swinepipe or Wind Thruſh. *Brit. zool.* 1. *n.* 108. *Arct. zool.* 2. *p.* 342. D. *Raj. av. p.* 64. *n.* 4. *Will. orn. p.* 189. *Albin. av.* 1. *t.* 35. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 22. *n.* 7.

Tordo

Tordo saffello. *Olin. ucc. t.* 25.
Weindroſſel. *Friſch av. t.* 281.
Weisdroſſel. *Günth. Neſt. u. Eyer t.* 33.
Habitat in Europa, *numeroſis gregibus migrans, pilari minor*, 9 *fere pollices longus, in dumetis et ſepibus nidificans, et ova* 6 *ex caeruleo viridia, nigro-maculata pariens, vere egregie cantans, in terris auſtralibus vineis damnum inferens.*
Roſtrum *nigricans*; pedes *pallide griſei*; ungues *fuſci*; colore *muſico ſatis ſimilis.*

minor. 32. T. ſpadiceus, ſubtus albus, pectore flavicante, maculis atris vario.
Turdus iliacus carolinenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 212. *n.* 4.
Grivette d'Amérique. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 289.
Little Thruſh. *Arct. zool.* 2. *p.* 338. *n.* 201. *Edw. glean. n.* 296. *Catesb. Car.* 1. *t.* 31. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 20. *n.* 5.
Habitat in Jamaica *et ſeptentrionali* America, 7 *pollices longus, migrans, baccis victitans, vix canorus, in ſilvis denſis uliginoſisque nidificans.*
Roſtrum *fuſceſcens*; orbitae *dilutius tinctae*; pedes *cinerei.*

jamaicenſis. 33. T. ſupra cinereus, roſtro, capite pedibusque fuſcis, remigibus caudaque atris, mento gulaque albis fuſco ſtriatis, pectore cinereo, jugulo et abdomine albis.
Jamaica Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 20. *n.* 4.
Habitat in Jamaica, *merulae magnitudine.*

guianenſis. 34. T. ſupra ex vireſcente fuſcus, ſubtus ochroleucus: ſtriis longitudinalibus atris.
Grive de la Guyane. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 289. *Pl. enl. n.* 398. *f.* 1.
Gujana Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 20. *n.* 3.
Habitat in Gujana, 7 *pollices longus.*

muſicus. 4. T. remigibus baſi interiore ferrugineis. *Fn. ſuec.* 217. *Scop. ann.* 1. *n.* 196. *Müll. zool. n.* 240. *Brünn. orn. n.* 236. *Kram. el. p.* 361. *n.* 8.
Turdus ſimpliciter dictus viſcivorus minor. *Geſn. av.* 762. *Aldr. orn.* 2. *p.* 599. *t.* 600.
Turdus minor. *Briſſ. av.* 2. *p.* 203. *n.* 2.
Tordo meſſano. *Ol. ucc. t.* 25.
Grive. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 280. *Pl. enl. n.* 406.
Mavis Throttle or Songthruſh. *Brit. zool.* 1. *n.* 107. *Arct. zool.*

zool. 2. *p.* 342. C. *Raj. av. p.* 64. *n.* 2. *Will. orn. p.* 188. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 18. *n.* 2.
Singdroſſel. *Friſch av. t.* 27.
β) Turdus minor leucocephalus. *Briſſ. av.* 2. *p.* 207. A.
γ) Turdus minor criſtatus. *Briſſ. av.* 2. *p.* 207. B.
δ) Turdus minor totus albus, fuſco parumper tinctus.
Habitat in Europae *ſilvis*, 9 *pollices longus*, *veſpere vernali in arboris faſtigio luſciniam cantilena imitans*, *et per* 9 *fere menſes continuans*; *bis vel ter in anno in dumetis humilioribus ex terra*, *muſcis et ſtramine nidum ſtruens*, *argilla intus obliniendum*, 5-6 *ova ex caeruleſcente viridia*, *maculis paucis nigris varia pariens.*
Viſcivoro minor, *ſed tinctu ſimilis*, *ut tamen maculae inferiores ſagittas potius referant*: *Cauda ſubbifida.*

olivaceus. 5. T. ſubfuſcus, ſubtus fulcus. *Mantiſſ.* 1771. *p.* 526.
Merula olivacea capitis bonae ſpei. *Briſſ. av.* 3. *p.* 294. *n.* 43. *t.* 22. *f.* 3.
Merle olive du Cap de bonne eſpérance. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 381.
Habitat ad caput bonae ſpei, *iliaci magnitudine*, $8\frac{1}{4}$ *pollices longus.*
Roſtrum, pedes, ungues, rectrices 2 *intermediae fuſcae*, *reliquae ferrugineae*; corpus *ſupra ex fuſceſcente griſeum aut olivaceum*, *ſubtus flavum*, *aut cum* uropygio *ferrugineum*; lora *nigra*; gula *ex flavo fuſca*, *maculis fuſcis.*

indicus. 35. T. olivaceus, roſtro pedibusque nigricantibus, remigibus interiori latere fuſcis.
Merula olivacea indica. *Briſſ. av.* 2. *p.* 298. *n.* 45. *t.* 31. *f.* 2.
Merle olive des Indes. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 384. *Pl. enl. n.* 564. *f.* 1.
Indian Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 66. *n.* 81.
Habitat in India, *iliaco minor*, 8 *pollices longus.*

cinereus. 36. T. cinereus, rectricibus duabus intermediis cinereis, proximis utrinque nigris margine et apice cinereis, reliquis nigris.
Merula indica cinerea. *Briſſ. av.* 2. *p.* 286. *n.* 39. *t.* 25. *f.* 3.
Merle cendré des Indes. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 385.
Aſh-coloured Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 67. *n.* 82.
Habitat in India, *iliaco minor*, $7\frac{3}{4}$ *pollices longus.*
Roſtrum pedes*que nigri*; tectrices *alarum majores nigrae*, *margine griſeae*; remiges *nigrae*, *margine*, *ſecundariae latere quoque interiori albae.*

6. T.

migratorius. 6. T. griſeus, abdomine rufo, palpebris albis, rectrice extima apice interiore alba.

Turdus canadenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 225. *n.* 9.
Turdus pilaris migratorius. *Kalm it.* 3. *p.* 46.
Litorne de Canada. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 307.
Grive de Canada. *Buff. pl. enl. n.* 556. *f.* 1.
Fieldfare of Carolina. *Catesb. Car.* 1. *t.* 29.
American Fieldfare. *Forſter act. angl.* 62. *p.* 399.
Red breaſted Thruſh. *Arct. zool.* 2. *p.* 335. *n.* 196. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 26. *n.* 12.

Habitat in America *ſeptentrionali a ſinu* Hudſonis *ad ſinum* Natka *et* Carolinam *usque, viſcivori magnitudine*, 9 *pollices longus, gregatim migrans, egregie cantans, facile cicurandus, vermibus, inſectis, ſaſſafras ſeminibus, phytolaccae baccis aliisque victitans, nidum ex radicibus, muſcis, mare feminam adjuvante, in arboribus ſtruens, ovaque* 4-5 *aquae marinae aut caeli ſereni tinctu pariens, ex quibus poſt* 14 *dies prodeunt pulli.*

Caput *fuſcum*; gula *cineraſcens*; orbitae *oculorum albae*; macula *utrinque inter oculos et roſtrum alba*; tectrices *alarum inferiores albae.*

Trichas. 7. T. olivaceus, corpore ſubtus flavo, faſcia oculari nigra.

Avis marilandica, gutture luteo. *Petiv. gaz. t.* 6. *f.* 1.
Ficedula marilandica. *Briſſ. av.* 3. *p.* 506. *n.* 58.
Figuier aux joues noires. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 292.
Maryland Yellowthroat. *Edw. glean. t.* 237.
Yellow breaſted Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 399. *n.* 283. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 438. *n.* 32.
Ficedula area inter oculos alba.
Fauvette à poitrine jaune de la Louiſiane. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 162. *Pl. enl. n.* 709. *f.* 2.

Habitat aeſtate in Carolinae, Marylandiae *et* Penſylvaniae *ſilvis humidis depreſſis*, 5 *pollices longus, an potius motacillae ſpecies?*

Roſtrum *fuſcum, ad ejus baſin ſuperiorem area oculorum nigricans convergit*; pedes *incarnati*; rectrices *et* remiges *primores margine flavae*; vertex *cinereus.*

canorus. 8. T. fuſcus, ſubtus ferrugineus, linea alba ad latera capitis, cauda rotundata. *Amoen. ac.* 4. *p.* 241.

Turdus chinenſis. *Osb. it.* 309.
Merula benghalenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 260. *n.* 25.
Baniahbou de Bengale. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 379. *Alb. av.* 3. *t.* 19.

Brown indian Thruſh. *Edw. av. t.* 184.
Crying Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 35. *n.* 32.
Habitat in Bengala *et* Sina, *merulae magnitudine*, 9½ *pollices longus*, *oryza*, *muſcis*, *tineis*, *carne victitans*, *alta voce cantans.*
Roſtrum *et* irides *flavae*; pedes *rubeſcentes*; femina *tota ferruginea*, *exceptis* remigibus *et tribus* rectricibus, *maximam partem albis.*

rufus. 9. T. rufus ſubtus exalbidus maculatus, remigibus unicoloribus, cauda rotundata rufa.
Turdus carolinenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 223. *n.* 8.
Moqueur françois. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 323. *Pl. enl. n.* 645.
Fox-coloured Thruſh. *Catesb. Car.* 1. *t.* 28.
Ferruginous Thruſh. *Arct. zool.* 2. *p.* 335. *n.* 195. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 39. *n.* 41.
Habitat in America *a* Noveboraco *ad* Carolinam *usque*, *iliaci magnitudine*, 11-12 *pollices longus*, *multiplici varietate cantans*, *baccis*, *padi potiſſimum victitans*, *in dumetis humilioribus nidificans*, *et ova* 5 *alba*, *maculis ferrugineis denſe obſita pariens.*
Alarum *faſcia duplex alba*; pedes *fuſci.*

polyglottus. 10. T. obſcure cinereus, ſubtus pallide cinereus, remigibus primoribus exteriore dimidio albis.
Turdus americanus minor ſonans. *Raj. av. p.* 64. *n.* 5.
Turdus minor caeruleo-albus immaculatus. *Raj. av. p.* 185. *n.* 31.
Turdus minus major. *Briſſ. av.* 2. *p.* 266. *n.* 29.
Grand Moqueur. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 325. *Pl. enl. n.* 558. *f.* 1.
Singing Bird, Mocking Bird or Nightingale. *Sloan. jam.* 2. *p.* 306. *n.* 34.
Mock Bird. *Catesb. Car.* 1. *t.* 27. *Kalm it.* 1. *p.* 217. 2. *p.* 90. *t.* 3.
Mimic Thruſh. *Arct. zool. p.* 333. *n.* 194. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 40. *n.* 42.
Habitat in Jamaicae *et* Americae *ſilvis humidis*, *migrans*, *merulae magnitudine*, *ſed gracilior*, 9½ *pollices longus*; *muſcis*, *aliisque inſectis*, *moris et variis aliis baccis victitans*, *vocem aliarum avium mirifice imitans*, *cantu*, *noctu potiſſimum ſonoro*, *continuo*, *multiplici*, *grato*, *ſubtili*, *luſciniam ipſam ſuperans*, *animoſus*, *praeter incuba-*

cubationis tempus, ad domicilia accedens, in dumetis et arboribus, ipsis pomiferis nidificans, et ova 5-6 *caerulea aut margaritacea spadiceo maculata pariens.*

Rostrum *nigrum*; irides *flavae*; cauda 4 *pollices longa*; pedes *cinerei.*

Orpheus. 11. T. dorso fusco, pectore rectricibusque lateralibus albidis, superciliis albis. *Brown jam. p.* 469.
Mimus. *Briss. av.* 2. *p.* 262. *n.* 27.
Cencontlatolli seu quadringentae linguae. *Fernand. nov. Hisp. p.* 20. *Raj. av. p.* 159.
Moqueur. *Buff. hist. nat. desois.* 3. *p.* 325.
Polyglott bird. *Will. orn. p.* 294.
Lesser mocking bird. *Edw. av. t.* 78.
Mocking Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 41. *n.* 43.
β) Mimus varius. *Briss. av.* 2. *p.* 264. *n.* 28.
Tzonpan. *Fern. nov. Hisp. p.* 38. *Raj. av. p.* 160. *Will. orn. p.* 394.
γ) Turdus (Theuca) fusco-cinereus, subtus cinereus, remigibus rectricibusque apice albis. *Mol. hist. nat. Chil. p.* 222. *n.* 5.
Habitat in Jamaica, *et calidioribus paulo* Americae *partibus, polyglotto victu, moribus, imitandi praesertim arte, cantus varietate et gratia similis, at minor,* $8\frac{1}{2}$ *pollices longus; γ) in arboribus nidum cylindricum pedem longum, porta angusta struens, spinis extus muniens, lana et plumis intus sternens, ovaque* 3-4 *alba fusco-maculata pariens.*
Rostrum oculique *fusci*; corpus *supra ex fusco cinereum, in β) et γ) fusco et albo maculatum, subtus ex albido cinereum*; cauda *subcuneata, in γ) fere rotundata*; pedes *nigri, in γ) fusci.*

sandwichensis. 37. T. supra et abdomine fuscescens, subtus et fronte ex cinereo albus.
Sandwich Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 39. *n.* 40.
Habitat in insulis Sandwich, $5\frac{1}{2}$ *pollices longus.*
Rostrum pedes*que atri*; cauda *aequalis.*

pacificus. 38. T. supra cinereus, subtus ex fuscescente albus, loris atris, cauda nigra apice alba.
Pacific Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 38. *n.* 39.
Habitat in insulis amicis oceani australis, $5\frac{1}{2}$ *pollices longus.*
Rostrum pedes*que atri*; tempora *et* area *subocularis ex fuscescente alba*; colli pectoris*que latera in fuscum vergentia.*

39. T.

suratensis. 39. T. capite subcristato, collo, cauda, remigibus majoribus, pedibusque nigris, corpore supra succineo, subtus lorde griseo, tectricibus alarum remigibusque secundariis viridibus.

Merle huppé de Surate. *Sonner. it. 2. p. 194.*
Surat Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 39. *n.* 38.
Habitat in Surate, 8 *pollices longus.*
Rostrum *rufescens*; irides *rubrae.*

philippensis. 40. T. supra olivaceus, collo et pectore rufis albo-maculatis, abdomine et crisso ochroleucis.

Petite Grive des philippines. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 316.*
Philippine Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 38. *n.* 37.
Habitat in insulis Philippinis, *merulae magnitudine.*

Shanhu. 41. T. mento, gula et area oculorum nigris, litura ad aures magna alba, reliquo capite, cum jugulo, pectore et abdomine griseis, dorso et alis ex virescente fuscis.

Black-faced Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 37. *n.* 36.
Habitat in Sinae *silvis frequens, insectis utplurimum victitans, merulae magnitudine.*
Rostrum *atrum*; pedes *fusci.*

novae Hollandiae. 42. T. ex caerulescente plumbeus, capitis parte anteriore, rostro, mento, gula pedibusque nigris, remigibus rectricibusque atris margine plumbeis, intermediis apice albis.

New Holland Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 37. *n.* 35.
Habitat in terra van Diemen, 7 *pollices longus.*

plumbeus. 12. T. ater, axillis luteis, cauda cuneata. *Molin. hist. nat. Chil. p.* 221.

b) Turdus caerulescens, gula alba atro-punctata, cauda cuneata.

Merula cinerea americana. *Briss. av. 2. p. 288. n. 40.*
Merle Tilly. *Feuill. per.* 126.
Tilly ou Grive cendrée d'Amérique. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 314.*
Merle cendré d'Amérique. *Buff. pl. enl. n. 560. f. 1.*
Red legged Thrush. *Arct. zool. 2. p. 337. n. 200. Catesb. Car. 1. t. 30. Lath. syn.* II. 1. *p.* 33. *n.* 29.
Habitat in America *septentrionali et australi, insulis* Bahamicis, Andros *et* Ilathera, *voce et moribus congenerum, cantu continuo, molli, harmonico, non cicurandus, in arboribus ad rivos nidum ex limo struens, et ova* 3 *pariens,*

riens, baccis, amyridis praesertim elemiferae, victitans, carne graveolente, iliaco major, ultra 10 *pollices longus; femina mare minor.*

Mas *totus ater, excepta litura lutea subalari magna;* feminae rostrum, palpebrae, irides, pedes*que rubri;* palatum *aurantium;* caput *et* corpus *cinereum, subtus pallidius; inter* rostrum *et* oculos *macula nigra;* gula *alba lineolis nigris, subtus magis albicans;* remiges *nigricantes, margine griseae;* rectrices *nigricantes,* 4 *exteriores utrinque apice albae.*

crassirostris. 43. T. supra ex rufo, subtus ex atro fuscus, remigibus et rectricum aequalium acuminatarum duabus intermediis obscurioribus.

Thickbilled Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 34. *n.* 30. *t.* 37.

Habitat in nova Seelandia, *viscivori magnitudine,* 9 *pollices longus.*

Rostrum *nigricans;* irides *margaritae colore;* tempora *ex atro fusca;* colli *pennae* pectoris*que media stria rufescente, abdominis alba notatae;* pedes *atri.* Femina *spadicea, subtus dilutior;* tectrices *alarum fasciis duabus rufis.*

ulietensis. 44. T. ex rufo fuscus, remigibus margine atris, cauda rotundata atra.

Bay Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 35. *n.* 31.

Habitat in Ulietea, *musici magnitudine,* $8\frac{1}{2}$ *pollices longus.*

Rostrum *ex rubescente margaritaceum;* pedes *nigri.*

pallidus. 45. T. ex flavicante cinereus, subtus albidus, rectricibus ex cinereo fuscis, lateralibus apice albis.

Pale Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 32. *n.* 27.

Habitat in Sibiria, *ultra lacum* Baikal.

sibiricus. 46. T. niger, ore flavo, superciliis tractuque sub alis albis.

Pall. it. 3. *p.* 694. *n.* 10.

White-browed Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 31. *n.* 26.

Habitat rarissimus in Sibiriae *silvis alpinis et magis borealibus, empetri baccis inhians, canorus, viscivoro minor.*

ruficollis. 47. T. supra fuscus, subtus niveus, collo rectricibusque aequalibus rufis: intermediis duabus cinereis. *Pall. it.* 3. *p.* 694. *n.* 9.

Red-necked Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 31. *n.* 25.

Habitat in summis Dauuriae *jugis, lariceto obsitis, viscivori magnitudine.*

48. T.

obſcurus. 48. T. fuſcus, ſuperciliis, mento criſſoque albis.
Dark Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 31. *n.* 24.
Habitat in Sibiriae *ſilvis, ultra lacum* Baical.
Vox *tinnunculi*; pectus *nigricans.*

phoenicurus. 49. T. ſupra olivaceus, ſuperciliis albis, faſcia oculari nigra, remigibus et intermediis duabus rectricibus ſpadiceis, lateralibus cum gutture et pectore rufis.
Red-tailed Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 31. *n.* 23.
Habitat ad caput bonae ſpei, 7 *pollices longus.*
Roſtrum *et* vertex *atra*; pedes *nigri.*

ruficaudus. 50. T. ſupra olivaceus, ſubtus ex purpuraſcente albus, remigibus et rectricibus atris: lateralibus plurimam partem rufis.
Rufous-tailed Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 30. *n.* 22.
Habitat ad caput bonae ſpei, 7 *pollices longus.*
Roſtrum *apice curvatum* pedes*que nigri*; rectrices *laterales ad* $\frac{2}{3}$, tectrices *caudae ſuperiores totae rufae.*

malabaricus. 51. T. ex cinereo griſeus, ſubtus ex rufo fuſcus, remigibus roſtroque nigris, pedibus flavis.
Martin vieillard de la Côte de Malabar. *Sonner. it.* 2. *p.* 195.
Malabar Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 30. *n.* 21.
Habitat in Malabar, 8 *pollices longus.*
Roſtrum *apice flavicans*; capitis colli*que pennae longae, anguſtae, ſtria per mediam ſcapi longitudinem alba.*

pagodarum. 52. T. niger, dorſo uropygioque griſeo, criſſo albo, capite criſtato.
Martin Brame. *Sonner. it.* 2. *p.* 189.
Pagoda Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 30. *n.* 20.
Habitat in Malabar *et* Coromandel, *potiſſimum circa turres templorum, fringilla domeſtica paulo major.*
Roſtrum *nigrum, apice flavum*; irides *glaucae*; capitis, colli, *et inferiores* corporis *pennae longae anguſtae*; pedes *cum* unguibus *flavi.*

cayennenſis. 53. T. cinereus, ſubtus exalbidus, criſſo albo, tectricibus alarum majoribus remigibusque nigris, gula, roſtro pedibusque atris.
Litorne de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 306.
Grive de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 515.
Cayenne Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 29. *n.* 19.
Habitat in Cayenna, *muſici magnitudine*, 8 *pollices longus*; corporis *pennae ſuperiores margine albae, inferiores medio atrae*

atrae; remiges *minores et* tectrices *alarum margine ferrugineae.*

variegatus. 54. T. supra fuscus, subtus albidus, pennis albidis et nigris interspersis.
Grive seconde. *Fermin Surin.* 2. *p.* 187.
Variegated Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 29. *n.* 18.
Habitat in Surinam, *alaudae magnitudine, vermibus et insectis victitans; carne sapida.*

striatus. 55. T. ex flavo et griseo varius, stria dorsi longitudinali flava.
Grive premiere. *Fermin Surin.* 2. *p.* 187.
Yellow backed Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 29. *n.* 17.
Habitat in Surinam, *magnitudine et victu cum variegato conveniens.*

fuscus. 56. T. ex olivaceo fuscus, pectore et abdomine exalbidis, fusco maculatis, remigibus primoribus pedibusque atris.
Brown Thrush. *Arct. zool.* 2. *p.* 337. *n.* 199. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 28. *n.* 16.
Habitat in Noveboraco, *iliaci magnitudine.*

mustelinus. 57. T. mustelinus, subtus albus nigro-maculatus, genis fuscis albo-maculatis, uropygio, remigibus primoribus acuminatisque rectricibus fuscis.
Tawny Thrush. *Arct. zool.* 2. *p.* 337. *n.* 198. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 29. *n.* 15.
Habitat in Noveboraco, *iliaci magnitudine.*

camtschatkensis. 58. T. fuscescens, subtus ex fuscescente albus, superciliis pallidis, mento-gulaque caryophylli colore.
Kamtschatka Thrush. *Arct. zool.* 2. *p.* 343. E. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 28. *n.* 14.
Habitat in Camtschatca, 6 *pollices longus.*
Rostrum *atrum, apice nigrum;* area *inter rostrum et oculos nigra;* cauda *subcuneata;* ungues *nigri.*

naevius. 59. T. capite fasciaque pectorali nigris, stria ab oculis ad occiput ferruginea, corpore supra cinereo, subtus ferrugineo.
Varied Thrush. *Arct. zool.* 2. *p.* 337. *n.* 197. *t.* 15.
Spotted Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 27. *n.* 13.
Habitat in sinu Americae Natca, 10 *pollices longus.*
Rostrum *nigrum*; tectrices *alarum majores macula ferruginea trigona prope apicem notatae*; remiges *atrae, maculis in exteriori latere duabus ferrugineis*; pedes *flavi.*

Feminae

Feminae mentum *et* gula *cinerea*, *albo intermiſta*; faſcia *pectoralis nulla*; corpus *ſubtus rubrum*, *verſus* criſſum *ſenſim albeſcens*.

hudſonius. 60. T. ex caeruleſcente cinereus, roſtro pedibusque nigris, pennis verticis, nuchae, tectricibus alarum, remigibusque primariis margine pallide rufis.
Hudſonian Thruſh. *Arct. zool.* 2. *p.* 339. *n.* 204.
Habitat ad ſinum Hudſonis, $7\frac{1}{2}$ *pollices longus.*

novebora-censis. 61. T. capite, collo et pectore ex nigro et dilute ferrugineo variis, dorſi pennis margine ferrugineis, faſcia duplici ſupraoculari et ſuboculari, alis, cauda rotundata viridi-nitente, pedibusque nigris.
New-York Thruſh. *Arct. zool.* 2. *p.* 339. *n.* 205.
Habitat in America *ſeptentrionali*, *merulae magnitudine.*
Roſtrum *atrum.*

curaeus. 62. T. ater nitens, roſtro ſubſtriato, cauda cuneata. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 229.
Habitat in Chili *gregarius*, *egregie et continue cantans*, *voces que aliarum avium*, *et cicuratus ipſius hominis imitans*, *in circulo volitans*, *facile cicurandus*, *frumenti ſeminibus*, *vermibus*, *carne*, *aviculis victitans*, *interdiu victum quaerens*; *nidum ex virgis et caricibus ſtruens*, *plumisque et lana ſternens*, *ova* 3 *ex caeruleo alba pariens*; *inter ſturnos et merulas medius*, *viſcivori magnitudine.*
Roſtrum, oculi, pedes, ungues, *et ipſa caro ad oſſa usque nigra*; cauda 5 *pollices longa.*

niteus. 13. T. viridis: macula tectricum alarum violaceo-nitida.
Merula viridis angolenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 311. *n.* 53. *t.* 30. *f.* 2.
Shining Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 56. *n.* 60.
β) Merula viridis, ſubtus violacea, gula uropygioque caeruleis.
Merle vert d'Angola. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 372. *Pl. enl. p.* 561.
Habitat in Angola *et ad* caput bonae ſpei, *merulae magnitudine*, 9 *pollices longus.*
Roſtrum pedes*que nigri.*

aeneus. 63. T. viridi-nitens, ſubtus aeneus, capite nigricante aureo-nitente, uropygio et rectricibus intermediis purpuraſcentibus, cauda cuneiformi.

Merula

Merula viridis longicauda ſenegalenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 313. *n.* 54. *t.* 31. *f.* 1.
Merle vert à longue queue du Sénégal. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 369. *Pl. enl. n.* 220.
Merle cuivre d'Afrique. *Salern. orn. p.* 182.
Gloſſy Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 57. *n.* 61.
Habitat ad fluvium Senegal, *merula major*, 18 *pollices longus.*
Roſtrum pedes*que nigri*; cauda 11 *pollices longa.*

auratus. 64. T. violaceus, dorſo alisque viridi-aureis, alarum ad marginem internum faſcia caudaque cum tectricibus ſuperioribus caerulea.
Merle violet du royaume de Juida. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 373. *Pl. enl. n.* 540.
Gilded Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 57. *n.* 62.
Habitat in regno Africae Whidah, *merula major.*
Roſtrum *fuſcum*; irides *flavae*; pedes *ſpadicei.*

leucogaſter. 65. T. violaceus, ventre albo, remigibus nigricantibus, roſtro pedibusque cinereis.
Merle violet à ventre blanc de Juida. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 402. *Pl. enl. n.* 648. *f.* 1.
Whidah Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 58. *n.* 64.
Habitat in regno Africae Whidah, *alauda non major*, $6\frac{1}{2}$ *pollices longus.*

roſeus. 15. T. ſubincarnatus, capite, alis caudaque nigris, occipite criſtato. *Fn. ſuec.* 219. *S. G. Gmelin nov. comm. Petrop.* 15. *p.* 478. *t.* 23. *f.* 1.
Turdus roſeus, capite ex nigro caeruleo et cirrho retro compto alis et cauda nigris. *Klein av.* 71.
Turdus Seleucis. *Forſk. Fn. arab. p.* VI. a. *p.* 5. *n.* 16.
Sturnus roſeus. *Scop. ann.* 1. *p.* 130. *n.* 191.
Merula roſea. *Aldr. orn.* 2. *p.* 626. *Raj. av. p.* 67. *n.* 9. *Briſſ. av.* 2. *p.* 250. *n.* 20.
Merle couleur de roſe. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 348. *t.* 22. *Pl. enl. n.* 251.
Roſe- or carnation-coloured Ouzel. *Brit. zool.* 2. *app. p.* 627. *t.* 5. *Arct. zool.* 2. *p.* 344. G. *Will. orn. p.* 194. *Edw. av. t.* 20.
Roſe-coloured Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 50. *n.* 52.
Habitat in variis Europae *partibus*, Sibiria, Syria, *gregatim migrans, locuſtis potiſſimum victitans, ſturni vulgaris magnitudine*, 8 *fere pollices longus.*

Roſtrum *incarnatum baſi nigricans*; irides *pallidae*; capiti, collo, alis, caudae *nitor caeruleus, purpureus et viridis*; pedes *rubicundi*; ungues *adunci, fuſci.*

leucurus. 66. T. niger, uropygio caudaque albis, rectricibus apice nigris.
White-tailed Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 49. *n.* 51. *t.* 38.
Habitat circa Gibraltariam, *merula minor*, 8 *pollices longus.*
Roſtrum *plumbeum*; rectrices 2 *intermediae extrema parte dimidia nigrae*; pedes *cum* unguibus *flavicantes.*

cafer. 16. T. nigricans ſubcriſtatus, uropygio ventreque albis, criſſo rubro.
Merula criſtata capitis bonae ſpei. *Briſſ. av.* 2. *p.* 257. *n.* 23. *t.* 20. *f.* 2.
Merle huppé du Cap de bonne eſpérance. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 393. *Pl. enl. n.* 563. *f.* 1.
Gobe-mouche à tête noire de la Chine. *Sonner. it.* 2. *p.* 197.
Cape Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 72. *n.* 92.
β) Merula ſupra ex fuſceſcente cinerea, fuſceſcente ſtriata, ſubtus cana.
Habitat in Sina *et ad* caput bonae ſpei, *alauda criſtata major*, 8 *pollices longus.*
Roſtrum *nigricans*; caput *cum* criſta *ex violaceo nigrum*; corporis *pennae ſuperiores fuſcae, margine griſeae*; guttur *et* pectus *fuſcum, nitore violaceo*; remiges *et* cauda *cuneiformis fuſca, haec apice alba.*

macrourus. 67. T. ex purpuraſcente nitenti-niger, ſubtus ex ferrugineo fulvus, uropygio et rectricibus tribus utrinque extimis albis.
Long-tailed Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 72. *n.* 93. *t.* 39.
β) Turdus rectricibus 2 intermediis nigris, reliquis dimidiato-albis.
Gobe-mouche à longue queue de Gingi. *Sonner. it.* 2. *p.* 196.
Habitat in Pulo-Condore *et* Malabar, *alaudae magnitudine*, 11½ *pollices longus.*
Roſtrum *et* ungues *nigri*; rectrices *inaequales* 2 *intermediae* 6½, *extimae* 2½ *pollices longae*; 6, 6, 5, 5 *totae nigrae*; 4, 4 *dimidiato-albae*; pedes *flaveſcentes.*

amboinenſis. 68. T. ſpadiceus, ſubtus flavus, remigibus ſecundariis a baſi ad medium flaveſcentibus, cauda cuneiformi ſubtus fulva.
Merula amboinenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 244. *n.* 16.
Avicula amboinenſis cinerea. *Seb. theſ.* 1. *p.* 99. *t.* 62. *f.* 4
Merle d'Amboine. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 394.

Amboine

Amboine Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 73. *n.* 94.
Habitat in Amboina, *egregie cantans, incubationis tempore caudam in dorſum reflectens, alauda major.*

borbonicus. 69. T. ex cinereo olivaceus, vertice nigro, abdomine criſſoque ex olivaceo flavis, cauda fuſca, faſciis duabus obſoletis verſus apicem.
Merula borbonica. *Briſſ. av.* 2. *p.* 293. *n.* 42. *t.* 24. *f.* 3.
Merle de l'isle de Bourbon. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 395.
Bourbon Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 73. *n.* 95.
Habitat in inſula Bourbon, *alauda major*, 8 *fere pollices longus.*
Roſtrum pedes*que flavicantes*; abdominis *medium album*; remiges *fuſcae*, *margine rufeſcentes.*

ochrocephalus. 70. T. remigibus majoribus, cauda pedibusque viridibus, vertice genisque flaveſcentibus, loris nigris, abdomine pectoreque cinereis, hoc maculis ſagittatis vario.
Yellow-crowned Thruſh. *Brown Illuſtr. p.* 50. *t.* 22. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 74. *n.* 96.
Habitat in inſulis Zeylon *et* Java, *frequenter cicuratus, voces aliarum avium mirifice imitans.*
Roſtrum *nigrum*; *maculae* pectoris *albae et atrae.*

orientalis. 71. T. niger, ſubtus albus, uropygio cinereo, faſcia oculari nigra, rectricibus tribus utrinque extimis utroque latere albis.
Merula indica. *Briſſ. av.* 2. *p.* 248. *n.* 19. *t.* 31. *f.* 3.
Merle des Indes. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 397. *Pl. enl. n.* 273. *f.* 2.
Aſhrumped Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 74. *n.* 97.
Habitat in India, *alauda vix major*, $6\frac{1}{2}$ *pollices longus.*
Roſtrum *nigrum*; tempora *alba*; pedes remiges*que nigricantes*, *primores interiori latere a baſi ad medium*, *ſecundariae exteriori latere albae*; cauda *ſubcuneata.*

nigerrimus. 72. T. totus niger, pennis margine flavis, genis gulaque holoſericeis.
Merula madagaſcarienſis aurea. *Briſſ. av.* 2. *p.* 247. *n.* 18. *t.* 24. *f.* 2.
Merle doré de Madagaſcar. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 398. *Pl. enl. n.* 539. *f.* 2.
Black-checked Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 75. *n.* 98.
Habitat in Madagaſcar, *alaudae magnitudine*, $5\frac{3}{4}$ *pollices longus.*

hiſpaniolenſis. 73. T. olivaceus, ſubtus ex olivaceo et griſeo varius, rectricibus fuſcis, margine interiori albidis, exteriori olivaceis, intermediis totis olivaceis.
Merula olivacea dominicenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 296. *n.* 44. *t.* 27. *f.* 2.
Merle olive de S. Domingue. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 403. *Pl. enl. n.* 273. *f.* 1.
Hiſpaniola Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 75. *n.* 99.
Habitat in inſula S. Dominici, 6 *pollices longus.*
Roſtrum *et* pedes *ex griſeo fuſci;* remiges *et* tectrices *alarum majores fuſceſcentes, margine exteriori olivaceae, interiori albidae.*

albifrons. 74. T. ex atro plumbeus, ſubtus luteſcens, frontis macula alba, pedibus fuſcis.
White-fronted Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 71. *n.* 91.
β) Turdus niger, ſubtus albus, cauda ſubtus cinerea.
Habitat in nova Seelandia, 7 *fere pollices longus.*

capenſis. 17. T. fuſcus, abdomine ſubflaveſcente, criſſo luteo.
Merula fuſca capitis bonae ſpei. *Briſſ. av.* 2. *p.* 259. *n.* 25. *t.* 2. *f.* 3.
Brunet du Cap de bonne eſpérance. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 390.
β) Turdus capite gulaque nigris.
Merle à cul jaune du Cap. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 390. *Pl. enl. n.* 317.
Habitat ad caput bonae ſpei, *alaudae magnitudine*, $7\frac{1}{4}$ *pollices longus.*

atricapillus. 18. T. fuſcus, capite atro, abdomine uropygioque rufis, macula alari alba.
Merula atricapilla capitis bonae ſpei. *Briſſ. av. app. p.* 47. *n.* 66. *t.* 3. *f.* 2.
Merle à tête noire du Cap de bonne eſpérance. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 388. *Pl. enl. n.* 392.
Habitat ad caput bonae ſpei, *iliaci magnitudine*, 9 *pollices longus.*

mauritianus. 75. T. ex vireſcente profunde caeruleus, capitis collique pennis anguſtis longioribus, roſtro cinereo, pedibus plumbeis.
Merle vert de l'isle de France. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 388. *Pl. enl. n.* 648. *f.* 2.
Mauritius Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 69. *n.* 88.

Habitat

Habitat in insula Franciae, *iliaci magnitudine*, 7 *pollices longus.*

mindanaensis. 76. T. chalybeus, subtus albus, fascia alarum longitudinali alba, cauda subcuneata.

Merle de Mindanao. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. *p.* 387. *Pl. enl. n.* 627. *f.* 1.

Mindanao Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 69. *n.* 87.

Habitat in Mindanao, 7 *pollices longus.*

Rostrum *plumbeum*; pedes *fusci.*

madagascariensis. 77. T. fuscus, abdomine crissoque albis, cauda subfurcata, rectricibus duabus intermediis totis, reliquis margine exteriori viridi-aureis, extimis utrinque margine exteriori albis.

Merula madagascariensis. *Briss. av.* 2. *p.* 274. *n.* 33. *t.* 25. *f.* 1.

Merle de Madagascar ou Tanaombé. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. *p.* 386. *Pl. enl. n.* 557. *f.* 1.

Madagascar Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 68. *n.* 86.

Habitat in Madagascar, *iliaco minor*, $7\frac{1}{4}$ *pollices longus.*

Rostrum pedes*que nigri*; uropygium *ex virescente*, pectus *et* hypochondria *ex rufo fusca*; remiges *nigricantes*, 2-6 *exteriori latere partim albae*, *partim violaceae*; *secundariae nigrae*, *violaceo et viridi variae.*

senegalensis. 78. T. ex griseo fuscus, abdomine exalbido, rostro, remigibus, cauda pedibusque fuscis.

Merula senegalensis. *Briss. av.* 2. *p.* 261. *n.* 26. *t.* 22. *f.* 2.

Merle brun du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. *p.* 385. *Pl. enl. n.* 563. *f.* 2.

Senegal Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 68. *n.* 85.

Habitat ad fluvium Senegal, *iliaco minor*, 8 *pollices longus.*

longirostris. 79. T. ex olivaceo pallide fuscus, subtus pallide sulphureus, uropygio et superciliis flavicantibus, cauda rotundata flava: rectricibus intermediis fuscis.

Longbilled Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 67. *n.* 84.

Habitat in insulis Eimeo *et* York, $9\frac{1}{2}$ *pollices longus.*

Rostrum $1\frac{1}{2}$ *pollices longum apice vix emarginatum et* pedes *ex fusco incarnati*; digiti *longi*; unguis *posterior magnus*; capitis *pennae breves acuminatae*; tectrices *alarum* remiges*que margine flavescentes*; *nonne alauda?*

griſeus. 80. T. griſeus, vertice et cervice albidis, pectore, abdomine et criſſo ex pallidiſſimo rubro griſeis.
Merle gris de Gingi. *Sonner. it.* 2. *p.* 193.
Grey Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 67. *n.* 83.
Habitat in Coromandel, *merula minor, vermes et inſecta pro victu in ſtercore conquirens.*
Roſtrum *ochroleucum*; pedes *flavicantes.*

palmarum. 19. T. viridi-olivaceus, ſubtus ſubcinereus, capite nigro, maculis utrinque tribus albis.
Merula palmarum. *Briſſ. av.* 2. *p.* 301. *n.* 47. *t.* 29. *f.* 1.
Palmiſte. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 400. *Pl. enl. n.* 539. *f.* 1.
Palm Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 76. *n.* 101.
β) Merula palmarum atricapilla. *Briſſ. av.* 2. *p.* 303. *n.* 48. *t.* 29. *f.* 2.
Habitat in Cayennae *palmis, alaudae magnitudine,* $6\frac{1}{2}$ *pollices longus.*
Pedes, vertex, roſtrum *et* collum *cinerea*; mentum *album*; remiges *fuſcae, margine olivaceae.*

monacha. 81. T. ſupra flavus fuſco tinctus, ſubtus flaveſcens, capite nigro, nigredine in pectus usque producta et acuto fine terminata.
Moloxita ou religieuſe d'Abiſſinie. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 405.
Nun Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 77. *n.* 102.
Habitat in Abyſſiniae *ſilvis, merulae magnitudine, baccis aliisque fructibus victitans, frequens in arboribus ad praecipitia naſcentibus.*
Roſtrum *rubeſcens*; tectrices *alarum*, rectrices*que fuſcae, margine flavae*; remiges *nigricantes, margine dilute griſeae.*

aethiopicus. 82. T. niger ſubtus albus, faſcia alarum transverſa alba, cauda rotundata: rectricibus apice quadratis.
Merle noir et blanc d'Abiſſinie. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 406.
Ethiopian Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 78. *n.* 103.
Habitat in Abyſſiniae *ſilvis denſis, iliaci magnitudine, cuculi canori voce, baccis et fructibus victitans.*

abyſſinicus. 83. T. fuſcus, ſubtus fulvus, gula fuſcelcente, pedibus nigris.
Merle brun d'Abiſſinie. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 407.
Abyſſinian Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 78. *n.* 104.

Habitat

Habitat in Abyſſinia, *iliaci magnitudine, uvis victitans; palmae quoque cujusdam, ut fertur, floribus.*

cochinchinenſis. 84. T. viridis, maculis ad baſin roſtri utrinque caeruleis, facie, mento et gula nigris, hac arcu flavo cincta.
Verdin de la Cochin-chine. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 409. *Pl. enl. n.* 643. *f.* 3.
Habitat in Cochinchina, *carduelis magnitudine.*
Roſtrum pedes*que atri*; viror *verſus caudam, remigumque marginem exteriorem in caeruleum colorem vergens.*

cinnamomeus. 85. T. cinnamomeus, ſubtus dilutior, gula, pedibus, temporibus, genis, mento, tectricibus alarum, gula et pectore nigris, torque albo nebuloſo.
Merle à cravate de cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 392. *Pl. enl. n.* 560. *f.* 2.
Black-breaſted Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 79. *n.* 107.
Habitat in Cayenna, *iliaco minor*, 7 *circiter pollices longus.*
Tectrices *alarum minores apice albae, reliquae apice rufae;* cauda 2 *circiter pollices longa.*

rufifrons. 86. T. fuſcus, ſubtus, fronte temporibusque rufus, criſſo albo, cauda pedibusque cinereis.
Merle roux de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 402. *Pl. enl. n.* 644. *f.* 1.
Rufous Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 80. *n.* 108.
Habitat in Cayenna, *alauda minor*, $6\frac{1}{2}$ *pollices longus.*
Roſtrum *nigricans*; tectrices *alarum nigrae, apice flavae.*

cantans. 87. T. ex rufo fuſcus, ſtriis transverſis atris aut nigricantibus varius, ſubtus exalbidus, mento, genis gulaque ex rufo aurantiis, area nigra albo-maculata ad utrumque colli latus.
Arada. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 480.
Muſicien de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 706. *f.* 2.
Muſician Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 80. *n.* 109.
Habitat in Cayennae *ſilvis profundis, in arboribus*, 4 *pollices longus, ſolitarius, formicis aliisque inſectis victitans, cantus multiplici varietate et ſuavitate celebris*
Roſtrum *nigrum*; cauda *pollicem longa*; pedes *flavicantes.*

Coraya. 88. T. rufo-fuſcus, ſubtus dilutior, vertice, capitis collique lateribus nigris, cauda grilea, lineis nigricantibus varia.
Coraya. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 484. *Pl. enl. n.* 701. *f.* 1.
Barred-Tail Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 81. *n.* 110.

Magnitudo *luſciniae*; longitudo $5\frac{1}{2}$ *pollicum*; roſtrum *turdi*; *infra oculum ſtriae plures albae*; mentum *et* gula *alba*; cauda 2 *pollices longa*; pedes *flavicantes*.

fuſcipes. 89. T. cinereus, ſubtus rufus, vertice nigro, pedibus remigibusque fuſcis, cauda ſubcuneata.
Buffwinged Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 81. *n.* 111.
Habitat in Cayenna? $6\frac{1}{2}$ *pollices longus.*
Cauda $2\frac{1}{2}$ *pollices longa*; tectrices *alarum bubalini coloris.*

Alapi. 90. T. ex olivaceo fuſcus, gutture et pectore nigris, abdomine cinereo, cauda cuneiformi nigricante.
Alapi de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 485. *Pl. enl. n.* 701. *f.* 2.
White-backed Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 82. *n.* 112.
Habitat in Gujanae *ſilvis denſis*, *gregarius in terra*, *aliquando inferiores arborum ramos conſcendens*, *rariſſime diu volans*, *quamvis agiliſſimus*, *formicis victitans*; *vox ingrata*; *longitudo* 6 *pollicum.*
Pedes *flaveſcentes*; alae *ex cinereo fuſcae*, *tectricibus albomaculatis*; mari *in medio dorſo macula alba*; feminae *nulla*, *cui* mentum *album*, corpus *reliquum ſubtus*, *et* tectrices *alarum apice rufeſcunt.*

cirrhatus. 91. T. cinereus, cauda cuneiformi margine et apice alba, vertice criſtato, gula ex albo et nigro varia, jugulo et pectore nigris.
Fourmilier huppé. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 476.
Black-creſted Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 83. *n.* 113.
Habitat in Cayenna, 6 *pollices longus*, *formicis victitans*, *voce pulli gallinacei*, *pluries per annum nidificans*, *et* 3 *ova pariens.*
Irides *nigrae*; tectrices *alarum utplurimum apice albae*; cauda $2\frac{1}{2}$ *pollices longa*; criſta *mobilis*, mari *nigra*, feminae *rufa.*

tintinnabulatus. 92. T. vertice temporibusque albis nigro-maculatis, ſuperciliis nigris, mento albo, pectore incarnato nigro-maculato, dorſo, alis caudaque fuſcis, uropygio, abdomine et criſſo ex rufo aurantiis.
Carrilloneur. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 478. *Pl. enl. n.* 700. *f.* 2.
Chiming Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 83. *n.* 114.
Habitat in Cayenna *et* Gujanae *ſilvis profundis*, *victu congeneribus ſimilis*, *et gregibus exiguis*, *voce campanae triplicis ſono aemula*, 4 *pollices longus.*

Roſtrum

Roſtrum *ſupra nigrum*, *ſubtus album*; tectrices *alarum albo-maculatae*; pedes *atri*.

Bambla. 93. T. maculatus, ſupra ex rufo fuſcus, ſubtus cinereus, alis nigris: faſcia transverſa alba.
Bambla. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 479. *Pl. enl. n.* 703. *f.* 2.
Black-winged Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 84. *n.* 115.
Habitat in Cayenna, *rarior*, *fringillae domeſticae magnitudine*, $5\frac{1}{2}$ *pollices longus.*
Roſtrum *nigrum*; cauda $\frac{1}{2}$ *pollicem longa atra*; pedes *ex nigricante fuſci.*

auritus. 94. T. ex rufo et olivaceo varius, ſubtus albus, vertice et torque ex rufo fuſcis, mento gulaque nigris, pennis pone oculos et ad latera colli nitente-albis, elongatis latioribus.
Fourmilier à oreilles blanches. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 477. *Pl. enl. n.* 822.
White-eared Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 84. *n.* 116.
Habitat in Cayenna, *formicis victitans*, *fringillae domeſticae magnitudine*, *infra* 5 *pollices longus.*
Roſtrum pedes*que atri*; feminae *torques latior*, faſcia *ocularis vireſcens*, mentum *et* gula *alba.*

Colma. 95. T. ex rufo fuſcus, ſubtus cinereus, mento gulaque nigromaculata albis, pectore ex griſeo fuſco.
Colma. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 475. *Pl. enl. n.* 703. *f.* 1.
Rufous-naped Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 85. *n.* 117.
β) Turdus ex atro fuſcus, occipite et cervice rufis.
Tétéma. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 475. *Pl. enl. n.* 821.
Habitat in Cayenna, 7 *fere pollices longus.*
Roſtrum *nigricans*; nucha *rufa*; *ad baſin* narium *macula alba*; cauda $1\frac{1}{4}$ *pollicem longa*; pedes *ſpadicei.*

tinniens. 96. T. ſupra fuſcus, ſubtus albus, pectore atro-maculato, cauda aequali.
Grand Béfroi. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 470. *t.* 22. *Pl. enl. n.* 706. *f.* 1.
Alarum Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 86. *n.* 118.
Habitat in Cayenna, $6\frac{1}{2}$ *pollices longus*, *mane et veſpere per horae ſpatium altiſſime vociferans*, *voce campanarum ſono ſimili*; *caro ſapida.*
Roſtrum *ſupra nigrum*, *ſubtus album*; pedes *pallide plumbei.*

lineatus. 97. T. ex olivaceo fuſcus, mento, gula et pectore albis, hoc fuſco-maculato, colli lateribus albo-lineatis.
Petit Béfroi. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 472.
Fourmilier grivelé de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 823. *f.* 1.
Speckled Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p* 87. *n.* 119.
Habitat in Cayenna, $5\frac{1}{2}$ *pollices longus.*
Roſtrum pedes*que fuſci*; tectrices *alarum maculis rufeſcentibus.*

formicivorus. 98. T. ſupra ex rufo fuſcus, ſubtus cinereus, mento, gula et pectore nigris, faſcia ex albo nigroque varia circumſcriptis.
Palikour ou fourmilier. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 473. *Pl. enl. n.* 700. *f.* 1.
Ant Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 87. *n.* 120.
Habitat in Cayenna, *alaudae magnitudine*, 6 *pollices longus*, *agilis*, *non longinque volans*, *ſed certhiae inſtar arbores adſcendens et cauda ſe ſuſtinens*, *nidum ex muſcis ſtruens*, *et ova pariens fuſca paſſerinis aequalia*, *verſus finem latiorem obſcurius maculata.*
Roſtrum, dorſi *medium*, *et* alae *nigrae*; irides *rubeſcentes*; *area* oculorum *caerulea*; cauda *breviſſima*, *rufa*; tectrices *plurimae apice ex rufo flavae*; alae *ſpuriae albae.*

cyanurus. 99. T. ſpadiceus, ſubtus caeruleis et flavis ſtriis transverſis alternis varius, vertice ad nucham usque remigibus et faſcia oculari nigris, altera aurantia, faſcia pectorali et cauda cuneiformi caeruleis.
Azurin. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 410. 4. *p.* 470.
Merle de la Guyane. *Buff. pl. enl. n.* 355.
Blue tailed Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 88. *n.* 121.
Habitat in Gujana, *rarior*, *medius inter corvos et turdos*, *merula major*, $8\frac{1}{2}$ *pollices longus.*
Roſtrum pedes*que fuſci*; mentum *et* gula *flaveſcens*; tectrices *alarum majores apice albae.*

rex. 100. T. ex rufo fuſcus, ſubtus dilutior, occipite plumbeo, fronte ex albo fulcoque varia.
Roi des fourmiliers. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 468. *Pl. enl. n.* 702.
King Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 89. *n.* 122.
Habitat in America *auſtrali*, *potiſſimum* Gujana *et* Braſilia, *prope colles a termitibus exſtructos*, *quibus victitat*, *gregibus affinium intermiſtus*, *corvo affinis*, *pennis tamen recumbentibus ad nares nullis*, *viſcivori magnitudine*, $7\frac{1}{2}$ *pollices longus*; *caro ſapida.*

Roſtrum

Roſtrum *fuſcum*; remiges *atrae*; criſſum *albidum*; *ad latus* mandibulae *inferioris ſtria*, *in medio* pectoris *macula trigona alba*; pedes *rubeſcentes*, *ſupra genua nudi*; ungues *pallidi*; femina *mare major*.

ſinenſis. 20. T. rufeſcens, capite fuſco ſtriato, ſupercilliis albis, rectricibus fuſcis ſtrigis obſcurioribus, pedibus flavis.

Turdus ſinenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 221. *n.* 7. *t.* 23. *f.* 1.
Hoamy de la Chine. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 316.
Chineſe Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 36. *n.* 33.
Habitat in Sina, *iliaco minor et ſimilis.*
Corpus *ſupra ex rufo fuſcum*, *ſubtus ex rufo flavum*; roſtrum *flavicans*; caput collum*que per longitudinem fuſco-ſtriata*; cauda *rotundata.*

arcuatus. 101. T. ſupra ſpadiceus, ſuperciliis, loris, mento criſſoque albis, genis arcuque gutturis albis, cauda rotundata, verſus apicem nigra, apice alba.

Creſcent Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 73. *n.* 34.
Habitat in Sina, 11 *pollices longus.*
Roſtrum pedes*que plumbei*; *pone* oculos *faſciculus pennarum albarum laxarum*; abdomen *ex rubeſcente album*; ungues *albi.*

melanopis. 102. T. griſeus, dorſo alisque ex vireſcente fuſcis, orbitis, mento gulaque nigris, macula aurium alba.

Blackfaced Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 37. *n.* 36.
Habitat in Sinae *ſilvis*, *merulae magnitudine*, *inſectis victitans.*
Roſtrum *atrum*; pedes *fuſci.*

violaceus. 103. T. ex violaceo caeruleus, pennis capitis, colli, pectoris et tectricibus alarum ad apicem chalybeo-faſciatis, roſtro pedibusque nigris.

Merle bleu de la Chine. *Sonner. it.* 2. *p.* 188. *t.* 108.
Habitat in Sina, *merulae magnitudine.*
Irides *rubrae*; tectrices *alarum duae faſcia alba.*

leucocephalus. 104. T. griſeus, remigibus nigris, minoribus cum tectricibus alarum et cauda viridi-aeneis violaceo-nitentibus.

Merle Dominiquain de la Chine. *Sonner. it.* 2. *p.* 191.
White-headed Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 59. *n.* 66.
Habitat in Sina, *merula paulo major.*
Roſtrum *nigricans*, *rubro flavoque tinctum*; pedes *flavi*; tectrices *alarum albo-maculatae*; capitis colli*que pennae laxae et anguſtae*, *in mare albae.*

105. T.

nigricollis. 105. T. fuscus, capite, mento et nucha albis, fascia oculari et pectore flavescente, collo, dorso inferiori remigibusque nigris, cauda cuneiformi plumbea.
Blacknecked Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 60. *n.* 68.
Habitat in Sina, 9 *pollices longus.*
Rostrum pedes*que atri*; remiges *secundariae apice albae.*

Bubil. 106. T. terrae umbriae colore, fascia pone oculos longitudinali nigra.
Boubil de la Chine. *Sonner. it.* 2. *p.* 193.
Chanting Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 61. *n.* 70.
Habitat in Sina *australi, sola avis canora Sinensium, merulae magnitudine.*
Rostrum pedes*que ex flavicante grisei.*

perspicillatus. 107. T. capite colloque cinereis, fronte et litura sub oculis utrinque nigra, corpore supra ex virescente fusco, subtus ochroleuco.
Merle de la Chine. *Buff. hist. nat. desois.* 3. *p.* 368. *Pl. enl. n.* 604.
Spectacle Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 61. *n.* 71.
Habitat in Sina, *merula paulo major*, $8\frac{1}{2}$ *pollices longus.*
Rostrum *nigricans*; cauda *subcuneata*; rectrices 2 *intermediae ex virescente, reliquae obscurius fuscae*; pedes *flavi.*

flavus. 108. T. flavus, orbitis albis, fascia a mandibula superiore pone oculum producta nigra, rostro pedibusque rubris.
Merle jaune de la Chine. *Sonner. it.* 2. *p.* 193.
Yellow Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 63. *n.* 74.
Habitat in Sina, *merulae magnitudine.*
Irides *griseae*; rachis *pennarum alba.*

viridis. 109. T. viridis, superciliis, macula infraoculari, abdomine crissoque albis, gula grisea albo-maculata, pectore rufescente. *Georg. it. p.* 505.
Green Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 65. *n.* 79.
Habitat in Sina, *aqua se lavans, pilaris magnitudine, 7 pollices longus.*
Rostrum *nigrum*, *subtus flavicans*, apice *fuscum*; cauda *aequalis*; pedes *cum* unguibus *flavicantes.*

ater. 110. T. ex griseo fuscus, subtus ex virescente flavus, nigro-maculatus, rostro, pedibus, fronte, facie, mento et gutture nigris, hoc rufo marginato.

Merle

Merle à gorge noire de S. Domingue. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 382. *Pl. enl. n.* 559.
Black throated Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 65. *n.* 78.
Habitat in inſula S. Dominici, *viſcivori magnitudine*, $7\frac{1}{2}$ *pollices longus.*
Vertex *rufus*; tectrices *alarum majores et* remiges *ex nigricante fuſcae, margine dilute griſeae*; uropygium *ex vireſcente flavum*; cauda 3 *pollices longa, rotundata, ex nigricante fuſca, rectricibus lateralibus margine nigricantibus.*

dominicus. 21. T. ſubfuſcus ſubtus albus, remigibus primoribus baſi albis, rectricibus tribus extimis albis. ✓
Merula dominicenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 284. *n.* 38. *t.* 27. *f.* 1.
Merle de S. Domingue. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 325.
St. Domingo Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 42. *n.* 44.
Habitat in inſulis S. Dominici *et* Jamaica, *iliaci magnitudine*, $8\frac{3}{4}$ *pollices longus.*
Roſtrum pedes*que nigricantes.*

braſilienſis. 111. T. niger, ſubtus ex ferrugineo flaveſcens, uropygio ferrugineo, cauda ſubcuneata: rectricibus extimis totis, ceteris apice albis. ✓
Yellow-bellied Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 42. *n.* 45.
Habitat in Braſilia, *dominici magnitudine.*
Alarum *faſcia transverſa alba*; pedes *fuſci.*

Merula. 22. T. ater, roſtro palpebrisque fulvis. *Fn. ſuec.* 220.* *Nozem. nederl. Vogel t.* 10. *Scop. ann.* 1. *n.* 197. *Kram. el. p.* 360. *n.* 3. *Müller zool. n.* 29. 241. ✓
Merula. *Bell. av.* 30. b. *Geſn. av.* 603. *Aldr. orn.* 2. *p.* 602. *t.* 604. 605. *Briſſ. av.* 2. *p.* 227. *t.* 10.
Merle. *Olin. ucc. p.* 29.
Merle. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 330. *t.* 20. *Pl. enl. n.* 555.
Blackbird. *Brit. zool.* 1. *n.* 109. *t.* 47. *Arct. zool.* 2. *p.* 345. 1. *Raj. av. p.* 65. *n.* 1. *Will. orn. p.* 190. *Alb. av.* 1. *t.* 37. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 43. *n.* 46.
Schwarze Amſel. *Friſch av. t.* 29. *Günther Neſt. u. Eyer t.* 39.
β) Merula leucocephala. *Briſſ. av.* 2. *p.* 230. A.
γ) Merula varia. *Briſſ. av.* 2. *p.* 231. B.
Pied blackbird. *Alb. av.* 2. *t.* 37.
δ) Merula alba. *Briſſ. av.* 2. *p.* 232. C.

Habitat

Habitat in Europae *temperatae ſilvis, et dumetis, aeſtate quoque in hortis et prope domus, etiam in* Syria, *ſolitaria, timida, inquieta; juniperum diſſeminans; primo jam vere ſuavi, ſed altiſſima voce canens, facile cicuranda, tumque etiam alias et ipſam humanam vocem imitans, in ſepibus nidum ex ſtramine, muſcis, gramine ſicco ſtruens, intus argilla oblinens, et foeno ſternens, ova pariens 4-5 ex caeruleſcente viridia obſcure maculata.*

Femina *et* pulli *annotini fuſci, colore ſubtus in rufum vergente;* roſtro *nigro.*

aurantius. **112.** T. ex nigricante fuſcus, gula et abdomine albidis, roſtro pedibusque aurantiis.

Merula jamaicenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 277. *n.* 34.
Merle. *Fermin ſurin.* 2. *p.* 182.
Merle brun de la Jamaïque. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 391.
Thruſh. *Sloan. jam. p.* 305. *t.* 256. *f.* 2. *Raj. av. p.* 185. *n.* 30.
White-chinned Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 45. *n.* 47.

β) Merula gula fuſca.
γ) Merula nigra.
δ) Merula americana. *Briſſ. av.* 2. *p.* 308. *n.* 51.

Habitat in Jamaicae *montibus ſilvoſis, β) in* nova Caledonia, *γ) in* Surinam, *δ) in* America *calidiori, merulae magnitudine, fructibus et inſectis victitans, nidum ex muſcis, ramuſculis et radicibus compingens; caro bona.*

Pinguedo *etiam aurantia.*

labradorius. **113.** T. nitenti-niger, caeruleo et viridi tinctu, roſtro pedibusque nigris.

Labrador Thruſh. *Arct. zool.* 2. *p.* 340. *n.* 206. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 46. *n.* 48.

Habitat in terra Labrador, $8\frac{1}{2}$ *pollices longus.*
Digitus *poſterior longus, ungue robuſto.*

torquatus. **23.** T. nigricans, torque albo, roſtro flaveſcente. *Fn. ſuec.* 221. *Scop. ann.* 1. *p.* 198. *Müll. zool. n.* 242. *Brünn. orn. n.* 237. *Kram. el. p.* 360. *n.* 4.
Merula torquata. *Geſn. av.* 607. *Aldr. orn.* 2. *p.* 620. *t.* 621. 622. *Briſſ. av.* 2. *p.* 235. *n.* 12.
Merulae congener. *Raj. av. p.* 67. *n.* 12. *Will. orn. p.* 195.
Merle à plaſtron blanc. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 340. *t.* 31. *Pl. enl. n.* 516.

Ring-

Ring-Ouzel or Amſel. *Brit. zool.* I. *n.* 110. *t.* 46. *Arct. zool.* 2. *p.* 344. H. *Raj. av. p.* 65. *n.* 2. *Will. orn. p.* 194. *Albin. av.* I. *t.* 39. *Lath. ſyn.* II. I. *p.* 46. *n.* 49.

Ringamſel. *Friſch av. t.* 30.

β) Merula torquata alba.

γ) Merula torquata albo-maculata.

δ) Merula albo-maculata, non torquata.

Habitat in Europa, Aſia, Africa, *merula major*, 11 *pollices longus*, *gregatim migrans*, *inſectis baccisque victitans*, *pinguescens*, *et tum carnem ſapidam exhibens*, *in terra ad radicem fruticis merulae inſtar nidificans*, *et ova pariens*.

Roſtrum *nigricans*; os *interius flavum*; pedes *fuſci*; pennae *ſingulae margine cinereae*.

ſaxatilis. 114. T. fuſcus ſubtus ſordide aurantius, fuſco alboque undulatus, uropygio ferrugineo, mento albo, gula, et rectricibus intermediis fulcis, his margine, lateralibus totis aurantiis.

Merula ſaxatilis. *Raj. av. p.* 68. *n.* 3.

Greater Redſtart. *Will. orn. p.* 197. *t.* 36.

Rock Thruſh. *Lath. ſyn.* II. I. *p.* 54. *n.* 57.

Habitat in Italia, Hiſpania, *regione* altaica, *timidus*, *turdi magnitudine*.

Eremita. 115. T. orbitis albidis, vertice olivaceo, occipitis et ſuperioribus pennis fulcis prope apicem albidum atro-faſciatis, inferioribus ex rufo albis, margine fulcis, uropygio cinereo.

Merula ſolitaria philippenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 272. *n.* 32. *t.* 28. *f.* I.

Solitaire des Philippines. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 364. *Pl. enl. n.* 339.

Hermit Thruſh. *Lath. ſyn.* II. I. *p.* 54. *n.* 56.

Habitat in inſulis Philippinis, $7\frac{1}{2}$ *pollices longus*.

Roſtrum, remiges, cauda, pedes *fuſci*.

manillenſis. 116. T. ex cinereo caeruleus, uropygio caeruleo, remigibus caudaque margine rufa nigricantibus, gutture et pectore flavo-maculatis, abdomine aurantio, caeruleo et albo undulato.

Merula ſolitaria manillenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 270. *n.* 31. *t.* 33. *f.* 2.

Merle ſolitaire de Manille. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 363. *Pl. enl. n.* 564. *f.* 2. *et* 635.

Penſive Thruſh. *Lath. ſyn.* II. I. *p.* 53. *n.* 55.

Habitat

Habitat in Manilla, *lanii infausti magnitudine*, 8 *pollices longus.*

Rostrum *fuscum*; pedes *nigricantes*; feminae *neque caeruleus color, neque aurantius.*

solitarius. 117. T. fuscus, plurimam partem albido maculatus, cauda nigricante.

Merula solitaria. *Briss. av.* 2. *p.* 268. *n.* 30.
Passer solitarius. *Raj. av. p.* 66. *n.* 4.
Passera solitaria. *Ol. ucc. p.* 14.
Merle solitaire. *Buff. hist. nat. desois.* 3. *p.* 358.
Solitary Sparrow. *Will. orn. p.* 191. *t.* 36. 37.
Solitary Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 52. *n.* 54.

Habitat in Gallia, Italia, *maris* mediterranei *et* archipelagi *insulis*, *merula minor*, 8-9 *pollices longus*, *solitarius*, *montana et rupestria frequentans*, *insectis*, *uvis aliisque fructibus victitans*, *junior facile cicurandus*, *et docilis*, *in aedificiis dilabentibus nidificans*, *et ova* 5-6 *pariens*, *ob suavissimum cantum in patria sacer.*

Maris *temporibus*, *collo et pectori tinctus caeruleus adspersus.*

Cyanus. 24. T. pennis margine cinereo-caeruleis, ore palpebrisque luteis.

Merula caerulea. *Briss. av.* 2. *p.* 282. *n.* 37.
Cyanus. *Bell. av.* 79. *Gesn. av.* 806. *Aldr. orn.* 2. *p.* 618. *t.* 858. *Raj. av. p.* 66. *n.* 5. *Will. orn. p.* 192.
Turdus solitarius. *Syst. nat.* X. *p.* 170. *n.* 5. *Hasselq. act. Upsal.* 1750. *p.* 21.
Merle bleu. *Buff. hist. nat. desois.* 3. *p.* 355. *t.* 24.
Merle solitaire femelle d'Italie. *Buff. pl. enl. n.* 250.
Indian Mockbird. *Raj. av. p.* 66. *n.* 6?
Solitary Sparrow. *Edw. av. t.* 16.
Blue Thrush. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 51. *n.* 53.

Habitat in Candiae, *insularum* Archipelagi *et maris mediterranei*, Italiae *rupibus*, *merula minor*, 8 *pollices longus.*

Rostrum *nigricans*; pennae *versus apicem fascia fusca pictae, apice albae*; remiges, cauda, pedes*que fusci.*

arundinaceus. 25. T. fusco-ferrugineus, subtus albido-testaceus, remigibus fasciis apice rufescentibus.

Turdus musicus palustris dumetorum arundinum. *Klein av.* 179. *f.* 3.
Turdus minor flavescente-fuscus, subtus albidus, cauda rotundata. *Pall. adumbr.* 100.

Turdus

Turdus arundinaceus. *Briſſ. av.* 2. *p.* 219. *n.* 6. *t.* 22. *f.* 1.
Motacilla corpore ſupra teſtaceo, ſubtus rufeſcente. Rohrvogel. *Kram. el. p.* 375. *n.* 8.
Junco. *Geſn. av.* 573. *Aldr. orn.* 2. *p.* 487. *Raj. av. p.* 47. *n.* 2. *et* 113. *Will. orn.* 223. *t.* 58. *Lath. II. 1. p. 22. n. 26.* reed stonk
β) Turdus arundinaceus, uropygio caudaque rufis.
γ) Turdus arundinaceus ſupra ſagittis nigris varius. *Nozem. nederl. Vogel t.* 52.
δ) Turdus arundinaceus minimus, ſupra ex luteſcente virens, tectricibus alarum ferrugineis. *Nozem. nederl. Vog. t.* 53.
Habitat in Europae *arundinetis, more pici arundines ſcandens, in muſcoſis alivis inter arundines et carices nidum ſtruit, interdum ſuſpendit;* femina 5-6 *ova parit, quibus dum incubat, mas perpetuo cantillat.*
Minor reliquis europaeis, 7 *pollices longus;* mentum *et* gula *alba;* roſtrum, remiges *et* pedes *fuſci.*

morio. 26. T. ater nitens, remigibus primoribus rufis apice nigro. ✓
Merula capitis bonae ſpei. *Briſſ. av.* 2. *p.* 309. *n.* 52. *t.* 23. *f.* 2.
Jaunoir du Cap de bonne eſpérance. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 366.
Merle du Cap de bonne eſpérance. *Buff. pl. enl. n.* 199.
African Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 55. *n.* 58.
Habitat ad caput bonae ſpei, *merulae magnitudine,* 11 *pollices longus.*
Roſtrum *nigrum;* pedes *fuſci.*

bicolor. 118. T. fuſcus viridi tinctus, abdomine criſſoque albis. ✓
Merle brun du Cap de bonne eſpérance. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 378.
White-rumped Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 64. *n.* 75.
Habitat ad caput bonae ſpei, *merulae magnitudine,* 10 *pollices longus.*

erythropterus. 119. T. niger, alis rufis, tectricibus caudae inferioribus rectricibusque praeter intermedias apice albis, cauda cuneiformi. ✓
Padobé du Sénégal. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 368. *Pl. enl. n.* 354.
Rufous-winged Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 55. *n.* 59.
Habitat ad fluvium Senegal, *merulae magnitudine,* 10 *pollices longus.* ✓

chryſogaſter. 120. T. viridis aurantio tinctus ſubtus aurantius, roſtro pedibusque fuſcis.

Oranvert ou Merle à ventre orangé du Sénégal. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 377. *Pl. enl. n.* 358.
Orange-bellied Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 63. *n.* 73.

β) Turdus ex caeruleſcente viridis, ſubtus aurantius.
Oranbleu. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 377.
Merle du Cap de bonne eſpérance. *Buff. pl. enl. n.* 221.
Habitat ad fluvium Senegal *et* caput bonae ſpei, *merula minor, 8 pollices longus.*
Remiges *paucae exteriori latere albae.*

✓ Urovang. 121. T. cinereus, vertice in colorem vireſcente-nigrum, reliquo capite, collo, pectore et corpore ſupra in olivaceum vergente, abdomine criſſoque flavicantibus.
Merula madagaſcarienſis cinerea. *Briſſ. av.* 2. *p.* 291. *n.* 41. *t.* 25. *f.* 2.
Ourovang ou Merle cendré de Madagaſcar. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 380. *Pl. enl. n.* 557. *f.* 2.
Cinereous Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 64. *n.* 76.
Habitat in Madagaſcar, $8\frac{1}{2}$ *pollices longus.*
Pedes *fuſci.*

✓ ſurinamus. 27. T. ater nitens, vertice, uropygio, maculaque laterali pectoris luteis.
Merula ſurinamenſis. *Briſſ. av. app. p.* 46. *n.* 25. *t.* 3. *f.* 1.
Turdus niger. *Koelreuter nov. comm. Petrop. p.* 439. *t.* 16. *f.* 10.
Merle de Surinam. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 390.
Surinam Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 76. *n.* 100.
Habitat in Surinam, *alaudae magnitudine*, $6\frac{1}{2}$ *pollices longus.*
Tectrices *alarum minores interiores, et inferiores albae;* roſtrum remiges*que nigricantes; harum plurimae baſi intus flavae;* pedes *fuſci.*

✓ columbinus. 122. T. viridis, colores diverſimode reflectens.
Merle des colombiers. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 381.
Pigeon Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 64. *n.* 77.
Habitat in inſulis Philippinis, *in columbariis, muſici magnitudine.*
Uropygium *et* criſſum *nonnunquam alba.*

✓ dominicanus. 123. T. ſupra fuſcus hinc inde violaceo aut chalybeo tinctus, ſubtus ex fuſceſcente albus, cauda baſi chalybea, apicem verſus vireſcente.
Merle Dominiquain des Philippines. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 396. *Pl. enl. n.* 627. *f.* 2.

Domini-

Turdus praſinus (nec al. auct.) Gmel. I. n. 86 et 87) : ſupra fuſcus, ſubtus albidus praſino, roſtro nigro, pedibus carneis. Ex Asia.

Dominican Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 58. *n.* 65.
Habitat in inſulis Philippinis, 6 *pollices longus.*
Roſtrum *et* pedes *fuſceſcentes*; caput *ex fuſceſcente album*;
alae *longae*, *ut complicatae apicem fere caudae tangant.*

cantor. 124. T. ex vireſcente niger, caeruleo et violaceo nitens, remigibus caudaque nigris.
Petit merle de l'isle de Panay. *Sonner. it. p.* 115. *t.* 73.
Songſter Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 59. *n.* 67.
Habitat gregibus aliquando numeroſiſſimis in inſulis Philippinis, *ſuaviſſimo multiplicique cantu celebris, in columbariis ſaepe nidificans, hippolaidis magnitudine.*
Irides *rubrae*; capitis colli*que pennae longiores et anguſtiores.*

malabaricus. 125. T. viridi-nitens, fronte flava, gula, roſtro pedibusque nigris, tectricibus alarum, ſtriaque mandibulae inferioris caeruleis.
Petit merle de la côte de Malabar. *Sonner. it.* 2. *p.* 192.
Yellow-fronted Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 60. *n.* 69.
Habitat in Malabar, *fringillae domeſticae magnitudine, tamen longior.*
Irides *flavae*; feminae *minori* gula *azurea*, viror *ſubtus in flavedinem abiens.*

Seleucis. 126. T. roſtro pedibusque flavicantibus, abdomine dorſoque incarnatis, cauda, alis femoribusque fuſcis. *Forſk. Fn. arab. p.* 5.
Habitat in Smyrna, *vix pilaris magnitudine, gryllos exſtirpans.*

zeylonus. 28. T. viridis, ſubtus luteus, linea oculari utrinque in pectus nigrum ducta.
Merula torquata capitis bonae ſpei. *Briſſ. av.* 2. *p.* 299. *n.* 46. *t.* 30. *f.* 1.
Plaſtron noir de Ceylon. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 374.
Merle à collier du cap de bonne eſpérance. *Buff. pl. enl. n.* 272.
Green Pye of the isle of Ceylon. *Edw. glean. t.* 321.
Ceylon Thruſh. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 62. *n.* 72.
Habitat in Zeylona *et ad* caput bonae ſpei, *merulae magnitudine*, $7\frac{1}{2}$ *pollices longus.*
Roſtrum *nigrum*; vertex *ex olivaceo cinereus*; corpus *ſupra ex olivaceo viride*; feminae, *cui deeſt linea ocularis et lumula in pectore, ſupra et ſubtus ex vireſcente flavum*; cauda *cuneiformis*; rectricibus *lateralibus nigris apice flavis*; pedes *nigricantes.*

108. AMPELIS. *Roſtrum* rectum, convexum: Mandibula ſuperiore longiore, ſubincurvata, utrinque emarginata.

Nares ſetis tectae.

Lingua acuta, cartilaginea, bifida.

Garrulus. 1. A. occipite criſtato, remigibus ſecundariis apice membranaceo colorato. *Müller zool. p.* 30. *Kram. el. p.* 363. *n.* 1.
Ampelis remigibus quibusdam apice membranaceo terminatis. *Fn. ſuec.* 1. *p.* 179.*
Lanius Garrulus. *Fn. ſuec.* 2. *n.* 82. *Scop. ann.* 1. *p.* 20.
Bombycilla bohemica. *Briſſ. av.* 2. *p.* 333. *n.* 63.
Garrulus bohemicus. *Geſn. av.* 703. *Aldr. orn.* 1. *p.* 796. *t.* 798. *Calc. muſ.* 674. *t.* 675.
Jaſeur de Bohème. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 429. *t.* 26. *Pl. enl. n.* 261.
Silk Tail. *Act. angl.* 15. *p.* 1165. *t.* 1. *f.* 9. *Raj. av. p.* 85.
Bohemian Chatterer. *Will. orn. p.* 132. *t.* 20. *Alb. av.* 2. *t.* 26.
Prib Chatterer. *Brit. zool. n.* 42. *t.* 48. *Arct. zool.* 2. *p.* 346. *n.* 207.
Waxen Chatterer. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 91. *n.* 1.
Seidenſchwanz. *Friſch av. t.* 32. *f.* 1.
β) Bombycilla carolinenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 337. *n.* 64.
Coquatototl. *Hern. mex.* 55. *Raj. av. p.* 174.
Avis americana criſtata. *Seb. muſ.* 2. *t.* 65. *f.* 5.
Jaſeur de la Caroline. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 441.
Chatterer of Carolina. *Edw. glean. t.* 242. *Catesb. Car.* 1. *t.* 46. *Miller illuſtr. t.* 8. A.

γ) A. rectricibus purpurea apice maculatis. vitt.

Habitat in Europa, *ſeptentrionali* Aſia, *et* America *ab* Acadia *ad* Cayennam, *alaudae majoris magnitudine*, 8 *pollices longa*, *gregatim migrans*, *uvis aliisque baccis* e. g. *juniperi*, *ſorbi victitans*; *caro eſculenta*; *nidus in rupium antris*.

Roſtrum pedes*que nigri*; irides *rubeſcentes*; caput *et* corpus *ſupra ex rubeſcente cinereum*; linea *ocularis* mentum*que nigra*; frons *badia*; pectus *et* abdomen *ex pallido purpuraſcente badia*; tectrices *alarum minores fuſcae*, *majores a corpore remotiſſimae nigrae apice albae*; remiges *nigrae*, 3 *et* 4ta *apicis margine exteriori albae*, 5 *inſequentes flavae*, *ſecundariae cinereae exteriori apicis margine albae*, 8 *earum*

8 *earum (in mare) in margine miniatae*; cauda *nigra, apice flava.*

Pompadora. 2. A. purpurea, tectricibus alarum proximis enſiformibus elongatis carinatis rigidis.

Turdus puniceus. *Poll. adumbr.* 99.
Cotinga purpurea. *Briſſ. av.* 2. *p.* 347. *n.* 5. *t.* 35. *f.* 1.
Cotinga pourpre. *Buff. pl. enl. n.* 279.
Pacapac ou Pompadour. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 448. *Edw. gleam. t.* 341. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 96. *n.* 6.
β) Cotinga cinereo-purpurea. *Briſſ. av.* 2. *p.* 349. *n.* 6. *t.* 35. *f.* 2.
Pacapac gris-pourpre. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 450.
γ) Cotinga ex griſeo fuſca.
δ) Cotinga griſea.

Habitat in Gujana, $7\frac{1}{2}$ *pollices longa, in ſummis arborum ad aquas poſitarum ramis nidificans, fructibus victitans.*

Roſtrum *fuſcum*; tectrices *alarum proximae ad* 2 *pollices longae, ſupra remiges albas pendulae, ſcapis albis*; pedes *nigri.*

Carnifex. 3. A. rubra, faſcia oculari, remigum rectricumque apicibus nigris.

Lanius carnifex. *Syſt. nat.* X. *p.* 94. *n.* 5.
Cotinga rubra. *Briſſ. av.* 2. *p.* 351. *n.* 7. *Merrem Beytr.* 1. *p.* 1. *f.* 1.
Avicula Pipitzon. *Seb. muſ.* 1. *t.* 57. *f.* 4.
Coyoltototl. *Fern. nov. Hiſp. p.* 44.
Ouette ou Cotinga rouge de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 452.
Cotinga rouge de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 378.
Red bird from Surinam. *Edw. av. t.* 39.
Red Chatterer. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 97. *n.* 7.

Habitat in nova Hiſpania, Gujana, Cayenna, Surinamo, *merulae magnitudine, ultra* 8 *pollices longa.*

Roſtrum, tempora, collum, dorſum *et* pedes *fuſca*; guttur *ex fuſcescente purpureum*; caput pennis *exiguis apice anguſtiſſimis, denſe obtectum, criſtatum*; tectrices *alarum minores ochraceae, margine fuſcae*; remiges *ſecundariae cum tectricibus ochraceae*; remiges *primores cum ſuis* tectricibus, *alis ſpuriis et* unguibus *nigrae*; rectrices *mediae longitudinis, rotundatae.*

coccinea. 8. A. coccinea, pileo purpureo, collo dorſoque olivaceis, rectricibus margine viridibus.

Schillernder Cotinga. *Merrem Beytr.* 1. *p.* 6. *t.* 1. *f.* 2.
Habitat in America *auſtrali, magnitudine, facie externa et habitu cum rubra conveniens; at pennae* caput *tegentes majores*, genae *myſtace plumoſa obſcure fulva veſtitae*, alae *longiores*, cauda *rotundata.*

Cotinga. 4. A. nitidiſſima caerulea, ſubtus purpurea, alis caudaque nigris.
Cotinga. *Briſſ. av.* 2. *p.* 340. *n.* 1. *t.* 34. *f.* 1.
Cordon bleu. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 442. *t.* 21.
Cotinga du Bréſil. *Buff. pl. enl. n.* 186 (*fem.*). 188 (*mas*).
Purple-breaſted blue Manakin. *Edw. gleam. t.* 241.
Cock purple-breaſted Manakin. *Edw. gleam. t.* 340.
Purple-breaſted Chatterer. *Penn. gen. of birds p.* 63. *t.* 9. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 94. *n.* 2.
Habitat in Braſilia, *turdi muſici magnitudine*, $8\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum *nigrum*; guttur *lituris* 3-4 *coccineis*, pectus *purpureum* (*feminae caeruleum*) *cingulo caeruleo, et altero coccineo ornatum*; abdomen *et* criſſum *caeruleum*; pedes *nigricantes.*

Maynana. 5. A. nitida caerulea, gula violacea.
Cotinga mayanenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 341. *n.* 2. *t.* 34. *f.* 2.
Cotinga à plumes ſoyeuſes. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 447.
Cotinga des Maynas. *Buff. pl. enl. n.* 229.
Silky Chatterer. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 96. *n.* 5.
Habitat in terra Maynas, $7\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Capitis cervicis*que pennae longae, anguſtae, baſi fuſcae; pennae* corporis *reliquae plurimae baſi albae, medio violaceae*; mentum *et* gula *purpurea*; remiges *et* cauda *ex nigricante fuſca*; pedes *nigri.*

cayana. 6. A. nitida caerulea, collo ſubtus violaceo.
Cotinga cayanenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 344. *n.* 3. *t.* 34. *f.* 3.
Quereiva. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 444.
Cotinga de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 624.
Purple-throated Chatterer. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 95. *n.* 3.
Habitat in Cayenna, *turdi iliaci magnitudine*, $8\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum, cauda, pedes*que nigri*; pennae *plurimae nigrae, apice ex caeruleo virides*; mentum *et* guttur *ex purpuraſcente*

Aves *hujus generis praeter primam ſpeciem ſolius* Americae *calidioris incolae.*

cente rubra; tectrices *alarum majores* remigesque *nigrae, margine caeruleae.*

terſa. 7. A. nitida caerulea, dorſo nigro, abdomine albo-flaveſcente.
Terſine. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 446.
Blue-breaſted Chatterer. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 95. *n.* 4.
Caput *ſupra*, humeri, rectrices, remiges *nigrae*; *hae margine exteriori caeruleſcentes*; gula, pectus, dorſum *poſterius*, tectricum *alarum faſcia dilute caerulea*; abdominis *latera maculata.*

caruncu- 9. A. roſtri nigri baſi caruncula pendula expanſili et mobili.
lata. Cotinga alba. *Briſſ. av.* 2. *p.* 356. *n.* 10.
Cotinga blanc ou Guirapanga. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 454. *Pl. enl. n.* 793. 794.
Carunculated Chatterer. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 98. *n.* 8. *t.* 40.
Habitat in Cayenna *et* Braſilia, 12 *pollices longa, altiſſima voce clamans.*
Pedes *nigri*; mas *niveus*, uropygio *tamen*, cauda *et* remigibus *pauliſper flaveſcentibus*; femina *ſupra olivacea*, fronte genisque *albis*; *ſubtus flava*; rectrices 2 *intermediae olivaceae*; *reliquae griſeae, margine flavae.*

variegata. 10. A. cinerea, gutture carunculis duabus nigris lanceolatis.
Cotinga naevia. *Briſſ. av.* 2. *p.* 354. *n.* 9.
Guira-punga. *Raj. av. p.* 166. *n.* 4. *Will. orn. p.* 199. *t.* 38.
Averano. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 457.
Variegated Chatterer. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 99. *n.* 9.
Habitat in Braſilia, *turdi viſcivori magnitudine, per ſex aeſtatis hebdomades altiſſimam vocem edens duplicem, alteram mallei cuneum percutientis, alteram campanae fiſſae.*
Roſtrum *nigrum*; rictus *amplus*; irides *glaucae*; caput *fuſcum*; tectrices *alarum minores nigrae, majores ex nigro et viridi variae*; remiges pedesque *nigricantes*; cauda *cinerea, nigricante et viridi varia.* Feminae *nigricanti* *carunculae nullae.*

criſtata. 11. A. capite criſtato, alis caudaque nigris, abdomine genisque albis, dorſo rubro. *Miller illuſtrat. t.* 15. C.
Habitat in America.

latera 12. A. ſupra fuſco-olivacea, uropygio latera caudaque ſupreme nigra, ſubtus latera nuda ſtrigae a angulum oris abdomenque pulvere albido, criſta frontis ſubtus lateribusque flavicante. *Muſ. Carl.* II, nr. 20.

COLIUS. *Roſtrum* breve, craſſum, ſupra convexum, ſubtus planum: mandibula ſuperiore deorſum curvata.

Nares parvae, ad baſin roſtri, pennis fere tectae.

Lingua apice laciniata.

Cauda cuneiformis longa.

capenſis. 1. C. rectricibus extimis externe albis, corpore cinereo, ſubtus albido.

Colius capitis bonae ſpei. *Briſſ. av.* 3. *p.* 304. *n.* 1. *t.* 16. *f.* 2.

Loxia Colius. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 301. *n.* 12.

Coliou du Cap de bonne eſpérance. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 404. *Pl. enl. n.* 282. *f.* 1.

Cape Coly. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 100. *n.* 1.

Habitat ad caput bonae ſpei, *fringillae caelibis magnitudine*, $10\frac{1}{4}$ *pollices longus.*

Roſtrum *griſeum*, *apice nigrum*; caput *et* collum *ex vinaceo cinerea*; pectus *vinaceum*; tectrices *caudae ſuperiores ex purpuraſcente badiae*; *alarum inferiores nigrae*; pedes *griſei*; ungues *nigri.*

ſenegalenſis. 2. C. ex vinaceo pallide griſeus, cauda caeruleſcente, capite criſtato.

Colius ſenegalenſis criſtatus. *Briſſ. av.* 3. *p.* 306. *n.* 2. *t.* 16. *f.* 3.

Coliou huppé du Sénégal. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 404. *t.* 18. *Pl. enl. n.* 282. *f.* 2.

Senegal Coly. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 101. *n.* 2.

Habitat ad fluvium Senegal, *capenſis magnitudine*, $12\frac{1}{2}$ *pollices longus.*

Roſtrum *baſi griſeum*, *apice nigrum*; rectricis *et* occipitis *pennae thalaſſinae in criſtam elongatae*; remiges *et* cauda *ex griſeo fuſcae*; rectrices *intermediae* 8, *extimae vix pollicem longae.*

erythropus. 3. C. ex caeruleſcente cinereus, ſubtus exalbidus, capite criſtato, uropygio purpureo: ſtria media alba, pedum rubrorum digitis omnibus anterius verſis.

White-backed Coly. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 101. *n.* 3. *t.* 41.

Habitat ad caput bonae ſpei, 12 *pollices longus.*

4. C.

striatus. 4. C. griseus, abdomine rufo striis transversis nigris picto, cauda viridi.
Coliou rayé. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 405.
Radiated Coly. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 102. *n.* 4.
Habitat ad caput bonae spei, 13 *pollices longus.*
Pectus *ex rufo griseum*, rectrices 2 *intermediae* 8½ *pollices longae.*

panayensis. 5. C. cinereus flavicante tinctus, subtus rufus, pectore nigrostriato, capite cristato.
Coliou de l'isle de Panay. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 406. *Sonner. it. p.* 116. *t.* 74.
Panayan Coly. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 102. *n.* 5.
Habitat in insula Panay.
Rostrum *nigrum*; pedes *pallide incarnati.*

109. LOXIA.

Rostrum conico-gibbum, frontis basi rotundatum versus caput: Mandibula inferior margine laterali inflexa.

Nares in basi rostri minutae rotundae.

Lingua integra.

Curvirostra. 1. L. rubra, rostro forficato. *Fn. suec.* 224. *Scop. ann.* 1. *p.* 200. *Kram. el. p.* 365. *n.* 2. *Brünn. orn. p.* 66. *n.* 238. *Müll. zool. n.* 244.
Loxia. *Gesn. av.* 592. *Aldr. orn.* 1. *p.* 877. *t.* 878. *Charl. onom.* 68. *t.* 68. *Briss. av.* 3. *p.* 329. *n.* 1. *t.* 17. *f.* 3.
Bec croisé. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. *p.* 449. *t.* 27. *f.* 2. *Pl. enl. n.* 218.
Sheld-apple or Crosbill. *Brit. zool.* 1. *n.* 115. *t* 49. *Arct. zool.* 2. *p.* 347. *n.* 208. *Raj. av. p.* 86. *Will. orn. p.* 248. *t.* 45. *Albin. av.* 1. *t.* 61. *Edw. glean. t.* 303. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 106. *n.* 1.
Kreuzschnabel. *Frisch av. t.* 11. *Georg. it. p.* 174. *Otto Naturf.* 13. *p.* 92.
Kreuzvogel. *Günth. Naturf.* 2. *p.* 66.
β) Loxia rufescens, capite coccineo. *Briss. av.* 3. *p.* 332. A.
γ) Loxia major, rostro crassiore et breviore.
Tannenpapagai. *Otto Naturf.* 12. *p.* 97. B.

Habitat in Europae, *et ſeptentrionalis* Aſiae *atque* Americae *ſilvis, alaudae circiter,* γ) *ampelidis* Garruli *magnitudine, non raro gregatim migrans, pinuum, alni, ipſius mali ſeminibus victitans, et e ſtrobilis, aut pericarpiis enucleans, in altiſſimarum arborum ramis, ex ſurculis, et ſphagno arboreo gelidiſſima hieme ſtruens, et lichene florido ſternens nidum hemiſphaericum,* $2\frac{1}{2}$ *pollices craſſum, et ova, coccothrauſtae ovis aequalia, albida, verſus finem obtuſiorem ſanguineo varia pariens.*

Color *pro aetate, ſexu, vitae genere et victu varius; feminae et pullorum utplurimum viridis vel olivaceus; maris adulti miniatus, in roſeum vergens, magis minusve fuſco adumbratus, ſubtus pallidior, verſus criſſum albeſcens;* alae *et* cauda *ſubfurcata fuſcae;* pedes *nigri.*

leucoptera. **12.** L. roſtro forficato, pennis albidis margine rubris, uropygio dilute rubro, criſſo exalbido, cauda alisque nigris, alarum faſcia duplici alba.

White winged Croſsbill. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 108. *n.* 2.

Habitat in ſinu Hudſonis *et* Noveboraco, *carduelis magnitudine,* $5\frac{3}{4}$ *pollices longa.*

Roſtrum *corneum;* pedes *fuſci.*

pſittacea. 50. L. olivacea, remigum rectricumque aequalium margine flavicante, mandibula inferiore multo breviore.

Parrot-billed Grosbeak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 108. *n.* 3. *t.* 42.

Habitat in inſulis Sandwich, 7 *pollices longa.*

Roſtrum pedes*que fuſceſcentes; mari* caput collum*que flava.*

Coccothrauſtes. **2.** L. linea alarum alba, remigibus mediis apice rhombeis, rectricibus latere tenuiori baſeos nigris. *Fn. ſuec.* 222. *It. ſcan.* 332. *Scop. ann.* 1. *n.* 201. *Kram. el. p.* 364. *n.* 1. *Müll. zool. n.* 245. *Nozem. nederl. Vogel t.* 70.

Coccothrauſtes. *Geſn. av.* 276. *Aldr. orn.* 2. *p.* 645. *t.* 646. *Jonſt. av. t.* 37. *Charl. onom.* 84. *t.* 85. *Briſſ. av.* 3. *p.* 219. *n.* 1.

Gros-bec. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 444. *t.* 27. *f.* 1. *Pl. enl. n.* 99. 100.

Grosbeak or Hawfinch. *Brit. zool.* 1. *n.* 113. *Arct. zool.* 2. *p.* 354. C. *Raj. av. p.* 85. *n.* 1. *Will. orn. p.* 244. *t.* 44. *Albin. av.* 1. *t.* 56. *Edw. av. t.* 188. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 109. *n.* 4.

Froſone. *Olin. ucc. t.* 37.

Kirtchfink. *Friſch av. t.* 4.

Habitat

Habitat in Europa, *praesertim temperatiore, baccis pyri baccatae, amygdalis, juglandibus, cerasorum nucleis victitans, dura putamina rostro suo robusto facile diffringens, hortis hinc invisa, $6\frac{3}{4}$ pollices longa; in dichotomis ramorum arborum, nidum, altitudine circiter* 12 *pedum a terra ex fibris siccis struens, et ova* 5 *subrotunda, ex caerulescente viridia, maculis ex olivaceo fuscis varia pariens.* Color *princeps in badium vergens, subtus ex rufescente in roseum.*

Enucleator. 3. L. linea alarum duplici alba, rectricibus totis nigricantibus. *Fn. suec.* 223. *Schoenb. act. Holm.* 1757. *p.* 139. *Brünn. orn. n.* 239. *Müll. zool. n.* 246.
Coccothraustes canadensis. *Briss. av.* 3. *p.* 250. *n.* 15. *t.* 12. *f.* 3.
Dur-bec. *Buff. hist. nat. desois.* 3. *p.* 457.
Gros-bec de Canada. *Buff. pl. enl. n.* 135. *f.* 1.
Greatest Bulfinch. *Edw. av. t.* 123. 124.
Pine Grosbeak. *Brit. zool.* 1. *n.* 114. *t.* 49. *f.* 2. *Arct. zool.* 2. *p.* 348. *n.* 209. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 111. *n.* 5.
Habitat in septentrionalis Europae, Asiae *et* Americae *pinetis, pinuum seminibus potissimum victitans, quae etiam disseminat, noctu egregie summeque canora, cito tamen cessans; nidum in arboribus terrae satis propinquum ex bacillis struit, et plumis sternit; ova* 4 *alba parit;* 9 *pollices longa.*
Caput, collum, pectus *et* uropygium *juniori rubra, seniori flava, feminae olivacea.*

naevia. 51. L. fuscescens, temporibus et subtus exalbidus nigro-maculatus, axillis et uropygio flavescentibus, remigibus caudaque nigris.
Gros-bec tacheté du Cap de bonne espérance. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. *p.* 473. *Pl. enl. n.* 659. *f.* 1.
Habitat ad caput bonae spei, *an varietas capensis?*

macroura. 52. L. nigra, fascia dorsi et alarum ex rufo flava, cauda cuneiformi longa.
Pere noir à longue queue. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. *p.* 487.
Moineau du royaume de Juida. *Buff. pl. enl. n.* 183. *f.* 1.
Gros-bec noir. *Salern. orn. p.* 278. *n.* 17.
Long-tailed Gros-beak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 114. *n.* 8.
Habitat in Africa, *in regno* Whidah, *et ad fluvium* Senegal, *magnitudine fringillae domesticae, et ob caudam corpore vix dimidio breviorem* 7 *pollices longa.*
Rostrum pedes*que atri.*

53. L.

aurea. 53. L. nigra, dorso aureo, tectricibus alarum dilute fuscis, nigro-maculatis.
Golden-backed Finch. *Brown illustr. t.* 25.
Gold-backed Grosbeak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 115. *n.* 9.
Habitat in Benguelo, 6 *pollices longa.*
Pedes *caerulescentes.*

rubicilla. 54. L. coccinea, maculis acutis triquetris albis varia, cervice et dorso canescentibus, abdomine et crisso dilute roseis, remigibus primariis fuscis margine obsolete roseis, cauda aeneo-nigra. *Güldenst. nov. act. Petrop.* 19. *p.* 464. *n.* 1. *t.* 12.
Caucasian Grosbeak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 112. *n.* 6.
Habitat in Caucasi *alpibus, ad alveos glareosos torrentium, hippophaes rhamnoidis baccis victitans, easque disseminans, gregatim volans,* 8 *pollices longa.*

Pyrrhula. 4. L. artubus nigris, tectricibus caudae remigumque posticarum albis. *Fn. suec.* 225. *Scop, ann.* 1. *n.* 202. *Brünn. orn. n.* 240. 241. *Müller zool. n.* 247. *p.* 30. *Kram. el. p.* 365. *n.* 3. *Nozem. nederl. Vogel* 68.
Rubicilla s. Pyrrhula. *Gesn. av.* 733. *Aldr. orn.* 2. *p.* 744. *t.* 745. *Jonst. av. t.* 43. *Briss. av.* 3. *p.* 308. *n.* 1.
Bouvreuil. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 372. *t.* 17. *Pl. enl. n.* 145.
Bulfinch, Alp or Nope. *Brit. zool.* 1. *n.* 116. *Arct. zool.* 2. *p.* 353. A. *Raj. av. p.* 86. *Will. orn. p.* 247. *t.* 44. *Alb. av.* 1. *t.* 59. 60. *Hayes brit. birds t.* 37. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 143. *n.* 51.
Blutfink. *Frisch av.* 1. *t.* 2. *Georg. it. p.* 174.
Cifolotto. *Olin. ucc. p.* 40.
β) Pyrrhula nigra. *Briss. av.* 3. *p.* 313. A.
Bouvreuil noir. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 384.
Black Bulfinch. *Alb. av.* 3. *t.* 69.
γ) Pyrrhula candida. *Briss. av.* 3. *p.* 313. B.
Bouvreuil blanc. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 383.
Habitat in Europae *et* Sibiriae *silvis, hieme in hortis et pomariis, arboribus infesta, voce simplici haud ingrata, cicurata docilis, ut varios imitetur sonos, ipsumque quodammodo vocem articulatam, in fruticibus ex muscis nidum struens, altitudine* 5-6 *pedum a terra, et ova sub finem Maji pariens* 5-6 *ex caerulescente sordide alba, versus finem latiorem atro-maculata.*
Vertex *niger*; pectus *cinereum*; abdomen *mari rubrum*; *feminae spadiceum.*

5. L.

Cardinalis. 5. L. criſtata rubra, capiſtro nigro, roſtro pedibusque ſanguineis. *Amoen. ac.* 4. *p.* 242.* *Scop. ann.* 1. *n.* 203.
Cardinalis. *Will. orn.* 245. *t.* 44. *f.* 8.
Coccothrauſtes capenſis ruber, roſtro hiante. *Petiv. gaz.* 16. *t.* 16. *f.* 7.
Coccothrauſtes rubra. *Catesb. Car.* 1. *p.* 38. *t.* 38. *Friſch av.* 1. *t.* 4. *f.* 1.
Coccothrauſtes indica criſtata. *Jonſt. av.* 77. *t.* 37.
Coccothrauſtes virginiana, vulgo Cardinalis criſtatus dicta. *Briſſ. av.* 3. *p.* 252.
Pſittacus criſtatus ruber. *Seb. muſ.* 1. *p.* 96. *t.* 60. *f.* 4.
Avis rubra. *Kalm it.* 3. *p.* 31.
Gros-bec de Virginie. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 458. *t.* 28. *Pl. enl. n.* 37.
Virginian Nightingale. *Raj. av. p.* 85. *n.* 3. *Will. orn. p.* 245. *t.* 44.
Red Grosbeak. *Albin. av.* 1. *t.* 57. 3. *t.* 61.
Cardinal. *Arct. zool.* 2. *p.* 349. *n.* 210. *Brown jam. p.* 647. *du Praz Louiſ.* 21 *p.* 139. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 118. *n.* 13.
Habitat in America *ſeptentrionali*, 8 *fere pollices longa, vere et aeſtate in cacumine altiſſimarum arborum egregie cantans, voce altiſſima, non gregaria, migrans, frequenter cicurata, apibus, zea, fagopyro victitans, quorum penum in propria fovea colligit.*
Roſtrum pedesque *pallide rubeſcentes*; criſta, *dum erigitur, acuminata.*

Carlſoni. 94. L. rubra, mento nigro, uropygio, cauda, alis pedibusque fuſcis. *Sparrm. muſ. Carlſ.* 2. *n.* 41. *t.* 41.
Habitat in inſulis oceani indici, *Cardinali valde affinis, roſtro etiam ſubſanguineo, at non criſtata.*

indica. 55. L. criſtata rubra, capiſtro rubro, roſtro pedibusque flavis.
Coccothrauſtes indica. *Briſſ. av.* 3. *p.* 252. *n.* 16.
Pſittacus criſtatus ruber minor ex inſula Boetenſi. *Seb. muſ.* 1. *t.* 60. *f.* 4.
Indian Grosbeak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 119. *n.* 14.
Habitat in India, *coccothrauſte major*, 8 *pollices longa.*
Digiti *longi*; ungues *acuti*, *curvati.*

madagaſcarienſis. 6. L. rubra, faſcia oculari nigra, dorſo nigricante-maculato.
Cardinalis madagaſcarienſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 112. *n.* 20. *t.* 6. *f.* 2.

Foudia.

Foudis. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 495.
Moineau de Madagaſcar. *Buff. pl. enl. n.* 134. *f.* 2.
Madagaſcar Grosbeak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 119. *n.* 15.
Habitat in Madagaſcar, *fringillae domeſticae magnitudine,* $5\frac{1}{3}$ *pollices longa.*
Roſtrum *atrum*; remiges *et* cauda *fuſca*, *margine olivacea*; pedes *ex griſeo fuſci*; pulli *primo olivacei ſenſim rubeſcunt.*

mexicana. 7. L. rubra, alis caudaque nigris.
Coccothrauſtes mexicana. *Briſſ. av.* 3. *p.* 256. *n.* 18.
Avis mexicana grandis rubra. *Seb. muſ.* 1. *p.* 101. *t.* 65. *f.* 1.
Habitat in nova Hiſpania, *coccothrauſte paulo major*, $6\frac{3}{4}$ *pollices longa.*

braſiliana. 56. L. capite, mento, abdominisque medio rubris, torque caudaeque apice albis, dorſo tectricibusque alarum fuſcis, remigibus caudaque nigris, pectoris et abdominis ex rubelcente albi guttis albis circulo nigro cinctis.
Grivelin. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 461. *t.* 30.
Gros-bec du Bréſil. *Buff. pl. enl. n.* 309. *f.* 1.
Braſilian Grosbeak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 122. *n.* 18.
Habitat in Braſilia, $5\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Uropygium *atrum*; tectrices *alarum*, remiges*que ſecundariae apice rubeſcentes.*

Dominicana. 8. L. nigra, capite gulaque coccineis, pectore, abdomine, remigumque margine albis. *Amoen. acad.* 4. *p.* 242.*
Coccothrauſtes braſilienſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 246. *n.* 13.
Rubicilla americana. *Raj. av. p.* 86.
Guiratirica. *Marcgr. braſ.* 211.
American Bulfinch. *Will. orn. p.* 147. *t.* 11.
American Cardinal. *Edw. av. t.* 127.
Dominican Grosbeak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 123. *n.* 20.
β) Loxia coronata, dorſo, alis et rectricibus intermediis cinereis, corpore ſubtus albo. *Mill. illuſtr. t.* 2. A.
Cardinal Dominiquain huppé. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 501. *Pl. enl. n.* 103.
Creſted Cardinal. *Brown illuſtr. t.* 23.
γ) Cardinalis Dominicanus. *Briſſ. av.* 3. *p.* 116. *n.* 22. *t.* 6. *f.* 4.
Tije Guacu Paroara. *Raj. av. p.* 89. *n.* 9. *Will. orn. p.* 256. *t.* 41. 45.
Cardinal Dominicain. *Buff. pl. enl. n.* 55. *f.* 2.
Paroare. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 500. *t.* 31.
Pope Grosbeak. *Arct. zool.* 2. *p.* 350. *n.* 211.

Habitat

Habitat in Braſilia, γ) *etiam in ſeptentrionali* America, *alaudae magnitudine.*

Cervix *nigricans*; dorſum, uropygium, *et* tectrices *alarum griſea, nigro parumper maculata*; criſſum *et* colli latera *albida*; cauda remiges*que nigrae*; pedes *cinerei.*

ſibirica. 57. L. rubra, ſupra fuſco maculata, capiſtro purpureo, alarum faſcia duplici obliqua, rectricibusque extimis albis.
Pall. it. 2. *p.* 711. *n.* 24. *t.* 28. *Falk it.* 3. *t.* 28. *Lepechin it.* 1. *p.* 182.
Sibirian Grosbeak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 124. *n.* 21.
Habitat in fruticetis denſiſſimis circa rivos torrentesque Sibiriae *auſtralioris, hieme parvis turmis volitans, volatu maxime inquieto, artemiſiarum praeſertim ſeminibus victitans, voce rauca crepera, linariae magnitudine, quam femina et pulli anniculi colore quoque referunt.*
Color *altaicae avis miniatus, hiemalis ſibiricae roſeus, ſubtus magis dilutus.*

virginica. 58. L. capite, cervice, rectricibus intermediis et corpore ſubtus rubro, abdomine flavo, nucha, dorſo inferiore, alis et rectricibus lateralibus olivaceis.
Yellow-bellied Grosbeak. *Arct. zool.* 2. *p.* 351. *n.* 215. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 125. *n.* 22.
Habitat in Virginia. Roſtrum *flavum.*

criſtata. 9. L. albicans, fronte criſtata, uropygio pedibusque rubris, rectricibus intermediis longiſſimis.
Creſted Grosbeak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 125. *n.* 23.
Habitat in Aethiopia, *inter maximas ſui generis.*
Rectrices *cinereae*; *intermediae lateralibus duplo longiores*; criſta *et* pectus *mari rubra, feminae alba.*

erythro-cephala. 10. L. cineraſcens, capite purpuraſcente, pectore albo-maculato.
Cardinalis angolenſis. *Briſſ. av. app. p.* 78. *n.* 69.
Sparrow of Paradiſe. *Edw. av. t.* 180.
Paradiſe Grosbeak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 122. *n.* 19.
Habitat in Angola, 6 *fere pollices longa.*
Roſtrum pedes*que incarnati*; mentum *rubrum*; corpus *ſubtus*, *alarumque faſcia obliqua duplex alba.*

Maja. 11. L. fuſca, capite albo. *Osb. it.* 2. *p.* 328.
Maja ſinenſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 212. *n.* 65. *t.* 9. *f.* 2.
Majan. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 107. *t.* 3. *f. inf.*

Maja de la Chine. *Buff. pl. enl. n.* 109. *f.* 1.
Malacca Grosbeak. *Edw. glean. t.* 306. *f.* 1.
White headed Grosbeak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 151. *n.* 68.
Habitat in Malacca *et* Sina, 4 *pollices longa.*
Caput collum*que exalbida*; remigum 2da *et* 4ta *alba.*

flavicans. 13. L. flava, dorso virescente, capite fulvo. *Amoen. acad.* 4. *p.* 244.
Yellow Grosbeak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 139. *n.* 44.
Habitat in Asia, *magnitudine fringillae canariae.*
Alae *et* cauda *ex virescente flavae.*

bonarien-sis. 60. L. capite et cervice caeruleis, corpore supra nigricante, subtus flavo, abdomine crissoque sulphureis, remigibus caudaque nigricantibus margine caeruleis.
Noir-souci. *Buff. hist. nat. desois.* 4. *p.* 150.
Marigold Grosbeak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 139. *n.* 43.
Habitat in Bonariae *hortis locisque cultis, fringillae domesticae magnitudine, 7 pollices longa, gramine seminibusque victitans, per paria incedens.*
Roltrum *nigricans*; pedes *rubescentes*; ungues *acuti, curvati, sulcati, posterior maximus.*

oryzivora. 14. L. cinerea temporibus albis, rostro rubro. *Amoen. acad.* 4. *p.* 243. *n.* 16.
Loxia remigibus rectricibusque nigris. *Mus. Ad. Fr.* 1. *p.* 18.
Coccothraustes sinensis cinerea. *Briss. av.* 3. *p.* 244. *n.* 12. *t.* 11. *f.* 4.
Fringilla capite et gula nigra, temporibus albis. *Osb. it.* 103.
Passer indicus. *Aldr. orn. l.* 15. *c.* 24.
Padda ou oiseau de riz. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. *p.* 463.
Gros-bec cendré de la Chine. *Buff. pl. enl. n.* 152. *f.* 1.
Padda or Rice-bird. *Edw. av. t.* 41. 42.
Java Gros-beak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 129. *n.* 29.
Habitat in Sina, Java, Africa, Madera, *fringillae domesticae magnitudine, 5 pollices longa, campis oryziferis valde infesta.*
Roltrum, palpebrae, pedes*que rubri, feminae dilutius*; caput *et* gula *nigra*; abdomen *pallide roseum*; crissum *albicans*; cauda *nigra*; feminae *alae margine albae, genae nigrae.*

flabellifera. 62. L. spadicea, subtus dilutior, roltro, remigibus, cauda pedibusque atris.

Queue

Queue en éventail. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 463. *Pl. enl. n.* 380.
Fan-tailed Grosbeak. *Arct. zool.* 2. *p.* 351. *n.* 214. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 128. *n.* 28.
Habitat in Virginia, *fringillae domeſticae magnitudine*, 5 *circiter pollices longa.*

panicivora. 15. L. nigra, alula alba, roſtro incarnato.
Pyrrhula africana nigra. *Briſſ. av.* 3. *p.* 317. *n.* 4.
Bouvreuil noir d'Afrique. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 385.
White-winged Grosbeak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 144. *n.* 52.
Habitat in Africa, *coccothrauſtae magnitudine*, $7\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum *griſeum*; oculi *nigri*; pedes *cinerei.*

malacca. 16. L. badia, capite abdomineque nigris, roſtro caeruleo.
Coccothrauſtes javenſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 237.
Paſſer chinenſis, albo pectore. *Osb. it.* 2. *p.* 329. *n.* 4.
Jacobin. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 468. *Pl. enl. n.* 139. *f.* 3.
White-breaſted indian Sparrow. *Edw. glean. t.* 355. *Alb. av.* 2. *t.* 53.
Malacca Gros-beak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 140. *n.* 47.
β) Coccothrauſtes ſinenſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 235. *n.* 7.
Chineſe Sparrows. *Edw. av. t.* 43.
Habitat in Java, *β) in* Sina, $4\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Corpus *badium*; collum *nigrum*; pectus *et* hypochondria *alba*; pedes *fuſci*; *in β) cum roſtro cinerei.*

molucca. 17. L. fuſceſcens, capite, jugulo, rectricibusque nigris, ſubtus albo nigroque undulata.
Coccothrauſtes moluccenſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 241. *n.* 10. *t.* 13. *f.* 3.
Gros-bec des Moluques. *Buff. pl. enl. n.* 139. *f.* 2.
Habitat in inſulis Moluccis, 4 *pollices longa.*
Roſtrum *atrum*; occiput *fuſcum*; uropygium *albo nigroque undulatum*; remiges pedes*que fuſci.*

punctularia. 18. L. badia, abdomine nigro albo-maculato.
Coccothrauſtes javenſis naevia. *Briſſ. av.* 3. *p.* 239. *n.* 9. *t.* 13. *f.* 2.
Gros-bec tacheté de Java. *Buff. pl. enl. n.* 139. *f.* 1.
Chineſe Sparrow. *Albin. av.* 2. *t.* 53.
Gowry bird. *Edw. av. t.* 40.
Cowry Grosbeak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 142. *n.* 50.

Habitat in Java, $4\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum pedes*que atri*; occiput *et* dorſum *ex rufo fuſcum*; pectus *et* hypochondria *atra*, *maculis cordatis albis*; abdominis *medium* criſſum*que alba.*

hordeacea. 19. L. fulva, temporibus albis, cauda pectoreque atris. *Muſ. Ad. Fr.* 2. *p.* 29.*
Yellow-rumped Grosbeak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 140. *n.* 45.
Habitat in India, *motacillae albae magnitudine.*
Caput, collum, uropygium *fulva*; tempora *ad roſtrum usque*, alae, cauda, pectus *nigra*; humeri, femora, criſſum, rectricum*que margines ex fuſco cinerea.*

ſanguinirostris. 20. L, grifea, ſubtus alba, roſtro pedibusque ſanguineis. *Amoen. acad.* 4. *p.* 243.* *Osb. it.* 2. *p.* 329.
Braſilian Sparrow. *Edw. glean. t.* 271. *f.* 2.
Habitat in Africa *et* Aſia, *ſpini magnitudine.*
Frons facies*que nigra*; pectus *et* abdomen *ochroleuca*, *pennis interdum medio nigricantibus*; remiges *et* cauda *fuſcae.*

Aſtrild. 21. L. fuſca nigricante-undulata, roſtro, orbitis pectoreque coccineis.
Fringilla undulata. *Pall. adumbr.* 143.
Senegallus ſtriatus. *Briſſ. av.* 3. *p.* 210. *n.* 64. *t.* 10. *f.* 5.
Sénégali rayé. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 101. *t.* 2. *f.* 2. *Pl. enl. n.* 157. *f.* 2.
Waxbill. *Edw. av. t.* 179. *glean. t.* 354. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 152. *n.* 71.
β) Senegallus pectore exalbido, uropygii faſcia rubra.
Serevan. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 103.
Moineau du Sénégal. *Buff. pl. enl. n.* 230. *f.* 3.
Red-rumped Waxbill Finch. *Brown Illuſtr. p.* 70. *t.* 29.
γ) Senegallus corpore ſubtus ex roſeo albo.
Petit moineau du Sénégal. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 104. *Pl. enl. n.* 230. *f.* 2.
Habitat in inſulis Canariis, Madera, *ad fluvium* Senegal, *in* Angola, *ad* caput bonae ſpei, *in* India, *regulo vix major*, $4\frac{1}{4}$ *pollices longa*, *ſub gramine herbisque abſcondita, gregaria*, *ſeminibus victitans*, *hortis infeſta.*
Faſcia *ocularis*, pectoris *medium et* abdomen *rubra*; corpus *ſubtus ex rubeſcente griſeum*; cauda *cuneiformis utplurimum obſcurius lineata.*

leucura. 63. L. roſtro pedibusque rubris, capite et tectricibus alarum cinereis, dorso flavo, pectore et abdomine flavescentibus, cauda alba, rectricibus extimis nigris.

White-

White-tailed Wax-bill Finch. *Brown illuſtr. p.* 77. *t.* 29.
White-tailed Gros-beak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 154. *n.* 72.
Habitat in Braſilia, 3 *pollices longa.*

cyanea. 22. L. caerulea, remigibus rectricibusque nigris. *Amoen. acad.* 4. *p.* 244.
Coccothrauſtes angolenſis cyanea. *Briſſ. av. app. p.* 88. *n.* 19.
Blue Grosbeak from Angola. *Edw. av. t.* 125.
Habitat in Angola? *caeruleae magnitudine, an varietas?*
Roſtrum *plumbeum*; irides *avellanae colore*; pedes *nigri.*

virens. 23. L. virens, humeris caeruleis.
Blue-ſhouldered Grosbeak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 151. *n.* 70.
Habitat in Surinam; remiges rectrices*que nigrae, margine vireſcentes.*

angolenſis. 24. L. nigro-caerulea, ventre ferrugineo, macula alarum alba.
Black Grosbeak. *Edw. glean. t.* 352. *f.* 2.
Angola Grosbeak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 145. *n.* 53.
Habitat in Angola, *pyrrhulae magnitudine*, 5 *pollices longa.*
Roſtrum *atrum*; *margo* alarum *ſummus albus*; pedes *ex purpuraſcente incarnati.*

ferruginea. 64. L. capite mentoque fuſcis, corpore ſupra nigro, ſubtus ferrugineo, rectricibus aequalibus remigibusque atris, margine flavis.
Brown-headed Gros-beak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 145. *n.* 54.
Longitudo *pollicum ſex*; roſtrum *corneum*; pedes *pallidi.*

melanura. 65. L. capite caudaque nigris, cervice fuſca, gutture et uropygio griſeis, abdomine rufeſcente, criſſo albo, remigibus nigris, primoribus verſus apicem, ſecundariis margine interiori albis.
Gros-bec de la Chine. *Sonner. it.* 2. *p.* 199.
Grey-necked Gros-beak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 145. *n.* 55.
Habitat in Sina, *coccothrauſtae magnitudine.*
Roſtrum, irides, pedes*que flavi*; tectrices *alarum ex caeruleſcente atrae, macula in medio alba*; feminae *caput griſeum.*

aurantia. 66. L. aurantia, vertice nigro, remigibus rectricibusque nigris, margine aurantiis.
Bouveret. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 387. *Pl. enl. n.* 204 *f.* 1, 2.
Orange Gros-beak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 146. *n.* 56.

Habitat in insula Bourbon *et ad* caput bonae spei, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

Rostrum *atrum*; pedes *rubescentes*; feminae caput gutturque *nigra*; corpus *subtus album.*

torrida. 67. L. nigra, pectore et abdomine badiis, rectricibus intermediis longissimis. *Scop. ann.* 1. *n.* 204.
Bouvreuil à bec blanc. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 388.
White-billed Gros-beak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 147. *n.* 57.
Habitat in America *australi.*

Lineola. 25. L. nigra, linea frontali, temporibusque albis.
Lineated Gros-beak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 149. *n.* 63.
Habitat in Asia, *pari magnitudine.*
Corpus *supra caeruleo-nitens*, *subtus album*; rostrum *nigrum*, *macula supra mandibulam superiorem alba*; cauda *bifurca*, remigesque *nigrae*, *primores basi anteriori albae.*

hamburgia. 68. L. capite colloque supra spadiceis, gula, gutturis albi fascia media, caudaque rotundata fuscis, dorso, pectore et uropygio ex flavicante fuscis nigro-maculatis, abdomine, crisso et tectricum alarum falciis duabus albis.
Pyrrhula hamburgensis. *Briss. av.* 3. *p.* 314. *n.* 2.
Hambouvreux. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 398.
Hamburg Tree-Creeper. *Albin. av.* 3. *t.* 24.
Hamburg Gros-beak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 149. *n.* 64.
Habitat circa Hamburgum, *pyrrhulae magnitudine*, $5\frac{3}{4}$ *pollices longa*, *insectis victitans*, *et arbores instar certhiae conscendens.*
Rostrum *nigrum*; irides *flavae*; remiges *ex flavicante fuscae.*

mexicana. 26. L. fusco-maculata, fronte, gula, uropygio superciliisque luteis.
Passer mexicanus. *Briss. av.* 3. *p.* 97. *n.* 12.
Linotte à tête jaune. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 83.
Yellow headed Linnet. *Edw. av. t.* 44.
Yellow-headed Grosbeak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 140. *n.* 46.
Habitat in nova Hispania, *fringillae montanae magnitudine*, $5\frac{3}{4}$ *pollices longa.*

Chloris. 27. L. flavicante-virens, remigibus primoribus antice luteis, rectricibus lateralibus quatuor basi luteis. *Fn. suec.* 226. *Scop. ann.* 1. *n.* 208. *Müll. zool. n.* 248. *Kram. el. p.* 367. *n.* 5. Frisch. t. 2. f. 2.
Chloris. *Gesn. av.* 259. *Aldr. orn.* 2. *p.* 850. *Briss. av.* 3. *p.* 190. *n.* 54. *Nozem. nederl. Vogel t.* 39.

Anthus

Anthus ſ. Florus. *Geſn. av.* 165. *Aldr. orn.* 2. *p.* 750. Verdier. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 171. *t.* 15. *Pl. enl. n.* 267. *f.* 2.
Greenfinch. *Brit. zool.* I. *n.* 217. *Arct. zool.* 2. *p.* 353. B. *Raj. av. p.* 85. *n.* 4. *Will. orn. p.* 246. *t.* 44. *Alb. av.* I. *t.* 58. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 134. *n.* 36.
Habitat in Europa *et* Camtſchatca, *facile cicuranda et caecutiens, nidum in dumetis ſepibusque humilibus ex gramine ſicco ſtruens, pilis, lana &c. ſternens, et ova* 5-6 *virеſcentia, verſus finem latiorem ſpadiceo-maculata pariens, quibus mas et femina alternatim incubant, parum canora, emberizis affinis, roſtro tamen craſſiore; hieme gregatim volans.*
Roſtrum *fuſceſcens*; pedes *incarnati*; feminae *color magis in fuſcum vergens.*

ſinenſis. 69. L. capite colloque ex virеſcente griſeis, dorſo dilute fuſco, remigibus primoribus a baſi ad medium flavis, ceterum nigris, apice griſeis, ſecundariis intus nigris extus griſeis, criſſo flavo.
Verdier de la Chine. *Sonner. it.* 2. *p.* 202.
Chineſe Grosbeak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 135. *n.* 37.
Habitat in Sina, *chloridi ſatis ſimilis.*
Roſtrum *et* pedes *ex virеſcente flavi*; abdomen *ſordide rufum*; cauda *nigra, apice alba.*

butyracea. 28. L. virеſcens, capite dorſoque nigro-maculatis, ſubtus flava, roſtro, cauda, remigibus pedibusque nigris.
Yellow-fronted Gros-beak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 136. *n.* 38.
Habitat in India *et ad* caput bonae ſpei, *ligurini magnitudine.*
Frons, ſupercilia *et* tempora *flava*; feminae *maculae ſupra fuſcae, et* cauda *apice alba.*

dominicenſis. 70. L. ex viridi fuſca, ſubtus obſolete rufa fuſco-maculata, criſſo areaque oculorum albis, remigibus nigris, cauda pedibusque fuſcis.
Verderin. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 185.
Verdier de St. Domingue. *Buff. pl. enl. n.* 341. *f.* 2.
St. Domingo Grosbeak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 136. *n.* 39.
Habitat in inſula St. Dominici, *chloridis magnitudine*, $5\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum *rubeſcens.*

Mandibula utrayne mobilis in Loxia, Emberiza, Fringilla, *unde ſemina decorticantur nec integra deglutiuntur. Kram.* 365.

africana. 71. L. ex virescente fusco et griseo varia, subtus alba, pectore fusco-vario, remigibus primoribus et rectricibus lateralibus margine ex rufo albis, extimis macula alba notatis.
Verdier faus vert. *Buff. hist. nat. desois.* 4. *p.* 186.
African Grosbeak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 137. *n.* 40.
Habitat ad caput bonae spei, *chloridi valde affinis*, $6\frac{1}{3}$ *pollices longa.*
Tectrices *alarum superiores*, remigum*que secundariarum margines rufi.*

canadensis. 29. L. viridi-olivacea, subtus flavo-olivacea, capistro nigro.
Coccothraustes canadensis. *Briss. av.* 3. *p.* 229. *n.* 15. *t.* 11. *f.* 3.
Flavert. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. *p.* 462.
Gros bec de Canada. *Buff. pl. enl. n.* 152. *f.* 2.
Canada Grosbeak. *Arct. zool.* 2. *p.* 352. *n.* 220. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 127. *n.* 27.
β) Loxia supra ex caeruleo grisea, subtus dilute grisea.
Habitat in Canada *et* Cayenna, *fringillae domesticae magnitudine*, $6\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Rostrum pedes*que cinerei*; mentum *nigrum.*

sulphurata. 30. L. fusco-olivacea, gutture ventreque luteis, superciliis flavis.
Coccothraustes capitis bonae spei. *Briss. av.* 3. *p.* 225. *n.* 2. *t.* 11. *f.* 1.
Brimstone Gros-beak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 137. *n.* 41.
Habitat in pagis pone caput bonae spei *sitis*, *ad rivos*, *gregaria*, *in arboribus fruticibusque nemorum nidos pendulos*, *infra longo collo terminatos et apertos struens*, *monti fringillae magnitudine*, $5\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Rostrum *corneum*; remiges rectrices*que fuscae margine olivaceae*; *intermediae* 2 *totae olivaceae*; pedes *ex fuscescente grisei.*

flaviventris. 72. L. olivacea fusco-maculata, subtus flava, remigibus rectricibusque fuscis margine olivaceis, fascia supraoculari flava.
Coccothraustes lutea capitis bonae spei. *Briss. av.* 3. *p.* 227. *n.* 3. *t.* 11. *f.* 2.
Yellow-bellied Grosbeak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 138. *n.* 42.
β) Loxia occipite mentoque cinereo.
Habitat ad caput bonae spei, *sulphurata minor.*
Uropygium *olivaceum*; cauda *furcata*; pedes *grisei.*

Collaria. 31. L. flavescens, pectore collarique flavis, temporibus nigris.
Gros-bec Nonette. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. *p.* 466. *Pl. enl. n.* 393. *f.* 3.
Nun Gros-beak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 133. *n.* 34.
β) Loxia torque latiori.
Grivelin à cravate. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. *p.* 473.
Gros-bec d'Angola. *Buff. pl. enl. n.* 659. *f.* 2.
Habitat in India, β) *in* Angola, *pari caerulei magnitudine*, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Rostrum *nigrum*; frons *calva*; caput *et* corpus *supra ex viridescente caerulea*, *subtus cum* uropygio *ex rufo alba*; *fascia* pectoris *maculata nigra*; alae *ex rufo*, *flavo et nigro variae*; cauda *nigra*; pedes *fuscescentes.*

grisea. 73. L. ex caeruleo grisea, collo et fronte albis.
Grisalbin. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. *p.* 467.
Gros-bec de Virginie. *Buff. pl. enl. n.* 393. *f.* 1.
Grey Grosbeak. *Arct. zool.* 2. *p.* 352. *n.* 219. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 134. *n.* 35.
Habitat in Virginia, *pari caerulei magnitudine*, 4 *pollices longa.*
Rostrum unguesque *fusci*; pedes *rubescentes.*

bengalensis. 32. L. grisea, pileo flavo, temporibus albidis, abdomine albido fusco-maculato.
Passer benghalensis. *Briss. av.* 3. *p.* 95. *n.* 11.
Orchef. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. *p.* 466.
Gros-bec des Indes. *Buff. pl. enl. n.* 393. *f.* 2.
Bengal Sparrow. *Albin. av.* 2. *t.* 52.
Yellow headed indian Sparrow. *Edw. av. t.* 189.
Bengal Grosbeak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 133. *n.* 33.
Habitat in Bengala, *fringilla domestica paulo major*, $5\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Rostrum *incarnatum*; corpus *supra*, pectorisque *fascia fusca*; pedes *flavescentes*; ungues *grisei.*

malabarica. 33. L. cinerea, remigibus rectricibusque nigris, gula crissoque albis.
Malabar Grosbeak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 154. *n.* 74.
Habitat in India, *pari magnitudine et facie.*
Rostrum *nigrum.*

afra. 74. L. subtus nigra, capite, hypochondriis, tectricibusque caudae flavis, alis caudaque fuscescentibus.

Black-bellied Grosbeak. *Brown illustr. p.* 58. *t.* 24. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 155. *n.* 75.
Habitat in Africa.

caffra. 75. L. atra, remigibus fuscis, humeris sanguineis. *Thunberg act. Stockh.* 1784. *p.* 289.
Habitat ad caput bonae spei, *cominus ab urbe, pyrrhulae magnitudine, sed longior, tardius volans, prope paludes nidificans, tempore pruritus colorem cinereum induens, quo femina perpetuo vestitur.*
Nigredo *holosericea*; rostrum *ex cinereo fuscum*; remiges *margine, et* tectrices *alarum albae*; cauda *corpore longior, interdum duplo*; pedes *grisei.*

Totta. 76. L. remigibus rectricibusque omnibus nigris summo apice albis. *Sparrm. mus. Carlson. t.* 18.
Habitat inter stationes Hottentottorum.
Color *ex testaceo fuscus, subtus subaurantius*; frons *ex fusco virescens*; remiges *primariae* 6, *secundariae circiter* 8, rectrices 10 *subtus fuliginosae*; tibiae *flavicantes*; pedes *nigri.*

asiatica. 77. L. cinerea, capite, tectricibus alarum, remigibus caudaeque apice nigris, abdomine rubescente.
Asiatic Grosbeak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 155. *n.* 76.
Habitat in Sina, *pyrrhulae magnitudine.*
Rostrum *flavum*; cauda *furcata*; pedes *rubri.*

canora. 78. L. sordide virescens, subtus cinerea, genis fuscis fimbria flava cinctis.
Brown cheeked Grosbeak. *Brown illustr. p.* 56. *t.* 24. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 155. *n.* 77.
Habitat in nova Hispania, *suavissime cantans, pari magnitudine.*
Rostrum *atrum*; pedes *albidi.*

lineata. 79. L. nigra, hypochondriis, remigibus secundariis et a basi ad medium primoribus nigro alboque striatis, abdomine crissoque albis.
Radiated Grosbeak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 156. *n.* 78.
Magnitudo *linariae*; longitudo 4 *pollicum*; rostrum *album*; pedes *atri.*

perlata. 80. L. nigra subtus fusca, versus caudam ex albo nigroque varia.
Gros bec gris perlé. *Salern. orn. p.* 278. *n.* 16.
Pearled Gros-beak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 156. *n.* 79.

Habitat

Habitat in regno Africae Whidah, *feminibus victitans, cantu grato, magnitudine reguli.*

fasciata. 81. L. fuscescens: lunulis nigris, remigibus, cauda genisque fuscis, his fascia rubra lineaque nigra circumscriptis.
Fasciated Grosbeak. *Brown illustr. p.* 64. *t.* 27. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 156. *n.* 80.
Longitudo $4\frac{1}{2}$ *pollicum;* rostrum *ex caerulescente griseum;* pedes *incarnati.*

cantans. 82. L. fusca: lineis obsoletis atris, subtus alba, cauda fusca cuneiformi.
Brown Grosbeak. *Brown illustr. p.* 66. *t.* 27. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 157. *n.* 81.
Habitat in Africa, 4 *pollices longa.*

melanocephala. 34. L. lutea, capite atro.
Coccothraustes gambiensis. *Briss. av.* 3. *p.* 230. *n.* 5.
Gambia Grosbeak. *Albin. av.* 3. *t.* 62. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 149. *n.* 65.
Habitat ad Gambiam Africae, $6\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Rostrum *cinereum;* guttur *et* irides *nigrae;* pedes *ex caerulescente cinerei.*

erythromelas. 83. L. rubra, capite gulaque nigris.
Blackheaded Grosbeak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 150. *n.* 66. *t.* 43.
Habitat in Cayenna, 9 *pollices longa.*
Rostrum *nigrum, basi album;* cauda *rotundata, rectricibus apice subacuminatis.* Femina *supra ex virescente aurantia, rubro hinc inde admisto, subtus aurantia,* remigibus *olivaceis margine exteriori rufis.*

coronata. 84. L. coccinea subtus caerulea, capitis crista, gutturisque macula media nigris.
Pyrrhula americana cristata. *Briss. av.* 3. *p.* 327. *n.* 10.
Avis americana, rubicilla. *Seb. mus.* 1. *t.* 102. *f.* 3.
Huppe noire. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 397.
Black crested Grosbeak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 150. *n.* 67.
Habitat in America, *pyrrhula major,* 6 *fere pollices longa.*

cana. 35. L. cana, remigibus rectricibusque fuscis, pedibus rubris.
Fringilla cinerea indica. *Briss. av. app. p.* 83.
Linotte Gris-de-Fer. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 82.
Grey Finch. *Edw. av. t.* 179. *f.* 1.
Cinereous Gros-beak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 154. *n.* 73.

Habitat in Asia, *linariae magnitudine.*
Rostrum *cinereum*; remiges *majores basi albae, apice nigricantes*; cauda *nigricans, margine dilute cinerea*; pedes *incarnati.*

philippina. 36. L. fusca, subtus albido-flavicans, vertice pectoreque luteis, gula fusca.
Coccothraustes-philippensis. *Briss. av.* 3. *p.* 232. *n.* 6. *t.* 12. *f.* 1. *t.* 18. *f.* 1. 2.
Toucnam-courvi. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. *p.* 465.
Gros-bec des Philippines. *Buff. pl. enl. t.* 135. *f.* 2.
β) Loxia cauda remigibusque ex virescente fuscis, margine flavis.
Baglafecht. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. *p.* 469.
Habitat in insulis Philippinis, β) *in* Abyssinia, *fringillae domesticae magnitudine*, $5\frac{1}{4}$ *pollices longa, nidum ab extremo arboris ramo, utplurimum supra aquam pendente, suspendens, et ex foliorum fibris fabricans, longum, cylindricum, medio, in quo ova deponuntur, globosum, infra apertum,* β) *spiralem, nautili fere aemulum, introitu ad eam regionem converso, aqua pluviae quam minima pars exspectatur.*
Occiput, dorsum *et* humeri *lutei, pennis medio fuscis*; dorsum *inferius fuscum, pennarum margine albido*; abdomen *ochroleucum*; tectrices *alarum fuscae, margine albae*; remiges rectrices*que fuscae, margine rufescentes vel albidae*; pedes *flavicantes*. Femina *supra fusca, subtus rufescens.*

abyssinica. 85. L. flavescens, vertice, temporibus, gutture et pectore nigris, humeris nigricantibus, remigibus rectricibusque fuscis margine flavis.
Gros-bec d'Abyssinie. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. *p.* 470.
Abyssinian Grosbeak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 131. *n.* 31.
Habitat in Abyssinia, *coccothraustae magnitudine et rostro, nidum ex ramorum apicibus suspendens, struensque pyramidalem, versus orientem apertum, cavitate, in qua ipsa reconduntur ova, media a reliquis separata, eoque artificio, contra pluviam, serpentes, sciuros, simias tuta.*
Irides *rubrae*; tectrices *alarum fuscae, margine griseae*; pedes *ex rubescente grisei.*

pensilis. 86. L. viridis, capite et gutture flavis, fascia oculari viridi, abdomine griseo, crisso ex rufo rubro, rostro, pedibus, cauda remigibusque nigris, his margine viridibus.

Neli-

Nelicourvi de Madagaſcar. *Sonner. it.* 2. *p.* 200. *t.* 112.
Penſile Grosbeak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 131. *n.* 32.
Habitat in Madagaſcar, *fringillae domeſticae magnitudine, gregatim nidum ex ſtramine caricibusque intertextis marſupii forma, in cujus uno latere condunntur ova, ſtruens, quotannis novo priori affixo augens, ex arboris ad flumen crescentis ramo ſuperiore ſuſpendens, et* 3 *utplurimum pullos excludens.*
Irides *flavae.*

ſtriata. 37. L. fuſca ferrugineo-ſtriata, ſubtus alba, jugulo nigro.
Coccothrauſtes borbonica. *Briſſ. av.* 3. *p.* 243. *n.* 11. *t.* 13. *f.* 4.
Gros-bec de l'isle de Bourbon. *Buff. pl. enl. n.* 153. *f.* 1.
Striated Grosbeak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 142. *n.* 49.
Habitat in inſula Bourbon, *regulo vix major*, $3\frac{2}{5}$ *pollices longa.*
Roſtrum *atrum*; pedes *nigricantes.*

ludovicia-na. 38. L. nigra, pectore, ventre, alarum faſcia baſique remigum albis.
Coccothrauſtes ludoviciana. *Briſſ. av.* 3. *p.* 247. *n.* 14. *t.* 12. *f.* 2.
Roſe-gorge. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 460.
Gros-bec de la Louiſiane. *Buff. pl. enl. n.* 153. *f.* 2.
Red-breaſted Gros-beak. *Arct. zool.* 2. *p.* 350. *n.* 212. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 126. *n.* 24.
Habitat in America, *a* Noveboraco *ad* Louiſianam *migrans*, $6\frac{3}{4}$ *pollices longa*, 5 *ova pariens.*
Roſtrum pedesque *fuſci*; pectus *et* tectrices *alarum inferiores dilute purpureae*; criſſum *et* uropygium *album*; abdomen *maculis paucis purpureis varium*; rectrices 3 *utrinque extimae a medio ad apicem albae.*

maculata. 87. L. pennis corporis ſuperioribus atris, verſus apicem albo-maculatis, inferioribus exalbidis atro-ſtriatis, remigibus rectricibusque exteriori latere exalbidis.
Spotted Grosbeak. *Arct. zool.* 2. *p.* 350. *n.* 213. *t.* 16. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 126. *n.* 25.
Habitat in nova Anglia, *citrinellae magnitudine.*
Roſtrum *pallidum*, *apice atrum*; ſupercilia *pallida*; rectrices 2 *utrinque extimae*, *exteriori latere ad apicem fere albae*, *interiori prope apicem macula alba notatae*; pedes *fuſcescentes.*

88. L.

obſcura. 88. L. atra, gulae medio faſciaque duplici tectricum alarum albis, remigibus viridibus, hypochondriis albis, fuſco-maculatis.

Dusky Grosbeak. *Arct. zool.* 2. *p.* 351. *n.* 216. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 127. *n.* 26.

Habitat in Noveboraco.

Capitis, colli, dorſique *pennae margine fuſceſcentes.*

capenſis. 39. L. atra, uropygio, tectricibusque alarum luteis.

Fringilla capitis bonae ſpei. *Briſſ. av.* 3. *p.* 171. *n.* 45. *t.* 16. *f.* 1.

Loxia atra, uropygio flavo. *Koelreuter nov. comm. Petrop.* 11. *p.* 438. *t.* 16. *f.* 9.

Gros-bec de Coromandel. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 456. *Pl. enl. n.* 101. *f.* 1.

Pinſon noir et jaune. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 142.

β) Loxia ſupra pennis ſubfuſcis, in medio nigro-maculatis, ſubtus exalbidis nigro-maculatis.

Gros-bec tacheté du Cap de bonne eſpérance. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 473. *Pl. enl. n.* 659. *f.* 1.

Habitat in Coromandel, *et ad* caput bonae ſpei, *in campis, praeſertim in dumetis ad fluvios rivosque poſitis, fringillae caelibis magnitudine,* $6\frac{1}{4}$ *pollices longa, ova pariens cinerea nigro-maculata.*

Roſtrum pedes*que atri*; capitis *plumae breves, pruritus tempore holoſericeae*; alae *ſpadiceae margine griſeae*; remiges *majores margine flavae*; dorſum *interdum totum luteum.*

nigra. 40. L. nigra, macula alba humeri baſique remigum duarum exteriorum.

Pyrrhula mexicana nigra. *Briſſ. av.* 3. *p.* 316. *n.* 3.

Bouvreuil noir du Mexique. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 394.

Little Black Bulfinch. *Catesb. Car.* 1. *t.* 68. *Albin. av.* 3. *t.* 69. *Bancr. Guj. p.* 179.

Black Grosbeak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 147. *n.* 60.

Habitat in nova Hiſpania, *fringillae canariae magnitudine,* $5\frac{1}{4}$ *pollices longa.*

craſſiroſtris. 89. L. nigra, remigibus baſi, rectricibus intermediis medio albis, pedibus albidis.

Thickbilled Grosbeak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 148. *n.* 61.

Magnitudo *pyrrhulae*; longitudo $5\frac{3}{4}$ *pollicum*; roſtrum *flaveſcens, craſſum.*

90. L.

americana. 90. L. nigra ſubtus alba, faſcia pectoris nigra, duplicique alarum alba, cauda rotundata.
Blackbreaſted Grosbeak. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 148. *n.* 62.
Habitat in America, *pari minimi magnitudine, vix* 4 *pollices longa.*
Pedes *fuſci.*

caerulea. 41. L. caerulea, alis fuſcis: faſcia baſeos purpurea.
Pyrrhula carolinenſis caerulea. *Briſſ. av. p.* 323. *n.* 7.
Bec-rond ou Bouvreuil bleu d'Amérique. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 392.
Blue Finch of Gujana. *Bancr. Guj. p.* 179?
Blue Grosbeak. *Arct. zool.* 2. *p.* 351. *n.* 217. *Catesb. Car.* 1. *t.* 39. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 116. *n.* 11.
β) Loxia tota caerulea, excepta macula nigra inter roſtrum et oculos, ſive Pyrrhula caerulea braſiliana. *Briſſ. av.* 3. *p.* 321. *n.* 6. *t.* 17. *f.* 2.
Habitat in America *auſtrali, rarior in* Carolina, *pyrrhulae magnitudine,* 6 *pollices longa.*
Roſtrum *et* cauda *fuſca;* capiſtrum *nigrum;* pedes *atri;* femina *fere tota fuſca.*

Orix. 42. L. griſea, roſtro, fronte abdomineque nigris, collo uropygioque fulvis. *Mant.* 1771. *p.* 527. *Mill. on var. ſubj. t.* 1.
Emberiza orix. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 309. *n.* 7.
Cardinalis capitis bonae ſpei. *Briſſ. av.* 3. *p.* 114. *n.* 21. *t.* 6. *f.* 3.
Cardinal du Cap de bonne eſpérance. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 496. *Pl. enl. n.* 6. *f.* 2. *n.* 134. *f.* 1.
Grenadier. *Edw. av. t.* 178. *Forſter act. angl.* 66. *p.* 278. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 120. *n.* 16.
β) Loxia cauda alisque fuſcis.
Rouge-noir. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 461. *Pl. enl. n.* 309. *f.* 2.
Habitat in inſula S. Helenae, *ad* caput bonae ſpei, *β*) *in* Cayenna, *in arundinetis frequens, madagaſcarienſis magnitudine, capenſi minor, gregaria, antheris ſeminibusque frumentaceorum victitans, agris hinc infeſtiſſima, inter arundines nidificans, ovaque pariens viridia, minora, quam capenſis.*
Frons, tempora, mentum (*in plurimis*), pectus *et* abdomen *nigra;* alae *fuſcae, margine pallidiores;* pedes *pallidi;*

reliquum

reliquum corpus *rubrum*, *pruritus praesertim tempore vividum*; femina *per totum annum grisea.*

erythrina. 91. L. ex rubescente cinerea, subtus alba, capitis, uropygii gutturisque pennis apice ruberrimis, remigibus rectricibusque fuscis margine lutescentibus. *Pallas nov. comm. Petrop.* 14. *p.* 587. *t.* 23. *f.* 1.
Crimson-headed Finch. *Lath. syn.* II, 1. *p.* 271. *n.* 29.
Habitat ad Volgam, Samaram, Tomum Sibiriae *et circa* Noveboracum Americae *in silvis et arbustis densissimis, chloridis magnitudine, vix* 5 *pollices longa, plantarum seminibus victitans, incondite cantillans, stultitia emberizis similis, inter arborum ramos ex foeno nidum struens.*
Rostrum pedes*que ex fusco cornei*; lora *ex griseo cinerascentia*; capitis *pennae basi fuscae*, gutturis *albidae*; tectrices *alarum fuscae*, *caudae cinereae.* Femina *supra tota ex cinereo flavescit*; gula *alba*; rectrices *margine griseae.*

Flamengo. 92. L. alba, capite, collo, pectore abdomineque roseis. *Sparrm. mus. Carls. t.* 17.
Habitat Upsaliae, *pyrrhulae satis affinis, an varietas?*
Rostrum pedes*que rubicundi*; capistri *pennae apice nigricantes*; remigum *tertia et quarta*, uropygii*que macula nigra*; alarum *linea transversa* caudae*que pagina superior fuliginosa.*

violacea. 43. L. violacea, superciliis, gula crissoque rubris.
Pyrrhula bahamensis violacea. *Briss. av.* 3. *p.* 326. *n.* 9.
Bouvreuil ou Bec-rond violet à gorge et sourcils rouges. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 396.
Black Sparrow. *Raj. av. p.* 188. *Sloan. jam.* 2. *p* 311.
Purple Grosbeak. *Arct. zool.* 2. *p.* 352. *n.* 218. *Catesb. Car.* 1. *t.* 40. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 117. *n.* 12.
Habitat in insulis Bahamicis, Jamaica, *calidiori* America, *fringillae domesticae magnitudine*, $5\frac{3}{4}$ *pollices longa, mucilagine baccarum amyridis toxiferae victitans.*
Rostrum *nigrum*; irides *rubrae*; pedes *ex atro grisei*; *partes in mare nigrae, in femina fuscae sunt.*

grossa. 44. L. cano-caerulescens, jugulo rectricibusque atris, gula alba, rostro rubro.
Coccothraustes americana caerulea. *Briss. av. app. p.* 89. *t.* 5. *f.* 1.
Gros-bec bleu d'Amérique. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. *p.* 456. *Pl. enl. n.* 154.
White throated Grosbeak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 315. *n.* 10.

Habitat in America, $7\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Capitrum *nigrum*; pedes *ex atro caerulescentes.*

minima. 45. L. fusca subtus testacea, remigibus primoribus basi, secundariis posterius albis. *Jacquin Beytr. p.* 28. *n.* 22. *t.* 13.
Dwarf Grosbeak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 158. *n.* 84.
Habitat in Surinam, *paro minor.*
Rostrum *brevissimum*, *crassum*, *cum* oculis *nigrum*; rectrices *nigricantes*, *aequales*, *apice obsolete pallidae*, *acutiusculae*; pedes *cinerei.*

fusca. 46. L. fusca subtus albida, remigibus a tertia ad nonam basi omnino albis. *Amoen. acad.* 4. *p.* 244. *Osb. it.* 2. *p.* 329.
Pyrrhula africana nigra minor. *Briss. av.* 3. *p.* 319. *n.* 5. *t.* 17. *f.* 1.
Brown Grosbeak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 147. *n.* 58.
Habitat in Africa *et* Bengala, *fringillae canariae magnitudine.*
Rostrum *plumbeum*; crissum *album*; remiges rectrices*que nigrae*; pedes *pallidi.*

septentrionalis. 93. L. nigra, macula alarum alba.
Loxia atra. *Brünn. orn. n.* 244. *Müller zool. p.* 30. *n.* 249.
Northern Grosbeak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 147. *n.* 59.
Habitat in Scandinavia, *an vere distincta a pyrrhula species?*

minuta. 47. L. grisea, uropygio subtusque ferruginea, remigibus 4, 5, 6 basi utrinque albis, cauda integra. *Rolander.*
Bec-rond à ventre roux. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 390.
Bouvreuil à ventre roux de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 319. *f.* 2.
Grey Loxia. *Bancr. Guj. p.* 179.
Minute Gros-beak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 158. *n.* 83.
Habitat in Surinamo *et* Cayenna, *regulo vix major*, *agilis et ferox*, *frequens prope domicilia et in locis per aliquod tempus incultis*, *seminibus fructibusque victitans*, *voce fringillae domesticae*; *mas feminae perpetuus comes*; *nidum struens in arboribus rotundatum diametri bipollicaris ex herba rubente*, *ova* 3-4 *pariens.*
Rostrum pedes*que fusci.*

bicolor. 48. L. fusca subtus rubra.
Fringilla rubra minor. *Briss. av.* 3. *p.* 164. *n.* 40.
Brunor. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 137.
Little brown Bullfinch. *Edw. av.* 2. *t.* 83. *f.* 1.
Orange-bellied Grosbeak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 157. *n.* 82.

β) Loxia

β) Loxia fuscescens, subtus alba, menti colore in ferrugineum vergente.
Habitat in India, *regulo vix major*, $3\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Rostrum *albidum*; pedes *fusci.*

tridactyla. 49. L. pedibus tridactylis.
Guiflo Balito. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. *p.* 471.
Threetoed Grosbeak. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 159. *n.* 85.
Habitat in Abyssiniae *silvis*, *solitaria*, *nucleis victitans*, *quorum putamina rostro facile diffringit.*
Caput, pedes, guttur, *et* fascia *angusta ab hoc ad guttur producta rubra*; cervix, dorsum *et* cauda *nigra*; tectrices *alarum fuscae margine albae*; remiges *fuscae*, *margine virescentes*; *digiti* 2 *anterius versi.*

110. EMBERIZA. *Rostrum* conicum.

Mandibulae basi deorsum a se invicem discedentes: inferiore lateribus inflexo-coarctata, superiore angustiore.

nivalis. 1. E. remigibus albis: primoribus extrorsum nigris, rectricibus nigris: lateralibus tribus albis. *Fn. suec. n.* 227. *t.* 1.* *Scop. ann.* 1. *n.* 214. *Brünn. orn. n.* 245. *Müller zool. n.* 250. *Kram. el. p.* 372. *n.* 7. *Georg. it. p.* 174. *Phipps it. p.* 188. *Fabric. Fn. groenl. n.* 81. *Forster act. angl.* 62. *p.* 403. *n.* 11. *S. G. Gmelin it.* 1. *p.* 53. 2. *p.* 164.
Alauda remigibus albis: primoribus extrorsum nigris, rectricibus nigris: lateralibus tribus albis. *Act. Stockh.* 1740. *p.* 368. *t.* 1. *f.* 9. *Fn. suec.* 1. *n.* 194. *t.* 1. *f.* 194.
Hortulanus nivalis. *Briss. av.* 3. *p.* 285. *n.* 9.
Fringilla albicans. *Aldr. orn.* 2. *p.* 817. *t.* 818.
Avis ignota piperini. *Gesn. av.* 798.
Ortolan de neige. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 329. *Pl. enl. n.* 497. *f.* 1.
Pied mountain Finch. *Alb. av.* 3. *t.* 71.
Snow Bunting. *Brit. zool.* 1. *p.* 122. *t.* 50. *Arct. zool.* 2. *p.* 355. *n.* 222. *Lightfoot fl. scot.* 1. *p. p.* 26. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 161. *n.* 1. *Edw. av. t.* 126.
Schneevogel. *Martens Spitzberg.* 53. *t.* K. *f.* B.
β) Hortulanus nivalis naevius. *Briss. av.* 3. *p.* 288. A.
Weissfleckige Ammer. *Frisch av. t.* 6.

γ) Hortu-

γ) Hortulanus nivalis pectore nigro. *Briſſ. av.* 3. *p.* 289. B.
Fringilla ſublutea et ſubnigra. *Aldrov. orn.* 2. *t.* 818.
δ) Hortulanus nivalis torquatus. *Briſſ. av.* 3. *p.* 290. D.
Ortolan de neige à collier. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 335.
Pied Chaffinch. *Alb. av.* 2. *t.* 54.
Habitat gregaria aeſtate in Americae, Aſiae, Europae *ſumme borealibus, hieme in temperatiores, Europae praeſertim, plagas cohortibus denſis migrans, fringillae caelibis magnitudine, volatu immenſo; in illis in fiſſuris rupium ex gramine et plumis nidum ſtruens, et pilis, lanaque canis lagopodis ſternens, ova pariens* 5 *alba, fuſco-maculata, egregie cantans; in terra conſidens, avena victitans, noctu vigil. Caro ſapidiſſima.*
Color *pro anni tempore, aetate, ſexu varius, hieme fere totus albus, ut tamen* dorſum rectrices*que intermediae nigra ſint; aeſtate* occiput *quoque nigro-varium*; remiges, *baſi excepta, nigrae, ſecundariae intus macula nigra*; rectrices *laterales prope apicem macula atra notentur.* Roſtrum pedes*que fuſci.*

muſtelina. 7. E. remigibus atris baſi albis, ultima tota alba, rectricibus nigris intermediis margine, lateralibus tribus utrinque albis macula extus atra notatis.
Great pied mountain Finch, Brambling or Sealark. *Raj. av. p.* 88. *Will. orn. p.* 255. *t.* 77.
Pied mountain Finch. *Albin. av.* 3. *t.* 71.
Tawny Bunting. *Brit. zool.* 1. *n.* 121. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 164. *n.* 2.
Habitat cum nivali, ejus, ut videtur, varietas, $6\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Caput *et* collum *muſtelinum*; gula *tamen fere alba, colore verſus pectus in flavum abeunte,* pectore *et* abdomine *albo, flavicante-vario*; *pennae* dorſi *et* ſcapulares *nigrae, margine dilute ſpadiceae*; uropygium *altera parte album, altera flavum*; remiges *ſecundariae interiores albae*; pedes *nigri*; roſtrum *flavum, apice nigrum*; unguis *poſterior praelongus.*

montana. 25. E. remigibus 5 primis ex nigricante fuſcis: reliquis albis apice fulco-maculatis, rectricibus fuſcis, lateralibus utrinque tribus totis albis.
Leſſer pied mountain Finch or Brambling. *Will. orn. p.* 225. *Morton Northampt. p.* 423. *t.* 13. *f.* 1.
Mountain Bunting. *Brit. zool.* 1. *n.* 123. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 165. *n.* 3.

Habitat in Anglia.

Roſtrum *flavum*, *apice nigrum*; caput *badium*; gula *alba*; cervix *et* dorſum *cinerea*; pectus *et* abdomen *flammeo-undulatum*.

hyemalis. 2. E. nigra, ventre albo.

Fringilla hyemalis. *Syſt. nat.* X. *p.* 183.
Paſſer nivalis. *Kalm it.* 3. *p.* 39.
Hortulanus nivalis niger. *Briſſ. av.* 3. *p.* 289. C.
Ortolan Jacobin. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 335.
Snow Bird. *Catesb. Car.* 1. *t.* 36.
Black Bunting. *Arct. zool.* 2. *p.* 359. *n.* 223. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 166. *n.* 4.

Habitat in America *boreali*, *hieme in* Noveboracum, *et nive comparente in* Carolinam *usque gregibus numeroſiſſimis migrans*, *graminum*, *frumentorum praeſertim ſeminibus victitans*, *quae in campis*, *hortis*, *clivis*, *areis legit*, *coloris conſtantioris*; *carne exquiſita*.

Guttur *nigrum*; roſtrum *album*; pedes *griſei*.

Miliaria. 3. E. fuſca ſubtus nigro-maculata, orbitis rufis. *Fn. ſuec.* 228.* *It. ſcan.* 292. *t.* 4. *Brünn. orn. n.* 247. *Müller zool. n.* 251.

Emberiza pectore albo-ochreo punctis nigris maculato. *Kram. el. p.* 371. *n.* 6.
Emberiza alba. *Geſn. av.* 564. *Aldr. orn.* 2. *p.* 571.
Alaudae congener. *Aldr. orn.* 2. *p.* 849. *t.* 850.
Cynchramus. *Aldr. orn.* 2. *p.* 177. *Briſſ. av.* 3. *p.* 292. *n.* 10.
Miliaria cana. *Friſch av. t.* 6. *f.* 4.
Strillozzo. *Olin. ucc. t.* 44.
Proyer. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 355. *Pl. enl. n.* 233.
Bunting. *Brit. zool.* 1. *n.* 118. *Arct. zool.* 2. *p.* 366. B. *Raj. av. p.* 93. *Will. orn. p.* 267. *t.* 40. *Alb. av.* 2. *t.* 50. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 171. *n.* 8.

Habitat, *autumno et hieme*, *gregaria*, *in* Europa, *citrinellae magnitudine*, 5-6 *ova in gramine pariens*, *quibus dum incubat femina*, *in vicinae arboris ramo mas incondite cantat*.

Roſtrum *et* pedes *fuſceſcentes*; pennae *ſupra per mediam rachеos longitudinem macula nigricante notatae*, *margine rufae*, *ſubtus ochroleucae*, *ad latera atro-maculatae*; remiges rectrices*que atrae*, *margine flavicantes*; cauda *ſubfurcata*.

4. E.

Hortulana. 4. E. remigibus fuſcis: primis tribus margine albidis, rectricibus fuſcis: lateralibus duabus extrorſum nigris. *Fn. ſuec.* 229. *Müll. zool. n.* 253. *Nozem. nederl. Vogel t.* 74.
Hortulanus. *Geſn. av.* 569. *Aldr. orn.* 2. *p.* 178. *Jonſt. av.* 49. *t.* 37. *Will. orn. p.* 270. *t.* 40. *Raj. av. p.* 94. *n.* 6. *Briſſ. av.* 3. *p.* 269. *n.* 4.
Ortolano. *Olin. ucc. t.* 22.
Ortolan. *Arct. zool.* 2. *p.* 367. D. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 305. *t.* 14. *Pl. enl. n.* 247. *f.* 1. *Alb. av.* 3. *t.* 50. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 167. *n.* 5. *Friſch av. t.* 5. *f.* 3. 4.
β) Hortulanus flavus. *Briſſ. av.* 3. *p.* 272. A.
Ortolan jaune. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 312.
Aldrovandus's firſt ſort of Yellow-hammer. *Will. orn. p.* 270. *n.* 1. *Raj. av. p.* 94. *n.* 1.
γ) Hortulanus candidus. *Briſſ. av.* 3. *p.* 373. B.
Ortolan blanc. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 313.
Hortulanus albus. *Raj. av. p.* 94. *n.* 2. *Will. orn. p.* 270. *n.* 2.
δ) Hortulanus Albicilla. *Briſſ. av.* 3. *p.* 273. C.
Hortulanus quintus. *Raj. av. p.* 94. *Will. orn. p.* 270. *n.* 5.
Ortolan à queue blanche. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 314.
ε) Hortulanus niger. *Briſſ. av.* 3. *p.* 274. D.
Hortulanus quartus. *Raj. av. p.* 94. *Will. orn. p.* 270.
Ortolan noirâtre. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 313.
Habitat in Europa, *ab* Italia *in* Sueciàm *migrans*, *in* Sibiria *et in* Madera, *citrinella paulo major*, 6¼ *pollices longa*, *in loco obſcuro panici avenaeque ſemine paſta pinguescens*, *aliquando etiam avena conſitis agris devaſtatis*, *noctu interdum egregie cantat*; *bis in anno in ſepibus humilibus aut in terra nidum ſtruit*, *alaudae nido ſimilem*, *et* 4-5 *ova griſea parit*. *Caro delicioſa*.
Roſtrum, palpebrae *nudae*, pedes*que flavicantes*; caput collum*que ex cinereo olivaceum* (*feminae cinereum*, *pennis ſingulis lineis anguſtis nigricantibus notatis*); gula *flavicans*, *linea cinerea circumſcripta*; *pennae* dorſi *et* ſcapulares *ex fuſcescente badiae*, *in medio nigro-variae*; corpus *ſubtus rufeſcens*.

ſinenſis. 26. E. ex rubeſcente rufa, pennis margine flavicantibus, ſubtus flava; ſtria longitudinali media fuſca, cauda remigibusque fuſcis, primoribus margine flavis.
Ortolan de la Chine. *Sonner. it.* 2. *p.* 201.
Chineſe Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 169. *n.* 6.
Habitat ab Octobri in Decembrem in Sina *auſtrali*.
Roſtrum pedes*que rufeſcentes*; irides tectrices*que alarum minores flavae*; remiges *ſecundariae* rectrices*que margine griſeae*.

Citrinella. 5. E. rectricibus nigricantibus: extimis duabus latere interiori macula alba acuta. *Fn. suec.* 230. *Scop. ann.* I. *n.* 209. *Müll. zool. p.* 252. *Kram. el. p.* 370. *n.* I. *Nozem. nederl. Vogel t.* 60.

Emberiza flava. *Gesn. av.* 653.
Emberiza. *Briss. av.* 3. *p.* 258. *n.* I.
Luteae alterum genus. *Aldr. orn.* 2. *p.* 856. *t.* 857. 858.
Hortulano congener. *Aldr. orn.* 2. *p.* 179.
Gelgorsta. *Gesn. av.* 653.
Zivolo. *Olin. ucc. t.* 50.
Bruant. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 340. *t.* 8. *Pl. enl. t.* 30. *f.* I.
Yellow-hammer. *Brit. zool. n.* 119. *t.* 50. *Raj. av. p.* 93. *n.* 2. *Will. orn. p.* 268. *t.* 40. *Alb. av.* I. *t.* 66.
Yellow Bunting. *Arct. zool.* 2. *p.* 367. C. *Lath. syn.* II. I. *p.* 170. *n.* 7.
Goldammer. *Frisch av. t.* 5. *Georg. it. p.* 174. *Günth. Nest. u. Eyer t.* 17. *f. inf.*

Habitat in Europa, $6\frac{1}{4}$ *pollices longa, mitis, stupida, parum canora, seminibus insectisque victitans, in terra aut frutice humiliore pluries in anno ex foeno, stramine, paucis muscis, foliis siccis, bacillis nidum struens, et pilis lanave sternens, ova pariens* 4-5, *striis et hinc inde litura fusca aut nigricante varia.*

Rostrum *atrum*; vertex, genae *et* corpus *subtus flava*; supercilia *fuscescentia*; nucha *virescens*; cervicis dorsique *pennae per mediam longitudinem nigricantes, ad latera rufae, margine griseae*; uropygium *pallide mustelinum*; alae *spadiceae, olivaceae, aut atrae, margine utplurimum griseae*; cauda *fusca, subfurcata*; rectrices 2 *intermediae toto margine griseae, laterales extus olivaceae, apicis margine griseae, extimae margine albae*; pedes *ex flavicante fusci.*

olivacea. 6. E. olivacea subtus albidior, gula aurantia, fascia pectorali nigricante.

Emberiza dominicensis. *Briss. av.* 3. *p.* 380. *n.* 14. *t.* 13. *f.* 5.
Olive. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 363.
Olive Bunting. *Lath. syn.* II. I. *p.* 195. *n.* 34.

Habitat in insula S. Dominici, *regulo vix major*, $3\frac{3}{4}$ *pollices longa.*

Rostrum pedes*que ex griseo fusci*; supercilia *flava*; jugulum *et superior* pectoris pars *nigra*; *reliquum* pectus *cum* abdomine

domine *ex olivaceo griseum*; alarum *margo flavus*; remiges *fuscae*, *margine olivaceae*.

passerina. 27. E. corpore supra ex griseo ferrugineo, medio plumarum nigro, subtus ex cinerascente albido, ad latera maculato, rectricibus nigris, mediis margine ferrugineis, extima utrinque ferme ad basin, proxima ad medium oblique alba. *Pall. it.* 1. *p.* 456. *n.* 10.
Passerine Bunting. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 136. *n.* 35.
Habitat autumno ad fluvium Ural, *magnitudine et structura schoenicli, colore fringillae domesticae.*
Caput *ex ferrugineo cinereum, parte plumarum* verticis *tecta* (*in mare*) *atra*; *pone oculos striga pallida*; guttur (*in mare*) *nigrum, plumis margine pallidis, utrinque ad collum taeniola alba*; remiges, *maxime secundariae*, tectrices*que alarum*, *margine exteriori ex ferrugineo fulvescentes*; cauda *subfurcipata*; pedes *ex corneo fuscescentes.*

pusilla. 28. E. corpore supra ex griseo ferrugineo subtus albido, jugulo maculato, capite falciis alternis testaceis nigrisque longitudinaliter vario. *Pall. it.* 3. *p.* 697. *n.* 20.
Habitat circa rivos montanos et in laricetis frigidis circa torrentes alpium Dauuricarum *frequens, vix spini magnitudine.*
Fasciae capitis *testaceae* 5, *interjectae nigrae* 4.

rustica. 29. E. capite nigro, fasciis ejus tribus longitudinalibus; gula, corpore subtus, et rectricibus duabus utrinque extimis oblique albis. *Pall. it.* 3. *p.* 698. *n.* 21.
Habitat in salicetis Dauuriae, *Martio frequens, schoenicli magnitudine.*
Cervix humeri*que ferruginei*; dorsum *ex griseo ferrugineum*; jugulum *punctis testaceis varium.*

fucata. 30. E. ex griseo ferruginea, macula aurium orbiculata rufa, superc[illis], linea infra oculos et gutture albis, gula circulo macul[a] fusco circumscripta. *Pall. it.* 3. *p.* 698. *n.* 22.
Habitat frequens ad Ononam *et* Ingidam Sibiriae *in ripis, insulisque saliceto obsitis, Aprili adveniens, ciae magnitudine.*
Vertex *cum parte* cervicis *ex cano cinereus, rachibus fuscis.*

spodocephala. 31. E. ex griseo ferruginea, subtus pallidissime flava, capistro nigro, capite colloque ex cano cinereis. *Pall. it.* 3. *p.* 698. *n.* 24.

Habitat circa torrentes alpium Dauuricarum *varior vere, ſchoenicli magnitudine.*

chryſophrys. 32. E. ex griſeo ferruginea, vertice nigro, linea utrinque ſuperciliari citrina, faſciaque alba a medio verticis ad nucham. *Pall. it.* 3. *p.* 698. *n.* 25.
Habitat circa torrentes alpium Dauuricarum, *citrinellae magnitudine.*

maelbyenſis. 33. E. capite colloque ex plumbeo cinereis, gula albida, abdomine ferrugineo. *Sparrm. muſ. Carlſ. t.* 21.
Habitat in praedio Carlſoniano Maelby Sueciae.
Roſtrum *et* pedes *cum* unguibus *pallide rufeſcunt;* palpebrae, macula *utrinque inter nares et oculos*, mentum, colli *latera*, criſſum *et ſubtus* cauda *albicant;* pectoris *pars ſuperior ex plumbeo cinerea, inferior ferruginea;* dorſum, humeri *et* criſſum *maculis acutis nigris et ferrugineis varia;* tectrices *alarum ſuperiores nigrae, margine extimo ferrugineae, inferiores ſulphureae;* remiges *nigricantes, margine ſubferrugineae;* rectrices 6 *ſuperiores nigrae,* 4 *reliquae ab apice ad medium albae, margine exteriori nigrae.*

rutila. 34. E. ex ſanguineo rufa, ſubtus ſulphurea, alis ex griſeo ferrugineis. *Pall. it.* 3. *p.* 698. *n.* 23.
Habitat rarior in ſalicetis ad Ononem Sibiriae, *verſusque* Mongoliae *fines, citrinellae magnitudine.*

ferruginea. 35. E. ferruginea, abdomine remigumque primorum maculis duabus albis.
Rufty Bunting. *Arct. zool.* 2. *p.* 364. *n.* 231. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 197. *n.* 36.
Habitat in America *ſeptentrionali.*
Rectrices 2 *utrinque extimae apice albae.*

americana. 36. E. ſupra cinerea fuſco-ſtriata, ſubtus flava, mento albo, remigibus rectricibusque atris margine pallidis.
Blackthroated Bunting. *Arct. zool.* 2. *p.* 363. *n.* 228. *t.* 17. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 197. *n.* 37. *t.* 44.
Habitat in Noveboraco, *citrinellae magnitudine.*
Roſtrum *fuſceſcens;* ſupercilia (*mari*) *et* linea *infraocularis flava;* gulae (*in mare*) *macula ingens trigona nigra;* tectrices *alarum majores muſtelinae.*

braſilienſis. 37. E. vertice, collo et corpore ſubtus flavis, dorſo, alis caudaque ex virelcente, flavo et fuſco variis.

Guirum

Guiram heemgata. *Raj. av. p.* 89. *n.* 2. *Will. orn. p.* 253.
Emberiza braſilienſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 299. *n.* 13.
Guirnegat. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 361.
Bruant du Bréſil. *Buff. pl. enl. n.* 321. *f.* 1.
Braſilian Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 197. *n.* 38.
Habitat in Braſilia, *fringillae domeſticae magnitudine.*
Roſtrum oculi*que nigri*; pedes *fuſci.*

mexicana. 38. E. ſupra fuſceſcens, ſubtus exalbida fuſco-maculata, capite et gutture flavis.
Théreſe jaune. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 362.
Bruant du Mexique. *Buff. pl. enl. n.* 386. *f.* 1.
Mexican Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 198. *n.* 39.
Habitat in nova Hiſpania, $6\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum pedes*que pallidi*; cauda remiges*que fuſceſcentes.*

militaris. 39. E. capite, remigibus, cauda, dorſoque fuſcis, dorſo inferiore et pectore flavis, humeris vireſcentibus, abdomine albo. *Haſſelq. it. p.* 285. *n.* 48.
Military Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 198. *n.* 40.
Habitat prope Maltam.
Rectricum *apex margine exteriori flavicans.*

melanocephala. 40. E. flava capite nigro: dorſo rufo. *Scop. ann.* 1. *p.* 142. *n.* 208.
Blackheaded Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 198. *n.* 41.
Statura *citrinellae*; pectoris *latera rufeſcentia*; remiges *fuſcae margine albidae*; rectrices *immaculatae pallidiores.*

brumalis. 41. E. corpore ſubtus, fronte et oculorum regione citrinis, occipite colloque cinereis. *Scop. ann.* 1. *p.* 145. *n.* 213.
Brumal Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 199. *n.* 42.
Habitat in comitatu Tyrolenſi, *ſtatura ſpini.*
Dorſum *ex fuſco flavum*; criſſum *citrinum*; femora *albida*; remiges *fuſcae*, *margine exteriori citrinae.*

coccinea. 42. E. corpore ſupra argenteo, ſubtus coccineo, criſſo albo, roſtro, capite remigibusque nigris, poſtremis, occipite et cauda ex atro caeruleis. *Sander Naturf.* 13. *p.* 199.
Habitat in ſilvis Badenſibus, *cannabis ſemine victitans, badenſis magnitudine.*
Collum *coccineum*; alarum *macula alba.*

Badenſis. 43. E. olivacea, nigricante-ſtriata, ſubtus pallidior, gula aurantia, pectore nigricante-ſtriato. *Sander Naturf.* 13. *p.* 198.
Habitat

Habitat in marcgraviatu Badenſi, *olivaceae multum affinis, ſpithamae longitudine.*

Roſtrum *ſupra nigrum, ſubtus flaveſcens; in medio mandibulae ſuperioris dens ſolitarius craſſus obtuſus;* nares *ad baſin roſtri, plumis tectae;* lingua *breviſſima;* remiges 16, rectrices 12; pedes *flaveſcentes;* ungues *nigri.*

erythrophthalma. 44. E. nigra rubro relucens, abdomine rufeſcente, macula alarum alba.

Fringilla carolinenſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 169. *n.* 44.
Fringilla erythrophthalma. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 310. *n.* 6.
Pinſon noir aux yeux rouges. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 141.
Towhee bird. *Catesb. Car.* 1. *t.* 38.
Towhe Bunting. *Arct. zool.* 2. *p.* 359. *n.* 224. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 199. *n.* 43.

Habitat in Carolinae *ſilvis umbroſiſſimis, vere* Noveboracum *migrans, inquieta, voce tremula, per paria ingrediens; 8 pollices longa.*

Roſtrum pedes*que fuſci;* remiges *nigrae, margine albae;* cauda *ſubfurcata nigra.*

leucophrys. 45. E. verticis faſcia alba utrinque nigro-marginata, corpore ſubtus, ſuperciliis, alis ſpuriis, alarumque faſciis duabus albis, collo cinereo, dorſo, alis caudaque aequali, fuſcis, criſſo flavo. *Forſter act. angl.* 62. *p.* 426. *Mill. on var. ſubj. t.* 21. C.

White-crowned Bunting. *Arct. zool.* 2. *p.* 355. *n.* 221. *t.* 16. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 200. *n.* 44.

Habitat in Canada *et partibus* Americae *magis borealibus, fringillae caelibis magnitudine,* $7\frac{1}{4}$ *pollices longa, gramine vermibusque victitans, in fundo ſalicum nidificans, et* 3-5 *pariens ova ſpadicea; in arboribus ſuaviter cantans.*

Roſtrum pedes*que incarnati;* dorſum *ex ferrugineo,* uropygium *ex cinereo fuſcum, pennis margine cinereis;* pectus *cinereum.*

luctuoſa. 46. E. nigra, barba thoracica, fronte, pectore, abdomine, uropygio criſſoque albis. *Scop. ann.* 1. *p.* 146. *n.* 215.

Wreathed Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 200. *n.* 45.

Statura *pari majoris;* roſtrum *nigrum;* linea *alba a fronte utrinque in nucham producta; in medio* alarum *macula alba.*

47. E.

aureola. 47. E. citrina, vertice, cervice, torque dorſoque ſpadiceis, criſſo albido, rectricibus duabus utrinque extimis faſcia obliqua alba. *Pall. it.* 2. *p.* 711. *n.* 23. *Georg. it. p.* 174.
Emberiza ſibirica. *Lepechin nov. comm. Petr.* 15. *p.* 483. *Falck it.* 3. *p.* 398.
Yellow-breaſted Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 201. *n.* 46.
Habitat in omni Sibiria *ad* Camtſchatcam *usque gregaria; in pinetis, populetis, ſalicetis potiſſimum ad fluvios ſitis, ſchoenicli magnitudine et voce.*
Tempora *alba;* hypochondria *lineolis fuſcis picta;* alarum *baſes imo fuſcae, hinc late albae;* tectrices remigesque *nigricantes, margine rufeſcentes;* cauda *ſubforcipata;* pedes *ex griſeo pallidi.*

Sandwichenſis. 48. E. fuſca, ſubtus exalbida fuſco-maculata, ſuperciliis flavis temporibus atris.
Unalaſha Bunting. *Arct. zool.* 2. *p.* 363. *n.* 229.
Sandwich Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 202. *n.* 47.
Habitat in Unalaſchca *et ſinu* Sandwich, 6 *pollices longa.*
Roſtrum pedesque *atri;* linea *ſubocularis obſcura;* abdominis *medium exalbidum non maculatum.*

unalaſchcenſis. 49. E. fuſca, rubro tincta, ſubtus exalbida nebuloſa, medio abdominis unicolore.
Unalaſha Bunting. *Arct. zool.* 2. *p.* 364. *n.* 232. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 202. *n.* 48.
Habitat in Unalaſchca, 7 *pollices longa; an ſatis a Sandwichenſi diverſa?*

atricapilla. 50. E. ſpadicea, pennarum ſingularum ſtria media fuſca, ſubtus cinerea, vertice flavo, fronte et faſcia oculari nigra, mento exalbido, occipite cinereo.
Black crowned Bunting. *Arct. zool.* 2. *p.* 364. *n.* 230? *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 202. *n.* 49. *t.* 45.
Habitat in ſinu Natka, *et inſulis* Sandwich, 7 *pollices longa.*
Roſtrum *atrum;* uropygium *pallide olivaceum;* tectrices *alarum* remigesque *margine pallidae;* abdominis *pennae medio pallidiſſime flavicantes;* cauda *aequalis* pedesque *fuſci;* ungues *atri.*

pithyornus. 51. E. verticis macula media ovata alba, nucha albo-varia, gula ex teſtaceo ſanguinea, rectricibus utrinque duabus extimis faſcia obliqua alba. *Pall. it.* 2. *p.* 710. *n.* 22.
Emberiza leucocephala. *S. G. Gmelin nov. comm. Petrop.* 15. *p.* 480. *t.* 23. *f.* 3.

Emberizae alia ſpecies. *Lepechin nov. comm. Petrop.* 15. *p.* 486. *t.* 25. *f.* 2.

Pine Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 203. *n.* 50.

Habitat in Sibiria, *rarius hieme ad mare caſpium, citrinellae magnitudine, ſchoenicli voce.*

Roſtrum pedes*que exalbidi; ad utrumque* capitis *latus faſcia nigra; altera ocularis rufa; ad genas macula alba, ad tempora nigra, utraque trigona;* colli *latera ferruginea;* pectoris *macula trigona ingens;* abdominis *medium canum, latera rufa;* criſſum *albidum;* dorſum *et* uropygium *rufa;* tectrices *alarum et* remiges *ſecundariae fuſcae margine rufae; majores et* rectrices *nigricantes margine albidae;* cauda *ſubforcipata;* ungues *atri.* Femina *ex griſeo et rufeſcente varia, ſubtus magis rufa;* abdomine *poſtremo exalbido.*

cinerea. 52. E. badia ſubtus exalbida badio-maculata, cauda remigibusque fuſcis margine griſeis, uropygio griſeo, tectricibus caudae ex rufo albis.

Emberiza canadenſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 296. *n.* 11. *t.* 14. *f.* 1.

Cul-rouſſet. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 368.

Cinereous Bunting. *Arct. zool.* 2. *p.* 364. *n.* 233. *t.* 17. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 204. *n.* 51.

Habitat in Canada, *Martio in* Noveboracum *migrans, citrinellae magnitudine,* $5\frac{1}{2}$ *pollices longa, frequens ad radicem juniperi carolinianae vix ultra pedem ſupra terram elata.*

caerulea. 53. E. ex rufo et caeruleo varia, vertice rufo, tectricibus alarum majoribus, remigibus rectricibusque fuſcis margine exteriori rufis.

Emberiza canadenſis caerulea. *Briſſ. av.* 3. *p.* 298. *n.* 12. *t.* 14. *f.* 2.

Azuroux. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 369.

Blue Bunting. *Arct. zool.* 2. *p.* 365. *n.* 234. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 205. *n.* 52.

Habitat in Canada, *rarius in* nova Anglia, *cinerea minor,* $4\frac{1}{4}$ *pollices longa.*

cyanea. 54. E. cyanea, rectricibus fuſcis.

Tanagra cyanea. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 315. *n.* 6.

Tanagra caerulea carolinenſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 13. *n.* 6.

Miniſtre. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 86.

Blue Linnet. *Catesb. Car.* 1. *t.* 45. *Edw. av.* 4. *t.* 273. *f.* 2.

Indigo

Indigo Bunting. *Arct. zool.* 2. *p.* 365. *n.* 235. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 205. *n.* 53.

Habitat in Noveboraci, novae Hispaniae, Carolinae *interioris montibus, pomariis, milii semine victitans, carduelis magnitudine, 5 pollices longa, nidum struens ex gramine marcido, lanugine vegetabili sternens, et in bifurcatione rami cujusdum erecti suspendens, linariae cantu, cui etiam femina supra ex virescente fusca, subtus exalbida, et deplumationis tempore praeter marginem alarum caeruleum ipsa mascula avis similis est.*

Rostrum *plumbeum*; pedes *fusci.*

Quelea. 8. E. grisea, fronte nigra, rostro coccineo.

Passer senegalensis, erythrorhynchos. *Briss. av.* 3. *p.* 110. *n.* 19. *t.* 6. *f.* 1.

Moineau à bec rouge du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 485. *Pl. enl. n.* 183. *f.* 2.

Blackfaced Bunting. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 192. *n.* 28.

β) Emberiza supra ex fusco et atro varia.

Moineau du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 484. *Pl. enl. n.* 223. *f.* 1.

Habitat ad fluvium Senegal, *fringillae domesticae magnitudine*, $4\frac{3}{4}$ *pollices longa.*

Rostrum *crassum*; genae *et* gula *nigrae*; *reliquum* caput, humeri, dorsum *ex nigro et griseo varia*; pectus *et* abdomen *ex rufo alba*; remiges rectrices*que nigricantes margine cinereae*; pedes *et* ungues *incarnati.*

textrix. 55. E. spadicea, subtus flava, superciliis uropygioque flavis, fascia pectoris media nigra subdivaricata.

Weaver Bunting. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 193. *n.* 29.

Magnitudo *fringillae domesticae*; rostrum *corneum*; cauda *atra*; pedes *pallidi: Hieme omnem flavedinem exuit avis, tota fuscescens, in cavea sericum sibi obvium filis carceris intertexit.*

rubra. 56. E. rubra, cervice dorsoque ex nigricante et olivaceo variis, hinc inde rubro maculatis, abdomine crissoque cinereis, remigibus rectricibusque nigris, margine ex griseo viridibus.

Moineau de l'isle de France. *Buff. pl. enl. n.* 665. *f.* 1, 2.

Crimson Bunting. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 194. *n.* 30.

Habitat in insula Franciae, *textricis magnitudine.*

Rostrum *atrum*; pedes *pallide incarnati*; femina *olivacea, subtus dilutius.*

9. E.

capenſis. 9. E. griſea, gula albida, faſcia oculari maxillarumque nigricante.

Hortulanus capitis bonae ſpei. *Briſſ. av.* 3. *p.* 280. *n.* 7. *t.* 14. *f.* 4.

Ortolan du cap de bonne eſpérance. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 328. *Pl. enl. n.* 158. *f.* 2.

Cape Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 185. *n.* 23.

β) Emberiza ſubtus flava.

Ortolan à ventre jaune du cap de bonne eſpérance. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 326. *Pl. enl. n.* 664. *f.* 2.

γ) Emberiza ſubtus tota exalbida. *Buff. pl. enl. n.* 664. *f.* 1.

δ) Emberiza ſubtus exalbida, gutture cinereo-vario. *Buff. pl. enl. n.* 386. *f.* 2.

Habitat ad caput bonae ſpei, *fringillae magnitudine.*

Roſtrum *atrum*; corpus *ſupra ex rufo flavum nigro-varium, ſubtus ſordide ochroleucum*; vertex *et* nucha *ex griſeo nigroque varia*; tectrices *alarum minores rufae*; majores, remiges, rectrices*que atrae margine rufae*; pedes *nigricantes.*

fuſca. 57. E. fuſceſcens, remigibus caudaque fuſcis, lineis obſcurioribus, abdomine albo, narium, genarum mentique faſciculis plumoſis.

Barred-tail Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 187. *n.* 24.

Habitat in Sina, *miliariae magnitudine.*

Roſtrum *incarnatum*; pedes *roſei*; unguis *poſterior longus.*

ludovicia. 10. E. rufa nigro-maculata ſubtus pallida, pectora rufo, capite ſupra arcu nigro.

Hortulanus ludovicianus. *Briſſ. av.* 3. *p.* 278. *t.* 14. *f.* 3.

Ortolan de la Louiſiane. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 325. *Pl. enl. n.* 158. *f.* 1.

Louiſiane Bunting. *Arct. zool.* 2. *p.* 363. *n.* 227. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 177. *n.* 13.

Habitat in Luiſiana, *citrinellae magnitudine,* $5\frac{1}{4}$ *pollices longa.*

Roſtrum *rufum, nigro-maculatum*; caput *et* guttur *rufeſcens*; faſcia *et liturae infra oculos nigrae*; uropygium *et* cauda *cuneiformis nigra*; pectus *rufum*; tectrices *alarum majores* remigesque *nigrae margine rufae*; pedes *cinerei.*

Cia. 11. E. rufeſcens, capite lineis nigricantibus ſparſis, ſuperciliis albis.

Emberiza capite cinereo lineis nigricantibus variegato. *Kram. el. p.* 371. *n.* 3.

Emberiza barbata. *Scop. ann.* I. *n.* 210.

Emberiza

Emberiza pratenſis. *Geſn. av.* 655. *Aldr. orn.* 2. *p.* 573. *Briſſ. av.* 3. *p.* 266. *n.* 3.
Cirlus ſtultus. *Aldr. orn.* 2. *p.* 857. *t.* 858. *Will. orn. p.* 271. *Raj. av. p.* 94. *n.* 5.
Paſſeribus congener. *Aldr. orn.* 2. *p.* 562. *Will. orn. p.* 250. *Raj. av. p.* 87. *n.* 2.
Bruant fou. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 351.
Bruant des prés. *Buff. pl. enl. n.* 30. *f.* 2.
Fooliſh Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 191. *n.* 27.
Habitat ſolitaria in Europae *et* Sibiriae *auſtralis montanis, citrinellae magnitudine, ſtupida, volando* zip zip *ſonans.*
Roſtrum *atrum;* rectrices 2 *intermediae fuſcae, extimae dimidiato-albae;* mari caput *cinereum nigro-maculatum;* corpus *ſupra ex rufo griſeum, pennis ſingulis medio nigris, ſubtus magis minusve rufum, pectore cineraſcente;* faſcia *ocularis et alia maxillaris nigra;* remiges *atrae, margine albae;* cauda *nigra:* Feminae caput *linea verticali cinerea lateribus atro ferrugineoque variis;* tempora *linea alba;* linea *nigra ab oculis ad baſin mandibularum;* collum *ſubtus cinereum;* pectus abdomen*que ferruginea;* dorſum *rubeſcens, nigro-varium;* alae *baſi cineraſcentes;* cauda *nigricans.*

Cirlus. 12. E. fuſca, pectore maculato, ſuperciliis luteis, rectricibus duabus extimis macula alba cuneata.
Emberiza ſepiaria. *Briſſ. av.* 3. *p.* 263. *n.* 2.
Cirlus. *Aldr. orn.* 2. *p.* 855.
Bruant de Haye. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 347. *Pl. enl. n.* 653. *f.* 1. 2.
Cirlus or Zivolo. *Raj. av. p.* 93. *n.* 4. *Will. orn. p.* 269. *n.* 3. *Olin. ucc. t.* 50.
Cirl Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 190. *n.* 26.
Habitat in Galliae *et* Italiae *calidioris agris recens aratis, ſemina, vermes, inſecta legens, fringillarum non raro cohortibus interſerta, facile cicuranda,* zi zi *ſonans, citrinellae magnitudine,* $6\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum *ex cinereo fuſcum;* caput *olivaceum;* tempora *flava, macula inter roſtrum et oculos et nonnullis ad aures nigris;* mentum *et* gula *nigra, haec fuſcia flava picta;* corpus *ſubtus flavum,* (*in femina fuſco-ſtriatum, mento criſſoque albis*); cauda *ſubforficata fuſca, rectricibus margine griſeis.*

familiaris. 13. E. cinerea fuſco-maculata, apicibus rectricum albis, dorſo poſtico flavo.

Motacilla

Motacilla capite et roſtro nigro, uropygio luteo. *Osb. it. p.* 102.
Bruant familier. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 367.
Familiar Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 194. *n.* 31.
Habitat in Java, *egregie familiaris, ſpini magnitudine, ſubtus cinerea*; caput, collum*que cinereum*; roſtrum *nigrum*; dorſi *pars inferior flava*; *tectrices apexque* caudae *albae.*

flaveola. 14. E. griſea, facie flava.
Flaveole. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 363.
Yellow faced Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 195. *n.* 32.
Habitat in calidis *regionibus, ſpini magnitudine.*
Frons *et* gula *flava.*

amazona. 15. E. fuſca, vertice fulvo, criſſo albido.
Amazone. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 364.
Amazon's Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 195. *n.* 33.
Habitat Surinami, *pari magnitudine.*
Alarum *baſis ſubtus albida.*

oryzivora. 16. E. nigra, cervice rufeſcente, abdomine nigro, rectricibus mucronatis.
Hortulanus carolinenſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 282. *n.* 8. *t.* 15. *f.* 3.
Agripenne ou Ortolan de riz. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 337.
Rice-bird. *Catesb. Car.* 1. *t.* 14. *Edw. glean. t.* 291.
Rice Bunting. *Arct. zool.* 2. *p.* 360. *n.* 225. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 188. *n.* 25.
β) Emberiza oryzivora ſubtus flaveſcens.
Agripenne ou Ortolan de la Louiſiane. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 339. *Pl. enl. n.* 388. *f.* 2.
Habitat in Cuba, *ex qua, oryza depaſta, Septembri gregatim feminis praecedentibus in* Carolinam *migrat, oryza conſitos ibi agros ſimiliter devaſtans, quo facto Aprili et Majo in* Noveboracum *pergit, ibi primo vermibus et inſectis victitat, zea autem matureſcente ejus ſpathas perforando, ut pluvia intrare poſſit, iſtas quoque ſegetes perdit; egregie cantans, fringillae domeſticae magnitudine,* $6\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum *atrum*; frons, tempora, dorſum (*in femina rufum*), cauda *et* corpus *ſubtus nigra*; capitis dorſi*que pennae margine rufae*; occiput *rufeſcens*; humeri *exalbidi*; remiges *margine ex flavicante griſeae*; cauda *furcata apice fuſceſcens*; pedes *fuſci.*

17. E.

Schoeniclus. 17. E. capite nigro, corpore griseo nigroque, rectricibus extimis macula alba cuneiformi. *Fn. suec.* 231. *Brünn. orn. n.* 251. *Müller zool. dan. n.* 254. *Nozem. nederl. Vogel t.* 44. *Georg. it. p.* 174.

Emberiza capite nigro, maxillis rufis, torque albo, corpore rufo nigricante. *Fn. suec.* 1. *n.* 211. *Kramer el. p.* 37. *n.* 5.

Hortulanus arundinaceus. *Briss. av.* 3. *p.* 274. *n.* 5.

Passer arundinaceus. *Gesn. av.* 652. *Günth. Nest. u. Eyer t.* 17. *f. sup.*

Passer atricapillus torquatus. *Frisch av. t.* 7. *Raj. av. p.* 93. *n.* 3.

Junco Turneri. *Gesn. av.* 573.

Ortolan de roseaux. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 315. *Pl. enl. n.* 247. *f.* 2. *et* 497. *n.* 2.

Reed Sparrow. *Hayes brit. birds t.* 35.

Greater Reed Sparrow. *Raj. av. p.* 93. *n.* 3. *Will. orn. p.* 269. *Alb. av.* 2. *t.* 51.

Reed Bunting. *Brit. zool.* 1. *n.* 120. *Arct. zool.* 2. *p.* 368. E. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 173. *n.* 9.

β) Schoeniclus fuscus, subtus pallidus.

Habitat in Europae *et australis* Sibiriae, β) *in* promontorii bonae spei *arundinetis, citrinellae magnitudine,* $5\frac{3}{4}$ *pollices longa, noctu praesertim canora, nidum inter quatuor arundines pendulum,* 1-3 *pedes supra aquam elatum ex siccis graminum culmis struens, intus arundinis lanugine sternens, cujus quoque seminibus victitat, ova pariens* 4-5 *ex caerulescente alba, venis purpureis varia, non raro migrans.*

Rostrum *fuscum*; guttur *et* pectus *superius nigrum; inferius cum abdomine album, ad latera atro-striatum; pennae* corporis *superiores, tectrices* alarum remiges*que ex fuscescente rubrae, per mediam longitudinem nigrae;* rectrices *apice acuminatae,* 8 *mediae nigrae; intermediae duae utroque, reliquae exteriori margine rufae;* 2, 2 *rhachi tamen et latere interiori a basi ad medium albae; extimae utrinque basi et apice atrae;* pedes *fuscescentes.* Feminae caput *et* collum *ex fuscescente rubrum.*

arundinacea. 58. E. alba, remigibus obscuris, rectricum prima utrinque alba, secunda albo nigroque dimidiata, cauda aequali. *S. G. Gmelin it.* 2. *p.* 175.

Habitat in Astracania, ~~*an vero a schoeniclo diversa?*~~

provincialis. 59. E. subtus alba, fascia oculari et alarum mentoque albis, macula suboculari striaque utrinque gulari nigris, pectore fusce-

fuſceſcente nigro-maculato, remigibus rectricibusque atris margine rufis.

Gavoué de Provence. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 321. *Pl. enl. n.* 656. *f.* 1.

Multachoe Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 175. *n.* 10.

Habitat in Galloprovincia, $4\frac{2}{3}$ *pollices longa, ſupra ſchoeniclo ſimilis, ſeminibus victitans, Aprili egregie cantans.*

Roſtrum *atrum*; pedes *fuſceſcentes.*

lesbia. 60. E. ſubtus alba, facie alba: faſciis tribus nigris, pectore et uropygio fuſceſcente, rectricibus albis: intermediis duabus atris margine rufis.

Mitilene de Provence. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 322. *Pl. enl. n.* 656. *f.* 1.

Lesbian Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 176. *n.* 11.

Habitat in Galloprovincia, *provinciali, cui ceterum affinis, rarior et ferocior, Junio demum cantans, appropinquante accipitre* Chic *vociferans.*

lotharingica. 61. E. nigro-maculata, ſupra rufa, ſubtus cinerea, abdomine rufo, ſtria oculari et mandibulari nigra, rectricibus nigris et albis, intermediis rufis, extimis fere penitus albis.

Ortolan de Lorraine. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 323. *Pl. enl. n.* 511. *f.* 1.

Ortolan de paſſage. *Buff. pl. enl. n.* 511. *f.* 2. (*fem.*)

Lorrain Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 176. *n.* 12.

Habitat in Lotharingia, $6\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

Roſtrum *et* pedes *ex fuſceſcente incarnati*; tempora *pallida*; tectrices *alarum minores cinereae*; *reliquae ex rufo nigroque variae.* Femina *minor ſubtus alba, faſcia in* capite *nulla, at macula albida ſupra, rufaque infra oculum.*

pſittacea. 18. E. cinereo-fuſca, alis fulvis, rectricibus duabus longiſſimis.

Fringilla braſilienſis. *Seb. muſ.* 1. *p.* 103. *t.* 66. *f.* 5.

Linaria braſilienſis longicauda. *Briſſ. av.* 3. *p.* 147. *n.* 35.

Veuve éteinte. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 168.

Pſittaceous Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 178. *n.* 14.

Habitat in Braſilia, *fringillae domeſticae magnitudine*, $11\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

Capiſtrum *rubeſcens*; rectrices *intermediae apice badiae.*

paradiſaea. 19. E. nigra, pectore rubro, rectricibus intermediis quatuor elongatis acuminatis: duabus longiſſimis, roſtro nigro. *Scop. ann.* I. *n.* 216.

Paſſer

Paſſer indicus macrourus alius. *Aldr. orn.* 2. *p.* 567.
Paſſer pſittacus indicus, cauda longa. *Petiv. gazoph. t.* 55. *f.* 1.
Vidua. *Briſſ. av.* 3. *p.* 120. *n.* 25.
Veuve à collier d'or. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 155. *t.* 6.
Grande Veuve d'Angola. *Buff. pl. enl. n.* 194.
An other indian long-tailed Sparrow. *Will. orn. p.* 251. §. 11. *Raj. av. p.* 87. *n.* 10.
Red-breaſted long-tailed Finch. *Edw. av. t.* 86.
Whidah-Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 178. *n.* 15.

Habitat in Africa, *potiſſimum* Angola, *quotannis bis auctumno et vere plumas mutans et per totam hiemem longis rectricibus carens, quo tempore mas feminae ex atro fuſcae ſimilis, eoque tempore* $5\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

Roſtrum *plumbeum*; cervix *pallide aurantia*; abdomen *ſuperius aurantium inferius album*; criſſum *nigrum*; rectrices *intermediae* 4 *pollices longae, undulatae, reliquis ſplendidiores, latae, filo longo terminatae*; 5-5 13 *pollices longae aut longiores, medio latiſſimae, apice acutae, ex medio racheos naſcente filo longo*; pedes *incarnati.*

ſerena. 20. E. pileo nigro, vertice rubro, cauda cuneiformi: rectricibus duabus mediis longiſſimis, pedibus griſeis.
Vidua minor. *Briſſ. av.* 3. *p.* 124. *n.* 26. *t.* 8. *f.* 2.
Veuve dominicaine. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 160. *Pl. enl. n.* 8. *f.* 2.
Dominican Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 180. *n.* 16.

Bis in anno plumas mutat, hieme rectricibus longis carens, $6\frac{3}{4}$ *pollices longa.*

Roſtrum *rubrum*; *corona* verticis *ex rufo alba*; collum *ſupra et* corpus *ſubtus ex rufo alba*; cervicis *inferioris* dorſique *pennae nigrae, margine exalbidae*; alae *nigrae, tectricibus tamen interioribus* remigumque *margine albis*; cauda *nigra*; rectrices *mediae apice acuminatae,* 2 *pollicibus reliquis longiores,* 5, 4, 3 *apice albae*; 2, *et* 1 *interiori latere albae, exteriori rufeſcentes.* Femina *tota fuſca, cauda aequali.*

vidua. 21. E. nigricans ſubtus albida, rectricibus intermediis quatuor elongatis acuminatis: duabus longiſſimis, roſtro rubro.
Paſſer indicus macrourus, roſtro miniaceo. *Aldr. orn.* 2. *p.* 565.
Vidua major. *Briſſ. av.* 3. *p.* 127. *n.* 27.
Grande veuve. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 162.

Long-tailed Sparrow with a Scarlet-Bill. *Will. orn. p.* 251. *t.* 45. *Raj. av. p.* 87. *n.* 9.
Long-tailed Bunting. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 181. *n.* 17.
Habitat in India *et* Angola, *fringilla domestica minor.*
Tempora *et* corpus *subtus exalbida*; tectrices *alarum fascia alba*; remiges *margine fuscae*; rectrices 12, *intermediae* $12\frac{1}{2}$, *proximae his* 9 *pollices longae, utraeque penitus nigrae, reliquae aequales dimidiato-albae*; pedes *nigri aut fusci*; pedes *pallidi.*

principalis. 22. E. variegata, pectore rufo, rectricibus mediis quatuor longissimis, rostro pedibusque rubris.
Vidua angolensis. *Briss. av. app. p.* 80.
Veuve mouchetée. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 165.
Long-tailed Sparrow. *Edw. gleau. t.* 270.
Variegated Bunting. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 181. *n.* 18.
Habitat in Angola, *paradiseae magnitudine.*
Caput *et* corpus *supra ex nigro et rufo varium, subtus exalbidum*; tectrices *alarum minores albae, majores nigrae, margine rufae*; remiges *rufae*; rectrices 12, *mediae* 4 *nigrae*; *intermediae duae* $5\frac{1}{2}$, *proximae his* $4\frac{1}{2}$ *pollicibus reliquis longiores*; *hae aequales, fuscae, margine pallidiores, interiori latere albo-maculatae*; *an vere diversa a vidua?*

regia. 23. E. rectricibus intermediis longissimis aequalibus apice tantum pennatis, rostro rubro.
Vidua riparia africana. *Briss. av.* 3. *p.* 129. *n.* 28. *t.* 9. *f.* 1.
Veuve à qnatre brins. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 158. *t.* 5.
Veuve de la Côte d'Afrique. *Buff. pl. enl. n.* 8. *f.* 1.
Shaft-tailed Bunting. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 183. *n.* 19.
Habitat in Africae *maritimis, paradisea rarior, linariae magnitudine, hieme, quo tempore rectricibus longioribus caret, feminae fuscae similis,* $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Corpus *supra*, crissumque *nigrum*; guttur, tempora, area oculorum, *et* corpus *subtus rufa*; cervix *nigro maculata*; rectrices *nigrae*, 4 *intermediae* 9-10 *pollices longae, reliquae aequales breves*; pedes *rubri.*

longicauda. 62. E. nigra, alarum tectricibus minoribus rubris et area alba, rectricibus sex mediis longissimis.
Loxia longicauda. *Miller on var. subj. t.* 3. A.
Veuve à épaulettes. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 164. *Pl. enl. n.* 635.
Yellow-shouldered Oriole. *Brown illustr. t.* 11.

Orange-

Orange-ſhouldered Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 184. *n.* 20.
Capitcher Sperling. *Kolbe Cap.* 2. *p.* 199. *t.* 7. *f.* 7.
Habitat ad caput bonae ſpei, *turdi muſici magnitudine*, 20 *pollices longa.*
Roſtrum *robuſtum*, *atrum*; lingua *acuta*; remiges *nonnullae baſi albae*, *ſecundariae primoribus aequales*; rectrices 12, 6, 6 15, 5, 5 14, 4, 4 11½ *pollices longae*, *reliquae multo breviores*; pedes *fuſci*, *unguibus longis uncinatis.*

panayenſis. 63. E. nigra, pectoris macula magna coccinea, rectricibus quatuor mediis acuminatis pendulis longiſſimis aequalibus.
Veuve en feu. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 167.
Veuve à poitrine rouge. *Buff. pl. enl. n.* 647.
Veuve de l'isle de Panay. *Sonner. it. p.* 117. *t.* 76.
Panayan Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 184. *n.* 21.
Habitat in inſula Panay, *paradiſeae magnitudine*, 12 *pollices longa.*

angolenſis. 64. E. nigra, vertice colloque flavis, cauda longa.
Gros-bec à poitrine couleur de feu. *Salern. orn. p.* 277. *n.* 14.
Angola Bunting. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 185. *n.* 22.
Habitat in Angola, *fringillae magnitudine.*

Ciris. 24. E. capite caeruleo, abdomine fulvo, dorſo viridi, pennis viridi fuſcis. *Act. Stockh.* 1750. *p.* 278. *t.* 7. *f.* 1.
Fringilla maripoſa. *Scop. ann.* 1. *n.* 222.
Chloris ludoviciana vulgo Papa dicta. *Briſſ. av.* 3. *p.* 200. *n.* 55. *app. p.* 74.
Verdier de la Louiſiane. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 176. *t.* 9. *Pl. enl. n.* 159. *f.* 1. 2.
China Bulfinch. *Alb. av.* 3. *t.* 68.
Painted Finch. *Catesb. Car.* 1. *t.* 44. *Edw. av. t.* 130.
Painted Bunting. *Arct. zool.* 2. *p.* 362. *n.* 226. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 206. *n.* 54.
Habitat in America, *inter* Canadam *et* Gujanam, 5½ *pollices longa*, *in citro aurantia nidificans*, *milii ſemine victitans*, *pro ſexu*, *aetate*, *anni tempore colore varians.*
Anno *primo mas et femina fuſca*; *ſecundo* mas *ex caeruleo viridis*, *capite caeruleo*, *alis caudaque fuſcis margine ex caeruleo viridibus*; femina *caeruleſcens*; *adulta bis in anno plumas mutat*; mari roſtrum *ex griſeo fuſcum*; caput collumque *violaceum*; orbitae *rubrae*; humeri dorſumque *ſuperius ex flavo viride*; *inferius*, uropygium, *et* corpus *ſubtus rubrum*; tectrices *alarum minores ex violaceo fuſcae*, *majores*

majores virescentes; remiges *fuscae*, *margine aliae virescentes*, *aliae rubrae*; rectrices *fuscae*, *intermediae duae totae rubescentes*, *reliquae exteriori tantum margine*; pedes *fusci*. Femina *supra viridis*, *subtus ex flavo viridis*; remigibus *fuscis*, *margine viridibus*; cauda *ex fusco et viridi varia*.

quadricolor. 65. E. capite colloque caeruleis, dorso, alis caudaeque apice viridibus, cauda et abdominis medio rubris, pectore reliquoque abdomine fuscescentibus.
Quadricolor. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. *p.* 467. *n.* 15.
Grosbec de Java. *Buff. pl. enl. n.* 101. *f.* 2.
Red rumped Bunting. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 208. *n.* 55.
Habitat in Java, *Ciri minor*, 5 *pollices longa*.
Rostrum *atrum*; pedes *pallide incarnati*.

cyanopis. 66. E. viridis, uropygio et abdomine rufis, fronte, genis, gulaque caeruleis, remigibus fuscis margine viridibus, rectricibus margine rubris, intermediis viridibus, reliquis fuscis.
Chloris javensis. *Briss. av.* 3. *p.* 198. *n.* 57. *t.* 7. *f.* 4.
Toupet bleu. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 179.
Blue-faced Bunting. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 209. *n.* 56.
Habitat in Java, 4 *pollices longa*.
Rostrum *plumbeum*; abdominis *medium rubrum*; pedes *grisei*.

viridis. 67. E. supra viridis subtus alba, remigibus caudaque caeruleis.
Chloris indica minor. *Briss. av.* 3. *p.* 197. *n.* 56.
Parement bleu. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 181.
Green Bunting. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 209. *n.* 57.
Habitat in India, *chloridis magnitudine*.
Rostrum *ex virescente fuscum*; remigum rectricumque *rhachis alba*; pedes *nigri*.

platensis. 68. E. supra ex virescente fusca, subtus ex cinereo alba, dorso nigro-vario, alarum, remigum lateraliumque rectricum margine flavo.
Emberise à cinq couleurs. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 364.
Plata Bunting. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 210. *n.* 58.
Habitat in Bonaria, *ad fluvium* Plata Americae *australis*, 8 *pollices longa*.
Rostrum *cinereum*; irides *badiae*; pedes *plumbei*.

borbonica. 69. E. ex rufo rubra, alis, cauda pedibusque spadiceis.
Mordoré. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 366.
Bruant de l'isle de Bourbon. *Buff. pl. enl. n.* 321. *f.* 2.
Habitat

Habitat in insula Bourbon, *citrinellae magnitudine*, 5½ *pollices longa.*
Rostrum *fuscum.*

Calfat. 70. E. cana, subtus vinacea, capite, gula, caudaeque margine nigris, rostro, pedibus et orbitis roseis.
Calfat. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 371.
Red-eyed Bunting. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 210. *n.* 60.
Habitat in insula Franciae, *magnitudine inter fringillam domesticam et linariam media.*
Irides *roseae; a rictu ad occiput stria alba;* tectrices *caudae inferiores albae.*

chlorocephala. 71. E. fusca, capite colloque olivaceis, dorso tectricibusque alarum ex fusco et nigro variis, cauda furcata.
Green-headed Bunting. *Brown illustr. p.* 74. *t.* 30. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 211. *n.* 61.
Habitat prope Londinum.
Pedes *flavicantes.*

grisea. 72. E. grisea, tectricibus alarum superioribus et pectore rubore adsperso, remigibus rectricibusque intus albis, extus ex griseo et rubro variis.
Emberiza surinamensis. *Briss. av.* 3. *p.* 302. *n.* 15.
Gonambouch. *Seb. mus.* 1. *p.* 174. *t.* 110. *f.* 6. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 366.
Grey Bunting. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 211. *n.* 62.
Habitat in Surinamo *frequens, lusciniae voce, alaudae magnitudine,* 5 *pollices longa, zea victitans.*

surinamensis. 73. E. grisea, subtus ochroleuca, pectore maculis oblongis nigris vario.
Proyer. *Fermin. surin.* 2. *p.* 200.
Surinam Bunting. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 212. *n.* 63.
Habitat in Surinam, *alaudae colore, sed major.*

Cyanella. 74. E. caerulea nitens, interscapuliis humerisque ex caeruleo ferrugineoque variis, remigibus rectricibusque fuscis margine caerulescentibus. *Sparrm. mus. Carls.* 2. *t.* 42. 43.
Habitat in America *septentrionali, rostro pedibusque flavicantibus, an vere distincta species?*

ruficapilla. 75. E. corpore supra fusco subtus cinereo, gula ferruginea, capistro albo, capillitio insuper rufescente, cauda nigra.
Sparrm. mus. Carls. 2. *t.* 44.
Habitat - - - -

III. TANAGRA. *Roſtrum* conicum, acuminatum, emarginatum, baſi ſubtrigonum, apice declive.

Jacapa. 1. T. atra, fronte, jugulo pectoreque coccineis.
Cardinalis purpureus. *Briſſ. av.* 3. *p.* 49. *n.* 29. *t.* 3. *f.* 2. 3.
Lanius Carbo. *Pallas adumbr.* 114.
Jacapu. *Marcgr. braſ.* 192.
Bec d'argent. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 259.
Red-breaſted Blackbird. *Edw. glean. t.* 267.
Red-breaſted Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 214. *n.* 1.
Habitat in Americae, *praeſertim auſtralis hortis, et in domuum vicinia, utplurimum gemina, fructibus victitans, ex ſiccis fibris foliisque nidum ſtruens cylindricum pauliſper incurvum,* 6 *pollices longum, et* $4\frac{1}{4}$ *in diametro amplum, foliis amplioribus ſternens, et in horizontali ramo arboris humilioris, apertura deorſum verſa, ſuſpendens, ova pariens* 2 *alba, maculis exiguis rubeſcentibus varia: Fringillae domeſticae magnitudine,* $6\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum *nigrum, mandibula inferiore poſterius convexa argentea;* mentum *coccineum;* frons *aliquando atra;* pedes *fuſci:* Femina *ex purpuraſcente fuſca, ſubtus rubeſcens;* cauda alisque *fuſcis.*

braſilia. 2. T. coccinea, alis caudaque nigris.
Cardinalis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 42. *n.* 24. *t.* 3. *f.* 1.
Merula braſilica. *Bell. av.* 319. *Aldr. orn.* 2. *p.* 628.
Paſſer erythromelanus indicus. *Aldr. orn.* 3. *p.* 568. *Raj. av. p.* 87.
Paſſer indicus porphyromelanus. *Aldr. orn.* 2. *p.* 571.
Tye piranga. *Marcgr. braſ.* 192. *Will. orn. p.* 251.
Chiltototl. *Hern. mex. p.* 54. *Raj. av. p.* 169.
Cardinal. *Buff. pl. enl. n.* 127. *f.* 1. *n.* 156. *f.* 1.
Braſilian Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 215. *n.* 2.
β) Cardinalis naevius. *Briſſ. av.* 3. *p.* 44. *n.* 25.
γ) Cardinalis torquatus. *Briſſ. av.* 3. *p.* 45. *n.* 26.
Rumpleſs blue red and black indian Sparrow. *Will. orn. p.* 252.
Habitat in America *auſtrali, fringilla domeſtica paulo major,* $6\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum *nigrum, mandibula inferiore a baſi ad medium alba;* pennarum *baſis* pedesque *nigri.*

3. T.

rubra. 3. T. rubra, alis caudaque nigris, rectricibus apice albis.
Cardinalis canadenſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 48. *n.* 28. *t.* 2. *f.* 5.
Canada Tanager. *Arct. zool.* 2. *p.* 369. *n.* 237.
Red Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 217. *n.* 3.
β) Merula braſilienſis. *Raj. av. p.* 66. *n.* 8. *Will. orn. p.* 195.
Scarlatte. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 245.
Scarlet Sparrow. *Edw. glean. t.* 343.
Habitat in Canadae *ſilvis denſiſſimis*, *fringillae domeſticae magnitudine*, $6\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum *corneum*; remiges *fuſcae*, *interioris marginis parte plurima alba*; cauda *ſubfurcata*; pedes *nigri.*

olivacea. 6. T. olivacea, gula et pectore flavis, abdomine albo, remigibus rectricibusque fuſcis margine albis.
Olivet. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 269.
Olive Tanager. *Arct. zool.* 2. *p.* 369. *n.* 238. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 218. *n.* 4.
Habitat in Cayenna *et* Noveboraco.
Pedes *fuſci.* Feminae cauda *et* alae *fuſcae*, *margine olivaceae.*

miſſiſſipenſis. 23. T. tota rubra.
Tangara du Miſſiſſipi. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 252. *Pl. enl. n.* 741.
Miſſiſſipi Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 218. *n.* 5.
β) Tanagra ex coccineo et vireſcente luteſcente varia. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 219. *t.* 46.
γ) Cardinalis mexicanus. *Briſſ. av.* 3. *p.* 46. *n.* 27.
Habitat circa fluvium Miſſiſſipi, *γ*) *in* nova Hiſpania, *rubra paulo major*, *ſuaviter canora*, *zea victitans*, *cujus penum pro hieme colligit*, *foliis ſiccis tectam.*

aeſtiva. 25. T. rubra, roſtro flavicante.
Muſcicapa rubra. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 326. *n.* 8.
Muſcicapa rubra Carolinenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 432. *n.* 37.
Preneur de mouches rouge. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 585.
Summer Red-Bird. *Catesb. Car.* 1. *t.* 56. *Edw. glean. t.* 239.
Summer Tanager. *Arct. zool.* 2. *p.* 369. *n.* 236. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 220. *n.* 6.
Habitat aeſtate in Carolina *et* Virginia, *fringilla domeſtica paulo major*, $6\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Oculi *nigri*; remigum *apex ſanguineus*; pedes *atri*; femina *ex flavo fuſca.*

magna. 26. T. ex olivaceo fuſca, ſubtus rubeſcens, pedibus, fronte temporibusque caeruleis, criſſo gulaque rubris, hac medio alba.
Grand Tangara. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 239. *t.* 11.
Tangara des grands bois de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 205.
Grand Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 220. *n.* 7.
Habitat in Gujanae *et* Cayennae *denſis potiſſimum ſilvis, inſectis minoribusque fructibus victitans, turdi magnitudine,* $8\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum *fuſcum*; mandibula *inferior utrinque ſtria nigra notata.*

Jacarina. 4. T. atro-violacea, alis ſubtus albicantibus, cauda divaricato-bifurca.
Tangara braſilienſis nigra. *Briſſ. av.* 3. *p.* 28. *n.* 16.
Jacarini. *Marcgr. braſ. p.* 210. *Will. orn. p.* 258. *Edw. glean. t.* 306. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 293. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 238. *n.* 34.
Moineau de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 224.
Habitat in Braſiliae *et* Gujanae *agris potiſſimum recentibus, ſubſultando in arboribus humilioribus, praeſertim coffea cantans, nidum ex herbis ſiccis griſeum ſtruens, hemiſphaericum, diametri circiter bipollicaris, ova pariens* 2 *ex vireſcente alba, numeroſiſſimis rubris maculis varia.* Magnitudo *carduelis.* Roſtrum *et* pedes *cinerei*; femina *et deplumationis tempore ipſa maſcula avis griſea.*

violacea. 5. T. violacea, ſubtus flaviſſima. *Muſ. Ad. Fr.* 2. *p.* 31.*
Tanagra braſilienſis nigro-lutea. *Briſſ. av.* 3. *p.* 31. *n.* 18; *t.* 2. *f.* 2. 3.
Fringilla violacea. *Syſt. nat.* X. *p.* 182. *n.* 25.
Paſſer e violaceo nigricans. *Koelreuter nov. comm. Petrop.* II. *p.* 431. *n.* 3. *t.* 14. *f.* 3.
Teitei. *Marcgr. braſ.* 212. *Raj. av. p.* 92. *n.* 12. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 295.
Teitei, Guiranhemgeta, Guraundi. *Will. orn. p.* 266.
Gurauthè-engera. *Pernett. it.* 1. *p.* 185. *t.* 3. *f.* 3?
Tangara du Bréſil. *Buff. pl. enl. n.* 114. *f.* 2.
Golden Titmouſe. *Edw. glean. t.* 263. *f.* 1.
Golden Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 239. *n.* 35.

chlorotica. β) T. nigra nitens, abdomine pectore fronteque luteis, rectrice extima interius macula alba. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 317. *n.* 23.

Tangara

Tangara cayanenſis nigro-lutea. *Briſſ. av.* 3. *p.* 34. *n.* 19. *t.* 2. *f.* 3.
Tangara de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 114. *f.* 1.
Habitat in Braſilia, Surinamo *et* Cayenna, *gregatim non raro agros devaſtans oryza conſitos, Jacarini inſtar nidificans, fringillae canariae magnitudine,* $3\frac{3}{4}$ *pollices longa, pro ſexu et aetate colore varia.*
Femina *ſupra olivacea*; pulli *ex caeruleo et olivaceo varii.*

caerulea. 27. T. caerulea, roſtro atro, pedibus ſpadiceis.
Paſſe-bleu. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 495.
Moineau bleu de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 203. *f.* 2.
Blue Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 234. *n.* 28.
Habitat in Cayenna, *fringillae domeſticae magnitudine,* 5 *pollices longa.*

Gyrola. 7. T. viridis, capite rubro, collari flavo, pectore caeruleo.
Tangara peruviana viridis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 23. *n.* 13. *t.* 4. *f.* 1.
Fringilla Gyrola. *Syſt. nat.* X. *p.* 181. *n.* 12.
Fringilla viridis capite ſpadiceo. *Koelreuter nov. comm. Petrop.* II. *p.* 432. *n.* 4. *t.* 15. *f.* 4.
Rouverdin. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 286.
Tangara de Perou. *Buff. pl. enl. n.* 133. *f.* 2.
Red-headed Greenfinch. *Edw. av. t.* 23.
Red-headed Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 233. *n.* 27.
Habitat in variarum Americae *auſtralis partium arboribus ſilvaticis, quarum fructibus victitat, linariae magnitudine,* $4\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum *corneum*; caput *rufum aut coccineum*; alae *ſupra macula alba notatae*; remiges rectrices*que fuſcae margine, intermediae* 2 *penitus virides*; pedes *fuſceſcentes.*

variabilis. 28. T. viridis, caeruleum alias, alias fuſcum colorem reflectens, faſcia oculari nigra, remigibus rectricibusque atris margine viridibus.
Variable Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 234. *n.* 29.
Magnitudo *linariae*; longitudo $4\frac{1}{2}$ *pollicum*; roſtrum *corneum*; uropygium *vireſcens*; pedes *pallidi.*

tricolor. 29. T. viridis, capite, mento, jugulo et pectore pallide thaliaſſinis, capiſtro nigro, cervice collique lateribus viridi-aureis, gulae macula magna dorſoque nigris, pectoris faſcia caerulea, abdomine criſſoque ex flavicante viridibus.
Tangara cayanenſis varia chlorocephalos. *Briſſ. av. app. p.* 59. *t.* 4. *f.* 1.

Tricolor. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 276.
Tangara varié à tête verte de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 33. *f.* 1.
Green-headed Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 234. *n.* 30.
β) Tangara cayanenſis varia cyanocephalos. *Briſſ. av. app. p.* 62. *t.* 4. *f.* 2.
Tangara varié à tête bleue de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 33. *f.* 2.
Habitat in Cayenna, *fringillae domeſticae magnitudine*, $5\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum *nigrum*; dorſum *inferius cum* uropygio *aurantium*; tectrices *alarum minores et mediae violaceae*, *majores et* remiges *ex vireſcente nigrae*, *margine exteriori virides*; cauda *ſubbifurca*; rectrices *margine exteriori prope apicem macula exili violacea notatae*; pedes *plumbei.*

griſea. 18. T. ex griſeo olivacea ſubtus griſea, alis caudaque nigris, margine griſeis.
Gris-olive. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 277.
Tangara olive de la Louiſiane. *Buff. pl. enl. n.* 714. *f.* 1.
Grey Tanager. *Arct. zool.* 2. *p.* 370. *n.* 239. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 236. *n.* 31.
Habitat in Gujana *et* Luiſiana, 5 *pollices longa.*
Roſtrum *nigrum*; frons *griſea*; pedes *ex atro fuſci.*

cayana. 8. T. fulva, dorſi viridi, pileo rufo, genis nigris.
Tangara cayanenſis viridis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 21. *n.* 12. *t.* 4. *f.* 3.
Paſſe-vert. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 494. 4. *p.* 273.
Moineau à tête rouſſe de Cayenne, et (fem.) Tangara à tête rouſſe de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 201. *f.* 2. *et n.* 290. *f.* 1.
Rufous-headed Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 231. *n.* 26.
β) Tanagra ſubtus aurea, dorſo ex viridi flavo, capite caeruleo, alis caudaque viridibus.
Paſſe-vert à tête bleue. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 275.
Habitat, *gemina utplurimum*, *in* Cayennae *apertis regionibus*, *linariae magnitudine*, *muſae pſidiique fructibus*, *et oryzae ſeminibus victitans.*
Roſtrum pedes*que atri*; gula *ex caeruleo griſea*; corpus *ſubtus ex eodem colore*, *rufo*, *et viridi-aureo varium*; remiges rectrices*que fuſcae*, *margine viridi-aureae.*

atrata. 9. T. atra nitens.
Emberiza atra. *Syſt. nat.* X. *p.* 178.
Black Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 241. *n.* 38.

Habitat

Habitat in India, *turdi magnitudine.*
Avis *tota aterrima, dorsi nitore cyaneo.*

mexicana. 10. T. nigra subtus flavicans, pectore uropygioque caeruleis.
Tangara cayanensis caerulea. *Briss. av.* 3. *p.* 6. *n.* 2. *f.* 3.
Touauhtototl. *Hern. mexic.* 52. *Raj. av. p.* 170.
Tangara tacheté de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 290. *f.* 2.
Tangara diable-enrhumé. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 270.
Black and blue Titmouse. *Edw. glean. t.* 350.
Black and blue Tanager. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 230. *n.* 24.
β) Tangara barbadensis caerulea. *Briss av.* 3. *p.* 8. *n.* 3.
Passer americanus. *Seb. mus.* 1. *p.* 104. *t.* 67. *n.* 3.
Tangara bleu des Barbades. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 282. *Pl. enl. n.* 155. *f.* 1.
Habitat in Cayenna *et* Gujana *rarior*, *in* novae Hispaniae *campis et montanis frequentior*, *fringilla domestica minor*, 5 *pollices longa*, *suaviter canens*; *caro sapida.*
Rostrum, pedes*que nigri*; caput *supra et* guttur *caerulea*; hypochondria *nigro-caeruleoque maculata*; tectrices *alarum superiores ex caeruleo nitente-virides*, *majores nigrae*, *margine caeruleae*; remiges *margine aliae virides*, *aliae albae.*

guianensis. 30. T. viridis, capite ex cinereo griseo, fronte taeniaque utrinque a fronte in nucham producta rufis.
Verderoux. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 272.
Grey-headed Tanager. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 231. *n.* 25.
Habitat rarior in Gujanae *silvis ingentibus*, $5\frac{1}{3}$ *pollices longa.*

Tatao. 11. T. violacea, dorso nigro, uropygio fulvo, capite viridi, pectore alisque violaceis.
Tangara brasilienſis. *Marcgr. brasil.* 214. *t.* 215. *Will. orn. p.* 243. *Raj. av. p.* 84. *n.* 13.
Tangara. *Briss. av.* 3. *p.* 3. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 1. *Buff. pl. enl. n.* 7. *f.* 1. *n.* 127. *f.* 2.
Avis de Tatao. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 279. *t.* 13.
Titmouse of Paradise. *Edw. glean. t.* 349.
Paradise Tanager. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 236. *n.* 32.
Habitat in Gujana, *Septembri gregatim in* Cayenna *adveniens*, *in arbore floribunda considens*, *cujus fructibus matureſcentibus*, *cicurata pane quoque et farina victitat*, *vix canora*, *cardueli paulo minor*, *vix* 6 *pollices longa.*
Rostrum pedes*que nigri*; pectus, abdomen *et* crissum *colore aquae marinae*; tectrices *alarum minores viridi-aureae*, *mediae*

mediae caeruleae, majores violaceae; remiges *nigrae margine caeruleae; ſecundariae cum* cauda *nigrae:* Mari uropygium *flammeum*; feminae *aurantium.*

nigricollis. 31. T. olivacea ſubtus flava, gula nigra, pectore aurantio, tectricibus alarum, remigibus rectricibusque fuſcis, margine olivaceis.

Tangara à gorge noire. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 283.
Tangara olive à gorge noire de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 720. *f.* 1.
Black-throated Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 237. *n.* 33.
Habitat in Gujana, 5 *pollices longa.*
Mandibula *ſuperior nigra, inferior griſea*; colli *latera flava*; pedes *nigricantes.*

albiroſtris. 12. T. nigra, macula alarum baſique caudae flavis, roſtro albo.
Muſ. Ad. Fr. 2. *p.* 31.
White-billed Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 241. *n.* 39.
β) Tanagra nigra, roſtro albo, macula alarum baſique caudae albis. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 316. *n.* 18.
Habitat in America, *ſturni magnitudine.*
Roſtrum *craſſum loxiae, longum ſturni*; dorſi *pennae baſi albae*; uropygium *flavum*; cauda *aequalis.*

gularis. 13. T. nigra, ſubtus alba, capite rubro, jugulo purpureo.
Cardinalis americanus. *Briſſ. av. app. p.* 67. *n.* 34. *t.* 4. *f.* 4.
Rouge-Cap. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 267.
Tangara brun d'Amérique. *Buff. pl. enl. n.* 155. *f.* 2.
Red-headed Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 228. *n.* 21.
Habitat in Cayenna *et* Gujana, *rarior*, 7 *pollices longa.*
Roſtrum *fuſcum*; mentum *et* gula *rubra, haec maculis purpureis picta*; cauda *ſubrotundata*, 3 *pollices longa*; pedes *atri.*

cayennenſis. 14. T. nigra nitida, pectore utrinque alisque ſubtus flavis.
Tangara cayanenſis nigra. *Briſſ. av.* 3. *p.* 29. *n.* 17. *t.* 2. *f.* 1.
Tangara nègre. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 297.
Tangara noir de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 114. *f.* 3.
Negro-Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 240. *n.* 36.
Habitat in Braſilia, Gujana *et* nova Hiſpania, *congenerum magnitudine.*
Roſtrum pedes*que atri.*

ruficollis. 32. T. ex atro caerulea, gulae litura ingente rufa, alis caudaque atris.
Rufous-throated Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 241. *n.* 37.

Habitat

Habitat in Jamaica, *alaudae magnitudine*, 5¾ *pollices longa.*
Roſtrum pedes*que nigri*; *illud apicem verſus pauliſper curvatum.*

brasilien- 15. T. nigra ſubtus alba, jugulo uropygioque caerulescentibus,
sis. facie pectoreque nigris.
Tangara braſilienſis caerulea. *Briſſ. av.* 3. *p.* 9. *n.* 4. *t.* 1. *f.* 4.
Guira-genoia. *Marcgr. braſ.* 209. *Raj. av. p.* 170. *Will. p.* 241.
Turquin. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 258.
Tangara bleu du Bréſil. *Buff. pl. enl. n.* 179. *f.* 1.
Turquoiſe-Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 225. *n.* 16.
Habitat in Braſilia, *fringillae caelibis magnitudine*, 6 *pollices longa.*
Roſtrum *nigricans*; caput *caeruleſcens.*

dominica. 16. T. nigro-maculata, ſupra fuſca, ſubtus albida.
Tangara dominicenſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 37. *n.* 21. *t.* 2. *f.* 4.
Eſclave. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 263.
Tangara de S. Domingue. *Buff. pl. enl. n.* 156. *f.* 2.
S. Domingo Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 226. *n.* 17.
Habitat in inſula S. Dominici, *fringillae domeſticae magnitudine*, 6½ *pollices longa.*
Avis *ſupra ex olivaceo fuſca*; remiges *fuſcae*, *margine olivaceae*; cauda *ſubbifurca ex cinereo fuſca*; rectricibus *intermediis totis*, *reliquis margine olivaceis*; roſtrum pedes*que fuſci.*

militaris. 17. T. fuſca, pectore, jugulo, gula humerisque ſanguineis.
Muſ. Ad. Fr. 2. *p.* 30.*
Emberiza militaris. *Syſt. nat.* X. *p.* 178. *Amoen. acad.* 4. *p.* 241.
Cardinalis fuſcus. *Briſſ. av.* 3. *p.* 51. *n.* 30.
Merula indica, pectore cinnabarino. *Raj. av. p.* 67.
Troupiale de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 236.
Greater Bullfinch or Shirley. *Edw. av. t.* 82. *glean. t.* 342. *Bancr. Guian. p.* 180.
Military Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 242. *n.* 40.
Habitat in America *auſtrali*, *alaudae magnitudine*, 6 *pollices longa*, *oriolo gujanenſi multum affinis.*
Roſtrum pedes*que fuſcescentes.*

leucocephala. 33. T. ex atro fuſca, fronte alba, gutture rubeſcente, pectore alisque purpuraſcentibus, abdomine criſſoque flaveſcentibus.
Tangara braſilienſis leucocephalos. *Briſſ. av.* 3. *p.* 35. *n.* 20.
Quatoztli. *Seb. muſ.* 1. *p.* 58. *t.* 36. *f.* 6.
Habitat in Braſiliae *montanis*, *violaceae magnitudine*, 4 *pollices longa.*
Roſtrum pedes*que flavi.*

flava. 34. T. cerea, gutture, pectore abdominisque maculis nigris, remigibus rectricibusque atris, margine thalaſſinis.
Tangara braſilienſis flava. *Briſſ. av.* 3. *p.* 39. *n.* 22.
Guiraperea. *Raj. av. p.* 89. *n.* 4. *Will. orn. p.* 256.
Yellow Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 244. *n.* 42.
Habitat in Braſilia, *alaudae magnitudine.*
Roſtrum *nigrum*; pedes *cinerei.*

amboinenſis. 35. T. ex nigro et caeruleo varia, vertice nigro, uropygio ex caeruleo virescente, genis, mento, gutture et pectore caeruleis, abdomine et criſſo albis.
Tangara amboinenſis caerulea. *Briſſ. av.* 3. *p.* 12. *n.* 5.
Avis amboinenſis, Calatti dicta. *Seb. muſ.* 1. *p.* 63. *t.* 38. *f.* 6.
Amboina Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 244. *n.* 43.
Habitat in Amboina, *alaudae magnitudine*, $6\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Tectrices *alarum ſuperiores caeruleae*, *macula purpurea*; remiges *ex caeruleo*, *nigro et viridi variae*; cauda *nigra*, *apice rufeſcens.*

canora. 36. T. caerulea, fulvo intermiſto varia, cauda nigra apice alba, alis partim caeruleis partim fulvis.
Tangara caerulea novae Hiſpaniae. *Briſſ. av.* 3. *p.* 15. *n.* 7.
Xiuhtototl. *Fernand. hiſt. n. Hiſp. p.* 13. *c.* 170.
Habitat in nova Hiſpania, *fringillae domeſticae magnitudine*; *cantus ſuavis*; *caro ſapida.*
Roſtrum *fuſceſcens*; pedes *griſei.*

Epiſcopus. 19. T. cinerea, alis caudaque extus caeruleis.
Epiſcopus avis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 40. *n.* 23. *t.* 1. *f.* 2.
Bluet. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 265. *t.* 12.
Evêque. *Buff. pl. enl. n.* 178. *f.* 1. 2. *du Praz Louiſ.* 2. *p.* 140. *Salern. orn. p.* 277. *t.* 19. *f.* 3.
Bishop Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 226. *n.* 18.
Habitat gemina, *aliquando gregaria*, *in* Cayennae *ſilvarum margine*, *montifringillae magnitudine*, $6\frac{1}{4}$ *pollices longa*, *vix canora*, *fructibus minoribus victitans*, *in palmae foliis quieſcens.*

Roſtrum

Roſtrum *nigrum*; pedes *cinerei*; *reliqua* avis *ex griſeo caerulea*, *hinc inde viresćens*. Feminae caput, collum *et* pectus *ex caeruleo viride*; abdomen *griſeum*; dorſum tectricesque *alarum fuſcae*; *hae faſcia obliqua ſubgriſea notatae*; remiges *et* cauda *ſubbifurca nigrae*.

Sayaca. 20. T. cana, alis ſubcaeruleis.
Tangara braſilienſis varia. *Briſſ. av.* 3. *p.* 18. *n.* 10.
Sayacu. *Marcgr. braſ.* 193. *Will. orn. p.* 256. *Raj. av. p.* 89. *n.* 3. *Salern. orn. p.* 273. *n.* 3. *Edw. glean. t.* 351. *f.* 2. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 288. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 227. *n.* 19.
Tangara tacheté de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 301. *f.* 1.
Habitat in Cayenna, *rarior*, *epiſcopo minor*.
Roſtrum *et* oculi *nigri*.

punctata. 21. T. viridis nigro-punctata, ſubtus flaveſcente-albida.
Tangara viridis indica punctata. *Briſſ. av.* 3. *p.* 19. *n.* 11. *t.* 4. *f.* 2.
Syacou. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 288.
Spotted green Titmouſe. *Edw. glean. t.* 262.
Spotted Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 228. *n.* 20.
Habitat in Cayenna, *linariae magnitudine*, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa*, *an vere diſtincta ſpecies?*
Roſtrum pedesque *fuſci*; mentum, pectus *et* gula *fuſca*, *pennarum margine albido*; remiges rectricesque *fuſcae*, *margine virides*.

virens. 22. T. viridis, ſubtus flaveſcens, loris, genis gulaque nigris.
Tangara braſilienſis viridis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 25. *n.* 14.
Tangara vert du Bréſil. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 268.
Green Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 229. *n.* 22.
Habitat in nova Hiſpania, Peru *et* Braſilia, *fringilla domeſtica paulo major*, $6\frac{1}{4}$ *pollices longa*.
Roſtrum *atrum*; faſcia *mandibulae inferioris longitudinalis caerulea*; remiges rectricesque *atrae*, *margine caeruleſcentes*, *intermediae duae penitus viresćentes*; pedes *fuſci*.

ſinenſis. 37. T. olivacea ſubtus flava, remigibus rectricibusque atris margine flavis.
Chinete Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 229. *n.* 23.
Habitat in Sina, *fringillae domeſticae magnitudine*, $5\frac{1}{2}$ *pollices longa*.
Roſtrum *ſpadiceum apice flavum*; pedes *atri*; cauda *ſubfurcata*.

24. T.

cristata. 24. T. nigricans, crista aurantia, gula uropygioque fulvis.
Tangara cayanensis nigra cristata. *Briss. av. app. p.* 65. *n.* 33. *t.* 4. *f.* 3.
Houppette. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 240. *Pl. enl. n.* 7. *f.* 2. *et n.* 301. *f.* 2.
Crested Tanager. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 221. *n.* 8.
Habitat frequens in Gujanae *locis apertis, minoribus fructibus victitans, fringillae caelibis cantu, domesticae magnitudine,* $6\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Rostrum *nigrum;* mentum *et* uropygium *pallide lutescens;* humerorum *stria, et* alarum *margo superior albus;* pedes *plumbei.*

bonarien- sis. 38. T. ex atro violacea, tinctu in alis et cauda paulisper virescente.
Tangavio. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 241. *Pl. enl. n.* 710.
Violet Tanager. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 222. *n.* 9.
Habitat in Bonaria, 8 *pollices longa.*
Rostrum *nigrum;* pedes *nigricantes;* unguibus *magnis robustis;* femina *fusca;* capite *nigro, nitoris chalybei.*

atra. 39. T. cinerea, facie, mento et gutture nigris (feminae fuscis).
Camail ou Cravatte. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 254.
Tangara à cravatte noire de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 714. *f.* 2.
Black-faced Tanager. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 222. *n.* 10.
Habitat in Gujanae *apertis,* 7 *pollices longa.*
Rostrum *nigrum,* mandibula *superiore basi albida;* pedes *atri.*

pileata. 40. T. ex caerulescente cinerea, subtus argentea, vertice, temporibus collique lateribus nigris, macula oculari alba.
Coiffe noire. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 284.
Tangara à coiffe noire de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 720. *f.* 2.
Hooded Tanager. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 223. *n.* 11.
b) Tangara brasilienſis cinerea. *Briss. av.* 3. *p.* 17. *n.* 9.
Tijepiranga. *Raj. av. p.* 89. *n.* 1. *Will. orn. p.* 251. §. 9.
Habitat in Gujana *et* Brasilia, *fringillae domesticae magnitudine.*
Rostrum pedes*que atri.* Femina (b) *supra tota ex caerulescente cinerea, subtus alba.*

melanictera. 41. T. supra ferruginea, subtus flavissima, capite nuchaque atris, alis albido-striatis caudaque fuscis. *Güldenst. nov. comm. Petrop.* 19. *p.* 465. *n.* 2. *t.* 13. 14.
Black-crowned Tanager. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 223. *n.* 12.

Habitat

Habitat ſolitaria in ſubmontanis promontorii ſeptentrionalis et meridionalis Caucaſi, *circa thermas ad fluvium* Terek *obvias, et in* Georgia, *fringillae triſti ſimilis, emberizae miliariae aequalis, ultra 7 pollices longa, ſub dumetis ſpinoſis paliuri nidificans, ejusque baccis victitans; voce pari majoris.*

Roſtrum pedes*que lividi*; oculi *fuſci*; tectrices *alarum inferiores ex albido flavae*; rectrices *margine ochroleucae.* Femina *ſupra tota ex olivaceo ſordide ferruginea, ſubtus ex albido flava.*

fibirica. 42. T. atra, apicibus plumarum interſcapulii uropygiique candide et diſcrete ciliatis. *Sparrm. muſ. Carlſ. t.* 19.

Habitat in Sibiria, *turdi iliaci magnitudine, alauda affinis.*

Roſtrum *capite duplo fere brevius, pallidum, apice fuſcum*; cauda *apice emarginata*; pedes *cum* unguibus *nigri*; unguis *poſterior reliquis fere duplo longior, rectiuſculus.*

atricapilla. 43. T. ex rubeſcente rufa, capite, cauda et alis nitente-nigris, cauda rotundata.

Mordoré. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 255.

Tangara jaune à tête noire de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 809. *f.* 2.

Black-headed Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 224. *n.* 13.

Habitat in Gujana, *rarior*, 7 *pollices longa.*

Roſtrum *nigrum*; alae *margine interiori macula alba notatae*; pedes *fuſci.*

ſtriata. 44. T. ſubtus flava, capite nigro caeruleoque ſtriato, dorſo ſupra nigricante infra aurantio, remigibus, tectricibus alarum ſuperioribus rectricibusque nigris, margine caeruleis.

Onglet. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 256.

Furrow-clawed Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 224. *n.* 14.

Habitat in America *auſtrali*, 7 *pollices longa.*

Tectrices *caudae ſuperiores ex olivaceo fuſcae*; ungues *ad latera ſulco exarati, margini parallelo.*

nigerrima. 45. T. nigra, macula ad alas intus alba.

Tangara noir, et Tangara roux. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 257.

Tangara noir d'Amérique, et Tangara roux de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 179. *f.* 2. *et n.* 711.

Gujana Tanager. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 225. *n.* 15.

Habitat gemina, frequens in Gujanae *apertis, fructibus et inſectis victitans, voce rauca,* $6\frac{1}{2}$-7 *pollices longa.*

Femina *tota rufa, colore ſubtus in cinereum vergente*; roſtrum *atrum*; pedes *flavicantes*.

capenſis. 46. T. ſupra ferrugineo-fuſca ſubtus ferrugineo-alboque varia, cauda medio nigricante, lateribus ferrugineo-rufeſcente, roſtro flavicante, pedibus nigris. *Sparrm. muſ. Carlſ. t.* 45.
Habitat in promontorio bonae ſpei.

112. FRINGILLA. *Roſtrum* conicum, rectum, acuminatum.

lapponica. 1. Fr. capite nigro, corpore griſeo nigroque, ſuperciliis albis, rectricibus extimis macula alba cuneiformi. *Fn. ſuec.* 235. *Fabric. Fn. groenl. p.* 115. *n.* 82.
Fringilla calcarata. *Pall. it.* 2. *p.* 710. *n.* 20. *t.* E.
Fringilla montana. *Briſſ. av.* 3. *p.* 160. *n.* 38.
Montifringillae congener. *Aldr. orn.* 2. *p.* 821. *t.* 823.
Grand-Montain. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 134.
Greater Brambling. *Alb. av.* 3. *t.* 63.
Lapland Finch. *Arct. zool.* 2. *p.* 377. *n.* 299. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 263. *n.* 14.
Habitat in boreali America, Aſia, Europa, *montifringilla major*, $6\frac{1}{2}$ *pollices longa, non raro gregaria, alaudae more in terra currens, et volitando cantans, cantu linariae ſimilis, nidum, in* Groenlandia *Junio, ex muſcis et gramine ſtruens, plumisque ſternens, ova* 5-6 *ardeſiae colore tincta, pauliſper tamen fuſceſcentia pariens.*
Guttur *et* pectus *nigra*; abdomen *et* criſſum, remigisque *primae margo exterior albus*; cervix *ferruginea*.

ſurinama. 2. Fr. griſea, remigibus utrinque, rectricibus lateralibus intus albis.
Linette de Surinam. *Fermin Surin.* 2. *p.* 199?
Surinam Finch. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 276. *n.* 41.
Habitat Surinami, *vix canora; carne ſapida.*
Roſtrum *flavum*; abdomen *albidum*; remiges *nigrae; primores verſus baſin utrinque, ſecundariae baſi et apice albae*; rectrices *aequales nigricantes*, 1, 2 *macula in latere interiori alba*, 3, 4, 6 *apice albae.*

longiroſtris. 6. Fr. ex fuſco et flavo varia, ſubtus aurantia, cauda olivacea, capite gulaque nigris, torque badio.
Fringilla ſenegalenſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 173. *n.* 46. *t.* 15. *f.* 2.

Pinion

Pinſon à long bec. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 143.
Longbilled Finch. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 277. *n.* 42.
Habitat ad Senegal *fluvium, caelibis magnitudine,* $6\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum $\frac{3}{4}$ *pollicis longum, et* pedes *ex griſeo fuſci;* remiges *fuſcae, margine exteriori olivaceae, interiori plurimam partem flavae;* rectrices *laterales margine flavae.*

caelebs. 3. Fr. artubus nigris, remigibus utrinque albis: tribus primis immaculatis, rectricibus duabus oblique albis. *Fn. ſuec.* 232. *t.* 2. *f.* 199. *Nozem. nederl. Vogel t.* 72.
Fringilla. *Geſn. av.* 387. *Aldr. orn.* 2. *p.* 815. *Briſſ. av.* 3. *p.* 148. *n.* 36.
Fringilla ſylvia. *Scop. ann.* I. *n.* 217. *Brünn. orn. n.* 253. *Müll. zool. n.* 255. *Günth. Neſt. u. Eyer t.* 7. *fig. inf.*
Fringuello. *Olin. ucc. t.* 31.
Pinſon. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 109. *t.* 4. *Pl. enl. n.* 54. *f.* 1.
Chaffinch. *Brit. zool.* I. *n.* 125. *Arct. zool.* 2. *p.* 381. F. *Raj. av. p.* 88. *n.* 16. *Will. orn. p.* 253. *t.* 45. *Albin. av.* I. *t.* 63. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 257. *n.* 10.
b) Fringilla ſylvia. *Syſt. nat.* X. *p.* 180. *Fn. ſuec.* I. *n.* 200. *Kram. el. p.* 367. *n.* 4.
β) Fringilla hortenſis. *Günth. Neſt. u. Eyer t.* 7. *f. ſup.*
γ) Fringilla alis et cauda nigris. *Briſſ. av.* 3. *p.* 153. A.
Pinſon à ailes et queue noires. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 121. *n.* 1.
δ) Fringilla candida. *Briſſ. av.* 3. *p.* 154. B.
ε) Fringilla torquata. *Briſſ. av.* 3. *p.* 155. C.
ζ) Fringilla anterius alba, poſterius ferruginea.
η) Fringilla ſubtus pallidiſſima, dorſo flavicante.
Habitat in omni Europa, Madera, Africa; femina *ſola verſus auſtrum migrat, in frutice folioſo nidum parum ſupra terram elevatum, ex plantarum fibris muſcisque ſtruit, pilis, lana, plumis ſternit, et* 5-6 *pallide rubeſcentia nigricantibus maculis varia parit ova;* mas *propinquus, capite aliquot pilis, mutato ſono, aeſtatem annunciat tempore vernali, horis matutinis, canorus.*
Roſtrum *album, vere et aeſtate caeruleſcens apice nigrum;* vertex, nucha *et* colli *latera cana;* tempora *et* guttur *rubeſcentia;* dorſum (*mari*) *badium;* abdomen *et* criſſum *ex rufo album* (*in femina cum* pectore *exalbidum*); tectrices *alarum area magna, et majores praeterea faſcia alba notatae;* remiges *margine flavicantes baſi albae;* cauda *ſubbifurca;* pedes *fuſci.*

Montifringilla. 4. Fr. alarum basi subtus flavissima. *Fn. suec.* 233.* *t.* 2. *f.* 198. *Scop. ann.* I. *n.* 218. *Brünn. orn. n.* 255. 256. *Müll. zool. n.* 256. *Kram. el. p.* 367. *n.* 3.

Montifringilla s. fringilla montana. *Gesn. av.* 388. *Jonst. av.* 99. *t.* 38. *Aldr. orn. l.* 18. *c.* 7. *Briss. av.* 3. *p.* 155. *n.* 37.

Fringuello montanino. *Olin. ucc. t.* 32.

Pinson d'Ardenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 123. *Pl. enl. n.* 54. *f.* 2.

Bramble, Brambling, Bramblefinch or Montain Finch. *Brit. zool.* I. *n.* 126. *Arct. zool.* 2. *p.* 381. E. *Raj. av. p.* 88. *Will. orn. p.* 254. *t.* 45. *Albin. av.* 3. *t.* 64. *Hayes brit. birds t.* 36. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 261. *n.* 13.

Bergfink. *Frisch av. t.* 3. *f.* 2. 3. *Sander Naturf.* 13. *p.* 185.

β) Montifringilla superciliis fasciaque occipitis nigris, tectricibus alarum fascia ex rubescente alba, et altera ferruginea, gula et pectore mustelinis.

γ) Montifringilla leucocephalos. *Briss. av.* 3. *p.* 154. A.

Habitat in Europa *et* Sibiria, β) *in* Japoniae *silvis, praecipue pinetis*, $6\frac{1}{4}$ *pollices longa, gregatim aliquando migrans, fagi silvaticae aliarumque arborum seminibus victitans, ex muscis longis extus, ex lana plumisque intus nidum in arboribus struens, et ova* 4-5 *flavicantia maculata pariens; caro edulis, quamvis crebro amara.*

Rostrum *flavicans, apice nigrum;* caput, cervix, dorsum (*in multis etiam* gula) *nigra* (*feminae fusca*), *pennarum margine ex rufo fusco;* uropygium, pectus *inferius et* abdomen *alba;* guttur *et* pectus *superius ex rufo fulva* (*feminae ex rufo grisea*); tectrices *alarum minores rufescentes, mediae ex rufo albae, majores nigrae apice albae, et corpori proximae apice rufescentes;* remiges *nigrae, margine flavicantes;* cauda *subbifurca;* pedes *grisei.*

lulensis. 5. Fr. fusca, pectore humerisque rufis, alis nigris macula rufa. *Fn. suec.* 134.* *Müll. zool. n.* 257.

Carduelis lulensis. *Briss. av.* 3. *p.* 63. *n.* 2.

Chardonneret à quatre raies. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 210.

Lulean Finch. *Arct. zool.* 2. *p.* 380. B. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 287. *n.* 56.

Habitat in Bothnia *occidentali* Sueciae, *carduelis magnitudine.*

Rostrum *fuscum;* caput *et* corpus *supra ex nigricante cinereum;* guttur *album;* abdomen *et* crissum *albidum;* tectri-

ces *alarum fasciis alternis rufis et nigris, ultima alba*; remiges *atrae*; cauda *ex atro cinerea*.

erythrocephala. 40. Fr. olivacea, capite colloque coccineis, cauda alisque nigris, tectricibus alarum fasciis duabus albis.
Red-headed Finch. *Brown illustr. t.* 28. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 287. *n.* 55.
Habitat in insula Mauritii, 5 *fere pollices longa.*
Rostrum *nigrum*; pedes *ex rubescente grisei*; *area* oculorum *nigra.*

psittacea. 41. Fr. viridis, facie, gula, uropygio caudaque cuneiformi coccineis.
Parrot Finch. *Lat. syn.* II. 1. *p.* 287. *n.* 54. *t.* 48.
Habitat in nova Caledonia, *astrild magnitudine aut minor.* J. R. Forster.
Rostrum *nigrum*; remiges *exteriori margine virides, interiori ex cinereo fuscae*; rectrices 2 *intermediae totae coccineae, rachi fusca; reliquae extus coccineae, intus fuscae.*

Carduelis. 7. Fr. remigibus antrorsum luteis: extima immaculata, rectricibus duabus extimis medio reliquisque apice albis. *Fn. suec.* 236.* *Scop. ann.* 1. *n.* 211. *Brünn. orn. n.* 257. 258. *Müll. zool. n.* 258. *Kram. el. p.* 365. *n.* 1.
Carduelis. *Gesn. av.* 242. *Aldr. orn. l.* 18. *c.* 3. *Jonst. av. p.* 97. *t.* 37. *Merian. inf. t.* 173. *Briss. av.* 3. *p.* 53. *n.* 1.
Cardello. *Olin. ucc. t.* 10.
Chardonneret. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 187. *t.* 10. *Pl. enl. n.* 4. *f.* 1.
Goldfinch or Thistlefinch. *Brit. zool.* 1. *n.* 124. *Arct. zool.* 2. *p.* 383. H. *Raj. av. p.* 89. *n.* 1. *Will. orn. p.* 256. *t.* 46. *Albin. av.* 1. *t.* 64. *Hayes brit. birds t.* 34. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 281. *n.* 51.
Distelfink. *Frisch av. t.* 1. *Günth. Nest. u. Eyer t.* 3. *f. sup.*
β) Carduelis leucocephalos. *Briss. av.* 3. *p.* 57. A.
Chardonneret à tête blanche. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 202. *n.* 2.
White-headed Goldfinch. *Will. orn. p.* 257. *var.* 2.
γ) Carduelis capite striato. *Briss. av.* 3. *p.* 58. B.
Chardonneret à tête rayée. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 203. *n.* 3.
Goldfinch. *Brown jam. p.* 468.
δ) Carduelis melanocephalos. *Briss. av.* 3. *p.* 58. C.
Chardonneret à tête noire. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 203. *n.* 4.

Swallow Goldfinch. *Alb. av.* 3. *t.* 70. a.

ε) Carduelis albida. *Briſſ. av.* 3. *p.* 59. D.
Chardonneret blanchâtre. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 204. *n.* 5.
Whitiſh Goldfinch. *Will. orn. p.* 257. *var.* 4.

ζ) Carduelis candida. *Briſſ. av.* 3. *p.* 60. E. *t.* 4. *f.* 4.
Chardonneret blanc. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 204. *n.* 6. *Pl. enl. n.* 4. *f.* 2.
White Goldfinch. *Will. orn. p.* 257. *n.* 3.

η) Carduelis nigra. *Briſſ. av.* 3. *p.* 60. F. *t.* 4. *f.* 5.
Chardonneret noir. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 205. *n.* 7.

ϑ) Carduelis nigra icterocephalos. *Briſſ. av.* 3. *p.* 61. G.
Cardueli congener. *Raj. av. p.* 90. *n.* 2.
Chardonneret noir à tête jaune. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 207. *n.* 8.
A bird of kin to the Goldfinch. *Will. orn. p.* 257.

ι) Carduelis hybrida. *Briſſ. av.* 3. *p.* 62. H.
Chardonneret métis. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 207.
Canary Goldfinch. *Albin. av. t.* 70. *β.*

Habitat in Europa, *rarior in* Aſia *et* Africa, *hieme gregaria, longaeva, in caveis etiam, ſuaviſſime canora, docilis, manſueta, cum canaria* (ι) *aliisque congeneribus coiens, et fertilem filiam gignens, ſeminibus, cannabis, et capitatarum inprimis victitans, artificioſum non raro in arboribus pomariorum, bis in anno, ex muſcis tenuioribus, lichenibus, carduorum pappo nidum ſtruens, lana et pilis, poſtremo ſalicum pappo ſternens, et ova* 5 *alba verſus finem latiorem maculis ex atro purpureis varia pariens, ex quibus pulli griſeo capite prodeunt.*

Roſtrum *album, apice nigrum*; capiſtrum *coccineum, feminae fuſcum*; genae, occiput *et* abdomen *alba*; verticis *corona nigra*; tectrices *alarum nigrae, feminae fuſcae*; dorſum, uropygium *et* pectus *ex muſtelino fuſceſcens.*

Melba. 8. Fr. viridis, facie caudaque rubris, abdomine albo nigroque undato. *Osb. it.* 2. *p.* 329.
Carduelis viridis. *Briſſ. av. app. p.* 70.
Chardonneret verd ou Maracaxao. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 211.
Green Goldfinch. *Edw. glean. t.* 272. *av. t.* 128. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 286. *n.* 52.
Habitat in Sina *et* Braſilia, *carduelis magnitudine.*
Roſtrum *incarnatum, feminae flaveſcens*; gula *et* uropygium *rubra*; lora *caeruleſcentia*; remiges *atrae, ſecundariae et* tectrices

tectrices *alarum margine rubrae*; cauda *aequalis*; pedes *fuscescentes*: Feminae *vertex et collum cinereum*; alarum *basis et* uropygium *ex flavicante viride*; cauda *fusca margine rubra.*

afra. 42. Fr. viridis, genis caudaque rubris, remigibus primoribus atris margine aurantiis.
Red-faced Finch. *Brown illustr. t.* 25. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 286. *n.* 53.
Habitat in Angola, 6 *fere pollices longa.*
Pedes *flavicantes.*

Alario. 9. Fr. capite pectoreque atris, corpore castaneo subtus albo, rectricibus quatuor lateralibus lineola nigra.
Passerculus capitis bonae spei. *Briss. av.* 3. *p.* 106. *t.* 5. *f.* 2.
Sparrow from the Cape of good Hope. *Albin. av.* 3. *t.* 67.
Cape Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 315. *n.* 85.
Habitat ad caput bonae spei, *domestica major*, $4\frac{1}{5}$ *pollices longa.*
Rostrum *dilute cinereum*; collum *nigrum*; remiges *nigricantes*; cauda *subbifurca*; pedes *fusci.*

leucotis. 43. Fr. supra obscura, subtus flava, macula aurium alba, remigibus primoribus caeruleis, secundariis viridibus. *Osb. it.* 2. *p.* 329. 330.
White-eared Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 314. *n.* 84.
β) Fringilla capite, dorso et tectricibus alarum purpureis, cauda caerulea.
γ) Fringilla capite, dorso, tectricibus alarum caudaque purpureis.
δ) Fringilla capite viridi, pectore caudaque purpureis.
ε) Fringilla capite et tectricibus alarum minoribus fuscis, pectore dilute viridi.
ζ) Fringilla subtus rubra, capite, dorso, cauda, et tectricibus alarum fuscis, inferioribus rubris.
Habitat in Sina, *exilis.*

Amanda- va. 10. Fr. fusca rufescensque albo-punctata.
Bengalus punctatus. *Briss. av.* 3. *p.* 206. *n.* 62. *t.* 10. *f.* 4.
Avis bengalensis parva maculata, Amandavad. *Pet. gaz.* 53. *f.* 1.
Avicula amadavadaea. *Raj. av. p.* 92. *n.* 9.
Bengali piqueté. *Buff. hist. nat. des ois.* 4 *p.* 96. *t.* 2. *f.* 1. *Pl. enl. n.* 115. *f.* 3.
Amadavad Bird. *Will. orn. p.* 266. *t.* 46. *Alb. av.* 3. *t.* 77. *Edw. glean. t.* 355. *f.* 1.
Amadavade Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 311. *n.* 82.

β) Bengalus fuscus. *Briss. av.* 3. *p.* 205. *n.* 61. *t.* 10. *f.* 3.
Bengali brun. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 95. *Pl. enl. n.* 115. *f.* 2.
Rostrum *rubrum*; caput, uropygium, crissum *rufescentia*; dorsum *et* alae *fuscae punctis albis*; rectrices *nigrae*, *ad apicem puncto albo*; maris *color magis in purpureum*, feminae *potius in cinereum vergens.*

granatina. 11. Fr. cauda cuneiformi, corpore rufescente, rostro rubro, temporibus, uropygio abdomineque violaceis.
Granatinus. *Briss. av.* 3. *p.* 216. *n.* 67. *t.* 9. *f.* 3.
Grenadin. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 169. *t.* 7. *f.* 1. *Pl. enl. n.* 109. *f.* 3.
Red and blue brasilian Finch. *Edw. av. t.* 191. *Bancr. Guj. p.* 181.
Brasilian Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 316. *n.* 87.
Habitat in Brasilia, *agilis et gratissime canora, spini magnitudine*, $4\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Palpebrae *coccineae*; gula, cauda *et* abdomen *inferius nigra*; remiges *fuscae*; *reliquum* corpus *et* caput *badium*; feminae vertex *fulvus*; dorsum *ex griseo fuscum*; gula *et* corpus *subtus pallide fulva*; abdomen *inferius et* crissum *albida.*

zeylonica. 44. Fr. flava, subtus alba et atra, remigibus rectricibusque atris, exteriori margine flavis, rostro et capite nigris.
Ceylon Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 317. *n.* 88.
β) Fringilla capite mustelino, dorso viridi, pectore et abdomine ochroleucis.
Habitat in Sina *et* Zeylon, *exigua.*

fuscicollis. 45. Fr. vertice, uropygio crissoque viridibus, dorso ferrugineo, gula fuscescente: macula cinerea et altera rubescente, cauda dimidiato flava nigraque.
Brown throated Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 318. *n.* 89.
Habitat in Sina.
Rostrum *rubrum*; linea *alba ab oculis retrorsum ducta*; alae *atrae*; remigum *macula flava*; pedes *flavi.*

ignita. 46. Fr. nitente-spadicea, remigibus caudaque cuneiformi atris.
Fire Bird. *Brown illustr. t.* 2.
Fire-Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 318. *n.* 90.
Habitat ad Gambiae *fluvium* Africae, *linariae magnitudine.*
Rostrum *atrum*, *basi flavicans*; pedes *incarnati.* Femina *dilutius tincta*; frons *et area inter* oculos *rubra*; cauda *rubescens apice atra.*

tristis. 12. Fr. flava, fronte nigra, alis fuscis.
Carduelis americana. *Briss. av.* 3. *p.* 64. *n.* 3.
Chardonneret jaune. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 212.
Chardonneret de Canada. *Buff. pl. enl. n.* 202. *f.* 2.
Chardonneret de Surinam. *Ferm. Surin.* 2. *p.* 199.
Green Sparrow of Gujana. *Bancr. Guj. p.* 181?
American Goldfinch. *Arct. zool.* 2. *p.* 371. *n.* 242. *Catesb. Car.* 1. *t.* 43. *Edw. glean. t.* 274. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 288. *n.* 57.
Habitat in America, *potissimum* Noveboraco, *linariae magnitudine*, $4\frac{1}{3}$ *pollices longa*, *carduorum seminibus victitans.*
Rostrum *et* pedes *albi*; tectrices *alarum nigrae*, *fascia alba*; cauda remiges*que nigrae*, *minores margine et apice albae.* Feminae *nigredo capitis nulla*; corpus *supra olivaceum*; abdomen *et* crissum *album.*

Zena. 13. Fr. nigra subtus alba, linea supra infraque oculos candida, pectore fulvo.
Fringilla bahamensis. *Briss. av.* 3. *p.* 168. *n.* 43.
Pinson à tête noire et blanche. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 140.
Bahama Finch. *Catesb. Car.* 1. *t.* 42.
Orange Finch. *Arct. zool.* 2. *p.* 372. *n.* 244. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 276. *n.* 40.
Habitat in insulis Bahamicis, Jamaica, *aliisque vicinis*, *et* America *australi*, *caelibis magnitudine*, $6\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Rostrum pedes*que plumbei*; *sub* mento *macula magna flava*; cervix *et* uropygium *rubra*; abdomen *et* crissum *alba*; cauda *et* alae *fuscae*; tectrices *alarum fascia alba.* Feminae caput collum*que cinereum.*

lepida. 14. Fr. fusco-virens, fascia supraoculari, et infraoculari gulaque fulvis, pectore nigro. *Jacq. Beytr. p.* 7. *n.* 5. *t.* 2.
Lepid Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 299. *n.* 67.
Habitat in Cubae *silvis*, Havanae *frequenter cicurata*, *et tum panici miliacei*, *et phalaridis canariensis seminibus victitans*, *continuo cantans voce gratissima*, *at adeo exili*, *ut vix audiatur*, *nisi proximus quis adstiterit*, *canaria duplo minor.*
Oculi *nigri*; pectus *nigricans*; rostrum *atrum*; abdomen pedes*que ex cinereo purpurascentes.*

carthaginensis. 47. Fr. tota ex cinereo fusco et flavo varia. *Jacq. Beytr. p.* 8. *n.* 6.

Habitat in silvis Carthaginensibus Americae, *seminibus victitans, cantu caelibis, habitu canariae, sed major, facile cicuranda.*
Rostrum *et* pedes *dilute fusci.*

aethiops. 48. Fr. tota aterrima, oculorum iride rufa. *Jacq. Beytr. p.* 10. *n.* 7.
Habitat in silvis Carthaginensibus Americae, *caelibi affinis, fructibus et seminibus, cicurata etiam pane victitans; pennis capitis collique erectis cantans, voce suavi, at exili.*

autumnalis. 15. Fr. virens, pileo ferrugineo, crisso testaceo.
Autumnal Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 298. *n.* 66.
Habitat Surinami.
Cauda *integra.*

Citrinella. 16. Fr. subviresens, dorso fusco-maculato, pedibus incarnatis.
Citrinella. *Gesn. av.* 260. *Aldr. orn.* 2. *p.* 853.
Serinus italicus. *Briss. av.* 3. *p.* 182. *n.* 51.
Verzellino. *Olin. ucc. t.* 15.
Venturon de Provence. *Buff. pl. enl. n.* 658. *f.* 2.
Citril of Vienna. *Raj. av. p.* 92. *n.* 7. *Will. orn. p.* 265. *t.* 46. *Russel alepp. p.* 65.
Citril Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 297. *n.* 64.
Habitat in Europa *australi, et* Syria, *Serino paulo major, grate canora.*
Rostrum *fuscum;* corpus *subtus et* uropygium *ex viresente flavum;* tectrices *alarum minores viresentes; majores,* remiges rectrices*que atrae, margine virides.*

Serinus. 17. Fr. subviresens, mandibula inferiore albida, dorso lateribusque fusco-maculatis, fascia alarum flava. *Kram. el. p.* 368. *n.* 7. *Sander Naturf.* 13. *p.* 187.
Serinus. *Gesn. av.* 260. *Aldr. orn.* 2. *p.* 854. *Will. orn. p.* 265. *t.* 46. *Raj. av. p.* 92. *n.* 8. *Briss. av.* 3. *p.* 179. *n.* 50.
Loxia Serinus. *Scop. ann.* 1. *n.* 205.
Serin. *Buff. pl. enl. n.* 658. *f.* 1. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 296. *n.* 63.
Habitat in Europa *australi, ad* Germaniam *superiorem usque, vere gregaria in pomariis frequens, linariae magnitudine,* $4\frac{1}{2}$ *pollices longa, cannabis semine victitans.*
Mandibula *superior ex grisco fusca;* corpus *supra fuscum, colore ex flavicante viridi intermixto, subtus ex viresente flavum;*

flavum; remiges rectricesque *fuscae*, *margine ex virescente griseae*; cauda *subbifurca*; pedes *fusci*.

senegala. 18. Fr. fusco-ferruginea, vertice subtusque rufa, rostro rubro nigro-striato.

Senegalus ruber. *Briss. av.* 3. *p.* 208. *n.* 63. *t.* 10. *f.* 2.
Sénégali rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 99. *Pl. enl. n.* 157. *f.* 1.
Senegal Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 312. *n.* 83.
Habitat ad Senegal *fluvium*, *regulo vix major*, $4\frac{3}{4}$ *pollices longa*, *in* Europa *semel*, *in patria saepius quotannis plumas mutans*, *milii seminibus victitans*, *facillime cicuranda*, *in utroque sexu canora*, *amandavae multum affinis*.
Rostrum *rubescens*, *marginibus fuscum*; corpus *ex vinaceo rubrum*; abdomen *inferius ex virescente fuscum*; occiput, cervix, dorsum *et* tectrices *alarum fusca*; cauda *nigra*; pedes *dilute grisei*.

noctis. 19. Fr. nigra, gula lorisque rufis, rostro nigro.

Passer niger. *Briss. av.* 3. *p.* 118. *n.* 23. *t.* 7. *f.* 1.
Passer niger, punctis croceis. *Sloan. jam.* 2. *p.* 311. *Raj. av. p.* 188.
Avis nocturna, Yohualtototl. *Hern. mex* 49. *Raj. av. p.* 171.
Pere noir. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. *p.* 485. *Pl. enl. n.* 201. *f.* 1.
Rufous-chinned Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 267. *n.* 20.
Habitat in nova Hispania, America *australi*, *insulis* Jamaica, Martinica, *et plurimis* Caribaeis, *domesticae magnitudine*, $4\frac{3}{4}$ *pollices longa*.
Irides *rubrae*; pedes *nigricantes*.

martinicensis. 31. Fr. nigra, gula rufa, loris nigris. *Jacq. Beytr. p.* 11. *n.* 8.
Habitat in Martinica, *graminum seminibus*, *fructibus et insectis victitans*, *fringilla noctis minor*, *ceterum solis loris nigris distincta*, *an satis*, *ut propriam constituat speciem?*

nitens. 49. Fr. ex caeruleo atra, chalybeo-nitens, rostro pedibusque incarnatis.

Passer niger erythrorhynchos. *Briss. av.* 3. *p.* 120. *n.* 24.
Moineau du Bresil. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. *p.* 486. *Pl. enl. n.* 291. *f.* 1. 2.
Short-tailed indian Sparrow. *Will. orn. p.* 252. *Raj. av. p.* 87. *n.* 11.
Glossy Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 267. *n.* 21.

b) Fringilla roſtro pedibusque nigris.
Moineau de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 224. *f.* 3.
Habitat in Braſilia, *domeſtica minor*, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Irides *albae:* Femina *ſupra nigricans, pennarum margine ex flavicante fuſco, ſubtus ex flavicante fuſca;* uropygium *griſeum; pone* oculos *ſtria nigricans;* cauda *nigra, margine griſea.*

melanicterа. 50. Fr. nigra, alarum caudaeque margine ferrugineo, abdominis maculis paucis albis.
Moineau de Macao. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 486. *Pl. enl. n.* 224. *f.* 1.
Small black-and orange-coloured Bird. *Raj. av. p.* 188. *n.* 51? *Sloan. jam.* 2. *p.* 312. *n.* 50.
Black-and Orange Finch. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 268. *n.* 22.
Habitat in Macao, *linotae magnitudine*, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum pedes*que fuſceſcentes.*

melanoleuca. 51. Fr. nigra, faſcia pectoris alba anomala.
Moineau de Java. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 486. *Pl. enl. n.* 224. *f.* 2.
White-breaſted Finch. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 268. *n.* 23.
Habitat in Java, *melanicterae aequalis, multumque ſimilis.*

pecoris. 52. Fr. fuſca, ſubtus dilutius, cauda ſubbifurca.
Fringilla virginiana. *Briſſ. av.* 3. *p.* 165. *n.* 41.
Brunet. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 138.
Cowpen Bird. *Catesb. Car.* 1. *t.* 34.
Cowpen Finch. *Arct. zool.* 2. *p.* 371. *n.* 241. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 269. *n.* 24.
Habitat in America *ſeptentrionali, hieme in* Virginia *et* Carolina, *Majo in* Noveboraco *adveniens, inter pecora lubenter paſcens, montifringilla paulo major,* $6\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum *nigricans;* pedes *fuſci.*

ſinica. 20. Fr. olivacea, ſubtus teſtacea, remigibus rectricibusque nigris baſi luteis. *Osb. it.* 2. *p.* 329.
Fringilla ſinenſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 175. *n.* 47. *t.* 7. *f.* 2.
Olivette. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 144.
Chineſe Finch. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 277. *n.* 43.
Habitat in Sina, *linotae magnitudine*, 5 *pollices longa.*
Roſtrum pedes*que flavicantes;* color *ſupra ex olivaceo fuſcus, hinc inde ruſo interſperſo;* guttur *olivaceum.*

53. Fr.

melanocephala. 53. Fr. ex ferrugineo fuſca, capite, gutture remigibusque fuſcis, colli lateribus et hypochondriis nigro-ſtriatis, cervice et abdomine albis.
Black-headed Finch. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 278. *n.* 45.
Habitat in Sina, 4 *pollices longa.*
Roſtrum *rubrum*; pedes *plumbei.*

fuſca. 54. Fr. fuſca, ſubtus ex fuſceſcente alba, roſtro pedibusque atris.
Brown Finch. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 278. *n.* 46.
Habitat in Sina, *regulo paulo major.*

naevia. 55. Fr. cinerea, ſupra ſtriata, temporibus albis, ſtria oculari rubeſcente, dorſo alisque rufeſcentibus, cauda atra.
White-cheeked Finch. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 278. *n.* 44.
Habitat ad caput bonae ſpei, *domeſticae magnitudine*, $5\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Pedes *nigri.*

Euſtachii. 56. Fr. flava, ſubtus aurantia, macula utrinque ſuboculari caerulea, artubus rubris.
Fringilla inſulae S. Euſtachii. *Briſſ. av.* 3. *p.* 177. *n.* 48.
Paſſer africanus eximius. *Seb. muſ.* 2. *p.* 67. *t.* 65. *f.* 6.
Pinſon jaune et rouge. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 145.
Habitat in inſula S. Euſtachii, *caelibis magnitudine*, $5\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

variegata 57. Fr. ex rubro, flavo, caeruleo et albo varia, capite rubeſcente, pectore flaveſcente, caudae apice margine albo.
Fringilla varia novae Hiſpaniae. *Briſſ. av.* 3. *p.* 178. *n.* 49.
Touite. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 146.
Variegated Finch. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 279. *n.* 48.
Habitat in nova Hiſpania, *caelibis magnitudine*, $5\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum *flavicans*; pedes *rubri.*

nivalis. 21. Fr. nigra, ſubtus nivea, remigibus ſecundariis tectricibusque albis.
Fringilla nivalis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 162. *n.* 39. *t.* 15. *f.* 1.
Pinton de neige ou Niverrole. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 136.
Snow-Finch. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 264. *n.* 15.
β) Fringilla hypochondriis nigro-ſtriatis, rectricibus extimis macula cuneiformi alba. *Hablizl apud S. G. Gmelin it.* 4. *p.* 168. *et apud Pallas n. nord. Beytr.* 4. *p.* 46.

Habitat

Habitat in Europa, *praesertim in* Delphinatu, β) *in alpibus* caucaficis *et* hircanicis, 7 *pollices longa.*
Roſtrum *nigrum*, caput *et* cervix *cinerea*; dorſum *et* uropygium *ex griſeo fuſca*; rectrices 2 *intermediae nigrae*, *laterales albae*, *apice nigrae.*

montico-la. 58. Fr. fuſca ſubtus alba, vertice badio griſeo vario, temporibus, collo, et alarum faſciis duabus albis.
Paſſer canadenſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 102. *n.* 15.
Soulciet. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 500.
Moineau de Canada. *Buff. pl. enl. n.* 223. *f.* 2.
Mountain Finch. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 265. *n.* 16.
Tree Finch. *Arct. zool.* 2. *p.* 373. *n.* 246.
Habitat in America *ſeptentrionali*, *autumno auſtrum verſus migrans*, *domeſticae magnitudine*, $6\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum *rubeſcens*; pedes *fuſci.*

Capſa. 59. Fr. ex rubeſcente griſea, fronte gulaque albis, alis caudaque nigris.
Dattier ou Moineau de Datte. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 487.
Capſa Sparrow. *Shaw it. p.* 253.
Capſa Finch. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 265. *n.* 17.
Habitat in Abyſſinia *et* Barbaria, *gregaria*, *frequens circa granaria*, *et campos phoenice plantatos*, *canariam cantus dulcedine ſuperans.*

arcuata. 60. Fr. nigra, ſtria alba ab oculis per colli latera producta in gutture arcuata, cervice fuſcefcente, dorſo badio, tectricibus alarum majoribus remigibusque fuſcis, margine griſeis.
Paſſer capitis bonae ſpei. *Briſſ. av.* 3. *p.* 104. *n.* 16. *t.* 5. *f.* 3.
Croiſſant. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 501.
Moineau du Cap de bonne eſpérance. *Buff. pl. enl. n.* 230. *f.* 1.
Creſcent Finch. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 266. *n.* 18.
Habitat ad caput bonae ſpei, *domeſticae magnitudine*, 6 *pollices longa.*
Tectrices *alarum minores badiae*, *mediae nigrae*, *apice albae*; cauda pedesque *fuſci.*

elegans. 61. Fr. roſtro, fronte, capiſtro, gula, uropygio, cauda pedibusque rubris, pectore flavo, occipite et cervice cinereis, dorſo alisque viridibus, abdomine albo-lineato, criſſo albo.
Beau Marquet. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 497. *t.* 30. *f.* 2. *Pl. enl. n.* 203. *f.* 1.

Beauti-

Beautiful Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 266. *n.* 19.
Habitat in Africa, *domesticae magnitudine*, 5 *pollices longa.*
Remigum *apex ater*; cauda *rotundata.*

butyracea. 22. Fr. virens, superciliis, pectore abdomineque flavis, remigibus primoribus margine exteriori albis.
Chloris indica. *Briss. av.* 3. *p.* 195. *n.* 55.
Vert-brunet. *Buff. hist. nat. desois.* 4. *p.* 182.
Verdier du cap de bonne espérance. *Buff. pl. enl. n.* 341. *f.* 1.
Indian Greenfinch. *Edw. av. t.* 84.
Yellow Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 299. *n.* 68.
Grünfink. *Kolbe Vorg.* 2. *p.* 151?
Habitat in India, *et ad* caput bonae spei, *grate canora, canariae magnitudine*, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Color *olivaceus, subtus flavus*; rostrum pedes*que fusci*; remigum *margo albus.*

canaria. 23. Fr. rostro corporeque albo-flavicante, rectricibus remigibusque virescentibus, rostro albido. *Fn. suec.* 1. *n.* 207.
Canaria. *Gesn. av.* 240. *Aldr. orn.* 2. *p.* 814. *t.* 815.
Passer canariensis. *Jonst. av. t.* 36. *Raj. av. p.* 92. *n.* 6.
Serinus canarius. *Briss. av.* 3. *p.* 184. *n.* 52.
Passera di Canaria. *Olin. ucc. t.* 7.
Serin des Canaries. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 1. *Pl. enl. n.* 202. *f.* 1.
Canary Bird. *Will. orn.* 262. *t.* 46. *Alb. av.* 1. *t.* 65.
Canary Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 293. *n.* 62.
Canarienvogel. *Frisch av. t.* 12.
β) Serinus supra fuscus.
Serin de Mozambique. *Buff. pl. enl. n.* 364. *f.* 1. 2.
γ) Serinus hybridus. *Briss. av.* 3. *p.* 186. A.
Habitat in insulis Canariis, *aliisque maris* atlantici, β) *in littore* Africae *orientali, per omnem* Europam *familiaris, longaeva, egregie cantans, docilis, cum serino, cardueli, spino et citrinella coiens, femina adeo cum linota, caelibe, domestica, ipsa emberiza citrinella, phalaridis praesertim, praeterea cannabis, myagri, napi, avenae seminibus vi-ctitans.*

flaveola. 24. Fr. flava, fronte fulva, remigibus rectricibusque nigris flavo marginatis.
Saffron-fronted Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 298. *n.* 65.
Corpus *magnitudine et statura canariensis flavissimum*; rostrum *pallidum apice fuscum*; dorsum *ex flavo virescens*; cauda *forficata*; pedes *pallidi. An forsan hybrida?*

25. Fr.

Spinus. 25. Fr. remigibus medio luteis: primis quatuor immaculatis, rectricibus basi flavis apice nigris. *Fn. suec.* 237.* *Scop. ann.* 1. *n.* 212. *Brünn. orn. n.* 261. 262. *Müll. zool. n.* 259. *Kram. el. p.* 366. *n.* 2. *Nozem. nederl. Vogel t.* 69.

Acanthus avicula. *Gesn. av.* 1.

Spinus s. Ligurinus. *Aldr. orn.* 2. *p.* 807. *t.* 810. 811.

Ligurinus. *Briss. av.* 3. *p.* 65. *n.* 4.

Lucarino. *Ol. ucc. t.* 171.

Tarin. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 221. *Pl. enl. n.* 485. *f.* 3.

Abadavine. *Alb. av.* 3. *t.* 76.

Siskin. *Brit. zool.* 1. *n.* 129. *t.* 53. *Arct. zool.* 2. *p.* 383. I. *Raj. av. p.* 91. *n.* 5. *Will. orn. p.* 261. *t.* 46. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 289. *n.* 58.

Zeischen. *Frisch av. t.* 11. *Georg. it. p.* 174. *Günth. Nest. u. Eyer t.* 13. *f. inf. Sander Naturf.* 13. *p.* 187.

β) Ligurinus niger. *Briss. av.* 3. *p.* 69. A.

Tarin noir. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 233. *n.* 4.

γ) Spinus uropygio et subtus flavus.

Tarin de la nouvelle York. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 231. *Pl. enl. n.* 292. *f.* 1. 2.

δ) Spinus supra dilute olivaceus subtus flavus.

Olivarez. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 232. *n.* 3.

Habitat in Europae, γ) *in* Noveboraci, δ) *in* Bonariae *et freti Magellanici silvis, linotae magnitudine aut minor, 4¾ pollices longa, juniperi, alni, lupuli, aliisque seminibus victitans, canora, mansueta, docilis.*

Vertex *niger*; corpus *flavicans, supra viresens*; pectus *viresens*; alae *virides*; guttur *fuscum*; feminae *album, cui etiam caput et dorsum ex viresente cinereum, fusco-maculatum.*

mexicana. 62. Fr. supra ex viresente fusca, subtus ochroleuca.

Ligurinus mexicanus. *Briss. av.* 3. *p.* 70. *n.* 5.

Acatéchili. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 234.

Acatechichictli. *Raj. av. p.* 90. *n.* 3.

Mexican Siskin. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 292. *n.* 59.

Habitat in nova Hispania, *magnitudine, victu, moribus cum spino conveniens.*

Catotol. 63. Fr. supra ex flavo et nigricante varia subtus alba, pedibus cinereis.

Ligurinus niger mexicanus. *Briss. av.* 3. *p.* 71. *n.* 6.

Catotol. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 234.

Black mexican Siskin. *Lath. syn.* II, 1. *p.* 292. *n.* 6.

Habitat

Habitat in novae Hiſpaniae *planitiebus, ſpini magnitudine, ſuaviter canora, arborum ſeminibus victitans.*

barbata. 64. Fr. lutea, alis viridibus nigro-rubroque maculatis, gula barbata. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 219.

Habitat in regni Chilenſis *montibus maritimis, hieme quoque in planitie, per totum annum ſuaviſſime canora, aliarum etiam avium vocem imitans, facillime cicuranda, et docilis, ſeminibus minoribus praeſertim madiae ſativae, et herbis viridibus potiſſimum ſcandicis chilenſis victitans, in arboribus nidum ex plumis mollibus ſtruit, et ſtramine ſubtili ſternit, ſaepiusque quotannis ova 2 parit, coloribus cardueli, ſtatura et magnitudine canariae propior; caro ſapidiſſima.*

Roſtrum *baſi album, apice nigrum;* caput *nigrum; pullo gula flava; ſemeſtri pilis nigris ornata, in decenni circiter barbam referentibus;* femina *muta imberbis cinerea, alis hinc inde flavo-maculatis.*

Diuca. 65. Fr. caerulea, gula alba. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 221.

Habitat in Chili *circa habitationes, domeſticae affinis, barbata major, gratiſſime, oriente praeſertim ſole, cantans.*

ſinenſis. 66. Fr. olivacea ſubtus flava, capite, roſtro, pedibus remigibusque nigris, majoribus et rectricibus dimidiato-flavis.

Tarin de la Chine. *Sonner. it.* 2. *p.* 202.

Chineſe Siskin. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 293. *n.* 61.

Habitat in Sina, *domeſtica minor.*

Tectrices *alarum flavae, majores macula ad apicem, minores faſciis duabus nigris.*

flammea. 26. Fr. fuſca, criſta flammea. *Fn. ſuec.* 238.

Linaria ſ. luteola nigra. *Klein av.* 93.

Fringilla criſtata. *Briſſ. av.* 3. *p.* 155. E.

Flaming Finch. *Arct. zool.* 2. *p.* 380. D.

Crimſon-crowned Finch. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 259. *n.* 11. *t.* 47.

Habitat in Norlandia, *cannabinae magnitudine,* 4 *pollices longa.*

Roſtrum pedes*que fuſcescentes;* corpus *ſubtus roſeum.*

flaviroſtris. 27. Fr. fuſca, roſtro flavicante. *Fn. ſuec.* 239.* *Müll. zool. n.* 260. *Pall. it.* 2. *p.* 710. *n.* 21.

Fringilla fuſca. *Briſſ. av.* 3. *p.* 154. B.

Pinſon brun. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 121.

Arctic Finch. *Arct. zool.* 2. *p.* 379. A. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 260. *n.* 12.
Habitat in Norwegia *et orientali* Sibiria, *ad fluvium* Jenisai *praesertim frequens circa habitationes, mansueta, hieme versus austrum migrans.*
Rostrum *cereum apice fuscum*; corpus *fuliginosum, feminae magis fuscum*; pectoris *pennae apice rubro-variae*; remiges rectrices*que atrae, margine griseae*; cauda *subfurcata*; pedes *atri.*

cannabina. 28. Fr. remigibus primoribus rectricibusque nigris utroque margine albis. *Fn. suec.* 240. *Nozem. nederl. Vogel t.* 81. *Scop. ann.* 1. *n.* 219. *Kram. el. p.* 368. *n.* 8. *Brünn. orn. n.* 263. *Müll. zool. n.* 261.
Linaria marina. *Aldr. orn.* 2. *p.* 825. *t.* 826.
Linaria rubra major. *Briss. av.* 3. *p.* 135. *n.* 30.
Grande linotte de vignes. *Buff. hist. nat. desois.* 4. *p.* 58. *Pl. enl. n.* 485. *t.* 1.
Greater red-headed Linnet. *Brit. zool.* 1. *n.* 131. *t.* 55. *Raj. av. p.* 99. *n.* 2. *Will. orn. p.* 260. *Alb. av.* 3. *t.* 72. 73.
Greater Redpole. *Arct. zool.* 2. *p.* 378. *n.* 261. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 304. *n.* 74.
Haenfling. *Frisch av. t.* 9. *f.* 1. 2. *Georg. it. p.* 174.
Habitat in Europa, *et septentrionali* America *gregaria, linota paulo minor, ejusdem longitudinis.*
Rostrum *atrum*; frontis *macula sanguinea*; *reliquum* caput *cum* collo *cinereum*; pectus *roseum*; dorsum *spadiceum*; abdomen *medio album*; pedes *fusci.* Feminae caput *cinereum nigro-maculatum*; pectus *sordide flavum, lineis atris striatum.*

Linota. 67. Fr. spadicea subtus ex rubescente exalbida, capitis pennis margine cinereis, gulae linea fusca utrinque albo marginata, alarum macula longitudinali alba, rectricibus fuscis, intermediis margine rubescentibus, reliquis margine albis.
Linaria. *Briss. av.* 3. *p.* 131. *n.* 29.
Fanello. *Olin. uce. t.* 45.
Linotte. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 58. *t.* 1. *Pl. enl. n.* 151. *f.* 1.
Common Linnet. *Brit. zool.* 1. *n.* 130. *Raj. av. p.* 90. *n.* 1. *Will. orn. p.* 258. *t.* 46. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 302. *n.* 73.
Habitat in Europa, $5\frac{1}{2}$ *pollices longa, hieme saepe gregaria, seminibus, lini praecipue victitans, in fruticibus humilioribus, oxyacantha, pruno spinosa &c. ex herbis siccis, gramine,*

mine, muscis nidum struens, lana pilisque intus sternens, et ova 5 alba, versus finem latiorem maculis spadiceis varia pariens, satis longaeva.

Rostrum *griseum apice fuscum, vere glaucum*; colli *latera cinerea*; pectus *maris adulti liberi rubrum, primo vere laetissimum*; feminae, pulli, *in caveis custoditae avis fusco-striatum*; hypochondria *fusco-maculata*; remiges *atrae*; cauda *subforficata*; pedes *fusci*.

Linaria. 29. Fr. remigibus rectricibusque fuscis margine obsolete pallido, litura alarum albida. *Fn. suec.* 241.* *Fabr. Fn. groenl. p.* 121. *n.* 83. *Brünn. orn. n.* 246. *Müll. zool. n.* 262. *Kram. el. p.* 369. *n.* 9. *Georg. it. p.* 174.

Linaria rubra. *Gesn. av.* 591. *Aldr. orn.* 2. *p.* 825.

Linaria rubra minor. *Briss. av.* 3. *p.* 138. *n.* 31.

Sizerin. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 216.

Petite linotte de vignes. *Buff. pl. enl. n.* 151. *f.* 2.

Lesser red-headed Linnet. *Raj. av. p.* 91. *n.* 3. *Will. orn. p.* 260. *t.* 46. *Albin. av.* 3. *t.* 75.

Lesser Redpole. *Brit. zool.* 1. *n.* 132. *t.* 54. *Act. zool.* 2. *p.* 379. *n.* 262. *Forster act. angl.* 62. *p.* 405. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 305. *n.* 75.

Rothplattiger Haenfling. *Frisch av. t.* 10.

Habitat in Europa *ab* Italia *ad extremam* Russiam, *boreali* Asia *et* America, *cannabina duplo minor*, 5 *pollices longa, in alni, cujus etiam seminibus victitat, et amenta scindit, trunco ex siccis bacillis et lana nidum struens, pilisque et plumis intus sternens, ova pariens* 4 *ex caerulescente pallide virescentia versus finem obtusum maculis exiguis rubescentibus cumulatis varia.*

Rostrum pedes*que fusci*; frontis *macula et* (*mari*) *pectus ex purpurascente rubra*; dorsum *atrum, pennarum margine spadiceo.* Feminae *macula frontis crocea.*

montium. 68. Fr. atra, subtus pallida, gutture et pectore nigricantibus, uropygio (maris) pallide rubro.

Linaria montana. *Briss. av.* 3. *p.* 145. *n.* 33.

Linotte de montagne. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 74.

Mountain Linnet. *Brit. zool.* 1. *n.* 133. *t.* 53. *Raj. av. p.* 91. *n.* 4. *Will. orn. p.* 261. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 307. *n.* 76.

Steinhaenfling. *Frisch av. t.* 10.

β) Linaria minima. *Briss. av.* 3. *p.* 148. *t.* 32.

Petite Linotte ou Cabaret. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 76. *Pl. enl. n.* 485. *f.* 2.

Twite. *Arct. zool.* 2. *p.* 380. C. *Alb. av.* 3. *t.* 74.
Habitat in Europa, *linotae magnitudine*, $6\frac{1}{2}$, *β*) $4\frac{1}{2}$ *pollices longa*, *fringultiens.*
Capitis *pennae margine cinereae*, *reliquae corporis superioris margine spadiceae*; tectrices *alarum minores* remigesque *secundariae apice albidae*; pedes *fuscescentes.*

argentoratensis. 69. Fr. fusca, subtus rufa fusco-maculata, abdomine crissoque albidis.
Linaria argentoratensis. *Briss. av.* 3. *p.* 146. *n.* 34.
Gyntel de Strasbourg. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 73.
Strasburg Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 308. *n.* 77.
Habitat circa Argentoratum, *linotae magnitudine*, 4 *ova pariens.*

angolensis. 70. Fr. ex fuscescente cinerea, subtus aurantia, capistro nigro, area oculorum et gulae utroque latere albis, uropygio flavo, alis caudaque fuscis.
Linaria angolensis. *Briss. av. app. p.* 81. *n.* 71.
Vengoline. *Brit. zool.* 8. *vol.* 2. *app. p.* 666. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 80.
Linnets from Angola. *Edw. av. t.* 129.
Angola Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 309. *n.* 78.
Habitat in Angola, *linotae magnitudine*, *suavissime cantans.*
Rostrum *fuscum*; tectrices *alarum majores* remigesque *fuscae*, *margine flavae*; rectrices *fuscae*, *margine griseae*; pedes *incarnati.* Femina *supra ex rufo fusca*, *subtus rufescens*, *fusco-maculata*; tempora *rufescentia*; *prope basin* rostri *macula fusca.*

atra. 71. Fr. nigricans, pectore et uropygio cinerascentibus.
Linotte brune. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 84.
Dusky Linnet. *Edw. glean. t.* 270.
Dusky Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 310. *n.* 79.
Habitat in Angola *aut* Brasilia? 4 *pollices longa*; rostrum *cinereum*; pennarum *apex dilutius tinctus*; pedes *atri.*

macroura. 72. Fr. subtus pallidissime cinerea, remigibus fuscis margine virescentibus, cauda cuneiformi: rectricibus intermediis angustis acuminatis ex virescente fuscis, lateralibus fulcis.
Longtailed Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 310. *n.* 80.
Habitat in Cayenna, *linotae magnitudine*, $7\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Rostrum pedesque *fusci*; corpus *supra alaudae arvensis colore tinctum.*

petronia. 30. Fr. grisea, supercíliis albis, gula lutea.
Passer sylvestris. *Briss. av.* 3. *p.* 88. *n.* 6. *t.* 5. *f.* 1.
Passer torquatus. *Raj. av. p.* 87. *n.* 6?
Oenanthae congener. *Aldr. orn.* 2. *p.* 764.
Petronia marina s. Oenanthae congener. *Will. orn. p.* 267. *Raj. av. p.* 80. *n.* 2. *p.* 92. *n.* 10.
Soulcie. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. *p.* 498. *t.* 30. *f.* 1. *Pl. enl. n.* 225.
Ring Sparrow. *Will. orn. p.* 250? *Lath. syn.* II. 1. *p.* 254. *n.* 4.
Graufink. *Frisch av. t.* 3.
Habitat in Europae, *praesertim* Germaniae *silvis, domestica major*, $5\frac{3}{4}$ *pollices longa, gregaria, migrans, seminibus et insectis victitans, semel quotannis in cavis arboribus nidificans, et* 4-5 *ova pariens.*
Rectrices *apice lateris exterioris macula alba, at extima margine exteriori albo.*

stulta. 73. Fr. ex rufo grisea, fuliginoso-maculata, subtus flavicans, superciliis alarumque duabus fasciis albis, gulae macula flava, cauda nigricante margine rufa.
Passer stultus. *Briss. av.* 3. *p.* 87. *n.* 5.
Passer stultus Bononiensium. *Raj. av. p.* 87. *n.* 1.
Passera mattugia. *Olin. ucc. t.* 45.
Foolish Sparrow. *Will. orn. p.* 249. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 255. *n.* 5.
Habitat circa Bononiam, *domesticae magnitudine.*

bononiensis. 74. Fr. subtus ochroleuca, capite colloque albis flavicante maculatis, dorso et uropygio ex albo, nigro et flavicante variis.
Passer bononiensis. *Briss. av.* 3. *p.* 91. *n.* 7.
Passer maculatus. *Raj. av. p.* 87. *n.* 3.
Speckled Sparrow. *Will. orn. p.* 250. *n.* 4. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 255. *n.* 6.
Habitat circa Bononiam, *domesticae magnitudine.*
Rostrum *flavum*; remiges *atrae*; cauda pedesque *flavicantes.*

leucura. 75. Fr. ochroleuca, corpora supra flavicante badio maculato alboque striato, cauda ex cinereo alba.
Passer albicilla Bononiensis. *Briss. av.* 3. *p.* 92. *n.* 8.
White-tailed Sparrow. *Will. orn. p.* 250. *n.* 5. *Raj. av. p.* 87. *n.* 4. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 256. *n.* 7.
Habitat circa Bononiam.

brachyura. 76. Fr. tota flavicans.
Passerculus Bononiensis. *Briss. av.* 3. *p.* 93. *n.* 9.
Short-tailed italian Sparrow. *Will. orn. p.* 252. *n.* 13. *Raj. av. p.* 87. *n.* 12.
Short-tailed Sparrow. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 256. *n.* 8.
Habitat circa Bononiam.

dalmatica. 77. Fr. supra rubescens, subtus albida, cauda furcata.
Passer sclavonicus. *Briss. av.* 3. *p.* 94. *n.* 10.
Dalmatic Sparrow. *Will. orn. p.* 250. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 256. *n.* 9.
Habitat in Dalmatia, *domestica major.*
Rostrum *albidum*; pedes *flavescentes.*

Bengalus. 32. Fr. dilute caerulea, capite dorsoque griseis, lateribus capitis purpureis.
Bengalus. *Briss. av.* 3. *p.* 303. *n.* 60. *t.* 10. *f.* 1.
Bengali. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 92. *Pl. enl. n.* 115. *f.* 1.
Blue bellied Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 310. *n.* 81.
b) Fringilla (angolensis) dorso fusco, abdomine caudaque caeruleis. *Syst. nat.* XII. 1. *p.* 323. *n.* 31.
Blue-bellied Finch. *Edw. av. t.* 131.
Habitat in Angola *et* Bengala, *linariae magnitudine*, $4\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Rostrum *sordide incarnatum*; remiges *fuscae*, *margine griseae*; cauda *dilute caerulea subcuneata*; pedes *albidi*; *feminae* b) *nulla purpura ad latera capitis.*

jamaica. 33. Fr. grisea, pectore viridi-caerulescente, remigibus rectricibusque nigris. *Amoen. acad.* 1. *p.* 489.*
Fringilla jamaicensis. *Briss. av.* 3. *p.* 166. *n.* 42.
Bonana. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 139.
Bonana Bird. *Raj. av. p.* 187. *n.* 46. *Sloan. jam. p.* 311. *n.* 47. *t.* 207. *f.* 3.
Grey Grosbeak. *Brown illustr. t.* 26.
Bonana Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 269. *n.* 25.
Habitat in Jamaica, *spini magnitudine*, 5 *pollices longa.*
Rostrum pedes*que nigri*; pennae *corporis superiores mollissimae caeruleae*, *inferiores dilutius caeruleae*; tectrices *alarum*, remiges *et* cauda *ex virescente caeruleae.*

cana. 78. Fr. supra ex flavo fusca, subtus flava, capite gulaque griseis, crisso albo, alis caudaque fuscis albo-lineatis.
Serinus jamaicensis. *Briss. av.* 3. *p.* 189. *n.* 53.

Serino

Serino affinis e cinereo, luteo et fuſco varius. *Raj. av.* *p.* 188. *n.* 50. *Sloan. jam.* 2. *p.* 311. *n.* 50.
Grey-headed Finch. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 270. *n.* 26.
Habitat in Jamaica, 8 *pollices longa.*
Roſtrum *ex caeruleſcente fuſcum*; pedes *caeruleſcentes*; unguibus *fuſcis.*

Savanna-rum. 79. Fr. ſupra fuſca albido et luteſcente varia, ſubtus ex flaveſcente fuſca, abdomine remigumque apice albis, alis caudaque fuſcis, ſuperciliis flavis.
Paſſer jamaicenſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 99. *n.* 13.
Savanna-Bird. *Sloan. jam. p.* 306. *p.* 259. *f.* 5. *Raj. av.* *p.* 188. *n.* 49.
Savanna Finch. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 270. *n.* 27.
Habitat in Jamaicae *planitiebus, in terra conſidens, et ne detegatur, inſtar alaudae arvenſis, terrae quam proxima currens*, 4 *pollices longa.*
Roſtrum *fuſcum*; pedes *albidi.*

coccinea. 80. Fr. ex coccineo aurantia, alis caudaque aequali atris, remigum margine exteriori aurantio, primorumque apice nigro.
Scarlet Finch. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 270. *n.* 28.
Habitat in inſulis Sandwich, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum *fuſceſcens*; pedes *nigri.*

punicea. 81. Fr. nigra, genis, gutture et pectore rubris, tectricibus alarum lineis duabus albis.
Red-breaſted Finch. *Arct. zool.* 2. *p.* 372. *n.* 245. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 272. *n.* 30.
Habitat ad Sandy Hook Americae.
Roſtrum *album.*

ferrugi-nea. 82. Fr. fuſca, pennarum margine ſpadiceo, area oculorum alba, pectore maculato et abdomine dilutius tinctis.
Little Sparrow. *Edw. glean. t.* 354. *f.* 2.
Ferruginous Finch. *Arct. zool.* 2. *p.* 375. *n.* 251. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 272. *n.* 31.
Habitat in America *ſeptentrionali, domeſticae magnitudine,* $5\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum *atrum*; pedes *ex fuſceſcente incarnati.*

albicollis. 83. Fr. ſpadicea, ſubtus cana, gula alba, genis canis, ſuperciliis aurantiis.
Paſſer penſilvanicus. *Briſſ. av. app. p.* 77.

White-throated Sparrow. *Edw. glean. t.* 304.
White-throated Finch. *Arct. zool.* 2. *p.* 373. *n.* 248.
Habitat in Penſilvania, *montanae magnitudine*, $6\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum faſcia*que ocularis atra*; pedes *incarnati.*

faſciata. 84. Fr. ferruginea nigro-maculata, ſubtus alba nigro-ſtriata, alis ferrugineis, cauda fuſca atro-lineata.
Faſciated Finch. *Arct. zool.* 2. *p.* 375. *n.* 252. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 273. *n.* 33.
Habitat in Noveboraco.
Remiges *primores atrae, margine exalbidae.*

graminea. 85. Fr. ex cinereo, ferrugineo et nigro varia, ſubtus alba, jugulo ſtriato, cauda remigibusque primoribus atris, tectricibus alarum minoribus badiis.
Graſs Finch. *Arct. zool.* 2. *p.* 375. *n.* 253. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 273. *n.* 34.
Habitat in Noveboraco, *Majo* 5 *ova in gramine pariens.*
Tectrices *alarum mediae et majores nigrae, et* remiges *primores margine albae.*

cinerea. 86. Fr. ex cinereo fuſca, pennis margine ferrugineis, genarum faſcia duplici griſea et atra, gula griſea, jugulo cinereo albido-maculato.
Cinereous Finch. *Arct. zool.* 2. *p.* 378. *n.* 260. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 274. *n.* 35.
Habitat in Unalaſchca.
Roſtrum pedes*que atri.*

Nortonienſis. 87. Fr. nigra, pennis margine badiis, ſubtus alba, gutturis pennis medio ferrugineis, remigibus primoribus rectricibusque atris, his margine exalbidis, intermediis apice albis.
Norton Finch. *Arct. zool.* 2. *p.* 376. *n.* 256. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 274. *n.* 36.
Habitat in ſinu Norton.

hiemalis. 88. Fr. dilute fuſca nigro-varia, ſubtus alba fuſco-maculata, abdomine albo, tectricibus alarum remigibusque primoribus fuſcis margine albis.
Winter Finch. *Arct. zool.* 2. *p.* 376. *n.* 254. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 274. *n.* 37.
Habitat in Noveboraco.

89. Fr.

striata. 89. Fr. capitis ſtriis quatuor nigris, facie flava, temporibus albidis, tectricibus alarum caudaque ſubcuneata fuſcis, remigibus atris.
Striped Finch. *Arct. zool.* 2. *p.* 374. *n.* 250.
Striped-headed Finch. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 275. *n.* 38.
Habitat Noveboraci, $5\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum *plumbeum*; corpus *ſupra linotae ſimile*; pectus *ex caeruleo griſeum*; abdomen *pallidum*; pedes *fuſceſcentes.*

purpurea. 90. Fr. ~~olivacea~~ violacea, abdomine albido, remigibus intus fuſcis.
Pyrrhula carolinenſis violacea. *Briſſ. av.* 3. *p.* 324. *n.* 8.
Bouvreuil violet de la Caroline. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 395.
Purple Finch. *Catesb. Car.* 1. *t.* 41. *Arct. zool.* 2. *p.* 377. *n.* 258. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 275. *n.* 39.
Habitat in Carolina, *caelibis magnitudine*, $5\frac{2}{4}$ *pollices longa, juniperi baccis, arborumque pomiferarum gemmis victitans.*
Cauda *ſubfurcata*; femina *tota fuſca*, *pectore ſolo albo-maculato.*

roſea. 91. Fr. roſea, capiſtro argenteo, dorſo lituris ex griſeo fuſceſcentibus vario, alis caudaque nigricantibus, rectricum margine exteriori roſeo. *Pall. it.* 3. *p.* 699. *n.* 26.
Habitat rarior et ſolitaria in ſalicetis ad Udam *et* Selengam Sibiriae, *magnitudine montifringillae.*

iliaca. 92. Fr. pennis corporis ſuperioribus baſi chalybeis, medio olivaceis, apice fuſcis, ſubtus albis, hinc inde apice ſpadiceis, tectricibus caudae rectricibusque ſupra rufis. *Merrem Beytr.* II. *p.* 40. *t.* 10.
Habitat in America *ſeptentrionali*, *ſturni magnitudine*, *9 pollices longa.*
Roſtrum *flavum*, *carina et apice fuſcum*; tempora *alba*; tectrices *alarum inferiores cinereae margine et apice albae*; *ſuperiores rufae*; remiges *ex nigricante fuſcae*, *margine exteriori rufae*; pedes *flavi.*

tricolor. 34. Fr. nigra, capite uropygioque cyaneis, humeris viridibus, abdomine flaveſcente.
American Sparrow of Seba. *Bancr. Guj. p.* 182.
Blue-faced Finch. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 318. *n.* 91.
Habitat in Surinam, *mediae magnitudinis.*
Narium *regio atra*; frons *et* tempora *cyanea*; remiges *primores margine exteriori virides*; cauda *aequalis.*

cyanomelas. 93. Fr. caerulea, linea inter oculos arcuque dorsi superioris nigris, cauda aequali remigibusque ex atro fuscis, his margine caeruleis.
Fringilla caerulea. *Koelreuter nov. comm. Petrop.* II. *p.* 434. *t.* 15. *f.* 6.
Demi-fin noir et bleu. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 327.
Blue-headed Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 319. *n.* 92.
Magnitudo *linotae*; rostrum pedesque *fusci.*

picta. 94. Fr. rubra, vertice, remigibus caudaque caeruleis, abdomine dilute cinereo, uropygio flavo, dorso et tectricibus alarum minoribus purpurascentibus, majoribus viridibus.
Azure-headed Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 319. *n.* 93.
Habitat in Sina, 4 *pollices longa.*

cyanocephala. 95. Fr. capite cyaneo, cervice rubra, dorso ferrugineo, abdomine, uropygio femoribusque ex caerulescente canis, alis cauda pedibusque nigris. *Mill. on var. subj. t.* 24. B.
Blue-crowned Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 319. *n.* 94.
Habitat ad Senegal *fluvium.*

torquata. 96. Fr. supra ferruginea, subtus alba, capite rubro, uropygio caerulescente, gulae arcu, pedibus, cauda remigibusque nigris, his apice caeruleis, et ad apicem macula alba notatis. *Mill. on var. subj. t.* 30. B.
Lunar Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 320. *n.* 95.
Habitat in India, $6\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

multicolor. 97. Fr. nigra subtus flavescens, crisso flavo, genis flavescentibus, dorso inferiori viridi, tectricibus alarum macula, remigibus secundariis ad apicem lineis albis notatis.
Greenrumped Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 320. *n.* 96.
Habitat in insula Zeylon.
Rostrum *caerulescens*; pedes *grisei.*

Maja. 35. Fr. purpurascens, fascia pectorali saturatiore.
Maja. *Hern. mex.* 56. *Nieremb. nat.* 208. *Will. orn. p.* 386. *Raj. av. p.* 155.
Maja ex insula Cuba. *Briss. av.* 3. *p.* 214. *n.* 66. *t.* 7. *f.* 3.
Maja de la Cuba. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 105. *t.* 3. *Pl. enl. n.* 109. *f.* 2.
Habitat gregaria in insula Cuba *et* India, $3\frac{3}{4}$ *pollices longa, oryza consitos agros devastans, carne sapida.*
Rostrum *griseum*; caput, collum *et subtus* corpus *nigricans, supra ex purpurascente badium*; remiges *ex griseo fuscae, margine badiae*; pedes *plumbei.*

36. Fr.

domesti-ca. 36. Fr. remigibus rectricibusque fuscis, corpore griseo nigroque, fascia alarum alba solitaria. *Fn. suec.* 242.* *Scop. ann.* 1. *n.* 220. *Brünn. orn. n.* 264. *Müll. zool. n.* 263. *Kram. el. n.* 369. *n.* 10. *Nozem. nederl. Vogel t.* 42.

Fringilla remigibus rectricibusque fuscis, gula nigra, temporibus ferrugineis. *Fn. suec.* 1. *n.* 212.

Passer domesticus. *Gesn. av.* 643. *Aldr. orn.* 2. *p.* 528. *t.* 534. *Briss. av.* 3. *p.* 72. *n.* 1.

Passera nostrale. *Ol. ucc. t.* 42.

Moineau franc. *Buff. hist. nat. desois.* 3. *p.* 474. *t.* 29. *f.* 1. *Pl. enl. n.* 6. *f.* 1. *n.* 55. *f.* 1.

House Sparrow. *Brit. zool. n.* 127. *t.* 51. *Arct. zool.* 2. *p.* 382. G. *Raj. av. p.* 86. *Will. orn. p.* 249. *t.* 44. *Alb. av.* 1. *t.* 62. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 248. *n.* 1.

Sperling. *Frisch av. t.* 8. *Georg. it. p.* 174.

β) Passer candidus. *Briss. av.* 3. *p.* 77. A.

Fringilla candida. *Sparrm. mus. Carls. t.* 20.

Passer albus. *Aldr. orn.* 2. *t.* 566. *Scop. ann.* 1. *p.* 149.

γ) Passer flavus. *Briss. av.* 3. *p.* 78. B. *Aldr. orn.* 2. *p.* 557.

δ) Passer niger. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 251. C.

ζ *Habitat in* Europa, *ad lacum* Baikal, *in* Syria, Aegypto, *ad fluvium* Senegal, *prope et in habitationibus hominum*, $5\frac{3}{4}$ *pollices longus, seminibus fructibusque victitans, hortis ideo infestissimus, astu majore insidias hominum evadens, quam congeneres, auctumno saepe gregatim arbores petens, non canorus, hieme saepius gregatim arbores petens, exigua cura nidum ex foeno plumisque struens, aut alcedinis nidum occupans, et ter utplurimum quotannis* 5-6 *ova pariens ex rubescente alba, fusco-maculata.*

Color *supra ex spadiceo et nigro varius, subtus pallide et sordide cinereus*; vertex *cinereus*; facies, mentum *et* (*mari*) guttur *nigrum*; tectrices *alarum ex badio et nigro variae*; remiges *atrae, margine rufae*; cauda *subfurcata fusca margine griseo*; pedes *ex griseo fusci.* Feminae *pone oculos stria alba.*

montana. 37. Fr. remigibus rectricibusque fuscis, corpore griseo nigroque, alarum fascia alba gemina. *Fn. suec.* 243.* *Scop. ann.* 1. *n.* 221. *Brünn. orn. n.* 267. *Müller zool. n.* 264. *Kram. el. p.* 370. *n.* 11.

Passer montanus. *Aldr. orn.* 2. *p.* 560. *t.* 560. *Raj. av. p.* 87. *n.* 15. *Briss. av.* 3. *p.* 79. *n.* 2.

Passer arboreus. *Nozem. nederl. Vogel t.* 43.

Passera montanina. *Olin. ucc. t.* 48.

Friquet.

Friquet. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 489. *t.* 29. *f.* 2. *Pl. enl. n.* 267. *f.* 1.
Mountain Sparrow. *Will. orn. p.* 252. *t.* 45. *Alb. av.* 3. *t.* 66. *Edw. glean. t.* 269.
Tree Sparrow. *Brit. zool.* 1. *n.* 128. *t.* 52. *Arct. zool.* 2. *p.* 373. *n.* 246. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 252. *n.* 2.
Bergſperling. *Friſch av. t.* 7.
Habitat in Europa, *orientali* Sibiria *et? ſeptentrionali* America, *domeſtica paulo minor*, $5\frac{1}{2}$ *pollices longa*, *in arboribus nidificans.*
Roſtrum, (*mari*) *macula aurium*, mentum*que nigra*; caput *et* nucha *badia*; corpus *ſupra ex rufo fuſcum nigro-maculatum*, *ſubtus exalbidum*; tectrices *alarum nigrae*, *margine rufae*, *majores margine ferrugineae*; remiges *nigricantes*, *margine rufae*; cauda *aequalis ex rufo fuſca*; pedes *flaveſcentes.*

pinetorum. 98. Fr. ſupra ex rufeſcente teſtacea, ſubtus flava, faſcia pectorali transverſa ferruginea. *Lepechin it.* 2. *p.* 188.
Habitat in Sibiriae *pinetis.*

ſylvatica. 99. Fr. capite faſciato, corpore ſupra griſeo nigroque vario, pectore atque imo abdomine canis. *Lepechin it.* 2. *t.* 7. *f.* 2.
Habitat in Sibiriae *pinetis.*

hudſonia. 100. Fr. ſupra nigra ſubtus alba, rectricibus exterioribus albis. *Forſter act. angl.* 62. *p.* 428. *Miller on var. ſubj. t.* 21. B.
Habitat ad fretum Hudſonis.

flavicollis. 101. Fr. ſupra cinerea, ſubtus exalbida, mento albo, gulae macula flaveſcente, remigibus primoribus atris margine fuſceſcentibus, roſtro pedibusque ex caeruleſcente griſeis.
Yellow-throated Finch. *Arct. zool.* 2. *p.* 374. *n.* 249.
Habitat in Noveboraco.

criſtata. 102. Fr. ſpadicea, ſubtus rubra, vertice criſtato rubro, temporibus nigris.
Friquet huppé. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 496.
Moineau de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 181. *f.* 1. 2.
Blackfaced Finch. *Arct. zool.* 2. *p.* 376. *n.* 255. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 253. *n.* 3.
Habitat in Carolina *et* Cayenna, *domeſticae magnitudine*, $6\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum *et* uropygium *rubrum*; pedes *fuſci*; feminae vertex *laevis*; area *oculorum et* mentum, remiges *et* faſcia *pectoralis nigra*; abdomen *album.*

bicolor. 38. Fr. capite pectoreque nigris, dorso, alis caudaque obscure virescentibus.
Chloris bahamensis. *Briss. av.* 3. *p.* 202. *n.* 59.
Verdinere. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 184.
Bahama Sparrow. *Arct. zool.* 2. *p.* 373. *n.* 247. *Catesb. Car.* 1. *t.* 37. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 300. *n.* 69.
Habitat in insularum Bahama *et* Jamaica *silvis, canariae magnitudine, 4 pollices longa, cantu monotono.*
Rostrum *et* gula *nigra.*

abyssinica. 103. Fr. nigra, supra flava, torque nigro, crisso flavo.
Worabée. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 54.
Black-collared Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 300. *n.* 70.
Habitat gregaria in Abyssinia, *seminibus plantae cujusdam oleosis victitans, canariae magnitudine et forma.*
Crissum *flavum*; cauda *margine ex virescente flava*; pedes *fuscescentes.*

ultramarina. 104. Fr. caerulea, rostro albo, pedibus rubris.
Outre-mer. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 56.
Ultra-marine Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 301. *n.* 71.
Habitat in Abyssinia, *canariae magnitudine, suavissime canora.*
Feminae avesque *anniculae griseae.*

syriaca. 105. Fr. ex fusco, atro flavoque varia, vertice rubro, genis et gutture ex nigricante et fusco variis, tectricibus alarum majoribus, remigibus rectricibusque cinereis margine aurantiis, abdomine crissoque exalbidis maculatis.
Habesch de Syrie. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 57.
Tripoline Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 301. *n.* 72.
Habitat circa Tripolin Syriae, *linota paulo major, migratoria, grate canora.*
Rostrum pedesque *plumbei*; tectrices *alarum majores margine pallidae*; abdominis *maculae flavicantes et atrae*; cauda *subfurcata.*

crispa. 39. Fr. olivacea, subtus lutea, capite nigro, pennis plurimis recurvatis.
Fringilla crispa. *Briss. av. app. p.* 86.
Pinson frisé. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 148. *t.* 7. *f.* 2.
Black and yellow frizzled Sparrow. *Edw. glean. t.* 271. *f.* 1.
Frizzled Finch. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 280. *n.* 49.
Habitat in Angola *aut* Brasilia, *caelibis magnitudine.*
Rostrum *album*; collum *nigrum*; pedes *fusci.*

106. Fr.

indica. 106. Fr. ex cinereo fuſca, ſubtus ex rufo alba, roſtro, capite, faſcia juguli, remigibus, et tectricibus alarum nigris, capiſtro, area oculorum gulaque albis.
Fringilla torquata indica. *Briſſ. av. app. p.* 85. *n.* 73.
Pinſon à double collier. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 149.
Collared Finch. *Edw. glean. t.* 272. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 280. *n.* 50.
Habitat in India, *caelibis magnitudine.*
Tectrices *alarum*, remiges*que ſecundariae margine rufae.*

ochracea. 107. Fr. alba, capite, lateribus colli, pectore tectricibusque alarum ochraceis, roſtro pedibusque flavis. *Jacquin Beytr. p.* 19. *n.* 14. *t.* 5.
Habitat in Auſtria.
Occiput *ſubcriſtatum.*

teſtacea. 108. Fr. teſtacea, rectricibus remigibusque fuſcis, roſtro pedibusque carneis. *Jacquin Beytr. p.* 27. *n.* 21. *t.* 12.
Habitat in Luſitania.
Oculi *nigri.*

PHYTOTOMA. *Roſtrum* conicum, rectum, ſerratum.

Nares ovatae.

Lingua brevis, obtuſa.

rara. 1. Ph. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 226.
Habitat in regno Chilenſi, *coturnicis fere magnitudine, voce rauca, interrupta clamans, herbis recentibus victitans, quarum truncos prope radices roſtro quaſi ſerra abſcindit, hinc hortis infeſtiſſima, et incolis deteſtata, in locis umbroſis parum frequentatis in arboribus frondoſiſſimis nidificans, et ova pariens alba, rubro-maculata.*
Roſtrum *craſſum*, ½ *pollicem longum*; corpus *ſupra obſcure cinereum, ſubtus dilutius*; remiges *primores* rectrices*que utrinque nigro-punctatae*; cauda *mediae longitudinis, rotundata.*

113. MUSCICAPA. *Roſtrum* ſubtrigonum, utrinque emarginatum, apice incurvo; *vibriſſae* patentes verſus fauces.

Nares ſubrotundae.

paradiſi. 1. M. capite criſtato nigro, corpore albo, cauda cuneata: rectricibus intermediis longiſſimis.

Muſcicapa criſtata alba capitis bonae ſpei. *Briſſ. av.* 2. *p.* 414. *n.* 29. *t.* 41. *f.* 2.

Icterus maderaſpatenſis criſtatus. *Briſſ. av.* 2. *p.* 92. *n.* 7.

Pica papoenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 45. *n.* 6.

Corvus paradiſi. *Syſt. nat.* X. *p.* 107.

Manucodiata criſtata ex albo nigroque varia. *Raj. av. p.* 195. *t.* 2. *f.* 3.

Avis paradiſi orientalis ex albo nigroque varia. *Seb. muſ.* 1. *p.* 85. *t.* 52. *f.* 3.

Vardiole. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 105.

Moucherolle huppé à tête couleur d'acier poli. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 558.

Gobe-mouche blanc huppé du cap de bonne eſpérance. *Buff. pl. enl. n.* 334. *f.* 2.

Pied Bird of Paradiſe. *Edw. av. t.* 113.

Paradiſe Flycatcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 345. *n.* 44.

β) Muſcicapa criſtata capitis bonae ſpei. *Briſſ. av.* 2. *p.* 418. *n.* 31. *t.* 41. *f.* 1.

γ) Muſcicapa criſtata longicauda ſubtus alba, pectore ex caeruleſcente cinereo.

Creſted long-tailed Pie. *Edw. glean. t.* 325.

δ) Muſcicapa braſilienſis criſtata. *Briſſ. av.* 2. *p.* 416. *n.* 30.

Avis paradiſiaca braſilienſis ſeu Cuiriri Acamaky criſtata. *Seb. muſ.* 1. *t.* 87. *f.* 2.

Habitat ad fluvium Senegal, *ad* caput bonae ſpei, *in inſula* Madagaſcar, *alaudae magnitudine*, 8½ *pollices longa*, *muſcis victitans.*

Roſtrum *nigricans*, *baſi ſetis tectum*; caput, cervix *et* gula *ex vireſcente nigra*; dorſum, uropygium, jugulum *et* corpus *ſubtus album*; tectrices *alarum* remigesque *nigrae*, *margine albae*; rectrices *intermediae* 15 *pollices longae*; pedes *plumbei.*

2. M.

mutata. 2. M. capite criſtato, cauda cuneata, rectricibus intermediis longiſſimis, palpebris caeruleis.

Muſcicapa madagaſcarienſis varia longicauda. *Briſſ. av.* 2. *p.* 424. *n.* 36. *t.* 40. *f.* 3.

Gobe-mouche à longue queue et ventre blanc. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 568. *Pl. enl. n.* 248. *f.* 2.

Mutable Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 347. *n.* 45.

β) Muſcicapa madagaſcarienſis longicauda. *Briſſ. av.* 2. *p.* 424. *n.* 34. *t.* 40. *f.* 1.

Schet-all. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 568.

Gobe-mouche à longue queue de Madagaſcar. *Buff. pl. enl. n.* 248. *f.* 1.

γ) Muſcicapa madagaſcarienſis albicilla longicauda. *Briſſ. av.* 2. *p.* 427. *n.* 35. *t.* 40. *f.* 2.

Schet vouloulou. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 569.

Habitat in Madagaſcar, *fringillae domeſticae magnitudine,* 11½ *pollices longa.*

Roſtrum pedes*que nigri*; caput, collum dorſum*que ex vireſcente nigra, hoc albo varium*; corpus *ſubtus album*; alae *nigrae, medio longitudinaliter albae*; cauda 7½ *pollices longa*; rectrices *intermediae* 4¼ *pollices reliquis longiores, albae, macula ad apicem nigra notatae; reliquae intus albae, extus nigrae.*

ſtriata. 7. M. vertice nigro, occipite albo nigroque vario, genis albis, gula ochroleuca fuſco-maculata, pectore albido, abdomine albo, dorſo cinereo nigro vario, alarum faſcia duplici, ochroleuca et alba.

Striped Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 349. *n.* 46.

β) Muſcicapa (maris) capillitio rubro, pectore flaveſcente, genis uropygioque caeruleis. *Forſter act. angl.* 62. *p.* 428. *Mill. on var. ſubj. t.* 15. A. B.

Habitat in America *ſeptentrionali, pari atri magnitudine,* 5 *pollices longa.*

Roſtrum *nigrum*; dorſum *ſtriatum*; cauda *fuſca*; rectrices 3 *utrinque extimae albo-variae*; pedes *flavi*; ungues *fuſceſcentes.* Feminae *caput ex vireſcente flavum, nigro-ſtriatum*; palpebrae *et* ſupercilia *flava*; gula, genae *et* pectus *ex albido flava, maculis oblongis fuſcis varia.*

martinica. 3. M. capite criſtato, corpore fuſco, ſubtus cinereo, remigum margine exteriori albido.

Muſci-

Muſcicapae *inſectis, potiſſimum muſcis victitant.*

Muſcicapa martinicana criſtata. *Briſſ. av.* 2. *p.* 362. *n.* 3. *t.* 36. *f.* 2.
Gobe-mouche huppé de la Martinique. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 540. *Pl. enl. n.* 568. *f.* 1.
Martinico-Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 352. *n.* 52.
Habitat in inſula Martinica, *griſolae magnitudine vel paulo major*, 6 *pollices longa.*
Verticis *pennae baſi*, remiges *margine albidae*; pedes *cinerei.*

fuſca. 8. M. fuſca, ſubtus ochroleuca, roſtro, vertice pedibusque nigris.
Muſcicapa carolinenſis fuſca. *Briſſ. av.* 2. *p.* 367. *n.* 6.
Gobe-mouche noirâtre de la Caroline. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 541.
Black-headed Fly-catcher. *Arct. zool.* 2. *p.* 387. *n.* 269.
Black-cap Fly-catcher. *Catesb. Car.* 1. *t.* 53. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 353. *n.* 53.
Habitat in Carolina, *luſciniae magnitudine*, $6\frac{1}{2}$ *pollices longa, hieme migrans.*
Cauda *ſubfurcata.*

Tyrannus. 4. M. cauda longiſſima forficata, corpore nigro ſubtus albo.
Tyrannus cauda bifurca. *Briſſ. av.* 2. *p.* 395. *n.* 20. *t.* 39. *f.* 3.
Savana. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 557. *t.* 26.
Tyran à queue fourchue. *Buff. pl. enl. n.* 571. *f.* 2.
Fork-tail Fly-catcher. *Arct. zool.* 2. *p.* 385. *n.* 265. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 355. *n.* 59.
Habitat in Canada *et* Surinamo, *alaudae criſtatae magnitudine*, 14 *pollices longa.*
Verticis *pennae mediae baſi flavae*; cervix, dorſum, uropygium, tectrices *alarum minores et* humeri *cinerea*; tectrices *alarum majores* remigesque *fuſcae*, *hae margine interiori albae*; rectricum *extimae exterieri latere dimidiato-albae.*

forficata. 22. M. dilute griſea, ſubtus alba, cauda forficata, remigibus rectricibusque nigris margine griſeis, harum extimis extus dimidiato-albis.
Moucherolle à queue fourchue du Mexique. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 564. *Pl. enl. n.* 677.
Swallow-tailed Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 356. *n.* 60.
Habitat in nova Hiſpania, *alaudae magnitudine*, 10 *pollices longa.*

Roſtrum pedes*que nigri*; iridēs *rubrae*; *infra alas area rubra*; tectrices *alarum margine pallidae*, *minores ceterum cinereae*, *majores nigricantes*; cauda 5 *pollices longa.*

ſurinama. 5. M. cauda rotundata apice alba, corpore nigro ſubtus albo.
Surinam Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 361. *n.* 69.
Habitat Surinami.

ſuliginoſa. 23. M. ex atro fuſca, pennarum margine ex flavicante fuſco, ſubtus albida, rectricum aequalium remigumque margine albido.
Gobe-mouche brun de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 536. *Pl. enl. n.* 574. *f.* 1.
Brown Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 361. *n.* 70.
Habitat in Cayenna, *vix* 4 *pollices longa.*
Roſtrum pedes*que atri*; pectori *adſperſus color fuſceſcens.*

aurantia. 24. M. rufa tinctu viridi adſperſo, ſubtus alba, pectore aurantio, capite et cervice ex vireſcente fuſcis, remigibus nigris margine rufis.
Gobe-mouche roux à poitrine orangée de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 537. *Pl. enl. n.* 831. *f.* 1.
Orange-breaſted Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 361. *n.* 71.
Habitat rarior in Gujanae *ſilvarum limitibus et uliginibus*, $4\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum *atrum*; pedes *pallidi.*

coronata. 25. M. fuſca, criſta capitis rotundata, temporibus et corpore ſubtus rubris.
Rubin ou Gobe-mouche huppé. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 547. *Pl. enl. n.* 675. *f.* 1.
Round-creſted Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 362. *n.* 72.
Habitat ad fluvium Amazonum, $5\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Criſta *ingens*, *feminae nulla*; remiges *margine griſei*; pedes *rubeſcentes.*

rufeſcens. 26. M. nitente-rufeſcens, ſubtus alba, remigibus nigris, verticis litura fuſca.
Gobe-mouche roux de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 549. *Pl. enl. n.* 453. *f.* 1.
Rufous Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 362. *n.* 73.
Habitat in Cayenna, *fringillae domeſticae magnitudine*, $5\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum pedes*que atri.*

27. M.

cinerea. 27. M. cinerea, uropygio, cauda et corpore ſubtus rufis.
Muſcicapa cayenenſis rufa. *Briſſ. av. app. p.* 51. *t.* 3. *f.* 3.
Rufous bellied Flycatcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 363. *n.* 74.
Habitat in Cayenna, *alaudae criſtatae magnitudine*, $8\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Mandibula *ſuperior atra*, *inferior griſea*; gutturis *pennae margine albidae*; remiges *margine rufae.*

pygmaea. 28. M. ſubtus ſtraminea, capite et cervice rufis nigro-maculatis, pennis dorſi et tectricibus alarum cinereis, margine vireſcentibus, remigibus nigris margine griſeis, cauda nigra brevi.
Gobe-moucheron. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 554.
Petit Gobe-mouche tacheté de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 831. *f.* 2.
Dwarf Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 363. *n.* 75.
Habitat in Cayenna, *vix tres pollices longa.*
Roſtrum *atrum*; ſtria *infra oculos pallida*; humeri *et* uropygium *dilute cinerea*; pedes *incarnati.*

minuta. 29. M. ex olivaceo griſea, alis nigricantibus hinc inde ochroleuco-ſtriatis.
Gobe-moucheron. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 553.
Petty Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 364. *n.* 76.
Habitat in America *auſtrali*, *pygmaea paulo major.*
Dorſo *ſuperiori et* abdomini *tinctus vireſcens adſperſus.*

barbata. 30. M. ex olivaceo fuſca, ſubtus ex vireſcente flava, vertice aurantio, uropygio flavo.
Barbichon de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 534. *Pl. enl. n.* 830. *f.* 1. 2.
Whiſkered Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 364. *n.* 77.
Habitat in Cayenna, mare *feminam utplurimum comitante, fringillae domeſticae magnitudine*, 5 *pollices longa*, *ſuaviter fiſtulans*, *in arborum ramis foliorum fere expertibus ex muſcis nidum ſtruens*, 12 *pollices profundum*, *et diametri* 5 *pollicum*, 3 *pollicum ſpatio a vertice apertum.*
Roſtrum *todi*, *ſetis baſin cingentibus brevius*; pedes *fuſci.*

rubricollis. 31. M. nigra, menti gutturisque area ingente rubra.
Piauhau. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 588.
Muſcicapa cayenenſis nigra major. *Briſſ. av.* 2. *p.* 386. *n.* 15. *t.* 38. *f.* 3.
Grand Gobe-mouche noir de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 381.
Purple-throated Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 365. *n.* 78.

Habitat in Americae *auſtralis potiſſimum ſilvis, merulae magnitudine,* 12 *pollices longa, gregaria, agilis, voce acuta ſaepius iterata, fructibus quoque victitans, ramphaſti ſocietatem amans.*
Roſtrum *atrum.*

crinita. 6. M. capite criſtato colloque caeruleſcente, abdomine flaveſcente, dorſo vireſcente, remigibus rectricibusque rufis.
Muſcicapa virginiana criſtata. *Briſſ. av.* 2. *p.* 412. *n.* 28.
Moucherolle de Virginie à huppe verte. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 565.
Gobe-mouche huppé de Virginie. *Buff. pl. enl. n.* 569. *f.* 1.
Creſted Fly-catcher. *Arct. zool.* 2. *p.* 386. *n.* 267. *Catesb. Car.* 1. *t.* 52. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 357. *n.* 61.
Habitat aeſtate in Carolina *et* Virginia, *ex pilis et ſerpentum exuviis nidum ſtruens in arboribus cavis, vocem rixantis edens, alaudae criſtatae magnitudine,* 8 *pollices longa.*
Roſtrum pedes*que nigri;* caput, cervix *et* dorſum *viridia;* alae tectrices*que caudae fuſcae;* mentum, guttur et pectus *cinerea;* remiges rectrices*que fuſcae; illae margine utrinque badiae,* tectrices *laterales margine interiori.*

ferox. 32. M. fuſca, mento, gutture et pectore cinereis, abdomine flaveſcente, tectricibus alarum majoribus margine olivaceis.
Tyrannus cayenenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 398. *n.* 21.
Tyran de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 581.
Tyrant Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 357. *n.* 62.
β) Tyrannus cayenenſis minor. *Briſſ. av.* 2. *p.* 400. *n.* 22.
Petit tyran de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 571. *f.* 1.
Habitat in Cayenna, *ad* 7 *pollices longa.*
Pedes *nigricantes.*

ludoviciana. 33. M. ex cinereo fuſca ſubtus flavicans, gula ardeſiae colore, remigibus rectricumque margine rufis.
Tyran de la Louiſiane. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 583.
Louiſiane Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 358. *n.* 63.
Habitat in Louiſiana, *ferocis magnitudine.*
Tectricibus *alarum majoribus candor adſperſus.*

audax. 34. M. atra, pennarum margine ex rufo fuſco, ſubtus flaveſcens ad latera nigro-ſtriata, vertice (maris) flavo, facie, mento gulaque albis, ſtria oculari atra, uropygio caudaque ferrugineis.
Caudec. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 582.

Gobe-

Gobe-mouche tacheté de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 453. *f.* 2.
Yellow-crowned Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 358. *n.* 64.
Habitat ad ſinus Cayennae, *in humilioribus arborum ramis, inſectis aquaticis victitans, alaudae magnitudine*, 8 *pollices longa.*
Roſtrum *nigrum*; uropygii *pennae* rectrices*que ſupra medio atrae*; pedes *ex atro caerulei*; ungue *poſteriori reliquis longiore.*

atricapilla. 9. M. nigra, ſubtus, frontis macula et alarum ſpeculo albis, rectricibus lateralibus extus albis. *Kram. el. p.* 377. *n.* 16.
Motacilla remigibus extimo dimidiato extrorſum albo. *Fn. ſuec.* 1. *n.* 230. *t.* 1. *f.* 229.
Rubetra anglicana. *Briſſ. av.* 3. *p.* 436. *n.* 27.
Ficedula atricapilla ſe mutans. *Aldr. orn.* 2. *p.* 758.
Ficedula tertia Aldrovandi. *Will. orn. p.* 170.
Oenanthe noſtra quarta. *Raj. av. p.* 77. *n.* 5.
Traquet d'Angleterre. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 222.
Goldfinch. *Raj. av. p.* 77. *n.* 5. *Will. orn. p.* 266. *Edw. av. t.* 30.
Pied Fly-catcher. *Brit. zool.* 1. *n.* 135. *Arct. zool.* 2. *p.* 391. B. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 324. *n.* 2.
β) Muſcicapa nigra. *Briſſ. av.* 2. *p.* 381. *n.* 13.
γ) Motacilla nigra torquata. *Kram. el. p.* 377. *n.* 16.
Muſcicapa capite dorſoque atris, abdomine, collo, uropygio, alarum ſpeculo faſciaque frontali niveis, rectricibus extimis extus albis. *Jacq. Beytr. p.* 41. *n.* 32. *t.* 19.
Curruca tergo nigro. *Friſch av. t.* 24. b. 2.
Gobe-mouche noir à collier. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 520. *t.* 25. *f.* 1. *Pl. enl. n.* 565. *f.* 2. 3.
Habitat in Europa, $4\frac{3}{4}$ *pollices longa, ex paucis fibris muſcisque in arboribus cavis ſupra terram elatum ſtruens nidum, et* 6 *ova pariens.*
Roſtrum pedes*que nigri*; femina *fuſca, ſubtus exalbida, macula frontali nulla.*

Ruticilla. 10. M. nigra, pectore, macula alarum baſique remigum rectricumque flavis.
Moracilla Ruticilla. *Syſt. nat.* X. *p.* 186. *n.* 15.
Muſcicapa americana. *Briſſ. av.* 2. *p.* 383. *n.* 14.
Petit noir-aurore. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 546.
Gobe-mouche d'Amérique. *Buff. pl. enl. n.* 566. *f.* 1. 2.
Small black and orange coloured Bird. *Raj. av. p.* 188. *n.* 5. *Sloan. jam. p.* 312. *n.* 50.

Small american Red-ſtart. *Edw. av. t.* 80. *Catesb. Car.* I. *t.* 67.
Black-headed Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 398. *n.* 282. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 427. *n.* 18.

b) Yellow-tailed Flycatcher. *Edw. glean. t.* 251.
Habitat aeſtate in Americae *ſeptentrionalis ſilvis umbroſis, auctumno in* Jamaicam *vicinasque inſulas migrans*, 4¾ *pollices longa.*
Roſtrum *nigricans*; abdomen criſſum*que pallide aurantia*; cauda *aurantia*, *verſus finem nigra*; rectricibus *duabus intermediis totis nigris*; pedes *fuſci.* Femina (b) *ſupra ex fuſceſcente cinerea*, *ſubtus alba*; cauda, alarum *macula et* hypochondria *flava.*

✓ virens. II. M. fuſco-virens, ſubtus lutea, ſuperciliis albis.
Muſcicapa carolinenſis cinerea. *Briſſ. av.* 2. *p.* 368. *n.* 7.
Gobe-mouche brun de la Caroline. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 543.
Little brown Flycatcher. *Catesb. Car.* I. *p.* 54.
Cinereous Flycatcher. *Arct. zool.* 2. *p.* 387. *n.* 270. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 350. *n.* 47.
Habitat aeſtate in Carolina, *auctumno diſcedens, griſolae magnitudine*, 5¾ *pollices longa.*
Mandibula *ſuperior nigra*, *inferior flava*; caput *et* corpus *ſupra obſcure cinereum*, *ſubtus ochroleucum*; alae *fuſcae margine albae*; cauda *fuſca*; pedes *nigri.*

✓ viridis. 35. M. viridis, ſubtus flava, abdomine criſſoque exalbidis, ſuperciliis maculaque ſuboculari albis, cauda fuſca.
Merula viridis carolinenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 315. *n.* 55.
Merle vert de la Caroline. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 396.
Yellow breaſted Chat. *Catesb. Car.* I. *p.* 50.
Chattering Fly-catcher. *Arct. zool.* 2. *p.* 385. *n.* 266. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 350. *n.* 48.
Habitat in Carolinae *locis incultis*, *ad magnos fluvios*, *timida*, *pedibus extenſis volitans*, *canora*, *ſeminibus etiam ſolani cujusdam victitans*, *alauda paulo major*, 7¾ *pollices longa.*
Roſtrum *et* pedes *cum unguibus nigri*; linea *alba*, *mandibulae inferiori parallela.*

✓ ſibirica. 36. M. fuſca, gula et criſſo albo-maculatis.
Dun-Fly-catcher. *Arct. zool.* 2. *p.* 390. A. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 351. *n.* 49.

Habitat

Habitat circa lacum Baikal, *et in orientali* Sibiria *ad* Camtſchatcam *usque.*
Color *ſubtus in cinereum vergens.*

erythropis. 37. M. maculata, ſubtus alba, fronte rubra.
Red-faced Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 351. *n.* 50.
Habitat circa fluvium Jenilei.
Color *ſub alis rufus.*

cayanenſis. 12. M. fuſca, ſubtus lutea, ſuperciliis albis, vertice ſubaurantio.
Muſcicapa cayenenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 404. *n.* 24. *t.* 38. *f.* 4.
Gobe-mouche à ventre jaune. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 550. *Pl. enl. n.* 569. *f.* 2.
Cayenne Flycatcher et Yellow-bellied Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 355. *n.* 58. *p.* 359. *n.* 65.
Habitat in Cayenna *et inſula* S. Dominici, *alauda minor,* $7\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum pedes*que atri*; verticis *pennae mediae baſi aurantiae*; mentum *album*; corporis *pennae ſuperiores margine olivaceae*; remiges rectrices*que margine rufae.*

canadenſis. 13. M. cinerea, ſubtus lutea, loris luteis, vertice nigro maculato.
Muſcicapa canadenſis cinerea. *Briſſ. av.* 2. *p.* 406. *n.* 25. *t.* 39. *f.* 4.
Canada Fly-catcher. *Arct. zool.* 2. *p.* 388. *n.* 273. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 354. *n.* 5.
Habitat in Canada, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum *ex griſeo fuſcum*; macula *infraocularis nigra*; guttur *nigro-maculatum*; tectrices *alarum intus*, remiges rectrices*que ex griſeo fuſcae*, *margine cinereae*; pedes *flaveſcentes.*

cinnamomea. 38. M. ex flavicante cinnamomea, alarum faſcia, tectricumque apice flavis, remigibus atris margine ferrugineis.
Cinnamom Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 354. *n.* 56.
Habitat in Cayenna, 8 *pollices longa.*
Roſtrum *nigrum.*

ſpadicea. 39. M. ſpadicea, remigibus caudaque aequali fuſcis, tectricibus alarum margine rufis, uropygio flavo, abdomine criſſoque luteſcentibus.
Yellow-rumped Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 354. *n.* 57.
Habitat in Cayenna, 7 *pollices longa.*
Roſtrum *fuſcum.*

olivacea. 14. M. olivacea, ſubtus albidior, ſuperciliis albis, oculis rubris.
Muſcicapa jamaicenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 410. *n.* 27.
Gobe-mouche de la Caroline et de la Jamaïque. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 539.
Olive-coloured Flycatcher. *Edw. glean. t.* 253.
Red-eyed Fly-catcher. *Arct. zool.* 2. *p.* 387. *n.* 271. *Catesb. Car.* 1. *t.* 54. *Brown jam. p.* 476. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 351. *n.* 51.
β) Muſcicapa canadenſis olivacea. *Briſſ. av.* 2. *p.* 408. *n.* 26.
Habitat aeſtate in Carolina, *hieme in* Jamaica, $5\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum *plumbeum*; faſcia *ocularis fuſceſcens*, *huicque parallela altera albida*; remiges rectrices*que margine albae*; pedes *fuſci.*

ſenegalenſis. 15. M. varia, ſuperciliis albis, rectricibus extimis dimidiato-albis.
Muſcicapa ſenegalenſis pectore rufo. *Briſſ. av.* 2. *p.* 374. *n.* 10. *t.* 37. *f.* 2.
Gobe-mouche à bandeau blanc du Sénégal. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 528.
Gobe-mouche à poitrine rouſſe du Sénégal. *Buff. pl. enl. n.* 567. *f.* 1.
β) Muſcicapa ſenegalenſis, pectore nigro. *Briſſ. av.* 2. *p.* 376. *n.* 11. *t.* 37. *f.* 3.
Gobe-mouche à poitrine noire du Sénégal. *Buff. pl. enl. n.* 567. *f.* 2.
Habitat ad fluvium Senegal, $4\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum, genae, cauda, pedes *nigri*; cervix *et* gula *ex rufo alba*; dorſum, uropygium *et* humeri *ex nigricante*, *griſeo*, *et pauco albo varii*; pectus *rufeſcens*; jugulum, abdomen *et* criſſum *cum* alarum *margine et faſcia alba*; remiges *fuſcae*, *margine griſeae*; rectrices 4, 4 *apice*, *tres utrinque extimae apice et margine exteriori albae.*

criſtata. 40. M. capite criſtato et gutture nitente-nigris, corpore ſupra badio, ſubtus cinereo, cauda cuneiformi.
Muſcicapa ſenegalenſis criſtata. *Briſſ. av.* 2. *p.* 422. *n.* 33. *t.* 39. *f.* 2.
Gobe-mouche huppé du Sénégal. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 530. *Pl. enl. n.* 573. *f.* 2.
Creſted Senegal Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 329. *n.* 6.
Habitat ad fluvium Senegal, *motacillae flavae magnitudine*, $8\frac{1}{4}$ *pollices longa.*

Roſtrum

Roſtrum *cinereum*; tectrices *alarum majores* remigesque *fuſcae*, *margine badiae*; cauda *ex purpuraſcente badia*, 4 *pollices longa*; pedes *griſei*.

borbonica. 41. M. ſubtus cinerea, capite ex vireſcente atro, nitente-violaceo, dorſo caudaque dilute badiis, uropygio griſeo, remigibus nigris margine badiis.

Muſcicapa borbonica criſtata. *Briſſ. av.* 2. *p.* 420. *n.* 32. *t.* 39. *f.* 5.

Gobe-mouche huppé de l'isle de Bourbon. *Buff. pl. enl. n.* 573. *f.* 1.

Bourbon Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 330. *n.* 7.

Habitat in inſula Bourbon, *criſtata minor*, $5\frac{1}{3}$ *pollices longa*.

Roſtrum *griſeum*; tectrices *alarum minores dilute badiae*, *mediae nigrae apice rufae*, *majores nigrae apice albae*; pedes *fuſci*.

melanoptera. 42. M. cinerea, ſubtus alba, gutture ex fuſceſcente badio: faſcia ſubtus transverſa nigra, roſtro, alis, caudaque nigris.

Muſcicapa ſenegalenſis torquata. *Briſſ. av.* 2. *p.* 370. *n.* 8. *t.* 36. *f.* 1.

Gobe-mouche à gorge brune du Sénégal. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 533.

Gobe-mouche à gorge rouſſe. *Buff. pl. enl. n.* 567. *f.* 3.

Collared Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 330. *n.* 8.

Habitat ad fluvium Senegal, *griſeae magnitudine*, $4\frac{3}{4}$ *pollices longa*.

Tectrices *alarum faſcia alba*; remiges *margine griſeae*; rectrices 2 *intermediae totae nigrae*; *reliquae apice*, *extimae utrinque exteriori latere albae*.

nigrifrons. 43. M. fuſca, ſubtus ex olivaceo fuſca, fronte temporibusque nigris, mento gulaque flavis, rectricibus ex olivaceo fuſcis, intermediis duabus fuſcis.

Black-fronted Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 331. *n.* 9.

Magnitudo *atricapillae*; longitudo $4\frac{1}{2}$ *pollicum*; roſtrum *atrum*; pedes *nigri*.

leucura. 44. M. ex cinereo griſea, ſubtus alba, roſtro, pedibus, et rectricibus intermediis nigris, reliquis dimidiato-oblique albis, extimis fere totis albis.

White-tailed Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 331. *n.* 10.

Habitat ad caput bonae ſpei, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa*.

pondiceriana. 45. M. ex cinereo griſea ſubtus alba, rectricibus lateralibus dimidiato, macula tectricum alarum et ſuperciliis albis.

Gobe-mouche de Pondichery. *Sonner. it.* 2. *p.* 198.
Coromandel Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 331. *n.* 11.
Habitat in Coromandel, *grate canens, fringilla domeſtica paulo major.*
Roſtrum pedes*que nigri.*

afra. 46. M. ſordide flaveſcens atro-maculata, vertice rufo atro-ſtriato, cauda alisque rufis, his margine fuſcis.
Spotted yellow Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 332. *n.* 12.
Habitat ad caput bonae ſpei, 8 *pollices longa.*
Colli *latera lituris* 2-3 *atris;* ſtria *atra ab angulis* oris *producta;* pedes *ex atro cinerei.*

cana. 47. M. cinerea, capite, nucha gulaque nigricantibus, criſſo albo, remigibus atris margine cinereis, roſtro caudaque nigris, rectricibus lateralibus apice cinereis, intermediis cinereis, apice nigricantibus.
Muſcicapa madagaſcarienſis cinerea major. *Briſſ. av.* 2. *p.* 389. *n.* 17. *t.* 36. *f.* 1.
Kinki-manou de Madagaſcar. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 584.
Grand Gobe-mouche cendré de Madagaſcar. *Buff. pl. enl. n.* 541.
Aſh-coloured Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 332. *n.* 13.
Habitat in Madagaſcar, $8\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

madagaſcarienſis. 48. M. olivacea, gula flava, jugulo et pectore flavicantibus.
Ficedula madagaſcarienſis major. *Briſſ. av.* 3. *p.* 482. *n.* 46. *t.* 24. *f.* 5.
Vira-ombé de Madagaſcar. *Sonner. it.* 2. *p.* 198.
Madagaſcar Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 333. *n.* 14.
Habitat in Madagaſcar, *alaudae magnitudine*, $7\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum *fuſcum;* pedes *griſei.*

undulata. 49. M. ex albido et fuſco undulata, capite ex nigricante, alis ex rufo fuſcis.
Gobe-mouche de l'isle de France. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 527.
Undulated Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 333. *n.* 15.
Habitat in inſula Franciae, *atricapilla minor et brevior.*

Teſtes. 50. M. fuſca maculis exilibus rufis varia, ſubtus rufeſcens, gutture exalbido, rectricibus remigibusque fuſcis margine, his quoque apice rufis.

Muſci-

Muſcicapa borbonica. *Briſſ. av.* 2. *p.* 360. *n.* 2. *t.* 30. *f.* 1.
Indian Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 334. *n.* 16.
Habitat in inſula Bourbon, *griſolae magnitudine*, $4\frac{3}{4}$ *pollicum longitudine.*
Roſtrum pedesque *fuſci*; femina *eas partes exalbidas habet, quae mari rufae ſunt.*

rufiventris. 51. M. nigra, criſſo et tectricibus caudae inferioribus rufis, pedibus rubeſcentibus.
Gobe-mouche de l'isle de Bourbon. *Buff. pl. enl. n.* 572. *f.* 3.
Rufous-vented Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 334. *n.* 17.
Habitat in inſula Bourbon, $4\frac{3}{4}$ *pollices longa.*

comata. 52. M. nigra, ſubtus, uropygio, rectricumque intermediarum apice albo, criſſo flavo, capite criſtato.
Tufted Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 334. *n.* 18.
Habitat in Zeylon.
Pedes *caeruleſcentes.*

haemorrhouſa. 53. M. fuſco-nebuloſa, ſubtus alba, criſſo rubro, capite ſubcriſtato caudaque nigris.
Red-vented Fly-catcher. *Brown illuſtr. p.* 78. *t.* 31. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 335. *n.* 19.
β) Muſcicapa criſſo flavo, cauda atra: faſcia verſus apicem alba.
Yellow-vented Fly-catcher. *Brown illuſtr. p.* 76. *t.* 31.
Habitat in Zeylon, *β*) *in* Java, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Pedes *atri.*

pſidii. 54. M. fuſca, ſubtus alba, criſſo flaveſcente, roſtro, vertice, loris pedibusque nigris, ſuperciliis albis.
Petit Goiavier de Manille. *Sonner. it. p.* 59. *t.* 28.
Guava Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 335. *n.* 20.
Habitat in Manilla *circa habitationes, frequens in pſidio, fringilla domeſtica paullo minor.*
Irides *flaveſcentes.*

melanictera. 55. M. capite genisque nigris, dorſo et tectricibus alarum ex cinereo fuſcis flavo-variis, pectore flavo, remigibus rectricibusque atris margine flaveſcentibus.
Yellow-breasted Fly-catcher. *Brown illuſtr. p.* 80. *t.* 82. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 336. *n.* 21.
Habitat in Zeylon, *carduelis magnitudine, cantu ſuavi.*
Roſtrum *griſeum*; pedes *caeruleſcentes.*

56. M.

nitens. 56. M. viridi-aurea, alis atris, gutture et pectore rufis, uropygio et abdomine flavis, rectricibus longis extus viridibus, intus atris.
Green Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 336. *n.* 22.
Habitat in India.

finenſis. 57. M. ex virescente griſea, roſtro, capite pedibusque nigris, gula alba, jugulo et pectore griſeis, abdomine et criſſo flavescentibus, remigibus ex flavicante viridibus.
Gobe-mouche verdâtre de la Chine. *Sonner. it.* 2. *p.* 151.
Wreathed Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 336. *n.* 23.
Habitat in Sina, *fringilla domeſtica major.*

griſea. 58. M. nigra, ſubtus rubeſcens, gutture griſeo, tectricum alarum faſcia alba, cauda ſubcuneata.
Grey-necked Fly-catcher. *Lat. ſyn.* II. 1. *p.* 337. *n.* 24.
Habitat in Sina.
Pedes *ex flavicante fuſci.*

flavicollis. 59. M. ſupra viridis, vertice areaque oculorum flavescentibus, facie nigra, gutture et remigum rectricumque margine flavo, abdomine virescente maculis tribus flavis vario.
Yellow-necked Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 337. *n.* 25.
Habitat in Sina, $6\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum *rubrum; ad utrumque* mandibulae *latus ſtria nigra;* cauda *ſubforficata;* rectrices 2 *intermediae apice albae;* pedes *rubeſcentes.*

flammea. 60. M. nigra, dorſo, tectricibus alarum ultimis, pectore, criſſo, remigum ſecundariarum margine, rectricumque apice aurantiis. *Ind. zool. p.* 25. *t.* 15.
Flammeous Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 338. *n.* 26.
Habitat in India.
Feminae caput *et* dorſum *cinerea;* abdomen *et* criſſum *flavescentia;* uropygium *et* alarum *faſcia transverſa aurantia;* cauda *ſubtus flava.*

fuſcescens. 61. M. fuſcescens, ſubtus exalbida, capite ſubcriſtato, uropygio criſſoque aurantiis.
Orange-vented Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 338. *n.* 27.
Habitat in Sina, 6 *pollices longa.*
Roſtrum *rubrum;* cauda *ſubforficata;* pedes *purpuraſcentes.*

luzonien-ſis. 62. M. nigra violaceo-nitens, ſubtus griſea, alis litura media alba.

Gobe-

Gobe-mouche noir de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p.* 58. *t.* 27. *f.* 2.
Black Fly-catcher. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 338. *n.* 28.
Habitat in insulis Philippinis *et* Madagascar, *puri caudati magnitudine.*

philippensis. 63. M. ex griseo fusca, subtus albida, superciliis albis.
Moucherolle des Philippines. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 565.
Philippine Fly-catcher. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 339. *n.* 29.
Habitat in insulis Philippinis, *lusciniae magnitudine.*

caerulea. 64. M. caerulea, occipitis pectorisque macula nigra, abdomine crissoque ex caerulescente albis, remigibus rectricibusque ex caeruleo atris.
Petit azur. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 534.
Gobe-mouche bleu des Philippines. *Buff. pl. enl. n.* 666. *f.* 1.
Azure Fly-catcher. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 339. *n.* 30.
Habitat in insulis Philippinis, 5 *pollices longa.*
Rostrum *nigrum*; remiges *margine ex caeruleo griseae*; pedes *dilute spadicei.*

cyanocephala. 65. M. rubra, subtus fuscescens, capite caeruleo, rectricum apice nigro.
Gobe-mouche à tête bleuâtre de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p.* 57. *t.* 26. *f.* 1.
Blue-headed Fly-catcher. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 339. *n.* 31.
Habitat in insula Manilla, *linotae magnitudine.*
Rostrum pedes*que fusci.*

manillensis. 66. M. occipite dorsoque griseo, capite reliquo nuchaque nigris, dorsi medio badio, gula flava, rectricibus intermediis nigris, lateralibus albis.
Gobe-mouche à gorge jaune de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p.* 57. *t.* 26. *f.* 2.
Yellow-throated Fly-catcher. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 340. *n.* 32.
Habitat in insula Manilla, *cyanocephala paulo major.*
Rostrum, remigum *nigrarum margo*, pedes*que fusci*; genarum *fasciae duae transversae*, hypochondria, *et* crissum *alba*; pectus *rubescens*; abdominis *medium flavum.*

flabellifera. 67. M. supra olivacea, subtus ferruginea, superciliis, mento, gula, lateribus colli rectricibusque lateralibus albis, intermediis, capite et torque nigris.
Fan-tailed Fly-catcher. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 340. *n.* 33. *t.* 49.
Habitat

Habitat in nova Seelandia, *pari biarmici magnitudine*, $6\frac{1}{2}$ *pollices longa*, *cauda flabelli inſtar expanſa volitans*, *facile cicuranda*, *fritinniens potius*, *quam canens*. Forſter.
Roſtrum *nigrum*; tectrices *alarum apice albae*; cauda *cuneiformis*; pedes *atri*.

ſuperciliola. 68. M. cinerea ſubtus ex rubeſcente alba, ſuperciliis nigris, cauda cuneiformi, rectricibus intermediis nigris, proxima utrinque apice, reliquis omnino albis.
Supercilious Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 341. *n.* 34.
Longitudo $4\frac{1}{2}$ *pollicum*; roſtrum *nigrum*; pedes *fuſci*.

caledonica. 69. M. olivacea, ſubtus ochroleuca, mento criſſoque flavis, remigibus ferrugineis.
Olive Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 342. *n.* 35.
Habitat in nova Caledonia, *fringillae caelibis magnitudine*, 6 *pollices longa*.
Pedes *atri*.

lutea. 70. M. ochracea, tectricibus alarum remigibusque atro-maculatis, cauda apicem verſus atra.
Luteous Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 342. *n.* 36.
Habitat in inſula Tahiti, 6 *pollices longa*.
Roſtrum *et* irides *plumbeae*; pedes *cinerei*, unguibus *nigris*.

ochrocephala. 71. M. capite, collo et pectore aureis, corpore ſupra ex flavicante viridi, ſubtus albo.
Yellow-headed Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 342. *n.* 37.
Habitat in nova Seelandia, $5\frac{1}{2}$ *pollices longa*.
Pedes *nigri*; unguibus *nigris*.

flaviſrons. 72. M. ex flavo olivacea, ſubtus flava, fronte, oculis, rectricum fuſcarum remiguunque nigricantium margine flavis, arcu ſupraoculari albo.
Yellow-fronted Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 342. *n.* 38.
Habitat in inſula Tanna, $5\frac{1}{2}$ *pollices longa*.
Roſtrum *dilute plumbeum*; cauda *ex olivaceo fuſca*; pedes *caeruleſcentes*.

naevia. 73. M. nigra, dorſi medio humerisque albo-maculatis.
Naevous Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 343. *n.* 39.
Habitat in nova Caledonia, $8\frac{3}{4}$ *pollices longa*.
Irides *dilute cinereae*.

multicolor. 74. M. nigra, fronte alba, pectore et abdomine rubris, criſſo rubeſcente.

Red-

Red-bellied Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 343. *n.* 40. *t.* 50.
Habitat in inſulae Norfolk *locis incultis*, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.* Forſter.
Mandibula *inferior baſi flavicans*; tectrices *alarum inferiores albae*; pedes *longi*, *graciles*, *ex flavicante fuſci.*
Femina *fuſca*; mento *et* loris *ex cinereo fuſcis*; pectore *et* abdomine *dilute aurantiis*; criſſo *ochroleuco.*

ſandwichenſis. 75. M. fuſca, ſubtus ochroleuca, fronte ex fuſco luteſcente, ſuperciliis albis, mento pallido ſtriis atris picto, pectore et tectricum alarum margine ferrugineo, remigibus rectricibusque fuſcis apice albis.
Sandwich Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 344. *n.* 41.
Habitat in inſulis Sandwich, $5\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum *nigrum*, *baſi flavicans*; pedes *nigri*; rectrices *intermediae totae fuſcae.*

obſcura. 76. M. fuſca, abdominis tinctu in fuſcum vergente, rectricibus longis, aequalibus, acuminatis.
Dusky Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 344. *n.* 42.
Habitat in inſulis Sandwich, $7\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum *prope apicem leviter emarginatum*; pedes *atri.*

maculata. 77. M. ferruginea, ſubtus dilute ſpadicea, remigibus atris, tectricibus alarum macula prope apicem ex ferruginco alba, rectricibus fuſcis, extimis intus apice albis.
Spotted-winged Flycatcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 345. *n.* 43.
Habitat in inſulis Sandwich.
Roſtrum *nigrum*; mandibulae *inferioris baſi margine flava.*

capenſis. 16. M. fuſca ſubtus alba, pectore nigro, faſcia alarum rufa, rectricibus apice albis.
Muſcicapa capenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 372. *n.* 9. *t.* 36. *f.* 3.
Gobe-mouche du Cap de bonne eſpérance. *Buff. pl. enl. n.* 572. *f.* 1.
Habitat ad caput bonae ſpei, *an mera torquatae varietas?*
Vertex, tempora *et* cauda *cum* tectricibus *nigra*; gula *et* rectricum *apex albus*; tectrices *alarum fuſcae*, *faſcia rufa*; remiges *atrae*, *margine ex rufo griſeae*; pedes *ex flavicante fuſci.*

torquata. 17. M. nigra, ſubtus alba, pectore rufo, remigibus intimis apice albis.
Muſcicapa torquata capitis bonae ſpei. *Briſſ. av.* 2. *p.* 379. *n.* 12. *t.* 36. *f.* 4.

Gobe-

Gobe-mouche à collier du cap de bonne eſpérance. *Buff. pl. enl. n.* 572. *f.* 2.
Cape Fly-catcher. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 326. *n.* 3.
Habitat ad caput bonae ſpei, *atricapillae magnitudine.*
Colli *latera*, torques, *macula in medio alarum alba*; roſtrum *atrum*; pedes *fuſci.*

bicolor. 78. M. nigra, fronte, area oculorum, gutture, uropygio, alis ſpuriis, faſcia tectricum alarum majorum, rectricum apice et corpore ſubtus albis.
Gobe-mouche à ventre blanc de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 542. *Pl. enl. n.* 566. *f.* 3.
Black and white Fly-catcher. *Edw. glean. t.* 348. *f.* 1. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 327. *n.* 4.
β) Muſcicapa alba, occipite, cervice et artubus nigris.
Gillit ou Gobe-mouche pie de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 542. *Pl. enl. n.* 675. *f.* 1.
Habitat in Cayenna, β) *in* Gujanae *pratis humidis, haec* $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Femina β) *tota griſea.*

carolinenſis. 18. M. fuſca, ſubtus cinerea, capite nigro, criſſo rubro.
Muſcicapa virginiana fuſca. *Briſſ. av.* 2. *p.* 365. *n.* 5.
Moucherolle de Virginie. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 562.
Cat bird. *Catesb. Car.* 1. *t.* 66.
Cat Flycatcher. *Arct. zool.* 2. *p.* 388. *n.* 272. *Lath. ſyn.* II. 1. *p.* 353. *n.* 54.
Habitat aeſtate in Camtſchatcae, Virginiae, Carolinae, Noveboraci *fruticibus et dumetis potius, quam arboribus, animoſa, voce catum mentiens, nidum extus ex foliis et caricibus, intus ex radicum fibris ſtruens, et ovum caeruleum pariens, alauda paulo major*, 8 *pollices longa.*
Roſtrum vertex*que niger*; cauda *aequalis nigricans.*

ochroleuca. 29. M. ſordide olivacea, ſubtus ochroleuca, gula alarumque margine flavis, remigibus primariis rectricibusque olivaceis.
Goldenthroat Flycatcher. *Arct. zool.* 2. *p.* 389. *n.* 276.
Habitat in Noveboraco.

atra. 80. M. ex cinereo olivacea, pectore cinereo, abdomine ochroleuco, capite, cauda et remigibus atris, ſecundariis margine, rectricibus extimis extus albis.
Dusky Fly-catcher. *Arct. zool.* 2. *p.* 389. *n.* 275.

Habitat

Habitat in Noveboraco, *Martio apparens, Auguſto evaneſcens, apibus victitans, ova 5 alba exigua pariens.*
Pedes *nigri.*

novebora-censis. 81. M. viresceus, abdominis medio, alarumque fasciis duabus albis, gula cinerea, rostri macula utrinque et hypochondriis flavis, remigibus primoribus rectricibusque atris margine viridibus.
Green Fly-catcher. *Arct. zool.* 2. *p.* 389. *n.* 274.
Habitat rarior a Majo ad Auguſtum in Noveboraco.

acadica. 82. M. ex cinereo dilute viresceus, subtus ochroleuca, capite cristato, rectricibus remigibusque atris, secundariarum margine et tectricum fasciis duabus albis.
Lesser crested Fly-catcher. *Arct. zool.* 2. *p.* 386. *n.* 268.
Habitat in nova Scotia.
Pedes *nigri.*

Aëdon. 83. M. subtus ex flavescente alba, rectricibus ex cinereo fuscescentibus elongatis, mediis subaequalibus, extima utrinque longe breviore. *Pall. it.* 3. *p.* 695. *n.* 12.
Habitat crebra in Dauuriae *rupestribus, apricis, turdi arundinacei fere magnitudine et tinctu, noctu quoque suavissime canora.*

ferruginea. 84. M. ex fusco rufa, subtus ochroleuca, gula alba, alis nigris margine ferrugineis, rectricibus subtus glaucis supra atris margine fusceicentibus, extimis brevissimis albis. *Merrem Beytr.* 1. *p.* 23. *t.* 6.
Habitat in Carolina, *fringillae domesticae magnitudine,* 5½ *pollices circiter longa.*
Rostrum *nigrum, mandibularum margine fusco;* pedes *fusci.*

nigra. 85. M. tota nigra, rostro, capite, interscapulio pedibusque atris. *Sparrm. mus. Carls. t.* 23.
Habitat in insulis Societatis *maris australis.*

ochracea. 86. M. collo et pectore ex cinereo ferrugineis, alis et cauda ex nigro cinereis. *Sparrm. mus. Carls. t.* 22.
Habitat ad caput bonae spei.
Caput *et* dorsum *brunneum;* abdomen *ex ochraceo ferrugineum; prope* aures *fasciculi plumarum longiorum ciliatarum;* remiges, tectrices *alarum et* rectrices *apice et latere interiori nigrae, exteriori albae;* pedes *nigri,* unguibus *flavis;* cauda *longitudine corporis.*

rectricibus supra-alaribus et remigibus margine flavescentibus, rectricibus extimis apice albo notatis. Mus. Ad. F. n. 97.

albifrons. 87. M. supra ex nigro fusca, jugulo et pectore exalbidis, abdomine dilute ferrugineo, fronte albido, rostro pedibusque nigris. *Sparrm. mus. Carls. t.* 24.

Habitat ad caput bonae spei.

Remiges *primores fuscae, margine exteriori ferrugineae.*

melanoleuca. 88. M. nivea, pennarum basi fusca, pectore levissime flavescente, capite infra, collo ad medium usque, alis, rectricum apice, rostro pedibusque atris. *Güldenst. nov. comm. Petrop.* 19. *p.* 468. *n.* 3. *t.* 15.

Habitat aestate in Georgia *campestri, ad fluviorum ripas fruticetis obsitas, praesertim circa* Teflisium *ad ripas* Cyri, *magnitudine et ipso tinctu ad motacillam melanoleucam accedens, ultra sex pollices longa.*

Feminae *partes, quae mari albae sunt, sordide cinereae, quae mari nigrae, fuscae.*

petechia. 19. M. fusca subtus cinerea rufo-maculata, gutture crissoque rufis.

Muscicapa martinicana fusca. *Briss. av.* 2. *p.* 364. *n.* 4. *t.* 38. *f.* 1.

Moucherolle brun de la Martinique. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 563.

Gobe-mouche brun de la Martinique. *Buff. pl. enl. n.* 568. *f.* 2.

Petechial Fly-catcher. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 360. *n.* 66.

Habitat in insula Martinica, *alaudae cristatae magnitudine,* $6\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

Rectrices *laterales margine fuscescentes et albae.*

virgata. 89. M. fusca, subtus ex fuscescente alba: striis longitudinalibus fuscis, vertice subcristato ex cinereo et flavo vario, margine remigum, et tectricum fasciis duabus rufis.

Gobe-mouche tacheté de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 545. *Pl. enl. n.* 574. *f.* 3.

Streaked Fly-catcher. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 360. *n.* 67.

Habitat in Cayenna, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

Rostrum *nigrum*; pedes *fusci.*

agilis. 90. M. ex olivaceo fusca, subtus exalbida, remigibus rectricibusque nigris margine ex olivaceo fuscis.

Gobe-mouche olive de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 544. *Pl. enl. n.* 574. *f.* 2.

Active Fly-catcher. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 360. *n.* 68.

Habitat in Cayenna, *virgatae magnitudine, perpetim insecta venans, eaque sub cortice arborum quoque quaerens.*

Rostrum

Rostrum *nigricans*; gulae *tinctus in rufum vergens*; cauda *longa*; pedes *fusci*.

Grisola. 20. M. subfusca, subtus albicans, collo longitudinaliter maculato, crisso rufescente.

Muscicapa. *Briss. av.* 2. *p.* 357. *n.* 1. *t.* 35. *f.* 3.
Curruca subfurca. *Frisch av. t.* 22?
Currucis f. Ficedulis cognata. *Gesn. av.* 629.
Grisola. *Aldr. orn.* 2. *p.* 737. *t.* 738. *Will. orn. p.* 211. *Raj. av. p.* 81. *n.* 7.
Stoparola. *Raj. av. p.* 77. *n.* 1. *Will. orn. p.* 217.
Gobe-mouche. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 517. *t.* 25. *f.* 2. *Pl. enl. n.* 565. *f.* 1.
Cob web. *Mort. Northampt. p.* 426.
Spotted Fly-catcher. *Brit. zool.* 1. *n.* 134. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 323. *n.* 1.

Habitat in Europa, *motacillae sylviae magnitudine*, $5\frac{3}{4}$ *pollices longa, cerasis infesta, insecta sub alis colligens, ex muscis aut lana fibrisque in arboris aut murorum &c. cavis nidum struens, et ova* 4-5 *pallida rubescente maculata pariens.*

Rostrum *atrum*, *basi albidum*; faux *flava*; caput *magnum*, *fuscescens*, *nigro-maculatum*; dorsum *murinum*; alae *margine albae*, *ceterum cum cauda atrae*; gula *rubro-maculata*; pedes *nigri*.

variegata. 21. M. fusca, subtus, fronte, uropygioque albis.

Habitat in India, *motacillae albae statura, an mera atricapillae varietas?*

Tempora, femora, *lineola ab* humeris *ad medium* dorsum *ducta alba.*

dichroa. 91. M. corpore supra cinereo subtus ochraceo, rectricibus partim ochraceis partim cinereis.

Muscicapa bicolor. *Sparrm. mus. Carls.* 2. *t.* 46.

Habitat in Africa *meridionali*, *rostro pedibusque nigricantibus.*

deserti. 92. M. corpore ex ferrugineo et nigricante fuliginoso, alis caudaque nigricantibus, rostro flavicante.

Muscicapa fuliginosa. *Sparrm. mus. Carls.* 2. *t.* 47.

Habitat in Africae *deserto inter fluvium* Hevy *et fontem* Quammedacka *intermedio*, *pedibus nigris.*

114. MOTACILLA.

Roſtrum ſubulatum, rectum: Mandibulis ſubaequalibus.

Nares obovatae.

Lingua lacero-emarginato.

α) **Luſcinia. 1. M.** rufo-cinerea, armillis cinereis. *Fn. ſuec.* 244. *Kram. el. p.* 375. *n.* 9. *p.* 376. *n.* 10. *Brünn. orn. p.* 79. *Müll. zool. p.* 32. *n.* 265. *Nozem. nederl. Vogel t.* 64.
Sylvia Luſcinia. *Scop. ann.* I. *n.* 227.
Luſcinia. *Geſn. av.* 592. *Aldr. orn.* 2. *p.* 771. *t.* 777. *Briſſ. av.* 3. *p.* 397. *n.* 13.
Ruſignuolo. *Olin. ucc. t.* 1.
Roſſignol. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 81. *t.* 6. *f.* 1. *Pl. enl. n.* 615. *f.* 2.
Nightingale. *Brit. zool.* 1. *n.* 145. *Arct. zool.* 2. *p.* 416. A. *Raj. av. p.* 78. *Will. orn. p.* 270. *t.* 41. *Alb. av.* 3. *t.* 53. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 408. *n.* 1.
Nachtigall. *Friſch av. t.* 21.

β) Luſcinia major. *Briſſ. av.* 3. *p.* 400. A.
Grand Roſſignol. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 113.
Slowik wiekſzy. *Rzaſcz. pol. auct. p.* 391.
Groſe Nachtigalle. *Schwenkf. theriotr. p.* 296.
Sproſsvogel. *Friſch av. t.* 21.

γ) Luſcinia alba. *Briſſ. av.* 3. *p.* 401. B. *Aldr. orn.* 2. *p.* 771.
Roſſignol blanc. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 114.

Habitat in Europa *et* Aſia, $6\frac{1}{4}$ *pollices longa, ſolitaria, vere potiſſimum tempore ſuaviſſime canora, facile cicuranda, nidum in dumetis humilioribus ſepibusque folioſis, extus ex foliis ſiccis, gramine fibrisque, intus ex pilis et lanugine ſtruens, et ter quaterve quotannis ova* 4-5 *ex vireſcente fuſca pariens, quibus femina muta, accinente mare incubat; formicarum aliorumque inſectorum larvis victitans. Caro ſapida.*

Roſtrum *fuſcum*; caput *et* dorſum *dilute muſtelina, maculis olivaceis*; cauda *ex muſtelino rubra*; corpus *ſubtus dilute cinereum*; pedes *et* remiges *ex cinereo fuſcae, hae margine exteriori ſpadiceae.*

Calidris. 2. M. ſupra fuſco vireſcens, ſubtus fulva, linea oculari ſubocularique nigra.
Ficedula jamaicenſis major. *Briſſ. av. app. p.* 101.

Grand

Grand Fiquier de la Jamaique. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 320.
Watchy Picket, Spaniſh Nightingale or American Hangneſt. *Sloan. jam.* 2. *p.* 299? *Raj. av. p.* 184. *n.* 27?
American Nightingale. *Edw. av. t.* 121. *f.* 2.
Hang-neſt Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 497. *n.* 129.
Habitat in Jamaica, *nidum penſilem ex tillendſia ſtruens, rubeculae magnitudine.*
Roſtrum *nigricans*, *mandibula inferiore nigricante*; rectrices *laterales et* remiges *intus rufae*; tempora *aurantia*; tectrices *alarum margine flavicantes*; pedes *nigricantes.*

bonarienſis. 52. M. nigra, gutture et hypochondriis ferrugineis, facie, mento, abdominis medio et rectricibus extimis albis.
Demi-fin noir et roux. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 328.
White-chinned Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 497. *n.* 30.
Habitat in Bonaria, *linotae magnitudine*, $5\frac{3}{8}$ *pollices longa.*
Roſtrum *nigricans*; unguis *poſterior magnus.*

palmarum. 53. M. fuſca, ſubtus ſordide ochroleuca, abdomine flaveſcente, uropygio olivaceo, rectricibus duabus extimis faſcia intus prope apicem alba.
Bimbelé ou fauſſe Linotte. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 330.
Palm Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 498. *n.* 131.
Habitat in inſula S. Dominici, 5 *pollices longa*, *ſeminibus fructibusque victitans*, *voce dulci*, *grata*, *neque tamen multum variata canens*, *inter palmas nidificans*, 2-3 *ova pariens.*

bananivora. 54. M. ex atro griſea, ſubtus flaveſcens, axillis flavis, criſſo ex flavo et griſeo vario, gula cinerea, rectricum apice, alarum macula et ſuperciliis albis, loris nigris.
Bananiſte. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 332.
Banana Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 498. *n.* 132.
Habitat in inſulae S. Dominici *inculti*s *potiſſimum*, *etiam muſis*, *quarum fructibus*, *praeterea pomis aurantiis*, *fructibus caricae*, *ſeminibus*, *inſectisque victitat*; *velociter*, *ſed per ſaltus volans*, *voce parum variata canens*, *in ſalicibus nidificans*, $3\frac{3}{4}$ *pollices longa.*

vermivora. 55. M. olivacea, capite, gutture et pectore fulvis, faſcia oculari et arcu ſuperciliari nigris, linea ſupraoculari flavicante, criſſo cinereo.
Ficedula penſilvanica. *Briſſ. av.* 6. *app. p.* 102, *n.* 76.
Demi-fin mangeur de vers. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 325.

Worm-eater. *Arct. zool.* 2. *p.* 406. *n.* 300. *Edw. glean. t.* 305. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 499. *n.* 133.
Habitat a Julio ad auctumnum in Pensilvania, *migratoria, modularis magnitudine.*
Rostrum *atrum, subtus incarnatum*; pedes *incarnati.*

madagascariensis. 56. M. ex olivaceo fusca, capite rufo, gula alba, pectore rufescente, abdomine ex rufo fusco.
Luscinia madagascariensis. *Briss. av.* 3. *p.* 401. *n.* 14. *t.* 22. *f.* 1.
Foudi-jala. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 116.
Madagascar Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 412. *n.* 2.
Habitat in Madagascar, *luscíniae magnitudine*, $6\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Rostrum pedes*que fusci.*

modularis. 3. M. supra griseo-fusca, tectricibus alarum apice albis, pectore caerulescente-cinereo. *Fn. suec.* 245.* *Brünn. orn. p.* 70. *n.* 269. *Müller zool. p.* 32. *n.* 266.
Curruca sepiaria. *Briss. av.* 3. *p.* 394. *n.* 12.
Curruca Eliotae. *Will. orn. p.* 215. *Raj. av. p.* 79. *n.* 6.
Passer rubi. *Aldr. orn.* 2. *p.* 738.
Magnanina. *Aldr. orn.* 2. *p.* 736. *Will. orn.* 158.
Prunella. *Gesn. av.* 653.
Traïne-buisson, Mouchet ou Fauvette d'hiver. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 151. *t.* 9. *Pl. enl. n.* 615. *f.* 1.
Hedge Sparrow. *Alb. av.* 3. *t.* 59.
Hedge Warbler. *Brit. zool.* 1. *n.* 150. *Arct. zool.* 2. *p.* 418. H. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 419. *n.* 9.
Braunflekige Grasmüke. *Frisch av. t.* 21. *Günth. Nest. u. Eyer t.* 1. *f. inf.*
Habitat in Europae *sepibus in australioribus ejus partibus migratoria*, $5\frac{1}{4}$ *pollices longa, per totam hiemem canens, ex muscis lanaque nidum struens, pilisque sternens, et* 4-5 *ova caerulescentia pariens.*
Rostrum *nigricans*; genae *exalbido-virgatae*; dorsi *pennae et* tectrices *alarum atrae, margine spadiceae*; remiges *et* cauda *atrae*; uropygium *ex virescente fuscum*; gula *et* pectus *cinerea*; abdomen *exalbidum*; crissum *flavescens*; pedes *incarnati.*

juncorum. 57. M. fusca, subtus dilutius tincta, cauda subfurcata.
Passer virginianus. *Briss. av.* 3. *p.* 101. *n.* 14.
Little brown Sparrow. *Catesb. Car.* 1. *t.* 35.
Rush Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 415. *n.* 323. *Lath. syn.* II. 1. *p.* 420. *n.* 10.

Habitat

Habitat solitaria in Virginia *et* Carolina, *prope domicilia, rarior, modulari minor.*

aquatica. 58. M. supra pallide rufescens, fusco-maculata, gula et pectore rufescente, abdomine et uropygio albido.
Sylvia Schoenobaenus. *Scop. ann.* I. *p.* 158. *n.* 235.
Aquatic Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 419. *n.* 8.
Migrat, antequam colchicum floret, nidificat in terra, crebro cacumini plantarum insidet.
Macula *supra canthum oculi externum et* fascia *ad basin alae alba*; rectrices *acuminatae.*

Schoenobaenus. 4. M. testaceo-fusca, subtus pallide testacea, capite maculato.
Fn. suec. 246.* *Forsk. Fn. arab. p.* 6. *n.* 17.
Motacilla yvica. *Hasselq. it. p.* 286. *n.* 50.
Curruca silvestris s. Luscinia. *Briss. av.* 3. *p.* 393. *n.* 11.
Luscinia. *Aldr. orn.* 2. *p.* 765. *Will. orn. p.* 237. *Raj. av. p.* 80. *n.* 1.
Fauvette des bois ou Rousette. *Buff. hist. nat. des oif.* 5. *p.* 139.
Bogrush. *Act. zool.* 2. *p.* 419. 1.
Red Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 418. *n.* 7.
Habitat in Europa, *hippolaidis magnitudine, mansueta, grate, etiam per hiemem cantans, in silvis nidum ex muscis et lana struens, et* 4-5 *ova coloris caelestis pariens.*
Rostrum *nigricans*; remiges *fuscae, margine rufae*; cauda *fusca*; pedes *albidi.*

campestris. 5. M. fusca, capite virescente-cinereo, rectricibus concoloribus, abdomine albido.
Curruca jamaicensis. *Briss. av. app. p.* 100.
Habit-uni. *Buff. hist. nat. des oif.* 5. *p.* 336.
American Hedge-Sparrow. *Edw. av. t.* 122. *f.* 1.
Simple Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 500. *n.* 134.
Habitat in Jamaica, *modularis magnitudine.*
Rostrum *nigrum*; collum *ex virescente cinereum*; corpus *subtus ex fusce scente album*; pedes *fusci.*

macroura. 59. M. fusca, subtus ochroleuca nigricante-maculata, superciliis albis, cauda cuneiformi.
Petite fauvette tachetée du cap de bonne espérance. *Buff. hist. nat. des oif.* 5. *p.* 161. *Pl. enl. n.* 752. *f.* 2.
Great-tailed Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 500. *n.* 135.
Habitat ad caput bonae spei, *curucae magnitudine, 6 pollices longa.*

longicauda. 60. M. olivacea, vertice rufescente, remigibus ex olivaceo fuscis, rectricibus longis angustis: intermediis longioribus.
Petit Figuier à longue queue de la Chine. *Sonner. it. 2. p. 206.*
Long-tailed Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 501. *n.* 136.
Habitat in Sina, *mitis, et grate canora.*

Curruca. 6. M. supra fusca, subtus albida, rectricibus fuscis: extima margine tenuiori alba. *Fn. suec.* 247. *Scop. ann.* 1. *n.* 228. *Müll. zool. p.* 32. *n.* 267.
Curruca garrula. *Briss. av.* 3. *p.* 384. *n.* 7. *Will. orn. t.* 23. *Raj. av. p.* 79. *n.* 6.
Luscinia altera. *Klein av.* 73. *t.* 1.
Hippolais s. Curruca. *Aldr. orn.* 2. *p.* 752. *t.* 753.
Cannavarola. *Aldr. orn.* 2. *p.* 754.
Beccafico canapino. *Olin. ucc. p.* 11. *f.* 2.
Fauvette babillarde. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 135. *Pl. enl. n.* 580. *f.* 3.
Kruka. *Act. zool.* 2. *p.* 422. U.
Babbling Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 417. *n.* 6.
Grasmüke. *Frisch av. t.* 21. *f.* 3. *Günth. Nest. u. Eyer t.* 15. *f. sup.*
Habitat in Europa *ab* Italia *ad* Sueciam *usque*, 5 *pollices longa, in sepibus nidificans, et ova virescentia fusco maculata pariens.*
Rostrum *nigricans*; vertex *et* stria *infraocularis cinerea*; remiges *margine interiori albae, exteriori ex rufo griseae, majores cinereae*; rectrices *margine griseae*; pedes *fusci.*

passerina. 61. M. cinerea, subtus ex griseo alba, superciliis albidis, remigibus caudaque atris.
Curruca minor. *Briss. av.* 3. *p.* 374. *n.* 3.
Borin. *Aldr. orn.* 2. *p.* 733. *t.* 734. *Johnst. av. t.* 44. *Raj. av. p.* 81. *n.* 10. *Will. orn. p.* 216.
Passerinette. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 123. *Pl. enl. n.* 579. *f.* 2.
Passerine Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 414. *n.* 4.
Habitat in Gallia *et* Italia, *hippolaide minor*, $5\frac{1}{4}$ *pollices longa, voce simplici, nidum ex herbis siccis in frutice humiliori prope terram struens, et* 4 *ova exalbida viridi-maculata pariens.*

Hippolais. 7. M. virescente-cinerea, subtus flavescens, abdomine albido, artubus fuscis, superciliis albidis. *Fn. suec.* 248.
Ficedula septima. *Aldr. orn.* 2. *p.* 759. *t.* 760.

Petty

Petty chaps or Beccafigo. *Brit. zool.* 1. *n.* 149. *Arct. zool.* 2. *p.* 418. G. *Raj. av. p.* 79. *n.* 7. *Will. orn. p.* 216.
Leſſer Pettychaps. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 413. *n.* 3.*
Habitat in Europa, *linota major, nidum ſtruens ex muſcis et plumis prope terram infra ceſpitem, aut ad radicem fruticis arcuatum, et ova pariens* 5 *alba, multis exiguis rubris maculis varia.*
Roſtri *mandibula ſuperior nigra, inferior caeruleſcens*; faux *incarnata*; *linea ſupra et infra* oculos *flavicans*; remiges rectricesque *murinae, margine virescentes, rachi nigrae*; tectrices *alarum inferiores flavae*; abdomen *argenteum.*

hortenſis. 62. M. ex griſeo fuſca, ſubtus ex rufo alba, ſuperciliis albidis, remigibus ex cinereo fuſcis, margine griſeis, rectricibus fuſcis: extima extus et verſus apicem intus exalbida.
Curruca. *Briſſ. av.* 3. *p.* 372. *n.* 2.
Fauvette. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 117. *t.* 7. *Pl. enl. n.* 579. *f.* 1.
Pettychaps. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 413. *n.* 3.
Habitat in Galliae *et* Italiae *campis et hortis frequens, modularis magnitudine,* 6 *pollices longa, nidum, aliquando ad piſi truncos, ex herbis ſiccis ſtruens, et fibris tenuibus pilisque ſternens, ova* 5 *pariens.*
Roſtrum *nigricans*; rectrices *laterales margine ex griſeo fuſcae*; pedes *fuſci.*

rufa. 63. M. ex rufo griſea, ſubtus rufeſcens, temporum ſtria longitudinali, remigibus rectricibusque rufeſcentibus.
Curruca rufa. *Briſſ. av.* 3. *p.* 387. *n.* 8.
Fauvette rouſſe. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 146. *Pl. enl. n.* 581. *f.* 1.
Rufous Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 431. *n.* 22.
Kleinſte Grasmüke. *Friſch av. t.* 24.
Habitat in Galliae *et* Germaniae *hortis, ſalicaria minor, vix* $4\frac{3}{4}$ *pollices longa, nidum pilis ſtratum ad fruticem aliamve ſtirpem humilem ſtruens, et* 5 *ova pariens ex viresceute alba, obſcure maculata.*
Roſtrum *ex griſeo fuſcum*; pedes *fuſci.*

ſalicaria. 8. M. cinerea, ſubtus alba, ſuperciliis albis. *Fn. ſuec.* 249.*
Curruca arundinacea. *Briſſ. av.* 3. *p.* 378. *n.* 5.
Luſcinia ſalicaria. *Klein av.* 74.
Salicaria. *Geſn. ic.* 50. *Aldr. orn.* 2. *p.* 737. *Raj. av. p.* 81. *n.* 11. *Will. orn. p.* 217.

Avis consimilis stoparolae et magnaninae. *Raj. av. p.* 81. *n.* 6.
Fauvette des roseaux. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 142. *Pl. enl. n.* 581. *f.* 2.
Lesser Reed Sparrow. *Will. orn. p.* 144.
Sedge Bird. *Brit. zool.* 1. *n.* 155. *Artt. zool.* 2. *p.* 419. M. *Albin. av.* 3. *t.* 60.
Sedge-Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 430. *n.* 21.
Weiderich. *Günth. Nest. u. Eyer t.* 12.

Habitat in Europae *carectis et salicetis, atricapillae magnitudine, sed gracilior, per totam noctem cantans, aliarumque avium vocem imitans, ad infimos arborum ramos nidum ex stramine siccisque plantarum fibris struens, et pilis sternens, ova* 5 *pariens exalbida, fusco varia.*

Sylvia. 9. M. supra cinerea subtus alba, rectrice prima longitudinaliter dimidiato alba, secunda apice alba. *Fn. suec.* 250.* *Brünn. orn. p.* 71. *n.* 275. *Müll. zool. p.* 32. *n.* 269.
Curruca cinerea s. cineraria. *Briss. av.* 3. *p.* 376. *n.* 4. *t.* 21. *f.* 1.
Turdus calamoxenus. *Nozem. nederl. Vogel t.* 51.
Stoparola. *Aldr. orn.* 2. *p.* 732. *Raj. av. p.* 77. *n.* 6.
Fauvette grise ou Grisette. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 132. *Pl. enl. n.* 579. *f.* 3.
Vitrec à menton blanc. *Salern. orn. p.* 226. *n.* 6.
White Throat. *Brit. zool.* 1. *n.* 160. *Artt. zool.* 2. *p.* 422. S. *Raj. av. p.* 77. *n.* 1. *Will. orn. p.* 236. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 429. *n.* 19.
β) Parus cinereus. *Briss. av.* 3. *p.* 549. *n.* 4.
Mésange cendrée. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 409.
γ) Curruca fulvescens.
Boutcarle de Provence. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 134. *Pl. enl. n.* 655. *f.* 2.

Habitat in Europae *sepibus migratoria*, $5\frac{1}{2}$ *pollices longa, insectis potissimum, sed ficubus quoque et olivis victitans, ex muscis siccisque stipitibus trium pedum supra terram altitudine nidum struens, et* 5 *ova pariens ex virescente grisea, rufo fuscoque maculata.*

Rostrum *nigrum, basi albidum*; caput *ex fuscescente cinereum*; dorsum *rubescens*; gula *alba*; pectus *et* abdomen *ex rubescente alba*; *feminae nivea*; pedes *fuscescentes.*

Ficedula. 10. M. subfurca, subtus alba, pectore cinereo maculato. *Fn. suec.* 251.* *Müll. zool. p.* 33. *n.* 271.
Curruca fusca, alba macula in alis. *Frisch av. t.* 22.

Ficedula.

Ficedula. *Gesn. av.* 384. *Aldr. orn.* 2. *p.* 758. *Will. orn. p.* 227. *Raj. av. p.* 81. *n.* 12. *Alb. av.* 3. *p.* 25. *t.* 26. *Briss. av.* 3. *p.* 369. *n.* 1.

Beccafico. *Olin. ucc. p.* 11. *Russel alepp. p.* 64.

Bechigue. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 187. *Pl. enl. n.* 668. *f.* 1.

Epicurean Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 432. *n.* 23.

Habitat in Europa *inter* Graeciam *et* Sueciam *intermedia, in frigidioribus patriae suae oris migratoria, parum canora, autumno ficubus etiam uvisque victitans,* 5 *pollices longa; carne deliciosa.*

Rostrum pedes*que nigricantes*; alae *ex cinereo fuscae, fascia alba*; rectrices *atrae, margine ex griseo fuscae, extima extus, colliique plurima pars alba.*

naevia. 64. M. ex rufo fulca, flavicante et cinereo varia, subtus alba, pectore flavicante nigro-maculato, remigibus rectricibusque nigricantibus margine albis.

Curruca naevia. *Briss. av.* 3. *p.* 389. *n.* 9.

Boarina. *Aldr. orn.* 2. *p.* 734. *Raj. av. p.* 77. *n.* 7. *Will. orn. p.* 217.

Bouvier. *Salern. orn. p.* 226. *n.* 7.

Fauvette tachetée. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 149. *Pl. enl. n.* 581. *f.* 3.

Fig-eater. *Albin. av.* 3. *t.* 26. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 433. *n.* 24.

Habitat in Italiae *pascuis,* $5\frac{1}{2}$ *pollices longa, pedis altitudine supra terram ad fruticem struens nidum, fidissima pullorum mater.*

Rostrum *spadiceum*; pedes *rubescentes*; ungues *nigri.*

alpina. 65. M. grisea, gula alba fusco-maculata, tectricibus alarum nigricantibus apice albis, remigibus fuscis, cauda furcata, rectricibus intus ad apicem macula rufescente notatis.

Fauvette des alpes. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 156. *t.* 10. *Pl. enl. n.* 668. *f.* 2.

Alpine Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 434. *n.* 25.

Habitat in Alverniae *et* Delphinatus *alpibus, utplurimum in terra, valde timida, emberizae magnitudine,* 7 *pollices longa.*

Rostrum *nigricans, mandibulae inferioris basi flava*; remiges *primores margine albidae; secundariae exteriori rufescentes*; pedes *flavicantes.*

patagonica. 66. M. cinerea, mento, gula, superciliis et rectricibus extimis albis, alis fuscescente variis, rectricibus falcia fuscescente, remigibus margine fuscis.

Patago-

Patagonian Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 434. *n.* 26.
Habitat in terra ignis *ad mare*, 9 *pollices longa*, *testaceis et vermibus marinis victitans.*
Rostrum *nigrum*, *margine cinereum*, *magnitudine et longitudine varium*; corpus *subtus albo striatum*; pedes *nigri*; digiti *longi*, *posterior cum* ungue *praelongus*; *alaudae affinis.*

provinciis. 67. M. spadicea, subtus ferruginea, abdominis medio, remigum margine, alis spuriis, et rectricum extimarum exteriori latere albis, palpebris rubris.
Pitchou de Provence. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 158. *Pl. enl. n.* 655. *f.* 1.
Dartford Warbler. *Brit. zool.* 1. *n.* 161. *t.* 56. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 435. *n.* 27.
Habitat in Anglia *et* Galloprovincia *inter brassicas*, *quibus innidulantia insecta venatur*, *regulo vix major*, *et cum longiori cauda* 5 *pollices longa.*
Rostrum *nigrum*, *basi album*; cauda remigesque *atrae*; pedes *flavi.*

africana. 68. M. nigra, pennarum margine ex rufo griseo, subtus ex rufo exalbida, vertice rufo nigricante maculato, gulae stria utrinque longitudinali nigra, remigibus et rectricibus 4 intermediis fuscis margine rufis, reliquis extus rufis.
Curruca naevia capitis bonae spei. *Briss. av.* 3. *p.* 390. *n.* 10. *t.* 22. *f.* 2.
Fauvette tachetée du cap de bonne espérance. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 160.
African Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 436. *n.* 28.
Habitat ad caput bonae spei, *fringillae montanae magnitudine*, $7\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Rostrum *corneum*; cauda *subcuncata*; pedes *ex griseo fusci.*

noveboracensis. 69. M. ex cinereo et fusco varia, subtus flavicans nigro-virgata, superciliis albis.
Fauvette tachetée de la Louisiane. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 161. *Pl. enl. n.* 752. *f.* 1.
New York Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 409. *n.* 308. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 436. *n.* 29.
Habitat solitaria in Louisiana, *et* Noveboraci *sepibus*, *alaudae pratensis magnitudine*, $5\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Rostrum *nigrum*; pedes *dilute spadicei.*

70. M.

umbria. 70. M. ex griseo fusca, subtus alba, rarius nigro-maculata, dorsi maculis obsoletis nigris, uropygio flavicante, tectricibus alarum, superioribus caudae et rectricibus atris, margine albis.

Fauvette ombrée de la Louisiane. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 162.

Fauvette tachetée de la Louisiane. *Buff. pl. enl. n.* 709. *f.* 1.

Umbrose Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 437. *n.* 30.

Dusky Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 410. *n.* 309.

Habitat in Louisiana, *noveboracensis magnitudine*, $5\frac{1}{2}$ *pollices circiter longa.*

Rostrum *nigrum*; remiges *majores* pedes*que atri.*

flavicollis. 71. M. grisea, subtus alba, ad latera nigro-varia, fronte, fascia oculari et rectricibus nigris, lateralibus interiori latere albidis, macula utrinque ad basin rostri et gutture flavis.

Parus carolinensis griseus. *Briss. av.* 3. *p.* 563. *n.* 10.

Mésange grise à gorge jaune. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 454.

Yellow throated Creeper. *Catesb. Car.* 1. *t.* 62.

Yellow-throated Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 400. *n.* 286. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 437. *n.* 31.

Habitat frequens in Carolina, *carduelis magnitudine*, $5\frac{1}{4}$ *pollices longa, continue arbores conscendens, insecta venatura.*

Rostrum *nigrum*; remiges tectrices*que alarum fusce*scentes, *bae fasciis duabus albis*, cauda *subbifurca*; pedes *fusci.*

ruficauda. 72. M. fusca subtus alba, dorsi colore in rufum vergente, remigum margine, tectricibus alarum caudaque rufis, gula alba, fusco maculata, pectore dilute fusco.

Fauvette de Cayenne à queue rousse. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 163.

Rufous-tailed Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 439. *n.* 33.

Habitat in Cayenna, $5\frac{1}{4}$ *pollices longa.*

fuscicollis. 73. M. ex virescente fusca, pectore et abdomine flavis, cauda virescente, tectricibus alarum remigibusque fuscis, margine rufescentibus.

Fauvette de Cayenne à gorge brune et ventre jaune. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 163.

Yellow-bellied Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 440. *n.* 34.

Habitat in Cayenna, *trochili magnitudine.*

74. M.

caerulef- cens. 74. M. ex cinereo caerulea, subtus alba, gula nigra, tectricibus alarum remigibusque fuscis, illis macula alba notatis, his margine ex cinereo caeruleis.
Fauvette bleuâtre de S. Domingue. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 164.
Blue-grey Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 440. *n.* 35.
Habitat in insula S. Dominici, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

americana. 75. M. ex cinereo caerulea, axillis ex olivaceo luteis, gula et pectore flavis, abdomine tectricumque alarum apice albis, caudae apice pallido.
Yellow-backed Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 440. *n.* 36.
Habitat in Europa.
Rostrum *pallidum*; pedes *fuscescentes.*

pensilis. 76. M. grisea subtus flava, abdomine et superciliis albis, loris flavo-maculatis, tectricibus alarum fasciis alternis albis nigrisque.
Cou-jaune. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 165. *Pl. enl. n.* 686. *f.* 1.
Pensile Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 441. *n.* 37.
Habitat in insula S. Dominici, *hippolaidis magnitudine*, $4\frac{3}{4}$ *pollices longa, suavissime canora (etiam femina), fructibus quoque victitans, nidum subtus apertum ex siccis plantarum fibris, exiguis radicibus, et foliis deciduis struens, lanugine sternens, et apice ex salicibus supra aquam pendentibus suspendens, ita ut a vento moveri possit, bis vel ter quotannis ova* 3-4 *pariens.*
Rostrum *atrum*; caput *ex grisco nigrum*; colli *latera et* hypochondria *nigro-maculata*; rectrices 4 *extimae albo-maculatae*; pedes *ex virescente grisei.*

alba. 11. M. pectore nigro, rectricibus duabus lateralibus dimidiato oblique albis. *Fn. suec.* 252.* *Scop. ann.* I. *n.* 224. *Brünn. orn. n.* 271. *Müll. zool. n.* 272. *Kram. el. p.* 373. *n.* 1.
Motacilla. *Briss. av.* 2. *p.* 461. *n.* 38.
Motacilla alba. *Gesn. av.* 618. *Aldr. orn.* 2. *p.* 726. *Bell. av.* 88. b. *Nozem. nederl. Vogel t.* 62.
Ballarina. *Olin. ucc. t.* 43.
Lavandiere. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 251. *t.* 14. *f.* 1. *Pl. enl. n.* 652. 1. 2.
White Wagtail. *Brit. zool.* I. *n.* 142. *t.* 55. *Arct. zool.* 2. *p.* 396. E. *Raj. av. p.* 75. *n.* 1. *Will. orn. p.* 237. *Albin. av.* 1. *t.* 49. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 395. *n.* 1.

Weisse

Weiſſe Bachſtelze. *Friſch av. t.* 23. *f.* 4. *Georg. it. p.* 174. *Günth. Neſt. u. Eyer t.* 1. *f. ſup.*

β) Motacilla alarum faſcia obliqua alba.

Bergeronnette à collier de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p.* 61. *t.* 29.

Habitat per omnem orbem antiquum *ad aquas, quarum inſecta venatur, migratoria, velociter currens,* 7 *pollices longa, nidum ex gramine ſicco, radicum fibrillis et muſcis in terra ſtruens, et pilis aut plumis ſternens, et utplurimum ſemel quotannis ova* 5 *alba, fuſco-maculata pariens, caudam, flavae, cinereae, maderaſpatenſis, boarulae, indicae, citreolae, afrae, tſchutſchenſis et viridis more perpetim motitans, prima germinationis die ex hybernatione redux.*

Roſtrum, occiput, nucha, guttur pedes*que nigra*; frons, area *oculorum*, colli *latera*, *et* abdomen *alba*; corpus *ſupra cinereum*; remiges *majores nigricantes*; *ſecundariae et* tectrices *alarum atrae*, *margine griſeae*; rectrices *mediae nigrae*, *margine griſeae*: Feminae vertex *in fuſcum vergens.*

albida. 77. M. albida, dorſo tectricibusque cineraſcentibus, roſtro pedibusque purpuraſcentibus. *Jacq. Beytr. p.* 23. *n.* 17. *t.* 8. Cauda *cineraſcens; an ſatis diſtincta ſpecies?*

maderaſpatenſis. 78. M. nigra, ſubtus alba, alarum faſcia obliqua et rectricibus lateralibus albis.

Motacilla maderaſpatana. *Briſſ. av.* 3. *p.* 478. *n.* 44.
Bergeronnette de Madras. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 275.
Black and white Wagtail. *Raj. av. p.* 194. *n.* 3. *t.* 1. *f.* 1.
Pied Wagtail. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 397. *n.* 2.

b) Motacilla furcata. *Raj. av. p.* 194. *n.* 4.
Habitat in India.
Feminae *partes, quae mari nigrae, cinereae.*

cinerea. 79. M. ex cinereo griſea, ſubtus alba, faſcia (mari) pectoris fuſceſcente, cauda nigra, rectricibus duabus extimis plurimam partem albis.

Motacilla cinerea. *Briſſ. av.* 3. *p.* 465. *n.* 39. *t.* 25. *f.* 1.
Bergeronnette griſe. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 261. *Pl. enl. n.* 674. *f.* 1.
Cinereous Wagtail. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 397. *n.* 3.
Habitat in Europae *paſcuis et ad aquas, in ſalice humiliori nidificans, bis quotannis pariens, alba paulo minor,* 6¾ *pollices longa.*

Roſtrum

Roſtrum pedes*que fuſci*; remiges *primores ex nigricante fuſcae, ſecundariae cum* tectricibus *nigricantes margine albidae.*

indica. 80. M. ex virescente griſea, ſubtus flava, pectoris faſciis duabus curvis nigris confluentibus, rectricibus intermediis ex virescente griſeis, reliquis ex nigricante fuſcis, extimis et criſſo albis.
Bergeronnette griſe des Indes. *Sonner. it. 2. p. 207.*
Indian Wagtail. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 399. *n.* 5.

viridis. 81. M. virescens, capite, alis caudaque cinereis, alarum caudaeque margine et abdomine albis.
Green Wagtail. *Brown illuſtr. p.* 86. *t.* 33. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 403. *n.* 11.
Habitat in inſula Zeylon, 4 *pollices longa.*

tſchutſchienſis. 82. M. ex olivaceo fuſca, ſubtus alba, ferrugineo-maculata, macula inter roſtrum et oculos, tectricum alarum faſciis duabus, rectricibusque extimis plurimam partem albis.
Tchutſchi Wagtail. *Artt. zool.* 2. *p.* 397. H. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 403. *n.* 10.
Habitat ad littora Tſchutſchi.
Tectrices *alarum* remiges*que primores fuſcae*; criſſum *flavescens*; cauda *praelonga, atra*; pedes *nigri.*

afra. 83. M. ex flavicante fuſca, ſubtus flava, tectricibus caudae inferioribus albis, roſtro, ſuperciliis, alis, cauda, pedibusque nigris.
Petite Bergeronnette du cap de bonne eſpérance. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 274.
African Wagtail. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 402. *n.* 9.
Habitat ad caput bonae ſpei, *alba minor.*
Unguis *poſterior maximus.*

citreola. 84. M. flava, nuchae lunula nigricante, dorſo ex caeruleſcente cinereo, rectricibus duabus lateralibus dimidiato-albis. *Pall. it.* 3. *p.* 696. *n.* 14. *Falck it.* 3. *t.* 29.
Motacilla Sheltobriuſchka. *Lepechin it.* 2. *p.* 187. *t.* 8. *f.* 1.
Yellow-headed Wagtail. *Artt. zool.* 2. *p.* 397. G. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 401. *n.* 7.
Habitat in Sibiria, *rarior in* Ruſſia, *flava minor, ad quam alis, cauda, rictibus accedit.*

flava. 12. M. pectore abdomineque flavo, rectricibus duabus lateralibus dimidiato oblique albis. *Fn. suec.* 253. *Scop. ann.* 1. *n.* 226. *Brünn. orn. n.* 273. 274. *Müll. zool. n.* 273. *Kram. el. p.* 374. *n.* 2.
Motacilla verna. *Briss. av.* 3. *p.* 468. *n.* 40.
Motacilla flava. *Gesn. av.* 618. *Aldr. orn.* 2. *p.* 729. *Nozem. nederl. Vogel t.* 54.
Bergeronnette de printems. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 265. *t.* 14. *f.* 1. *Pl. enl. n.* 674. *f.* 1.
Yellow Wagtail. *Brit. zool.* 1. *n.* 143. *Arct. zool.* 2. *p.* 396. F. *Raj. av. p.* 75. *n.* 5. *Will. orn. p.* 238. *t.* 68. *Edw. glean. t.* 258. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 400. *n.* 6.
β) Motacilla supra ex cinereo grisea.
Bergeronnette de l'isle de Timor. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 275.
γ) Parus luteus. *S. G. Gmelin it.* 3. *p.* 101. *t.* 20. *f.* 1.
δ) Parus caspicus. *S. G. Gmelin it.* 3. *p.* 104. *t.* 20. *f.* 2.
ε) Parus variegatus. *S. G. Gmelin it.* 3. *p.* 105. *t.* 20. *f.* 3.
Habitat in Europae, Asiae, Maderae *humidis, frequentius in silvis, quam alba,* $6\frac{1}{2}$ *pollices longa, non rara auctumno australiora versus migrans, inter segetes in terra ex radicum fibrillis nidum struens pilisque sternens, ova pariens* 5, *maculis lineisque atris varia.*
Rostrum pedesque *nigri;* ungue *posteriori praelongo;* corpus *supra olivaceum;* supercilia *flava* (feminae *albida*); fascia *ocularis et infraocularis atra;* gula (*mari*) *maculis paucis nigris varia;* tectrices *alarum mediae majoresque atrae, margine flavescentes;* remiges *atrae;* cauda *nigra.*

Tiphia. 13. M. viridis, subtus flavescens, alis nigris, fasciis duabus albis.
Ficedula bengalensis. *Briss. av.* 3. *p.* 484. *n.* 47.
Figuier vert et jaune. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 278.
Green Indian Fly-catcher. *Edw. av.* 1. *t.* 79.
Green Indian Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 474. *n.* 90.
Habitat in Bengala, *hippolaidis magnitudine.*
Rostrum pedesque *nigricantes, illius basis flava;* tectrices *alarum fuscae, mediae et majores apice albae;* remiges rectricesque *nigricantes margine flavae.*

Sinensis. 85. M. viridis, subtus incarnata, macula aurium striaque ab oculis ad nucham producta pallidis, cauda acuta.
China Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 474. *n.* 89.
Habitat in Sina, 6 *pollices longa.*
Rostrum pedesque *atri.*

singalensis. 86. M. variabili-viridis, gutture aurantio, pectore et abdomine flavis.
Green Warbler. *Brown illustr. p.* 82. *t.* 32.
Cingalese Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 474. *n.* 88.
Habitat in insula Zeylon, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Rostrum *fuscum.*

zeylonica. 87. M. viridis, subtus flava, vertice, nucha alisque nigris: harum fascia duplici alba.
Ceylon Black cap. *Brown illustr. p.* 36. *t.* 15.
Ceylon Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 474. *n.* 87.
Habitat in insula Zeylon, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Rostrum *ex caerulescente griseum.*

olivacea. 88. M. olivacea, pectore et abdomine albis.
Olive-coloured Warbler. *Brown illustr. p.* 33. *t.* 14. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 473. *n.* 86.
Habitat in insula Zeylon, *modularis magnitudine, caudam angulo acuto elevans.*
Rostrum *albidum, basi plumis flavescentibus tectum.*

caryophyllacea. 89. M. dilute caryophyllacea, rostro pedibusque rubescentibus.
Pink-coloured Warbler. *Brown illustr. p.* 84. *t.* 33. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 473. *n.* 85.
Habitat in insula Zeylon, *reguli magnitudine.*
Color *alarum et caudae in atrum vergit.*

albicapilla. 90. M. nigra, subtus exalbida, gula, macula verticis et oculorum alba.
White-crowned Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 472. *n.* 83.
Habitat in Sina, 7 *pollices longa.*

grisea. 91. M. ex cinereo grisea, vertice, rostro, gutture et pectore nigris, stria oculari, rectricum apice, abdomine crissoque albis.
Grisin de Cayenne. *Buff. hist. nat. desois.* 3. *p.* 408. *Pl. enl. n.* 643. *f.* 1. 2.
Grisly Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 473. *n.* 84.
Habitat in Cayenna, *hippolaidis magnitudine,* $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Remiges *margine griseae*; pedes *cinerei.*

92. M.

Motacillae *plurimae insectivorae, pauciores simul granivorae, hinc hiemem versus e borealibus ad australes terras migrant.*

maculata. 92. M. nigro-maculata supra fusca subtus exalbida, orbitis ochroleucis, uropygio fusco, cauda nigra basi alba, rectricibus extimis exterius et apice albis.

Pivote ortolane. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 195. *Pl. enl. n.* 654. *f.* 2.

Spotted Wheat-ear. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 472. *n.* 82.

Habitat in Galloprovincia, *massilienſi aequalis et affinis.*

Tectrices *alarum* remigesque *nigrae*, *margine exalbidae.*

massilien-sis. 93. M. rufa, subtus ex rubescente alba, nigricante-maculata; vertice et cervice ex-rufo fuscescentibus, macula sub oculis ochroleuca, rectricibus nigris, intermediis margine rufis, 4 utrinque proximis albis, extimis totis albis.

Filt de Provence. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 194. *Pl. enl. n.* 654. *f.* 1.

Provence Wheat-ear. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 471. *n.* 81.

Habitat in Galloprovincia, *alaudae minoris magnitudine.*

Rostrum *atrum*; verticis cervicisque *pennae apicis margine nigricantes*; tectrices *alarum minores* remigesque *nigrae margine rufae*; cauda *subforficata*; pedes *flavicantes*; digitus *posterior praelongus*, *ungue tamen anteriores non excedente.*

pileata. 94. M. capite, rectricibus intermediis lateraliumque apice nigris, superciliis, fronte, mento, uropygio, cauda et abdomine albis.

Blackhooded Wheat-ear. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 471. *n.* 80.

Habitat ad caput bonae spei, *et in* Sina, *oenanthes magnitudine*, 6 *pollices longa.*

Rostrum *nigrum.*

aurantia. 95. M. fusca, subtus aurantia, gutture exalbido infra nigrovario, tectricibus alarum majoribus et caudae albis, rectricibus fuscis, lateralibus apice albis.

Motteux ou Cul-blanc brun-verdâtre. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 248.

Orange-breasted Wheat-ear. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 470. *n.* 79.

Habitat ad caput bonae spei, *hotentotta minor*, 6 *pollices longa.*

hotentotta. 96. M. ex fulvo fusca, uropygii fascia fulvescente, gula et abdomine inferiore exalbidis, superiore fulvo, tectricibus caudae superioribus flavicantibus, inferioribus albis, cauda basi alba, medio nigra, apice exalbida.

Grand Motteux ou Cul-blanc du cap de bonne eſpérance. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 248.
Cape Wheat-ear. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 470. *n.* 78.
Habitat ad caput bonae ſpei, *oenanthe major.*
Vertex *et* pectus *dilutiori et obſcuriori fuſco varia*; alae *fuſcae*, *margine flavicantes*; rectrices *intermediae nigrae*, *apice fulvae.*

leucorhoa. 97. M. ex rufo fuſca, ſubtus ochroleuca, uropygio, tectricibus baſique caudae albis.
Motteux du Sénégal. *Buff. hiſt. nat des oiſ.* 5. *p.* 249.
Cul-blanc du Sénégal. *Buff. pl. enl. n.* 583. *f.* 2.
Rufous Wheat-ear. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 499. *n.* 77.
Habitat ad fluvium Senegal, *oenanthe major*, 7 *pollices longa.*
Roſtrum pedes*que nigri*; tectrices *alarum*, remiges rectrices*que fuſcae*, *margine rufae.*

Stapazina. 14. M. ferruginea, alis fuſcis, area oculorum caudaque nigris, rectricibus extimis latere albis.
Vitiflora rufa. *Briſſ. av.* 3. *p.* 459. *n.* 37.
Oenanthe altera. *Aldr. orn.* 2. *p.* 763. *Will. orn. p.* 233. *Raj. av. p.* 76. *n.* 2.
Stapazina. *Arct. zool.* 2. *p.* 421. Q.
Red or Ruſſet-coloured Wheat-ear. *Edw. av. t.* 31. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 468. *n.* 76.
β) Vitiflora rufeſcens. *Briſſ. av.* 3. *p.* 457. *n.* 36. *t.* 28. *f.* 4.
Cul-blanc rouſſâtre. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 245.
Strapazino. *Raj. av. p.* 81. *n.* 13. *Will. orn. p.* 233.
Habitat in Hiſpania, Gallia *auſtrali*, Italia, *et* Sibiria *ad* Camtſchatcam *usque*, *oenanthes magnitudine.*
Dorſum *inferius lunula ex nigris maculis conflata notatum*; gula *mari nigra*, *feminae alba*; uropygium, abdomen *inferius*, *et* tectrices *caudae ſuperiores albae*; roſtrum pedes*que nigri.*

✓ Oenanthe. 15. M. dorſo cano, fronte alba, oculorum faſcia nigra. *Fn. ſuec.* 254.* *Fabr. fn. groenl. p.* 122. *n.* 84. *Scop. ann.* I. *n.* 230. *Brünn. orn. n.* 276. *Müll. zool. p.* 33. *n.* 274. *Kram. el. p.* 374. *n.* 4. *Nozem. nederl. Vogel t.* 84.
Curruca major, pectore ſubluteo. *Friſch av. t.* 22.
Oenanthe ſ. Vitiflora. *Aldr. orn.* 2. *p.* 762. *t.* 763. *Jonſt. av.* 123. *t.* 45. *f.* 13. *Briſſ. av.* 3. *p.* 449. *n.* 33.
Cul-blanc, ou Vitrec, ou Motteux. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 237. *Pl. enl. n.* 554. *f.* 1. 2.

Wheat-

Wheat-ear, Fallow Smith, White Tail. *Brit. zool.* I. *n.* 157. *Arct. zool.* 2. *p.* 420. P. *Raj. av. p.* 75. *n.* 1. *Will. orn. p.* 233. *t.* 41. *Albin. av.* 1. *t.* 55. 3. *t.* 54. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 465. *n.* 75.

β) Motacilla subtus pallida, rectricibus introrsum albis, dorso undulato. *Fn. succ.* 1. *n.* 219.

Vitiflora grisea. *Briss. av.* 3. *p.* 452. *n.* 34. *t.* 21. *f.* 2.

Cul-blanc gris. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 244.

Grey Wheat-ear. *Brit. zool. app.*

γ) Vitiflora cinerea. *Briss. av.* 3. *p.* 454. *n.* 35. *t.* 21. *f.* 3.

Cul-blanc cendré. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 245.

δ) Vitiflora supra alba.

Habitat in Asiae *et* Europae *a* Bengala *ad* Groenlandiam *usque apricis lapidosis, in borealibus, cessante nocturno frigore, feminis praecedentibus, adveniens, auctumno australiora petens,* $5\frac{1}{2}$ *pollices longa, lumbricis quoque victitans, ex sicco gramine, muscis, lana, cuniculi aliisve pilis et plumis in terra sub lapide, aut in antro cuniculi nidum struens, ovaque pariens* 5-8 *dilute caerulea, circulo versus finem latiorem saturatiori picta. Caro sapida.*

Vertex, cervix *et* dorsum *ex caerulescente grisea*; supercilia, uropygium, tectrices *caudae superiores et* cauda *media a basi alba*; *altera* caudae *pars*, pedes remigesque *nigrae, hae margine mustelinae*; corpus *subtus ochroleucum*; pectori *rubor adspersus.* Femina *caret fascia suboculari nigra.*

Rubetra. 16. M. nigricans, superciliis albis, macula alarum alba, gula pectoreque flavescente. *Fn. suec.* 255.* *Scop. ann.* 1. *n.* 237. *Brünn. orn. n.* 277. *Müll. zool. n.* 275. *Kram. el. p.* 375. *n.* 5.

Rubetra major s. Rubicola. *Briss. av.* 3. *p.* 432. *n.* 26. *t.* 24. *f.* 1.

Curruca major altera. *Frisch av. t.* 22.

Montanellus bononiensium et Todtenfogel. *Aldr. orn.* 2. *p.* 735. 737.

Avicula parva. *Gesn. av.* 796.

Oenanthe secunda, et Ficedula 3. Aldrovandi. *Will. orn. p.* 232. 234. *Raj. av. p.* 76. 77.

Grand Traquet ou Tarier. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 224. *Pl. enl. n.* 678. *f.* 2.

Whin-Chat. *Brit. zool.* 1. *n.* 158. *Arct. zool.* 2. *p.* 421. R. *Raj. av. p.* 76. *n.* 3. *Will. orn. p.* 234. *Hayes brit. birds t.* 39. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 454. *n.* 54.

Habitat in Europa *ad* Sueciam *usque, rubicola paulo major et rarior, cui nido similis est, ova pariens* 5 *exalbida, nigro-maculata.*

Roſtrum pedes*que nigri*; mentum *album*; macula *alarum alba duplex*, *in femina minus evidens*; cauda *alba*, *extrema* $\frac{1}{3}$ *parte nigricans*; rectrices 2 *intermediae omnino nigricantes.*

✓ fervida. 98. M. fuſca, pennarum margine rufo, ſubtus ochroleuca, alarum maculis duabus albis, cauda atra.
Traquet du Sénégal. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 228. *Pl. enl. n.* 583. *f.* 1.
Sultry Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 455. *n.* 55.
Habitat ad fluvium Senegal, *rubetrae magnitudine.*
Roſtrum pedes*que nigri.*

Montanella. 99. M. ſubteſtacea fuſco-maculata, ſubtus dilute ochracea, vertice ex fuſco nigro, ſuperciliis et gula ochraceis aut albis, auribus nigris, areola caneſcente, alis fuſcis, cauda cineraſcente. *Pall. it.* 3. *p.* 695. *n.* 12.
Sibirian Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 456. *n.* 56.
Habitat a Februario in Dauuria, *rubetra major.*
Juguli *pennae baſi fuſcae*; remiges *extus ſubgriſeae*; tectrices *ſecundariae apice albae*; rectrices *longiuſculae*, *intermediae* 2 *et extima utrinque breviores.*

✓ magna. 100. M. fuſca, cervice dorſoque dilutiori, ſubtus rufeſcens, gula albida, remigibus rectricibusque dimidiato-rufis: extimis extus albis.
Grand Traquet. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 232.
Dark Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 453. *n.* 53.
Longitudo $7\frac{1}{2}$ *pollicum.*

✓ philippenſis. 101. M. ex violaceo nigra, ſubtus ex rubeſcente alba, maculis alarum tribus albis, capite ex rubeſcente albo, collo ſordide rubro, faſcia pectoris caeruleſcente, rectricibus extimis extus ex rufo albis.
Rubetra philippenſis major. *Briſſ. av.* 3. *p.* 446. *n.* 32. *t.* 22. *f.* 3.
Grand Traquet des Philippines. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 230. *Pl. enl. n.* 185. *f.* 2.
Traquet de Manille. *Salern. orn. p.* 225.
Habitat in inſulis Philippinis, $6\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum *ſordide flavum*; pedes *ferruginei.*

✓ coromandelica. 102. M. nigra, tectricibus alarum minoribus macula flavicante, reliquis macula alba notatis, et margine flavis, uropygio et abdomine rufeſcente, hoc nigro-faſciato.

Petit

Petit traquet des Indes. *Sonner. it.* 2. *p.* 207.
Coromandel Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 453. *n.* 51.
Habitat in Coromandel, *pari magnitudine.*

perspicil- lata. 103. M. nigra, tectricibus alarum macula alba notatis, cauda aequali, orbitis nudis flavicantibus rugosis.
Clignot ou traquet à lunette. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 234.
Spectacle Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 452. *n.* 50.
Habitat ad fluvium Plata Americae, *praecipue circa* Montevedeo, *carduelis magnitudine.*
Irides *flavae*; pupillae *caeruleae*; cauda *expansa triangulum aequilaterum refert.*

Rubicola. 17. M. grisea, subtus rufescens, jugulo fascia alba, loris nigris. *Scop. ann.* I. *n.* 236. *Kram. el. p.* 375. *n.* 6. *Georg. it. p.* 174.
Rubetra. *Aldr. orn.* 2. *p.* 739. *t.* 740. *Briss. av.* 3. *p.* 428. *n.* 25. *t.* 23. *f.* 1.
Muscipeta. *Aldr. orn.* 2. *p.* 734. *t.* 735. *Jonst. av. t.* 45.
Oenanthe tertia. *Will. orn. p.* 235. *t.* 41. *Raj. av. p.* 76. *n.* 4.
Traquet. *Salern. orn. p.* 224. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 215. *t.* 13. *Pl. enl. n.* 678. *f.* 1.
Stone-Smith, Stone-Chatter, Moor-Titling. *Brit. zool.* I. *n.* 159. *Raj. av. p.* 76. *n.* 4. *Will. orn. p.* 235. *t.* 41. *Alb. av.* 3. *t.* 52. *Hayes brit. birds t.* 39.*
Stone-chat. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 448. *n.* 46.
Steinschmazer. *Günth. Nest. u. Eyer t.* 26.
β) Tschecantschiki. *Lepechin it.* 2. *p.* 180. *nov. comm. Petrop.* 15. *p.* 488. *t.* 25. *f.* 3.
Habitat in Europae *et* Sibiriae *sepibus, locisque siccis, hieme aliquando victum quaesitura in humidiora migrans,* $4\frac{3}{4}$ *pollices longa, inquieta, callida, ut nidum, quam primo vere sub lapide aut in dumetis humilioribus struit, abscondat, ova* 5-6 *pariens ex caerulescente viridia, rarioribus obsolete rufis maculis varia.*
Rostrum pedes*que nigri*; caput, *et* collum *fere nigra*; corpus *supra ex nigricante et rufescente varium*; pectus *et* abdomen *ex rubescente flava*; crissum *et* uropygium *alba*; rectrices *nigrae, extimae* 2 *margine exteriori et apice dilute ferrugineae*; remiges *atrae, margine ferrugineae; corpori proximae ad basin*, tectrices *quoque alarum macula alba notatae.* Feminae vertex *ex nigricante et rufescente varius.*

atricapilla. 18. M. teſtacea, ſubtus cinerea, pileo obſcuro. *Fn. ſuec.* 256. *Scop. ann.* 1. *n.* 229. *Brünn. orn. n.* 278. 279. *Müller zool. p.* 33. *n.* 277. *Kram. el. p.* 377. *n.* 15.
Curruca atricapilla. *Briſſ. av.* 3. *p.* 380. *n.* 6.
Atricapilla ſ. Ficedula. *Geſn. av.* 348. *Aldr. orn.* 2. *p.* 756. *t.* 757.
Capinero. *Olin. ucc. t.* 9.
Fauvette à tête noire. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 125. *t.* 8. *f.* 1.
Black-cap. *Brit. zool.* 1. *n.* 148. *Arct. zool.* 2. *p.* 418. F. *Raj. av. p.* 79. *n.* 8. *Will. orn. p.* 226. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 415. *n.* 5.
Kloſterwenzel. *Friſch av. t.* 23. *f.* 1.
β) Curruca albo et nigro varia. *Briſſ. av.* 3. *p.* 383.
Ficedula varia. *Aldr. orn.* 2. *p.* 759.
γ) Curruca ſupra fere nigricans, gula alba.
Petite Colombaude. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 131.
δ) Curruca ſubtus griſea, gula ſuperciliisque albis.
Fauvette verdâtre de la Louiſiane. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 162.
Habitat in Europa *ab* Italia *in* Sueciam, δ) *in* Louiſiana, *in borealibus autumno diſcedens, hippolaide minor,* $5\frac{1}{4}$ *pollices longa, cantu luſciniam aemulans, praeter inſecta daphnes etiam, hederae ſorbique baccis victitans, nidum in frutice humiliori prope terram, rarius in aliqua arboris altitudine ex bacillis ſiccis, pauca lana, et muſcis recentibus ſtruens, radicum fibrillis et pilis equinis ſternens, et ova* 5 *dilute ſpadicea ſaturatius maculata pariens.*
Roſtrum *fuſcum*; vertex *niger*, *feminae ex ferrugineo badius*; corpus *ſupra ex vireſcente cinereum*, *ſubtus griſeum ſenſim in album declinans*; tempora *griſea*; remiges rectricesque *ex cinereo fuſcae*, *margine ex vireſcente cinereae*, *intermediae breviſſimae*; pedes *plumbei*; ungues *nigri.*

melanocephala. 104. M. ex vireſcente cinerea, ſubtus griſea, vertice nigro, oculorum faſcia rubra. *Cetti ucc. di Sard. p.* 215.
Habitat in Sardinia, *atricapillae multum affinis, nonne varietas? minor tamen et vix canora.*

moſchita. 104. M. plumbea, pileo rufeſcente. *Cetti ucc. di Sard. p.* 215.
Habitat in Sardinia, *cuculi ovis, nido ſuo ingeſtis, ſaepius incubans.*

19. M.

penſilvanica. 19. M. pileo flaveſcente, hypochondriis ſanguineis.
Ficedula penſilvanica icterocephalos. *Briſſ. av. app. p.* 105. *n.* 78.
Figuier à poitrine rouge. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 308.
Red-throated Fly-catcher. *Edw. glean. t.* 301.
Red-throated Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 490. *n.* 116.
Habitat vere in Penſilvania, *hippolaidis magnitudine.*
Roſtrum, occiput (*mari*), faſcia *infraocularis*, pedes*que nigra*; corpus *ſupra olivaceum*, *nigro-maculatum*, *ſubtus album*; tempora *alba*; tectrices *alarum atrae*, *faſciis duabus albis*; remiges rectrices*que atrae*, *extimae intus albo-maculatae.*

ruficapilla. 106. M. olivacea, ſubtus flava, gutture et pectore maculis longitudinalibus rufis vario, vertice rufo, tectricibus alarum, remigibus rectricibusque fuſcis, margine olivaceis.
Ficedula martinicana. *Briſſ. av.* 3. *p.* 490. *n.* 50. *t.* 22. *f.* 4.
Figuier à tête rouſſe. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 306.
Bloody ſide Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 405. *n.* 298. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 489. *n.* 115.
Habitat in Martinica, *agilis*, *cantu parum variato ſed harmonico*, *hippolaidis magnitudine*, *parum ultra* 4 *pollices longa.*
Roſtrum *fuſcum*; rectrices 2 *extimae intus flavicantes*; pedes *griſei.*

chryſoptera. 20. M. ex atro cinerea ſubtus alba, pileo maculaque alarum luteis, gula nigra.
Ficedula penſilvanica cinerea, gutture nigro. *Briſſ. av. app. p.* 109. *n.* 80.
Figuier aux ailes dorées. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 311.
Goldenwinged Flycatcher. *Edw. glean. t.* 299.
Goldenwinged Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 403. *n.* 295. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 492. *n.* 118.
Habitat Aprili et auctumno in Penſilvania, *caeruleae magnitudine.*
Roſtrum, ſtria *ocularis*, guttur, pedes*que nigra*; tempora *alba*; rectrices *extimae intus macula alba.*

chryſocephala. 107. M. ſpadicea ſubtus flaveſcens, capite et collo aurantiis, faſcia ſupra infraque oculos fuſca, tectricibus alarum albis nigrisque, rectricibus nigris, margine flaveſcentibus.
Figuier orangé. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 313.
Figuier étranger. *Buff. pl. enl. n.* 58. *f.* 3.

Orange-headed Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 492. *n.* 119.
Habitat in Gujana.
Roſtrum *nigrum*; pedes *flavi*.

criſtata. 108. M. ſupra ex fuſceſcente viridis, ſubtus ex vireſcente griſea, capitis criſta ex nigricante fuſca, margine alba.
Figuier huppé de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 314. *Pl. enl. n.* 391. *f.* 1.
Crelted Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 493. *n.* 20.
Habitat in Gujanae *apricis*, 4 *pollices longa*.
Roſtrum *ex atro fuſcum*; criſta *plicatilis*; pedes *ex flavicante fuſci*.

multicolor. 109. M. nigra, roſtro pedibusque fuſcis, pectore, colli lateribus, tectricum alarum majorum apice, caudaque dimidia rufis, abdomine et criſſo albis.
Figuier noir. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 314.
Figuier noir et jaune de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 391. *f.* 2.
Rufous and black Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 493. *n.* 121.
Habitat varior in Cayenna, 5 *pollices longa*.

aequinoctialis. 110. M. ex vireſcente fuſca, ſubtus ochroleuca, gula et pectore flaveſcentibus, remigibus, cauda pedibusque fuſcis.
Figuier olive de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 315. *Pl. enl. n.* 685. *f.* 1.
Equatorial Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 493. *n.* 122.
Habitat per omnem annum in Cayenna, *multicolore paulo minor*.

Protonotarius. 111. M. flava, uropygio cinereo, criſſo albo, remigibus caudaque ex cinereo et nigricante variis.
Figuier protonotaire. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 316.
Figuier à ventre et tête jaunes. *Buff. pl. enl. n.* 704. *f.* 2.
Protonotary Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 410. *n.* 310. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 494. *n.* 123.
Habitat in Louiſiana, *aequinoctialis magnitudine, cauda tamen breviore, roſtro longiore atro*.
Pedes *nigri*.

ſemitorquata. 112. M. ſubtus dilute cinerea, vertice ex flavicante olivaceo, ſtria pone oculos cinerea, tectricibus alarum remigibusque fuſcis, rectricibus cinereis acutis, lateralibus intus albis.
Figuier à demi-collier. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 316.
Half-collared Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 410. *n.* 311. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 494. *n.* 124.

Habitat

Habitat in Louisiana, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Rostrum *supra nigricans, infra albidum*; tectrices *alarum margine flavae*; remiges *primores albidae, secundariae olivaceae, et apice albae*; fascia *ad inferius collum flavicans*; pedes *nigricantes.*

fulva. **113.** M. ex olivaceo fusca, subtus flava, rectricibus remigibusque fuscis margine olivaceis, primoribus margine dilute griseis.
Figuier à gorge jaune. *Buff. hist. nat. desois.* 5. *p.* 317.
Orange bellied Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 410. *n.* 312. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 495. *n.* 125.
Habitat in Louisiana.
Rostrum pedes*que fusci.*

fusca. **114.** M. ex olivaceo fusca, gutture ex albido griseoque vario, abdomine ochroleuco, artubus fuscis, rectricibus duabus extimis intus prope apicem albis.
Figuier brun-olive. *Buff. hist. nat. desois.* 5. *p.* 318.
Olive-brown Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 411. *n.* 313. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 495. *n.* 126.
Habitat in Louisiana.
Tectrices *alarum* remiges*que secundariae margine fuscescentes, apice albidae, primores margine dilute griseae*; tectrices *caudae inferiores flavae*; rectrices *margine griseae, intermediae flavo tinctae, extima utrinque margine alba.*

pinguis. **115.** M. ex griseo olivacea hinc inde nigro-maculata, gutture ex rufescente et cinereo misto, pectore et abdomine albis, capitis macula et uropygio flavis, remigibus rectricibusque margine griseis.
Figuier grasset. *Buff. hist. nat. desois.* 5. *p.* 319.
Grasset Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 411. *n.* 314. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 496. *n.* 127.
Habitat in Louisiana.
Rostrum pedes*que nigri*; remiges *primores fuscae, margine interiori albidae, secundariae nigricantes, apice etiam griseae*; rectrices *nigrae, laterales intus prope apicem macula alba notatae.*

cana. **116.** M. cinerea, remigibus margine albidis, rectricibus nigris, extimis fere penitus albis.
Figuier cendré à gorge cendrée. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 319.

Grey-

Grey-throated Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 411. *n.* 315. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 496. *n.* 128.
Habitat in Louisianae *liriodendris et magnoliis.*
Rostrum *nigrum*, *subtus griseum*; rectricum 4, 4 *apice albae*; 5, 5 *dimidiato-albae.*

coronata. 21. M. nigro-maculata, pileo, hypochondriis uropygioque flavis.
Ficedula pensilvanica cinerea naevia. *Briss. av. app. p.* 110. *n.* 81.
Figuier couronné d'or. *Buff. hist. nat. desois.* 5. *p.* 312.
Golden-crowned Fly-catcher. *Edw. glean. t.* 298.
Golden-crowned Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 403. *n.* 294. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 486. *n.* 111.
Habitat vere per aliquot dies in Pensilvania *et* Acadia, *hippolaidis magnitudine.*
Rostrum *atrum*; corpus *supra ex cinereo caeruleum* (feminae *ex rufo-fuscum*); tempora, gula, alarum *fasciae duae et* abdomen *alba*; (*mari*) fascia *ocularis*, jugulum, *et* pectus *superius nigra*; pedes, tectrices *alarum*, remiges rectricesque *nigricantes*; remiges *margine griseae*; rectrices 3 *extimae intus macula alba notatae.*

senegalensis. 22. M. fusca, remigibus interius rufis, rectricibus nigris apice albis.
Rubetra senegalensis. *Briss. av.* 3. *p.* 449. *n.* 29.
Senegal Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 456. *n.* 57.
Habitat ad fluvium Senegal, 5-6 *pollices longa.*
Rectrices *intermediae penitus nigrae.*

leucomela. 117. M. nigra subtus alba, vertice albido, genarum gulaeque plumis nigris limbo albicantibus, uropygio albo, tectricibus alarum, remigibus et intermediis rectricibus ex fusco nigricantibus, lateralibus albis, apice atris. *Pall. nov. comm. Petrop.* 14. *p.* 584. *n.* 6. *t.* 22. *f.* 3. *Falk it.* 3. *t.* 30.
Motacilla pleschanna. *Lepechin nov. comm. Petrop.* 14. *p.* 503. *n.* 5. *t.* 14. *f.* 2.
Leucomele Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 456. *n.* 58.
Habitat in montosis praeruptisque ad dextram ripam Volgae *inferioris, ad pagos etiam accedens, truncis arborum saxisque insidens, non timida, vermibus et coleopteris victitans, caudam subinde motitans, ultra* 6 *pollices longa, hirundinis more garriens, flavae magnitudine, in rupium praeruptarum cavernis et rimis, inter confragosa saxa, circa pagos quoque, et sub ipso templorum tecto nidum simpli-*

ſimplicem ex ſtramine ſtruens, aut hirundinis vipariae in modum cavernas ſibi fodiens, aut apiaſtri nidum occupans, ad 10 *ova pariens.*

Roſtrum pedes*que ſordidi*, unguibus *nigris*; orbitae *albeſcentes*; remiges tectrices*que alarum exteriori margine obſoletae, interiori verſus marginem albicantes*; femina *ſupra ex fuſco cinerea, ſubtus cineraſcens, collo ex griſeo cinereo.*

erythrogaſtra. 118. M. ſubtus badia, capite nuchaque alarumque ſpeculo albis, fuliginoſo-ſordidis, capiſtro, genis, temporibus, collo, interſcapulio et alis aterrimis, uropygio caudaque badiis. *Güldenſt. nov. comm. Petrop.* 19. *p.* 469. *t.* 16. 17.

Chesnut-bellied Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 424. *n.* 13.

Habitat aeſtate ad alveos glareoſos torrentium Caucaſicorum, *auctumno verſus auſtrum migrans, arbuſculis dum inſidet, caudam motitans, inquietiſſima, neque tamen timida,* 7 *pollices longa, inter volandum albae more pipiens, hippophaës quoque baccis victitans, inter cujus ramos ex herbis nidum ſtruit; mare feminam cuſtodiente et undique comitante.*

Roſtrum pedes*que atri*; oculi *fuſci*; femina *phoenicuro et oenanthae multum ſimilis praeter roſtrum, criſſum, caudam pedesque cinerea, rectricum apice, et rectricibus* 2 *intermediis fuſceſcentibus.*

maura. 119. M. atra, ſubtus alba, uropygio lateribusque colli albis, jugulo intenſe ferrugineo, alarum area obliqua ex albo luteſcente, rectricibus nigris, lateralibus a baſi dimidiato-albis. *Pallas it.* 2. *p.* 708. *n.* 17.

Moor-Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 458. *n.* 60.

(β) Motacilla ſupra ex rufo fuſca, ſubtus ex rufo alba.

Habitat in betuletis circa Uralenſes *ſilvas et inter fluvios* Tobolin *et* Irtin *obviis, rubetrae magnitudine et habitu, per paria volans et ſub arborum truncis, et in murium citellorumque cuniculis nidulans.*

Alae *baſi atrae, margine griſeae*; remiges *fuſcae, interius albae*; feminae *et* aves *juniores obſoletius tinctae capite ex fuſco et griſeo nebuloſo, dorſo ſcolopaceo gaudent.*

ſuperciliosa. 120. M. ſupra vireſcens, ſubtus pallida, verticis ſtria pallida, ſuperciliis flavis.

Yellow-browed Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 409. *n.* 61.

Habitat in Ruſſia. Pennant.

121. M.

ferruginea. 121. M. supra cinerea, subtus albida, collo ferrugineo.
Gilt-throat Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 459. *n.* 63.
Habitat in Russia, *praesertim circa fluvium* Tunguska.
Pennant.

cyanura. 122. M. supra ex cinereo flava, subtus ex flavescente alba, gula superciliisque ex flavescente albis, uropygio caerulescente, crisso albo, rectricibus ex fusco caerulescentibus extus pallide cyaneis. *Pall. it.* 2. *p.* 709. *n.* 18.
Blue-tailed Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 459. *n.* 63.
Habitat ad hiemis usque initium in arbustis rivulos fluviosque alpestres obumbrantibus australioris regionis circa Jeniseam Sibiriae, *rubeculae magnitudine et habitu.*
Pectoris *latera versus alas aurantia*; alae *fuscae*; remiges *margine exteriori ex flavo virescentes, interiori flavae.*

aurorea. 123. M. subtus fulva, vertice et cervice canis, fronte exalbida, gutture atro, dorso alisque nigris, his area triangulari alba notatis, rectricibus fulvis, intermediis duabus nigris. *Pallas it.* 3. *p.* 695. *n.* 13.
Daurian Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 460. *n.* 64.
Habitat ab Aprili in salicetis circa Selengam Sibiriae *et collaterales fluvios ad* Sinae *usque fines frequens, etiam in pagis, phoenicuri magnitudine, sed procerior.*

striata. 124. M. nigro-striata, supra cinerea, subtus alba, vertice nigro, genis niveis.
Blackpoll Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 401. *n.* 290. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 460. *n.* 65.
Habitat in Noveboraco, *et aestate in insula* novae terrae.
Tectrices *alarum et* remiges *primores atrae, illae fasciis duabus albis*; remiges *secundariae margine albae*; rectrices *atrae, extimae ad apicem macula alba notatae.*

incana. 125. M. capite, colli lateribus et tectricibus caudae superioribus griseis, remigibus rectricibusque atris, margine griseis, gula aurantia, mento et pectore flavis, abdomine ex albido cinereo.
Grey-poll Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 402. *n.* 291. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 461. *n.* 66.
Habitat in Noveboraco.
Tectrices *alarum fasciis duabus albis.*

flavifrons. 126. M. ex caerulescente grisea, subtus alba, vertice, fronte et tectricibus alarum majoribus minorumque inferioribus flavis,

flavis, fascia oculari nigra albo-marginata, mento et gutture nigris.
Yellow-fronted Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 404. *n.* 296. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 461. *n.* 67.
Habitat in Pensilvania.
Remiges *primores* rectrices*que cinereae; harum extimae albo-maculatae.*

Blackburniae. 127. M. vertice nigro: linea media flava, fascia oculari, et tectricibus alarum minoribus nigris, majoribus, crisso et rectricibus lateralibus albis, intermediis atris, colli lateribus, gula et pectoris medio flavis.
Blackburnian Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 412. *n.* 317. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 461. *n.* 67.*
Habitat in Noveboraco.

mitrata. 128. M. olivacea, subtus et fronte flava, occipite et torque nigris.
Parus carolinensis torquatus. *Briss. av.* 3. *p.* 578. *n.* 16.
Mésange à collier de la Caroline. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 452.
Hooded Titmouse. *Catesb. Car. t.* 60.
Hooded Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 400. *n.* 287. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 462. *n.* 68.
β) Motacilla supra ex virescente grisea.
Gobe-mouche citrin de la Louisiane. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 538. *Pl. enl. n.* 666. *f.* 2.
Habitat in Carolina, β) *in* Louisiana, *carduelis magnitudine, 5 pollices longa.*
Rostrum *nigrum*; pedes *fusci.*

Calliope. 129. M. mustelina olivaceo-maculata, subtus ex flavescente alba, gula miniata linea alba nigraque cincta, loris nigris, superciliis albis. *Pall. it.* 3. *p.* 697. *n.* 17.
Ruby-throat. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 463. *n.* 69.
Habitat in Sibiriae *orientalis a* Jenisea *ad* Lenam *densissimis salicetis, circa fluenta alpina, in summis arborum cacuminibus suavissime canora, phoenicuro major.*

littorea. 130. M. supra obscure viridis, subtus ochroleuca, remigibus rectricibusque nigricantibus. *S. G. Gmelin it.* 3. *p.* 98. *t.* 19. *f.* 1.
Habitat ad litus maris caspii, *vermibus victitans, canora.*

131. M.

longiro-stris. 131. M. cinerea, ſubtus atra, roſtro longo. *S. G. Gmelin it.* 3. *p.* 100. *t.* 19. *f.* 2.
Habitat in montibus finitimis maris Caſpii.

ochrura. 132. M. capite cinereo, cervice et dorſo antice atro, jugulo et pectore ſplendide nigris, abdomine flavo. *S. G. Gmelin it.* 3. *p.* 101. *t.* 19. *f.* 3.
Habitat in montibus Perſiae.

obſcura. 133. M. corporis pennis ſuperioribus baſi cinereis, medio badiis, apice nigricantibus, ſubtus cinerea, remigibus rectricibusque nigricantibus margine exteriori badiis. *Hablizl apud S. G. Gmelin it.* 4. *p.* 178. *et apud Pallas n. nord. Beytr.* 4. *p.* 56.
Habitat in alpibus Perſiae ſunamiſicis, *luſciniae magnitudine.*
Roſtrum *fuſcum;* palpebrae *ſubnudae;* vertex *et* cervix *ex cinereo fuſceſcens;* uropygium *et* criſſum *ex cinereo alboque varium;* pedes *cum* unguibus *nigricantes.*

ſunamiſica. 134. M. ex cinereo rufeſcens, mento gulaque nigris, pectore et abdomine rufeſcentibus, pennarum apice albo, criſſo niveo, rectricibus intermediis fuſcis, lateralibus fulvis. *Hablizl apud Pallas n. nord. Beytr.* 4. *p.* 60. *et apud S. G. Gmelin it.* 4. *p.* 181. 182.
Habitat in alpium Perſiae ſunamiſicarum *rupeſtribus, ſuecicae magnitudine.*
Roſtrum pedes*que cum* unguibus *nigri;* linea *alba a baſi roſtri ſupra oculos ad nuchan ducta;* remiges tectrices*que alarum margine exteriori et apice albae.*

murina. 135. M. murina, capite, collo caudaque nigris, ſtria oculari, abdomine, et rectricum extimarum margine albis.
Murine Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 463. *n.* 70.
Magnitudo *fringillae domeſticae;* abdominis *medium nigrum.*

ſpinicauda. 136. M. ſpadicea, ſubtus alba, vertice flavo-maculato, facie ſuperciliisque flavis, tectricibus alarum rufis fuſco-variis, majoribus remigibusque fuſcis, cauda cuneiformi: rectricibus mucronatis.
Thorn-tailed Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 463. *n.* 71. *t.* 52.
Habitat in terra del Fuego, *fringillae domeſticae magnitudine, ultra* 6 *pollices longa.*
Linea *ſupra oculos ducta verſus occiput rufa;* axillae *albae;* rectrices 4 *mediae ferrugineae, reliquae ſpadiceae apice albae;* pedes *fuſci.*

137. M.

magellanica. 137. M. ex flavo fuſca, nigro undulata et rubro tincta, ſubtus ex cinereo flava nigricante-lineata, cauda brevi cuneiformi ex flavicante fuſca rubro tincta et nigro lineata.
Magellanic Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 464. *n.* 72.
Habitat in terra del Fuego, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Pedes *flavi.*

citrina. 138. M. flava, ſupra atro-ſtriata, genis, gutture et pectore albis, cauda nigra apice flava.
Citrine Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 464. *n.* 73.
Habitat in nova Seelandia, *reguli magnitudine*, $3\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum *nigrum*; cauda *brevis*; pedes *atri.*

longipes. 139. M. dilute viridis, ſubtus cinerea, arcu infraoculari albo, fronte, temporibus, genis, collique lateribus cinereis, criſſo vireſcente.
Longlegged Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 465. *n.* 74.
Habitat in nova Seelandia, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum *nigrum*; irides *ex caeruleſcente cinereae*; pedes *ultra pollicem longi, incarnati.*

varia. 23. M. albo nigroque maculata, faſciis alarum duabus albis, cauda bifida.
Ficedula dominicenſis varia. *Briſſ. av.* 3. *p.* 529. *n.* 69. *t.* 27. *f.* 5.
Figuier varié de S. Domingue. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 305.
Small black and white Bird. *Raj. av. p.* 106. *n.* 36. *Sloan. jam.* 2. *p.* 309. *t.* 265. *f.* 1.
Black and white Creeper. *Edw. glean. t.* 300.
White-poll Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 402. *n.* 293. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 488. *n.* 114.
Habitat in inſulis S. Dominici, Jamaica *aliisque vicinis, aeſtate in* Penſilvania. *et* Noveboraco, $4\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum *atrum*; vertex *albus*; tempora *nigra*, *ſtriis duabus albis*; tectrices *alarum nigrae*; remiges rectrices*que nigricantes margine griſeae*, *laterales intus albidae*; pedes *ex vireſcente fuſci*, unguibus *flavicantibus.*

capenſis. 24. M. fuſca ſubtus albida, faſcia pectorali fuſca, ſuperciliis albis, rectricibus lateralibus oblique albis.
Motacilla capitis bonae ſpei. *Briſſ. av.* 3. *p.* 476. *n.* 43. *t.* 25. *f.* 3.

Bergeronnette du cap de bonne eſpérance. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 273. *Pl. enl. n.* 28. *f.* 2.
Cape Wagtail. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 402. *n.* 8.
Habitat ad caput bonae ſpei, *albae magnitudine.*
Roſtrum pedes*que atri*; remiges *atrae*, *margine griſeae*; cauda *nigra.*

icteroce-phala. 25. M. nigra, ſubtus albida, pileo luteo, faſcia oculari nigra, duabusque alaribus flavis.
Ficedula canadenſis icterocephala. *Briſſ. av.* 3. *p.* 517. *n.* 64. *t.* 17. *f.* 2.
Figuier à tête jaune de Canada. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 299.
Figuier de Miſſiſſippi. *Buff. pl. enl. n.* 731. *f.* 2.
Quebec Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 408. *n.* 305. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 484. *n.* 109.
Habitat per aeſtatem in Americae *ſeptentrionalis fruticibus, praeſertim junipero virginiana et caroliniana, hippolaide minor*, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum pedes*que fuſci*; *inter* roſtrum *et* oculos *macula trigona nigra ingens*, *infra* oculos *alba*; corpus *ſupra nigrum*, *pennis margine ex flavicante viridibus*; remiges rectrices*que atrae*, *margine olivaceae et albidae*, 3 *extimae intus a medio ad apicem ochroleucae.*

dominica. 26. M. cinerea ſubtus alba, macula ante oculos lutea, pone alba, infra nigra.
Ficedula dominicenſis cinerea. *Briſſ. av.* 3. *p.* 520. *n.* 65. *t.* 27. *f.* 3.
Muſcicapa e caeruleo, cinereo, fuſco, luteo varia. *Raj. av. p.* 186. *n.* 37.
Figuier cendré à gorge jaune. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 300.
Blue and aſhcoloured Muſcicapa. *Sloan. jam.* 2. *p.* 310. *n.* 44.
Jamaica Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 485. *n.* 110.
Habitat in inſulis Jamaica *et* S. Dominici, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum pedes*que fuſci*; jugulum *et* lora *flava*; tectrices *alarum fuſcae*, *faſciis duabus albis*; remiges rectrices*que ex cinereo fuſcae*, *margine griſeae*, *extimae* 2 *intus prope apicem macula alba notatae.*

cincta. 27. M. cineraſcens, ſubtus alba, vertice faſciaque abdominali lutea, pectore fuſco-maculato.
Ficedula canadenſis cinerea. *Briſſ. av.* 3. *p.* 524. *n.* 67. *t.* 27. *f.* 1.

Figuier

Figuier à ceinture. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 303.
Belted Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 408. *n.* 306. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 487. *n.* 112.
Habitat in Canada, *atricapillae magnitudine*, 5 *pollices longa.*
Roſtrum *nigrum*; ſupercilia *alba*; orbitae, *faſciaeque* alarum *albae*; remiges *fuſcae*, *margine griſeae*; tectrices *caudae ſuperiores flavae*; rectrices *nigricantes*, *margine cinereae*, *extimae intus prope apicem albae*; pedes *fuſci.*

madagaſcarienſis. 28. M. virideſcens, ſubtus albida, gula anoque flavis, palpebris albis.
Ficedula madagaſcarienſis minor. *Briſſ. av.* 3. *p.* 498. *n.* 54. *t.* 28. *f.* 2.
Cheric. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 279.
White-eyed Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 475. *n.* 91.
Habitat gregaria in inſula Franciae *et* Madagaſcar, *audax*, *trochili magnitudine*, *vix* $3\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum *ex griſeo fuſcum*; remiges *fuſceſcentes*, *margine olivaceae*; rectrices *intermediae olivaceae*, *laterales fuſcae*, *margine olivaceae*; pedes *cinerei.*

borbonica. 140. M. ex griſeo fuſca, ſubtus ex flavicante ſordide griſea, remigibus rectricibusque fuſcis, margine ex griſeo fuſcis.
Ficedula borbonica. *Briſſ. av.* 3. *p.* 510. *n.* 60. *t.* 28. *f.* 3.
Petit Simon. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 280.
Figuier de l'isle de Bourbon. *Buff. pl. enl. n.* 705. *f.* 2.
Bourbon Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 475. *n.* 92.
Habitat gregaria in inſulis Bourbon *et* Madagaſcar, *madagaſcarienſis magnitudine*, *fructibus quoque tenerioribus victitans*, *Septembri in arboribus ſolitariis ex plantis ſiccatis nidum ſtruens*, *pilis ſternens*, *et ova* 3 *caerulea pariens.*

mauritiana. 141. M. ex caeruleo griſea, ſubtus alba, remigibus rectricibusque nigris, margine albis.
Figuier bleu. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 282.
Figuier de l'isle de Françe. *Buff. pl. enl. n.* 705. *f.* 1.
Maurice Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 476. *n.* 93.
Habitat in inſula Franciae, *borbonicae magnitudine*, $3\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum *nigricans*; pedes *caeruleſcentes.*

livida. 142. M. ex caeruleo griſea, criſſo albo, roſtro pedibusque plumbeis, remigibus nigricantibus margine albis, rectricibus nigris: extimis duabus albis.

Figuier bleu de Madagaſcar. *Buff. pl. enl. n.* 705. *f.* 3.
Madagaſcar Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 476. *n.* 94.
Habitat in Madagaſcar, *borbonicae magnitudine*, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Cauda *ultra* $1\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

flaveſcens. 143. M. fuſca, ſubtus flaveſcens, temporibus albidis, rectricibus aequalibus remigibusque margine ex rufo fuſcis.
Figuier du Sénégal. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 282. *Pl. enl. n.* 582. *f.* 1.
Citron-bellied Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 477. *n.* 95.
β) Motacilla ſubtus ex rubeſcente flaveſcens.
Figuier à ventre jaune du Sénégal. *Buff. pl. enl. n.* 582. *f.* 3.
Habitat ad fluvium Senegal, $4\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum pedes*que atri.*

undata. 144. M. nigra, pennarum margine rufo, ſubtus alba, uropygio rufo, cauda cuneiformi, rectricibus remigibusque fuſcis, margine ex rufo albis.
Figuier tacheté du Sénégal. *Buff. pl. enl. n.* 582. *f.* 2.
Undated Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 477. *n.* 96.
Habitat ad fluvium Senegal, 4 *pollices longa.*
Roſtrum *nigrum*; pedes *atri.*

fuſcata. 145. M. fuſca, ſubtus griſea, cauda aequali longa.
Figuier brun du Sénégal. *Buff. pl. enl. n.* 584. *f.* 1.
Dusky Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 477. *n.* 97.
Habitat ad fluvium Senegal, *hippolaidis magnitudine*, 6 *pollices longa.*
Roſtrum *atrum*; pedes *flavi.*

ſubflava. 146. M. fuſca ſubtus alba, cauda cuneiformi.
Figuier blond du Sénégal. *Buff. pl. enl. n.* 584. *f.* 2.
Flaxen Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 478. *n.* 98.
β) Motacilla ſubtus griſea.
Figuier à ventre gris du Sénégal. *Buff. pl. enl. n.* 584. *f.* 3.
Habitat ad fluvium Senegal, $4\frac{3}{4}$ *pollices longa, fuſcata minor, cauda etiam breviori.*
Roſtrum *atrum*; pedes *flavi.*

aurocapilla. 29. M. olivacea, ſubtus alba, vertice aureo, ſuperciliis nigris, pectore nigro maculato.
Ficedula penſilvanica aurocapilla. *Briſſ. av.* 3. *p.* 504.
Grivelette de S. Domingue. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 3. *p.* 317. *Pl. enl. n.* 398. *f.* 2.

Golden-

Golden-crowned Thruſh. *Arct. zool.* 2. *p.* 339. *n.* 203. *Edw. glean. t.* 252. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 21. *n.* 6.

Habitat aeſtate in Penſilvania, Noveboraco, *hieme in inſulis* S. Dominici, Jamaica *&c. nidum in terra ad ripam aut collis latus auſtrale fornacis forma ex foliis ſtruens, ſiccoque gramine ſtruens, ova* 5 *alba fuſco-maculata pariens, modularis magnitudine,* $5\frac{3}{4}$ *pollices longa.*

Roſtrum *fuſcum, baſi incarnatum;* tempora *alba;* pedes *ex flavicante fuſci.*

petechia. 30. M. olivacea, ſubtus flava rubro-guttata, pileo rubro.

Ficedula penſilvanica erythrocephalos. *Briſſ. av.* 3. *p.* 488. *n.* 49.

Figuier à tête rouge de Penſilvanie. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 286.

Yellow Redpole. *Edw. glean. t.* 256.

Red-headed Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 401. *n.* 289. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 479. *n.* 99.

Habitat ſolitaria per aeſtatem in Penſilvaniae *dumetis, autumno diſcedens, atricapillae magnitudine.*

Roſtrum *nigrum;* remiges rectrices*que atrae, margine flavae;* pedes *atri.*

albicollis. 147. M. olivacea, ſubtus flaveſcens, gutture et pectore ſordide ochroleuco rubro-ſtriato, remigibus rectricibusque fuſcis margine ex vireſcente flavis, lateralibus intus flavicantibus.

Ficedula dominicenſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 494. *n.* 52. *t.* 26. *f.* 5.

Figuier à gorge blanche. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 287.

St. Domingo Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 479. *n.* 100.

Habitat in inſula S. Dominici, *hippolaidis magnitudine,* 5 *fere pollices longa.*

Roſtrum *corneum;* tempora *flaveſcentia;* pedes *ex grifeo fuſci;* feminae cervix *ex vireſcente cinerea.*

ludoviciana. 148. M. olivacea, gutture et pectore rubro-maculato flavis, abdomine ochroleuco, alarum faſciis duabus, rectricibusque duabus extimis intus ad apicem albis.

Ficedula ludoviciana. *Briſſ. av.* 3. *p.* 500. *n.* 55. *t.* 26. *f.* 4.

Figuier à gorge jaune. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 288.

Louiſiane Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 407. *n.* 303. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 480. *n.* 101.

Habitat in Louiſiana *et inſula* S. Dominici, *regulo parum major,* $4\frac{1}{4}$ *pollices longa.*

Roſtrum *fuſcum ſubtus griſeum*; remiges *ex nigricante fuſcae, margine ex caeruleo griſeae*; pedes *cinerei*; feminae pectus *non maculatum.*

chloroleuca. 149. M. olivacea, ſubtus ochroleuca, capite cinereo olivaceo vario, tectricibus alarum majoribus rectricibusque fuſcis, margine ex flavicante viridibus.

Ficedula dominicenſis minor. *Briſſ. av.* 3. *p.* 496. *n.* 53. *t.* 26. *f.* 2.

Figuier vert et blanc. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 289.

Green and white Warblen *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 480. *n.* 102.

Habitat in inſula S. Dominici, *hippolaide minor*, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

Roſtrum *corneum*; cauda *ſubbifurca*; rectrices *laterales flavo-variae*; pedes *ex griſeo fuſci.*

auricollis. 150. M. olivacea, ſubtus aurantia, abdomine flaveſcente, criſſo albido, tectricibus alarum majoribus et rectricibus intermediis cinereis, lateralibus intus albis, extus et apice nigris.

Ficedula canadenſis major. *Briſſ. av.* 3. *p.* 508. *n.* 59. *t.* 26. *f.* 1.

Figuier à gorge orangée. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 290.

Orange-throated Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 408. *n.* 304. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 481. *n.* 103.

Habitat in Canada, *atricapillae magnitudine, ultra* 5 *pollices longa.*

Mandibula *ſuperior fuſca, inferior albida*; remiges *fuſcae, margine cinereae*; pedes *griſei.*

maculoſa. 151. M. olivacea nigro-maculata, capite remigibusque cinereis, abdomine, criſſo alarumque faſciis duabus albis, gula, uropygio et pectore nigro-maculato flavis.

Ficedula penſilvanica naevia. *Briſſ. av.* 3. *p.* 502. *n.* 56.

Figuier à tête cendrée. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 291.

Yellow-rumped Flycatcher. *Edw. glean. t.* 255.

Yellow-rumped Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 400. *n.* 288. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 481. *n.* 104.

Habitat in Penſilvania, *hippolaidis magnitudine.*

Roſtrum pedes*que fuſci*; remiges *margine albae*; rectrices *intermediae nigrae, laterales nigricante macula intus in medio alba.*

fuſceſcens. 152. M. fuſceſcens, ſubtus ex nigricante et ruſo-griſeo varia, roſtro, gula faſciaque oculari fuſca.

Ficedula jamaicenſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 512. *n.* 61.

Figuier

Figuier brun. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 292.
Worm-eater. *Sloan. jam. p.* 310. *n.* 65. *t.* 265. *f.* 2. *Raj. av. p.* 186. *n.* 38.
Brown-throated Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 482. *n.* 105.
Habitat in Jamaica, *hippolaidis magnitudine*, 5 *pollices longa.*

tigrina. 153. M. fuſca, pennarum margine olivaceo, ſubtus uropygioque flava, abdomine inferiori ſordide ochroleuco, litura pone oculos rufa, rectricum remigumque margine olivaceo.
Ficedula canadenſis fuſca. *Briſſ. av.* 3. *p.* 515. *n.* 63. *t.* 27. *f.* 4.
Figuier tacheté de jaune. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 293.
Spotted yellow Fly-catcher. *Edw. glean. t.* 257.
Spotted yellow Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 407. *n.* 302. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 482. *n.* 106.
β) Ficedula dominicenſis fuſca. *Briſſ. av.* 3. *p.* 513. *n.* 62. *t.* 28. *f.* 5.
Habitat in Canada, β) *in inſula* S. Dominici, *hippolaidis magnitudine*, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum *atrum*; collum *et* pectus *maculis nigricantibus* (β. *fuſcis*) *varium*; tectrices *alarum majores faſcia alba* (*in* β. *nulla*); cauda *ſubbifurcata*, *rectricibus duabus extimis intus prope apicem albis*; pedes *fuſci.*

virens. 154. M. olivacea, gutture nigro, pectore, colli capitisque lateribus flavis, abdomine, criſſo et alarum faſciis duabus albis, remigibus rectricibusque cinereis, tribus extimis intus albo variis.
Ficedula penſilvanica gutture nigro. *Briſſ. av. app. p.* 104. *n.* 77.
Figuier à cravatte noire. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 298.
Black-throated green Fly-catcher. *Edw. glean. t.* 300.
Green Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 404. *n.* 297. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 484. *n.* 108.
Habitat Aprili in Penſilvania, *hippolaidis magnitudine.*
Roſtrum *nigrum*; hypochondria *ex albo nigroque varia*; tectrices *alarum minores olivaceae*, *reliquae cinereae*, *apice albae*; remiges *margine albae*; pedes *fuſci.*

dumetorum. 31. M. cinereo-fuſca, capite caeruleſcente, gula pectoreque albis. *Kram. el. p.* 377. *n.* 19. *Georg. it. p.* 174.
White-breaſted Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 447. *n.* 41.
Habitat in Germania *et* Ruſſia.

cinnamomea. 32. M. cana, ſubtus coccinea, gula nigra, remigibus quatuor primis baſi rubris.

Cinnamom Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 447. *n.* 41.
Habitat in Zeylon, *erithaco similima.*
Mari *macula* alarum *rubra*; rectrices *nigrae*, *intermediae* 4 *latere oblique rufae.*

nigrirostris. 155. M. ex olivaceo fusca, loris gulaque ex rufo flavis, pectore rufo nigricante-maculato, abdomine albo, tectricibus alarum apice ex rubescente albis, remigibus margine flavicantibus, rectricibus acutis: extimis albis.
Black-jawed Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 447. *n.* 43.
Longitudo 7 *pollicum*; rostrum *nigrum*, *basi pallidum*; *ad utrumque mandibulae latus stria nigricans*; pedes *ex flavo fuscescentes.*

lutescens. 156. M. ex ferrugineo fusca, subtus ex rubescente alba, fronte mentoque ex atro lutescentibus, macula aurium rubra, pectore atro-maculato.
Buff-faced Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 448. *n.* 45.
Longitudo *pollicum* 6; rostrum *atrum*; pedes *fuscescentes.*

borealis. 157. M. viridis, subtus flava, fronte, gula temporibusque ferrugineis, cauda rotundata: rectricibus lateralibus apice albis.
Rufty-headed Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 448. *n.* 44.
Habitat in Camtschatca, 5 *pollices longa.*
Rostrum *pallidum*; pedes *atri*; *tinctus* corporis *olivaceus.*

✓ camtschatkensis. 158. M. fusca, subtus dilutius, abdominis medio albo, fronte, genis, et mento dilute ferrugineis.
Longbilled Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 420. O.
Habitat in Camtschatca, *modulari minor.*
Rostrum *praelongum*, *gracile.*

Awatcha. 159. M. fusca, gula et pectore albis nigro-maculatis, abdominis medio lorisque albis, remigibus primoribus margine albis, rectricibus basi aurantiis.
Awatcha. *Arct. zool.* 2. *p.* 422. T.
Habitat in Camtschatca.

Caprata. 33. M. nigra, uropygio, crisso, maculaque tectricum alari albis.
Rubetra lucionensis. *Briss. av.* 3. *p.* 442. *n.* 30. *t.* 24. *f.* 2. 3.
Traquet de l'isle de Luçon. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 229. *Pl. enl. n.* 235. *f.* 1. 2.
Luzonian Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 451. *n.* 48.
Habitat in insula Luçon, *rubicolae magnitudine.*
Rostrum *atrum*; pedes *ex nigro fusci.*

Femina

Femina *supra fusca, subtus ex rufo fusca*; gula *albida*; uropygium *rufescens*; cauda *fusca*.

Phoenicurus. 34. M. gula nigra, abdomine caudaque rufis, capite dorsoque cano. *Fn. suec.* 257.* *Scop. ann.* 1. *p.* 157. *n.* 232. *Brünn. orn. n.* 280. 281. *Müll. zool. p.* 33. *n.* 278. *Georg. it. p.* 174. *Kram. el. p.* 376. *n.* 11. *Nozem. nederl. Vogel t.* 45.
Ruticilla. *Gesn. av.* 729. *Aldr. orn.* 2. *p.* 746. *t.* 746. 747. *Briss. av.* 2. *p.* 403. *n.* 15.
Codirosso. *Olin. acc. t.* 47.
Rossignol de muraille. *Buff. hist. nat. desois.* 5. *p.* 170. *t.* 6. *f.* 2. *Pl. enl. n.* 351. *f.* 1. 2.
Redstart. *Brit. zool.* 1. *n.* 146. *Arct. zool.* 2. *p.* 416. B. *Raj. av. p.* 78. *n.* 5. *Will. orn. p.* 218. *Albin. av.* 1. *t.* 50. *Hayes brit. birds t.* 40. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 421. *n.* 11.
Hausroetele. *Frisch av. t.* 19.
β) Ruticilla cinerea. *Briss. av.* 3. *p.* 406. A. *Günth. Nest. u. Eyer t.* 19. *f. sup.*
Ruticilla tertia Aldrovandi. *Raj. av. p.* 78. *n.* 5. 1. *Will. orn. p.* 218.
γ) Ruticilla pectore maculato. *Briss. av.* 3. *p.* 407. B.
Rothschwaenzlein. *Frisch av. t.* 20.
δ) Motacilla (Titys) remigibus nigricantibus, rectricibus rufis: intermediis pari nigro, extrorsum rufescente. *Fn. suec.* 1. *n.* 227.
Silvia Titys. *Scop. ann.* 1. *p.* 157. *n.* 233.
Gartenrothschwanz. *Günth. Nest. u. Eyer t.* 31. *f. inf.*
Habitat in Europa; *non raro in domibus ipsis, migratoria, cantillans, aliarum quoque avium vocem imitans, rubecula minor,* $5\frac{1}{4}$ *pollices longa, caudam frequenter motitans, nidum ex muscis in murorum aut arborum cavis struens, et pilis plumisque sternens, ova caerulea,* 4-5 *modularis ovis similia, at longiora pariens.*
Rostrum, genae *et* pedes *nigra*; frons *et* abdomen *alba*; uropygium, pectus *et* rectrices *laterales rufae, intermediae fuscae*; alae *fuscae*; feminae vertex *et* dorsum *ex cinereo grisea*; mentum *album*.

gibraltariensis. 160. M. cana, fronte, temporibus gulaque nigris, occipite et abdomine inferiori albis, uropygio caudaque aurantiis, rectricibus intermediis fuscis.
Ruticilla gibraltariensis. *Briss. av.* 3. *p.* 407. *n.* 16.
Rossignol de muraille de Gibraltar. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 177.

Grey Redſtart. *Edw. av. t.* 29. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 423. *n.* 12.
Habitat circa Gibraltariam, *rubeculae magnitudine.*
Roſtrum pedes*que fuſci;* remiges *ex griſeo fuſcae, margine albae;* rectrices *laterales praeter extimam apice fuſcae.*

Erithacus. 35. M. dorſo remigibusque cinereis, abdomine rectricibusque rufis: extimis duabus cinereis. *Fn. ſuec.* 258.*
Phoenicurus. *Geſn. av.* 3. *p.* 409.
Phoenicurus alter. *Aldr. orn.* 2. *p.* 748.
Phoenicurus torquatus. *Briſſ. av.* 3. *p.* 411. *n.* 18.
Rouge-queue à collier. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 180.
Red-tail. *Raj. av. p.* 78. *n.* 5. 2. *Will. orn. p.* 218. *c.* 7. 2. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 425. *n.* 14.
Grey Redſtart. *Arct. zool. p.* 417. C.
Rotſchwenzel. *Friſch av. t.* 20.
b) Phoenicurus. *Briſſ. av.* 3. *p.* 409. *n.* 17.
Habitat in Europae *ſilvis, rubecula paulo major, caudam ejus more frequenter movens, vix canora, verſus finem aeſtatis pinguis et ſapida, vermibus quoque victitans, in dumetis humilioribus ex muſco extus, ex lana plumisque intus nidum ſtruens, et ova* 5-6 *alba, griſeo varia pariens.*
Roſtrum *nigricans;* corpus *ſupra griſeum; inter* roſtrum *et* oculos (*mari*) *macula exilis fuſca;* uropygium *et* cauda *rufa,* rectricibus *intermediis* (*mari*) *fuſcis;* corpus *ſubtus ex albido griſeum, ex rufeſcente varium, juguli* (*in mare*) *arcu fuſco, ferri equini ſpecie, parte concava ſurſum verſa;* tectrices *caudae et inferiores alarum rufeſcentes; majores alarum* remiges*que ex griſeo fuſcae, margine rufeſcentes.*

gujanenſis. 161. M. griſea, ſubtus alba, alis caudaque longa rufis.
Rouge-queue de la Guyane. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 186. *Pl. enl. n.* 686. *f.* 2.
Gujana Red-tail. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 426. *n.* 16.
Habitat in Gujana, $6\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum *pallidum;* pedes *pallide incarnati.*

atrata. 162. M. nigra, vertice plumbeo, remigibus atris: ſecundariis margine exteriori albis, rectricibus rufis: intermediis duabus atris.
Black Red-tail. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 426. *n.* 16.
Longitudo *pollicum* 6; dorſi *pennae margine ex atro fuſcae.*

Guira. 36. M. viridis, ſubtus lutea, genis gulaque nigris linea lutea cinctis.

Sylvia

Sylvia brasilienſis viridis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 533. *n.* 71.
Guira-guaiu-beraba. *Marcgr. braſ.* 212. *Raj. av. p.* 83. *n.* 10. *Will. orn. p.* 239. *t.* 41. *Edw. glean. t.* 351. *f.* 2.
Guira-beraba. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 342.
Guira-Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 505. *n.* 142.

Habitat in Braſilia, *carduelis magnitudine.*

Roſtrum *atrum*, *ſubtus incarnatum*; facies *nigra*; linea *ſupraocularis flava*, *per utrumque colli latus producta*; remigum *apex*, pedes*que faſci.*

ſuecica. 37. M. pectore ferrugineo faſcia caerulea, rectricibus fuſcis verſus baſin ferrugineis. *Fn. ſuec.* 259.* *Georg. it. p.* 174.
Motacilla pectore caeruleo: macula flaveſcente albedine cincta. *Fn. ſuec.* 1. *n.* 220.
Cyanecula. *Briſſ. av.* 3. *p.* 413.
Phoenicurus pectore caeruleo. *Friſch av.* 3. *t.* 19. *f.* 3. 4.
Gorge bleue ſans tache blanche. *Buff. pl. enl. n.* 610. *f.* 1. 2. 3.
Gorge-bleue. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 206. *t.* 12.
Blue throated Redſtart. *Edw. av. t.* 28.
Blue throated Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 417. E. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 444. *n.* 39.
Wegfleklin. *Raj. av. p.* 78. A. 5. *n.* 3. *Will. orn. p.* 219.
Wydengykerlin. *Geſn. av.* 796.

b) Cyanecula gibraltarienſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 416. *n.* 20.

β) Motacilla macula pectoris argentea.
Gorge-bleue à tache blanche. *Buff. pl. enl. n.* 361. *f.* 2.

Habitat in Europae *et* Sibiriae *alpinis et ſubalpinis ſalicibus, almis, ad aquam creſcentibus, Aprili ante ſolis ortum et occaſum quaterno ſaepiſſime numero, rubeculae magnitudine et habitu, cantu luſciniam aemulans, quamvis minus alto, in ſalicibus et gramine nidificans, non migrans.*

Supercilia *ex rufo alba*; guttur *caeruleum*, *faſcia nigra ſubtus terminatum*; abdomen *et* criſſum *exalbidum*: Feminae gula *alba*, *faſcia lata caerulea*, *alteraque contigua nigra terminata.*

Stalis. 38. M. ſupra caerulea, ſubtus tota rubra, abdomine albo.
Rubecula carolinenſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 423.
Avis caerulea. *Kalm it.* 3. *p.* 30.
Rouge-gorge bleue de la Caroline. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 212. *Pl. enl. n.* 390. *f.* 1. 2.
Blue Bird. *Catesb. Car.* 1. *t.* 47.
Blue Redbreaſt. *Edw. av. t.* 24.
Blue Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 446. *n.* 40.

Blue-

Blue-backed Redbreaſt. *Arct. zool.* 2. *p.* 398. *n.* 281.
Habitat gregaria in inſulis Bermudis *et aeſtate in* America *ſeptentrionali, in terra, ephemeris aliisque inſectis victitans, quae in zeae, miliique culmis conquirit, volatu pernix, voce lugubris, in cavis arboribus nidificans, rubecula major,* $5\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum *nigricans;* pedes *nigri;* feminae remiges *ſecundariae margine albae.*

fulicata. 39. M. nigro-violacea, criſſo caſtaneo, macula tectricum alba.
Rubetra philippenſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 444. *n.* 31. *t.* 23. *f.* 2.
Traquet des Philippines. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 230. *Pl. enl. n.* 185. *f.* 1.
Sooty Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 451. *n.* 49.
Habitat in inſulis Philippinis, *capratae magnitudine,* $6\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum pedes*que fuſci.*

cayana. 40. M. caerulea, capiſtro, humeris, alis caudaque nigris.
Sylvia cayanenſis caerulea. *Briſſ. av.* 3. *p.* 533. *n.* 72. *t.* 28. *f.* 1.
Elotototl. *Hern. mex.* 54. *Raj. av. p.* 170. *n.* 4.
Pitpit bleu de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 339. *Pl. enl. n.* 669. *f.* 2.
Cayenne Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 502. *n.* 138.
β) Motacilla capite caeruleo.
Blue Manakin. *Edw. glean. t.* 263.
γ) Pitpit bleu de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 669. *f.* 1.
Habitat in Gujana, $4\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum *nigricans;* frons *et* tempora *nigra;* pedes *griſei.*

cyanocephala. 163. M. viridis, capite et tectricibus alarum ſuperioribus caeruleis, gula cana, remigibus fuſcis margine viridibus.
Sylvia viridis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 531. *n.* 70. *t.* 28. *f.* 4.
Pitpit vert. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 338.
Blue-headed Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 503. *n.* 139.
Habitat in Cayenna, *hippolaidis magnitudine,* $4\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum *fuſcum;* pedes *griſei.*

lineata. 164. M. ſubtus caerulea, linea alba a pectore ad criſſum producta luteſcente, verticis macula longitudine et fronte caeruleis.
Pitpit à coëffe bleue. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 342.
Blue ſtriped Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 504. *n.* 140.
Habitat in Cayenna.

Roſtrum

Roſtrum pedes*que nigri*; color *caeruleus a fronte ad dorſum productus.*

cyanea. 165. M. ex caeruleo nigra ſubtus alba, capite pennis laxis longisque turgido, fronte, genis et torque ſplendidiſſime caeruleis. *Ellis narrat. p.* 22.
Superb Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 501. *u.* 137. *t.* 53.
β) Motacilla capite colloque penitus caeruleis.
Gobe-mouche à tête bleue de l'isle de Luçon. *Sonner. it. p.* 58. *t.* 27. *f.* 1.
Habitat in terra van Diemen, *β*) *in inſula* Manilla, $5\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Caput *praeter partes caeruleas nigerrimum*; roſtrum *et* faſcia *ocularis nigra*; mentum *ex atro caeruleum*; remiges *atrae*; cauda *cuneiformis*; pedes *fuſci*, unguibus *nigris.*

Velia. 41. M. caerulea, ventre uropygioque fulvis.
Sylvia ſurinamenſis caerulea. *Briſſ. av.* 3. *p.* 536. *n.* 73.
Pitpit varié. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 341.
Pitpit bleu de Surinam. *Buff. pl. enl. n.* 669. *f.* 3.
Rouge-gorge. *Ferm. Surin.* 2. *p.* 194?
Red-bellied blue Bird. *Edw. av. t.* 22. *Bancr. Guj. p.* 182?
Red-bellied Warbler. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 504. *n.* 141.
Habitat in Gujana, Cayenna, Surinamo, *hippolaidis magnitudine.*
Roſtrum *plumbeum*, *ſubtus albidum*; frons *ex caeruleſcente viridis*; uropygium *viridi-aureum*; gula jugulum*que violaceum*, *hoc fuſco varium*; remiges rectrices*que nigrae*, *margine caeruleae*; pedes *cinerei.*

canadenſis. 42. M. ſupra caerulea ſubtus alba, jugulo, remigibus rectricibusque nigris.
Ficedula canadenſis cinerea minor. *Briſſ. av.* 3. *p.* 527. *n.* 68. *t.* 27. *f.* 6.
Figuier bleu. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 304.
Petit figuier cendré de Canada. *Buff. pl. enl. n.* 685. *f.* 2.
Blue Fly-catcher. *Edw. glean. t.* 252.
Black-throated Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 399. *n.* 285.
Lath. ſyn. II. 2. *p.* 487. *n.* 113.
Habitat aeſtate in Penſilvania, *cincta minor*, $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum *et* tempora *nigra*; corpus *ſubtus albidum*; cauda *ſubfurcata ex cinereo caerulea*; rectrices 3 *extimae intus baſi et apice albae*; 4, 5 *apice*, remiges *primores apice albae.*

43. M.

caerulea. 43. M. supra caerulea, subtus alba, alis caudaque nigris.
Ficedula pensilvanica cinerea. *Briss. av. app. p.* 107. *n.* 79.
Figuier gris-de-fer. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 309.
Little blue grey Fly-catcher. *Edw. glean. t.* 302.
Caerulean Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 405. *n.* 299. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 490. *n.* 117.
β) Motacilla caerulea, capite nigro.
Figuier à tête noire de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 704. *f.* 1.
Habitat aestate in Pensilvania, *hippolaidis magnitudine, nidum cylindricum supra apertum in dichotomia arborum ex tenera lanugine, extus ex muscis et lichenibus struens, et pilis equinis sternens.*
Rostrum *nigrum, mandibulae inferioris basi rubescente*; linea (*mari*) *a rostro ad occiput nigra*; alae *ex cinereo fuscae*; remiges *margine interiori albae*; rectrices *longiusculae, extimae albae, reliquae ex cinereo caeruleae*, 5, 5 *apice albae.*

✓ Cyana. 166. M. tota cyanea, subtus nivea, striga a rostro ad alas atra.
Pall. it. 3. *p.* 697. *n.* 18.
Habitat rarior vere in extremis Dauuriae *campis inter* Ononem *et* Argunum, *calliopae magnitudine, currucae habitu, caeruleae affinis, quae tamen superciliis atris, et rectricibus lateralibus albis differt.*

arundinacea. 167. M. supra olivaceo-fusca, subtus albida, loris et orbitis fusco-albescentibus, angulo carpi subtus luteo-fulvo, cauda subcuneata fusca, plantis luteo-virescentibus. *Lightfoot act. angl.* 1785. 1. *p.* 8. *t.* 1.
Turdus arundinaceus anglic! an M. salicaria?
Habitat ad fluvium Coln *prope* Uxbridge *et alibi in* Anglia, *reguli magnitudine, ad* $7\frac{1}{2}$ *pollices longa, nidum inter* 3-4 *arundines, quarum culmi latera ejus quasi transfigunt, extus ex siccis graminum culmis, intus ex paniculis floriferis arundinis, aut marcido gramine paucisque pilis equinis struens, et* 4 *utplurimum ova pariens exalbida olivaceo-maculata.*
Rostri *mandibula superior cornea, inferior incarnata*; faux *aurantia*; mentum *album*; pedes *dilute olivacei.*

✓ Sibilla. 44. M. nigricans, subtus alba, pectore rufo, macula alarum alba.
Rubetra madagascariensis. *Briss. av.* 3. *p.* 439. *n.* 28. *t.* 24. *f.* 4.
Traquet de Madagascar. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 231.
Habitat

Habitat in Madagaſcar, *ſuaviſſime canora, rubicolae affinis, ſed paulo major.*
Dorſi *pennae*, tectrices*que alarum margine muſtelinae.*

Rubecula. 45. M. griſea, gula pectoreque ferrugineis. *Fn. ſuec.* 260.* *Scop. ann.* 1. *n.* 231. *Kram. el. p.* 376. *n.* 13. *Brünn. orn. n.* 283. *Müll. zool. n.* 276. *Nozem. nederl. Vogel t.* 47.
Rubecula ſ. Erithacus. *Geſn. av.* 729. *t.* 730. *Aldr. orn.* 2. *p.* 741. *t.* 742. *Briſſ. av.* 3. *p.* 418. *n.* 21.
Petti-roſſo. *Olin. ucc. t.* 16.
Rouge-gorge. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 196. *t.* 11. *Pl. enl. n.* 361. *f.* 1.
Robin Red-breaſt or Ruddock. *Raj. av. p.* 78. *n.* 3. *Will. orn. p.* 219. *t.* 39. *Alb. av.* 1. *t.* 51.
Red-breaſt. *Brit. zool.* 1. *n.* 147. *Arct. zool.* 2. *p.* 417. D. *Hayes brit. birds t.* 40.* *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 442. *n.* 38.
Roetele. *Friſch av. t.* 19. *Günth. Neſt. u. Eyer t.* 3. *f. inf.*
β) Rubecula bononienſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 422. *n.* 22.
Spipola prima Aldrovandi. *Raj. av. p.* 80. *n.* 3. *Will. orn. p.* 210.
γ) Rubecula tota alba.
Habitat in Madera *et* Europa, *aeſtate in ſilvis, hieme prope habitationes, alias migrans, ſolitaria, manſueta hominique familiaris, egregie cantillans, valde pugnax, ut non una arbor duos capiat erithacos, praeter inſecta alia etiam devorans, et euonymi ſeminibus multum delectata; in dumetis, interdum quoque ad aedificiorum partes remotiores ex ſiccatis foliis, pilis, muſcisque nidum ſtruens, plumisque ſternens, et ova 5-7 obſcure alba rubeſcente-maculata pariens, ex quibus prodeuntes pulli ad Septembrem usque naevii.*
Color *ſupra ex vireſcente cinereus*, frontis, colli *et* pectoris *ex rufo aurantius*, abdomini, *et* criſſi *albidus*, roſtri, pedum *et* hypochondriorum *ater*; rectrices *angulo acuto terminatae.*

Troglodytes. 46. M. griſea, alis nigro cinereoque undulatis. *Fn ſuec.* 261.* *Scop. ann.* 1. *n.* 239. *Kram. el. p.* 378. *n.* 20. *Brünn. orn. p.* 72. *n.* 284. *Müll. zool. p.* 33. *n.* 279. *Nozem. nederl. Vogel t.* 58.
Regulus. *Briſſ. av.* 3. *p.* 425. *n.* 24.
Paſſer troglodytes. *Geſn. av.* 651. *Aldr. orn.* 2. *p.* 654. *t.* 42.
Reattino. *Olin. ucc. t.* 6.
Roitelet. *Buff. pl. enl. n.* 651. *f.* 2.

Troglo-

Troglodyte. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 352. *t.* 1.
Wren. *Brit. zool.* 1. *n.* 154. *Arct. zool.* 2. *p.* 414. *n.* 322. *Raj. av. p.* 80. *n.* 11. *Will. orn. p.* 229. *t.* 42. *Albin. av.* 1. *t.* 53. B. *Hayes brit. birds t.* 38. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 506. *n.* 143.
Zaunkoenig. *Friſch av. t.* 24. *f.* 3. *Georg. it. p.* 175. *Günth. Neſt. u. Eyer t.* 2.

β) Regulus linea ſuperciliari nulla.
Roitelet de Buenos Ayres. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 361. *Pl. enl. n.* 730. *f.* 2.

γ) Regulus major, ſubtus ex rufeſcente flavus.
Troglodyte de la Louiſiane. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 361.
Roitelet de la Louiſiane. *Buff. pl. enl. n.* 730. *f.* 1.

Habitat in Europa *et* Aſia, β) *in vicinia fluvii* Plata Americae, γ) *in* Louiſiana, $3\frac{3}{4}$-5 *pollices longa, cauda erecta incedens, per omnem annum egregie cantans, et bis quotannis aut in ſilvarum dumetis, truncis, vel terra, aut prope domus in murorum foraminibus &c. ovalem foramine unico apertum nidum extus ex muſcis, intus ex plumis ſtruens, et* 10-18 *ova alba parumper rubeſcente-maculata pariens.*

Roſtrum *ex atro fuſcum;* caput, collum *et* dorſum *ſpadiceum, hoc lineis nigricantibus pictum;* genae *exalbidae rufo-variae;* ſupercilia, guttur *et* pectus *ex rufeſcente alba;* abdomen *fuſceſcens lineis fuſcis varium;* remiges *alternatim rubeſcentes et nigrae;* pedes *fuſceſcentes:* Cauda *rotundata faſciis transverſis fuſcis.*

furva. 168. M. tota fuſca, dorſo, alis caudaque lineis atris.
Roitelet de Surinam. *Ferm. Surin.* 2. *p.* 201?
Brown Warbler. *Brown illuſtr. p.* 68. *t.* 18. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 508. *n.* 144.

Habitat in Surinamo, *egregie cantans,* $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum pedes*que ex flavicante fuſci.*

Calendula. 47. M. cinereo-virens, linea verticali flaviſſima, abdomine aliſque ſubtus flaveſcentibus.
Calendula penſilvanica. *Briſſ. av.* 3. *p.* 584. *n.* 18.
Roitelet rubis. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 373.
Ruby-crowned Wren. *Arct. zool.* 2. *p.* 413. *n.* 320. *Edw. glean. t.* 254. *f.* 2. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 511. *n.* 146.

β) Regulus corona occipitis rubra.

Habitat in America *ſeptentrionali, regulo major, et pollicem longior, inſecta in pinuum truncis venans, in quibus pari inſtar decurrit.*

Corpus

Corpus *supra olivaceum*, *subtus ochroleucum*; alarum *fasciae duae flavicantes*; remiges rectricesque *fuscescentes margine pallidiores*; pedes *fusci*: Femina *linea* verticis *flammea nulla.*

Regulus. 48. M. remigibus secundariis exteriori margine flavis, medio albis, vertice luteo. *Fn. suec.* 262.* *Scop. ann.* 1. *n.* 240. *Kram. el. p.* 378. *n.* 21. *Brünn. orn. n.* 285. *Müller zool. p.* 33. *n.* 280.

Regulus cristatus. *Aldr. orn.* 2. *p.* 649.

Calendula. *Briss. av.* 3. *p.* 579. *n.* 17.

Fior Rancio. *Olin. ucc. t.* 6.

Roitelet. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 363. *t.* 16. *f.* 2.

Roitelet huppé. *Buff. pl. enl. n.* 651. *f.* 3.

Golden-crested Wren. *Brit. zool.* 1. *n.* 153. *Arct. zool.* 2. *p.* 414. *n.* 321. *Raj. av. p.* 79. *n.* 9. *Will. orn. p.* 227. *t.* 42. *Albin. av.* 1. *t.* 59. *f.* A. *Edw. glean. t.* 254. *f.* 1. *Catesb. Car.* 3. *p.* 13. *t.* 3. *Hayes brit. birds t.* 38.** *Lath. syn.* II. 2. *p.* 508. *n.* 145.

Ochsenauge. *Frisch av. t.* 24. *f.* 4. *Georg. it. p.* 175.

β) Regulus cristae parte posteriori flava.

Roitelet-mésange. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 375.

Mésange huppée de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 708. *f.* 2.

Habitat per omnem orbem cognitum, *potissimum in quercubus, inter europaeas aves facile minima, et* $3\frac{1}{2}$ *pollices modo longa, canora, nidum subrotundum altero latere apertum ex muscis struens, intus lanugine sternens, et ova* 6-8 *pariens.*

Rostrum *nigrum*; crista *verticis aurantia* (*feminae flava*) *utrinque nigro-marginata*; corpus *supra ex flavicante viride, subtus ex rufo album*; tectrices *alarum atrae fasciis duabus transversis albis*; remiges rectricesque *atrae*; pedes *flavi.*

Trochilus. 49. M. cinereo-virens, alis subtus tectricibus flavescentibus, superciliis luteis. *Fn. suec.* 264.* *Scop. ann.* 1. *n.* 238. *Kram. el. p.* 378. *n.* 22. *Brünn. orn. n.* 286. *Müll. zool. n.* 281.

Motacilla hispanica. *Hasselq. it. p.* 287. *n.* 52.

Regulus non cristatus. *Aldr. orn.* 2. *p.* 653. *t.* 654.

Asilus. *Gesn. av.* 223. *Aldr. orn.* 2. *p.* 657. *Briss. av.* 3. *p.* 479. *n.* 45.

Pouillot ou Chantre. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 344. *Pl. enl. n.* 651. *f.* 1.

Small yellow bird. *Raj. av. p.* 80. *n.* 10. *Will. orn. p.* 228.
Green Wren. *Albin. av.* 2. *t.* 59. *f.* A.
Yellow Wren. *Brit. zool.* 1. *n.* 151. *Arct. zool.* 2. *p.* 413. *n.* 319. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 412. *n.* 147.
Willowwren. *Hayes brit. birds t.* 38.*

β) Motocilla acredula. *Fn. suec.* 1. *n.* 237.
Oenanthe fusco-lutea minor. *Raj. av. p.* 186. *n.* 39. *Sloan. jam.* 2. *p.* 310. *n.* 46.
Ficedula carolinensis. *Briss. av.* 3. *p.* 486. *n.* 48.
Figuier brun et jaune. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 295.
Yellow Titmouse. *Catesb. Carl.* 1. *t.* 63.
Yellow Wren. *Edw. glean. t.* 278. *f.* 2.
Scotch Wren. *Brit. zool.* 1. *p.* 379?

γ) Trochilus lotharingicus, gula et superciliis albis.
Asilus major. *Briss. av.* 3. *p.* 482. A.
Grand Pouillot. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 351.
Greater not-crested Regulus. *Will. orn. p.* 228.

δ) Motacilla corpore ex fusco virideſcente, pectore ferrugineo. *Hasselq. it.* 286. *p.* 51.

Habitat in Europa, *et septentrionali* Asia *atque* America, β) *quoque in* Jamaica, *migratoria, frequens in salicibus, quarum ramos instar pari percurrit, insecta pro victu quaesitura, parum, nisi incubationis tempore canora, in cavis radicum arborum aut riparum nidum rotundum struens extus ex muscis, intus ex lana, pilis aut plumis, ovaque* 5 *pariens exalbida, rubescente-maculata; troglodyte paulo major,* $4\frac{3}{4}$ *pollices longa.*

Corpus *supra dilute olivaceum subtus flavum*; cauda alaeque *fuscae margine ex flavicante virides*; pedes *flavicantes.*

aestiva. 169. M. flava, corpore supra olivaceo, remigibus rectricibusque fuscis, lateralibus intus flavis.

Ficedula canadensis. *Briss. av.* 3. *p.* 492. *n.* 21. *t.* 26. *f.* 3.
Figuier tacheté. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 285.
Figuier de la Caroline. *Buff. pl. enl. n.* 58. *f.* 1.
Olive-warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 409. *n.* 307.
Yellow-Poll. *Arct. zool.* 2. *p.* 402. *n.* 292. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 515. *n.* 148.

β) Motacilla corpore supra fusco.
Figuier de Canada. *Buff. pl. enl. n.* 58. *f.* 2.
Habitat in Gujana, *aestate in* Canada, *migratoria, hippolaide minor,* $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Rostrum pedes*que nigri*; collum *et* pectus *maculis longitudinalibus rubescentibus varia.*

170. M.

sutoria. 170. M. tota flava minima. *Ind. zool. t.* 8.
Tailor Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 515. *n.* 149.
Habitat in India, 3 *pollices longa, nidum ex filamentis subtilibus texens, pennis, plumulis, plantarumque pappis sternens, folioque deciduo affigens, quod vegetae frondi denuo assuit, ova candida pariens, quae formicarum ovis aequiparat* Pennant.

caffra. 50. M. olivacea, gula caudaque ferrugineis, superciliis albis. *Mantiss. pl. alt. p.* 527.
Caffrarian Warbler. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 426. *n.* 17.
Habitat ad caput bonae spei, *albae magnitudine.*
Uropygium *ferrugineum*; pectus *et* abdomen *albida*; remiges *fuscae*; rectrices *aequales, laterales apice, intermediae totae fuscae*; lora *nigra.*

gularis. 171. M. supra ferruginea subtus alba, gula, alis caudaque nigris. *Miller on var. subj. t.* XXX. C.
Habitat in America *australi.*

flavicauda. 172. M. olivacea subtus alba, vertice et uropygio cinereis, alarum area et rectricibus lateralibus flavis apice fuscis, intermediis totis fuscis.
Yellow-tail Fly-catcher. *Edw. glean. t.* 257.
Yellow-tail Warbler. *Arct. zool.* 2. *p.* 406. *n.* 301.
Habitat in America, *migratoria.*

Tschecantschia. 173. M. supra nigricans, subtus ferruginea, capite atro, nucha albicante, torque et macula alarum oblonga albis, dorso nigro. *Lepechin it.* 2. *p.* 186.
Habitat in Sibiria. *An a M. rubicola specie subsistentes deprehenta?*

Melanope. 174. M. ex caerulescente cinerea, subtus flava, loris et gutture nigris, superciliis et rectricibus utrinque tribus lateralibus albis, praeter extimas margine exteriore nigris. *Pallas it.* 3. *p.* 696. *n.* 16.
Habitat rarior circa ripas glareosas orientales Dauuriae, *habitu flavae, sed minor, pedibus minoribus, cauda longiore.*
Linea *alba a rictu per collum utrinque longitudinalis*; cauda *aequalis.*

baarula. 51. M. supra cinerea subtus flava, rectrice prima tota, secunda latere interiori alba. *Mantiss. pl. alt. p.* 527. *Scop. ann.* I. *n.* 226.
Motacilla flava. *Briss. av.* 3. *p.* 471. *n.* 41. *t.* 23. *f.* 3.
Motacilla flava altera. *Raj. av. p.* 75. *n.* 3.

IV. 2. 95. Habitat in palmis Javae.

Bergeronnette jaune. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 268. *Pl. enl. n.* 28. *f.* 1.
Yellow Wagtail. *Alb. av.* 2. *t.* 58.
Grey Wagtail. *Brit. zool.* 1. *n.* 144. *Will. orn. p.* 238. *Edw. glean. t.* 259. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 398. *n.* 4.
b) Motacilla campeſtris. *Pall. it.* 3. *p.* 616. *n.* 15.
β) Motacilla javenſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 474. *n.* 42. *t.* 25. *f.* 2.
Bergeronnette de Java. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 272.
Habitat in Europae, Dauuriae, β) Javae, *humidis, ad rivos et fluvios, etiam ad* Senegal, *interdum gregaria, in* Suecia *aeſtate tota die boves comitans, conopſes calcitrantes et irritantes colligens, nidum prope aquas in terra extus ex fibris ſiccatis et muſcis, intus ex pilis, plumis et lana ſtruens, et* 6-8 *ova exalbida flavo-maculata pariens,* $7\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum *et* pedes *fuſci*; corpus *ſupra ex vireſcente cinereum*; tempora *cinerea*; mentum *et* gula (*mari*) *nigra*; tectrices *alarum fuſcae, margine cinereae*; remiges *fuſcae, ſecundariae baſi albae, primoribus aequales*; rectrices *praelongae, mediae nigrae, margine vireſcentes*; *tertia diſco alba*; *ſecunda latere interiori et apice alba.*

115. PIPRA. *Roſtrum* capite brevius, robuſtum, durum, baſi ſubtrigonum, integerrimum, apice incurvum.
Nares plurimis denudatae.
Pedes greſſorii.
Cauda brevis.

✓ Rupicola. 1. P. criſta erecta margine purpurea, corpore crocco, tectricibus rectricum truncatis.
Rupicola. *Briſſ. av.* 4. *p.* 437. *n.* 1. *t.* 34. *f.* 1.
Coq de roche. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 432. *t.* 20. *Pl. enl. t.* 39. *et* 747. *Voſm. t.* 6.
Hoopoe hen. *Edw. glean. t.* 264.
Creſted Manakin. *Gen. of birds p.* 64. *t.* 10.
Rock Manakin. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 518. *n.* 1.
Felſenhahn. *Walch Naturf.* 11. *p.* 1. *t.* 1. 13. *p.* 11. 17. *p.* 12.
β) Rupicola alis caudaque nigris.
Coq-de-roche du Pérou. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 437. *Pl. enl. n.* 745.
Habitat in Americae *auſtralis rupibus, earumque ſpeluncis et fiſſuris, frequens in montibus* Luca *et* Curuaye *ad fluvios*

vios Oyapoc *et* Aprouak, *columbae minoris magnitudine,* 10-12 *pollices longa, hominem metuens, junior tamen cicuranda, fructibus minoribus victitans, moribus gallinae similis, nidum in abditissimis rupium recessibus ex siccis baculis compingens, et ova 2 rotunda alba, columbinis aequalia pariens.*

Rostrum *flavicans*; crista *ex duplici plumarum serie conflata*; remiges *dimidia sui parte albae, altera fuscae*; rectrices *omnes apice aurantiae; extimae fuscae, intus a basi ad medium aurantiae; reliquae intus et extus a basi ad medium aurantiae; ceterum fuscae:* Pulli *grisei*; feminae *et mares anniculi toti fusci, tectricibus tamen alarum inferioribus ex rufo aurantiis.*

Pareola. 2. P. crista sanguinea, corpore nigro, dorso caeruleo.
Manacus cristatus niger. *Briss. av.* 4. *p.* 459. *n.* 10. *t.* 35. *f.* 1.
Tije-guacu. *Marcgr. bras.* 312. *Will. orn. p.* 218.
Tijé ou grand Manakin. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 411. *t.* 19. *f.* 2.
Manakin noir huppé. *Buff. pl. enl. n.* 687. *f.* 2. *et* (*fem.*) *n.* 303. *f.* 2.
Blue-backet Manakin. *Edw. glean. t.* 261. *f.* 1. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 520. *n.* 2.
Habitat in Brasilia, Cayenna, Cuba, *fringillae domesticae magnitudine,* $4\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Crista *plicatilis*; rectrices *alarum minores caeruleae*; pedes *rubri:* Femina *tota olivacea, junior avis viridis.*

superba. 14. P. aterrima, verticis medii plumis longiusculis ex flammeo rubris, dorsi inter alas area lunata dilute caerulea, remigibus primoribus fusceſcentibus. *Pallas spic.* 6. *p.* 8. *t.* 3. *f.* 1.
Aureola major, pareolae multum affinis; et rostrum *nigrum, plumae* frontis *nares obtegentes;* pili *ad nares et oris angulos inque gula crebri;* remiges *primores acutae;* cauda *brevis, rectricibus* 10 *constans;* pedes *cum* unguibus *lutei.*

cristata. 3. P. crista lutea, corpore purpureo.
Manacus cristatus ruber. *Briss. av.* 4. *p.* 462. *n.* 12.
Picicitli. *Seb. mus.* 1. *t.* 59. *f.* 4? *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 426.
Serin de Surinam. *Ferm. Surin.* 2. *p.* 194.
Purple Manakin. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 528. *n.* 14.
Habitat in Brasilia *et* nova Hispania, $3\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Rostrum *et* cauda *rubra.*

Rubetra. 4. P. crista lutea, corpore testaceo, remigibus rectricibusque caeruleis.
Manacus cristatus rufus. *Briss. av.* 4. *p.* 461. *n.* 11.
Avis americana cristata Rubetra. *Seb. mus.* 1. *t.* 102. *f.* 4.
Rubetra ou oiseau d'Amérique huppé. *Buff. hist. nat. des oiſ.* 4. *p.* 425.
Yellow Manakin. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 529. *n.* 15.
Habitat in Brasilia *et* Cayenna, $4\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Rostrum *flavum*; corpus *flavicans*; gula *fusca.*

torquata. 15. P. nigra, capite coccineo, gutture aureo, tectricibus alarum remigibusque caeruleis.
Manacus torquatus. *Briss. av.* 4. *p.* 456. *n.* 8.
Maizi de Miacatototl. *Seb. mus.* 1. *p.* 92. *t.* 57. *f.* 3. *Buff. hist. nat. des oiſ.* 4. *p.* 424.
Collared Manakin. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 529. *n.* 16.
Habitat in Brasilia, *erythrocephalae magnitudine*, $3\frac{1}{4}$ *fere pollices longa.*
Rostrum *flavicans*; pedes *dilute flavi.*

grisea. 16. P. grisea, subtus flava, occipite cristato, tectricibus alarum majoribus rubris, remigibus caudaque ex cinereo griseis, frontis macula flava.
Manacus cristatus griseus. *Briss. av.* 4. *p.* 463. *n.* 13.
Coquantototl, avicula cristata, forma passeris. *Seb. mus.* 2. *p.* 74. *t.* 30. *f.* 7. *Buff. hist. nat. des oiſ.* 4. *p.* 427.
Grey Manakin. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 530. *n.* 17.
Habitus *fringillae domesticae*; longitudo $3\frac{1}{4}$ *pollicum*; rostrum *flavum.*

albifrons. 5. P. crista alba, corpore testaceo, dorso nigro.
Demi-fin à huppe et gorge blanches. *Buff. hist. nat. des oiſ.* 5. *p.* 335.
White-faced Manakin. *Edw. glean. t.* 344. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 530. *n.* 18.
β) Pipra crista inaequali longiore, corpore caudaque cinnamomeis, cauda alisque nigris.
Plumet blanc. *Buff. hist. nat. des oiſ.* 4. *p.* 429.
Manicus de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 707. *f.* 1.
Habitat in America *australi*, $5\frac{1}{4}$, *β*) 6 *pollices longa.*
Rostrum *nigrum*; crista *plicatilis*, *ex pennis acutis conflata*, *cum* facie *et* gula *linea nigra circumscripta alba*; cervix, dorsi *medium et* alae *ex nigricante cinereae*; *reliquum* corpus *cum* cauda *ex aurantio cinnamomeum*; pedes *ex rubescente flavi.*

6. P.

erythrocephala. 6. P. nigra, capite armillisque fulvis.
Parus erythrocephalus. *Syst. nat.* X. 1. *p.* 191.
Manacus aurocapillus. *Briss. av.* 4. *p.* 448. *n.* 4. *t.* 34. *f.* 2.
Manakin à tête d'or. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 418. *Pl. enl. n.* 34. *f.* 1.
Golden-headed black Titmouse. *Edw. av. t.* 21.
Goldheaded Manakin. *Gen. of. birds p.* 64. *t.* 10. *f.* 2. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 522. *n.* 5.
β) Manacus rubro-capillus. *Briss. av.* 4. *p.* 450. *n.* 5.
Avis mexicana altera. *Seb. mus.* 1. *t.* 60. *f.* 8.
Tangarae species 2. *Marcgr. bras.* 215. *Raj. av. p.* 84. *n.* 14. *Will. orn. p.* 244.
Manakin à tête rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 418.
Habitat gregaria in Brasiliae, Gujanae, *et* novae Hispaniae *silvis, etiam in zea frequens,* $3\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Rostrum *flavum*; vertex (*in β. ruber*), nucha, genae *et* armillae *aurantiae*; *reliquum* corpus *ex purpurascente nigrum*; pedes *incarnati.*

Aureola. 7. P. nigra, capite pectoreque coccineis, remigibus antrorsum macula alba. *Mus. Ad. Frid.* 2. *p.* 32.*
Parus Aureola. *Syst. nat.* X. 1. *p.* 191.
Manacus ruber. *Briss. av.* 4. *p.* 452. *n.* 6. *t.* 34. *f.* 3.
Avicula surinamensis. *Pet. gazoph. t.* 46. *f.* 12.
Manakin rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 415. *Pl. enl. n.* 302. *f.* 2.
Red and black Manakin. *Edw. glean. t.* 261. *f.* 2. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 525. *n.* 9.
β) Manacus aurantius. *Briss. av.* 4. *p.* 454. *n.* 7.
Manakin orangé. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 417. *Pl. enl. n.* 302. *f.* 3.
Black and yellow Manakin. *Edw. av. t.* 83. *f.* 2.
Habitat in Gujana *frequens,* $3\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Rostrum *nigrum*; caput, capistrum, collum, pectus, abdominis *medium rubra, in β) aurantia*; alarum *macula alba*; pedes *cum* unguibus *rubri, in β) fusci*; femina *olivacea, vertice rubra corona cincto, subtus ex olivaceo flava*; pulli *toti olivacei, maculis tamen in capite, gula, pectore et abdomine rubris.*

leucocephala. 8. P. nigra, capite albo. *Mus. Ad. Frid.* 2. *p.* 33.*
White-headed Manakin. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 524. *n.* 7.
Habitat Surinami, *motacillae magnitudine, sed rostro robustiore.* Setae *ingentes circa os.*

leucocapilla. 9. P. atra, pileo albo. *Muſ. Ad. Frid.* 2. *p.* 33.*
Parus Pipra. *Syſt. nat.* X. 1. *p.* 190.
Manacus albo-capillus. *Briſſ. av.* 4. *p.* 446. *n.* 3. *t.* 35. *f.* 2.
Manakin à tête blanche. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 418. *Pl. enl. n.* 34. *f.* 2.
White-capped Manakin. *Edw. glean. t.* 260. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 523. *n.* 6.
Habitat in Braſiliae, Gujanae, Surinami *arundinetis, egregie cantans, erythrocephala minor*, $3\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum *ex griſeo fuſcum*; corpus *chalybis inſtar nitens*; pedes *cum* unguibus *rubeſcentes.*

guttura-lis. 10. P. nigra, gula alba.
Manacus gutture albo. *Briſſ. av.* 4. *p.* 444. *n.* 2. *t.* 36. *f.* 1.
Manakin à gorge blanche. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 421. *Pl. enl. n.* 324. *f.* 1.
White-throated Manakin. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 524. *n.* 8.
Habitat in Americae *calidioribus*, $3\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Mandibula *ſuperior nigricans, inferior alba*; remigum *mediarum nonnullae intus albae*; pedes *cum* unguibus *rubri.*

ſerena. 11. P. nigra, fronte alba, uropygio cyaneo, ventre fulvo. *Koelreut. nov. comm. Petrop.* 11. *p.* 433. *t.* 15. *f.* 5.
Manacus alba fronte. *Briſſ. av.* 4. *p.* 457. *n.* 9. *t.* 36. *f.* 2.
Manakin varié. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 423.
Manakin à front blanc. *Buff. pl. enl. n.* 324. *f.* 2.
White-fronted Manakin. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 521. *n.* 3.
Habitat rarior in Cayenna *et* Gujana, *troglodytae magnitudine*, $3\frac{1}{2}$ *pollices longa.*
Roſtrum pedes*que nigri*; capitis *pennae baſi nigrae, ceterum caeruleae*; frontis *apice albae*; criſtum *aurantium.*

Manacus. 12. P. nigra, ſubtus alba, macula cervicis alarumque albis.
Manacus. *Briſſ. av.* 4. *p.* 442. *n.* 1.
Caſſe-noiſette. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 413.
Manakin du Bréſil. *Buff. pl. enl. n.* 302. *f.* 1.
Black-capped Manakin. *Edw. glean. t.* 260. *f.* 1. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 521. *n.* 4.
β) Pipra macula alarum nulla.
Manakin à tête noire de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 303. *f.* 1.
Habitat in Gujanae *potiſſimum ſilvis, frequens*, $4\frac{1}{4}$ *pollices longa, gregaria, agilis et inquieta, nunc in terra, nunc in inferioribus arborum ramis, a formicis punctata vocem edens, quaſi nucis diffractae.*
Roſtrum *nigrum*; pedes *flavi.*

13. P.

minuta. 13. P. grisea, capite nigro albo-punctato. *Mus. Ad. Frid. 2. p. 34.**

Motacilla minuta. *Syst. nat.* X. 1. *p.* 189.
Little Manakin. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 526. *n.* 10.
Habitat in India, *troglodytae magnitudine.*
Pectus *flavicans lineis transversis nigris*; cauda *fusca*, *rectricum margine pallido.* Maris *frons lineis incarnatis*, occiput *lituris albis varium.*

striata. 17. P. subtus flavescens, capite superiore nuchaque nigris, singulis pennis per longitudinem stria alba notatis, remigibus atris: tertia brevissima.

Striped-headed Manakin. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 526. *n.* 11. *t.* 54.
Habitat in America *australi.*
Longitudo $4\frac{1}{2}$ *pollicum*; rostrum *fuscum*; *inter hoc et* oculos *macula flava*; cervix *et* dorsum *ex fuscescente cinerea*; tectrices *alarum fuscescentes*, *nonnullae apice flavae*; alae *spuriae apice albae*; cauda *nigra perbrevis*, *rectricibus lateralibus apice albis*; pedes *atri.*

naevia. 18. P. fusca, mento gulaque nigris, pectore, abdomine superiore, alarum fasciis duabus et rectricum apice albis, abdomine inferiore crissoque aurantiis, pectore nigro-maculato, dorso inferiore et remigibus nonnullis secundariis interioribus extus albo-variis.

Fourmilier tacheté de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 823. *f.* 2.
Spotted Manakin. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 527. *n.* 12.
Habitat in America *australi*, 4 *pollices longa.*
Rostrum *atrum*; pedes *fuscescentes.*

leucotis. 19. P. ex olivaceo et rufo varia, subtus rufa, abdomine griseo, vertice fusco, temporibus gulaque nigris, fasciculo plumarum nivearum longiorum utrinque ad collum.

Fourmilier à oreilles blanches. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. *p.* 477. *Pl. enl. n.* 822. *f.* 1. 2.
White-eared Manakin. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 527. *n.* 13.
Habitat in America *australi*, $4\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Pedes *fusci:* Feminae mentum *et* gula *alba*; stria *viridis a basi rostri infra oculos per utrumque colli latus procedens.*

atricapilla. 20. P. dilute cinerea, subtus ex griseo alba, rostro, vertice, tectricibus alarum majoribus, remigibusque nigris, his margine griseis, fronte, genisque ex griseo albis.

Oiseau cendré de la Guyane. *Buff. hist. nat. des oif.* 4. *p.* 430.
Manakin cendré de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 687. *f.* 1.

Black-crowned Manakin. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 532. *n.* 19.
Habitat in Gujana, 6 *pollices longa.*
Cauda, *quam congeneribus longior, ſubcuneata*; pedes *dilute griſei.*

papuenſis. 21. P. ex vireſcente nigra, ſubtus exalbida, pectoris litura oblonga aurantia, rectricibus intermediis breviſſimis.
Manikor. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 431.
Manikor de la nouvelle Guinée. *Buff. pl. enl. n.* 707. *f.* 2.
Papuan Manakin. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 532. *n.* 20.
Habitat in nova Guinea, $3\frac{1}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum *nigrum*; pedes *lividi.*

haemorrhoa. 22. P. nigerrima, ſubtus alba, criſſi macula rubra.
Crimſon-vented Manakin. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 533. *n.* 21.
Longitudo $3\frac{3}{4}$ *pollicum*; roſtrum *pallidum*; tectrices *caudae inferiores rectricibus fere aequales*; pedes *fuſci.*

nigricollis. 23. P. ex caeruleſcente atra, gula criſſoque nigris, abdomine albo.
Black-throated Manakin. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 533. *n.* 22.
Longitudo 4 *pollicum*; roſtrum pedes*que fuſci.*

capenſis. 24. P. atra, ſubtus ex flavicante dilute aurantia, remigum margine pallido, alarum ex flavicante dilute aurantio.
Orange-bellied Manakin. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 533. *n.* 23.
Habitat ad caput bonae ſpei, 4 *pollices longa.*
Roſtrum *nigrum*; pedes *atri.*

cinerea. 25. P. cinerea, abdomine albicante.
Cinereous Manakin. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 533. *n.* 24.
Longitudo $3\frac{1}{2}$ *pollicum.*

muſica. 26. P. nigra, ſubtus aurantia, fronte uropygioque flavis, vertice nuchaque caeruleis, mento gulaque nigris.
Organiſte. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 4. *p.* 290. *Pl. enl. n.* 809. *f.* 1.
Evêque. *du Praz Louiſ.* 2. *p.* 140.
Tuneful Manakin. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 534. *n.* 25.
Habitat in inſula S. Dominici, *frequens*, 4 *pollices longa, aucupis inſidias callide eludens, cantu harmonico, ſuavi, continuo.*
Roſtrum pedes*que atri.*

116. PARUS. *Roſtrum* integerrimum, anguſtum, ſubcompreſſum, robuſtum, durum, acuminatum, baſi ſetis tectum.
Lingua truncata, ſetis terminata.
Digiti ad ortum usque ſejuncti, poſteriori ingente et robuſto.

bicolor. 1. P. capite criſtato antice nigro, corpore cinereo, ſubtus exalbido rufeſcente. *Fabr. fn. groenl. p.* 123. *n.* 85.
Parus carolinenſis criſtatus. *Briſſ. av.* 3. *p.* 569. *n.* 9.
Méſange huppée de la Caroline. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 451.
Creſted Titmouſe. *Catesb. Car.* 1. *t.* 57.
Toupet Titmouſe. *Arct. zool.* 2. *p.* 423. *n.* 324. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 544. *n.* 11.
Habitat in Americae *ſeptentrionalis potiſſimum ſilvis, etiam in* Groenlandia, *majoris magnitudine*, 6 *pollices longus, inſectis praecipue victitans, et velociter volans.*
Roſtrum *nigrum*; criſta *acuta, griſea*; area oculorum *rufeſcens*; remiges rectrices*que margine ex rufo griſeae*; cauda *ſubfurcata*; pedes *plumbei*; abdomen feminae *album.*

criſtatus. 2. P. capite criſtato, collari nigro, ventre albo. *Fn. ſuec.* 266.* *Scop. ann.* 1. *p.* 162. 243. *Kram. el. p.* 379. *n.* 2. *Müll. zool. p.* 34. *n.* 282.
Parus criſtatus. *Geſn. av.* 642. *f. med. Aldr. orn.* 2. *p.* 723. *Briſſ. av.* 3. *p.* 558. *n.* 8.
Méſange huppée. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 447. *Pl. enl. n.* 502. *f.* 2.
Creſted Titmouſe. *Arct. zool.* 2. *p.* 427. F. *Raj. av. p.* 74. *n.* 6. *Albin. av.* 2. *t.* 57. *Will. orn. p.* 242. *t.* 43. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 545. *n.* 12.
Kohelmeiſe. *Friſch av. t.* 14. *f.* 2. *Georg. it. p.* 175. *Günth. Neſt. u. Eyer t.* 5. *f. ſup.*
Habitat in Europae *omnis, praeſertim profundis, ſilvis, et potiſſimum in pinetis, ſolitarius, non cicurandus,* $4\frac{3}{4}$ *pollices longus, caerulei magnitudine.*
Roſtrum *nigricans*; frons *et* genae *albae*; criſta *plicatilis acuta, nigra, margine alba*; mentum, gula, *et macula* aurium *nigra*; corpus *reliquum ex rufo griſeum, ſubtus album*; pedes *plumbei.*

3. P.

major. 3. P. capite nigro, temporibus albis, nucha lutea. *Fn. suec.* 265.* *Scop. ann.* I. *p.* 162. *n.* 242. *Kram. el. p.* 378. *n.* I. *Müll. zool. p.* 34. *n.* 283.
Parus major s. Fringillago. *Raj. av. p.* 73. *n.* I. *Briss. av.* 3. *p.* 539. *n.* I.
Parus major. *Gesn. av.* 640. *Bell. av.* 95. a. *Aldrov. orn.* 2. *p.* 713. *Nozem. nederl. Vogel t.* 59.
Grosse mésange on Charbonniere. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 392. *t.* 17. *Pl. enl. n.* 3. *f.* I.
Great Titmouse or Ox-eye. *Brit. zool.* I. *n.* 162. *t.* 57. *f.* I. *Arct. zool.* 2. *p.* 425. A. *Will. orn. p.* 240. *t.* 43. *Albin. av.* I. *t.* 46. *Hayes brit. birds t.* 38.*** *Lath. syn.* II. 2. *p.* 536. *n.* I.
Spernuzzola. *Olin. ucc. t.* 28.
Spiegelmeise. *Frisch av. t.* 13. *Georg. it. p.* 175.
Habitat in Europae, Asiae, Africae *hortis, incubationis tempore in silvis, fringillae caelibis magnitudine,* $5\frac{3}{4}$ *pollices longa, vulgaris, quintum aetatis annum assequens, voce monotona canens, carnem amaram exhibens, bis imo ter quotannis in arboribus cavis nidificans, ovaque* 8-12 *alba ferrugineo-maculata pariens.*
Rostrum, gula *et* cauda *nigra;* dorsum *et* alae *olivacea;* uropygium *ex caeruleo griseum;* abdomen *ex virescente flavum, media stria nigra ad crissum usque bipartitum;* remiges *atrae, margine griseae;* tectrices *alarum majores apice,* rectrices *extimae extus albae, reliquae extus ex caeruleo griseae;* pedes *plumbei.*

ignotus. 15. P. ex flavo viridis, gula flava, pectore flavo, badio-maculato, abdomine caeruleo, crisso flavicante. *Brünn. orn. bor. p.* 73.
Norway Titmouse. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 536. *n.* 2.
Strömian Titmouse. *Arct. zool.* 2. *p.* 427. B.
Habitat in Norwegia.
Rostrum *nigrum, subtus flavum;* cauda *furcata;* rectrices *intermediae virescentes, extimae extus albae;* pedes *nigri,* ungue *posteriori anterioribus ter longiori.*

16. P.

Pari *species fertilissimae, ut uno partu* 18-20 *ova edant; seminibus, fructibus, insectis, paucae carne ipsa, plures cerebro aliarum avium victitant, quibus mortuis cranium affringunt; inquietae, nequaquam timidae, ut aves se debiliores saepius occidant, aliquae ut aves se triplo majores adgrediantur: Vox plurimis ingrata.*

Cyanus. 16. P. corpore supra pallide caeruleſcente, ſubtus niveo, uropygio et vertice ex cano albidis, cervicis albae faſcia lata, humeris, tectricibusque cauda caeruleis. *Pallas nov. comm. Petrop.* 14. *p.* 588. *t.* 23. *f.* 2. *Falck it.* 3. *p.* 407. *t.* 31.

Parus dorſo dilute caeruleo, inferne albus, capite albo, taenia ad oculos et medio abdomine macula oblonga ex atro caeruleis, faſcia alarum media alba. *Lepechin nov. comm. Petrop.* 14. *p.* 498. *t.* 13. *f.* 1.

Parus caeruleus major. *Briſſ. av.* 3. *p.* 548. *n.* 3.

Parus indicus. *Aldr. orn.* 2. *p.* 714. *t.* 715.

Groſſe méſange bleue. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 455.

Azure Titmouſe. *Arct. zool.* 2. *p.* 426. C. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 538. *n.* 3.

Habitat in Ruſſia *et* Sibiria, *ad* Volgam *aliosque fluvios, praecipue in ſalicetis, caeruleo major, ultra* 5 *pollices longus.*

Roſtrum *brevius et craſſius, quam congeneribus;* lingua *cartilaginea biloba,* lobis *ſingulis* 3-5 *ſetis ciliatis;* plumae *laxae, molliſſimae, rarae, ut avicula erigere eas pro lubitu poſſit;* lora *anguſta nigra, ultra oculos continuata in taeniolam ex caeruleo nigricantem utrinque deſcendentem in cervicis faſciam;* ſterni *macula ex fuſco nigricans;* alulae *et* tectrices *alarum nigricantes, extus cyaneo perfuſae; utraeque,* tectrices *caudae et* remiges *ſecundariae apice albae,* primores *fuſcae extus cyaneo perfuſae, interiori margine et verſus apicem utrinque albae;* cauda *longiuſcula rotundata;* rectrices *mediae ex nigro caeruleae, apice extus albae.*

americanus. 4. P. caeruleſcens, temporibus, pectore dorſoque flaveſcentibus, hypochondriis purpuraſcentibus.

Ficedula carolinenſis cinerea. *Briſſ. av.* 3. *p.* 522. *n.* 66.

Figuier cendré à collier. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 301.

Figuier cendré de la Caroline. *Buff. pl. enl. n.* 731. *f.* 1.

Finch-Creeper. *Catesb. Car.* 1. *t.* 64.

Creeping Titmouſe. *Arct. zool.* 2. *p.* 423. *n.* 326.

Habitat hieme in Carolina *et* Canada, *Sylviae magnitudine, in arboribus perpetim adſcendens et deſcendens inſecta quaeſiturus.*

Mandibula *ſuperior fuſca, inferior flava;* macula *alba ſupra et infra oculos;* alarum *faſcia duplex alba;* ſemitorques *niger;* abdomen *album;* remiges *nigricantes, intus albae, margine ex caeruleſcente cinereae;* cauda *nigricans;* rectrices *intermediae totae, laterales margine ex cinereo caeruleae, extimae intus macula alba;* pedes *flavicantes:* Femina *tota nigra et fuſca.*

5. P.

caeruleus. 5. P. remigibus caeruleſcentibus: primoribus margine exteriori albis, fronte alba, vertice caeruleo. *Fn. ſuec.* 267.* *Scop. ann.* 1. *p.* 163. *n.* 244. *Kram. el. p.* 379. *n.* 3. *Müll. zool. p.* 34. *n.* 285.

Parus caeruleus. *Bell. av.* 96. a. *Geſn. av.* 641. *Aldr. orn.* 2. *p.* 721. *Briſſ. av.* 3. *p.* 544. *n.* 2. *Nozem. nederl. Vogel t.* 24. *Raj. av. p.* 74. *n.* 4.

Mélange bleue. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 413. *Pl. enl. n.* 111. *f.* 2.

Blue Titmouſe. *Brit. zool.* 1. *n.* 163. *t.* 57. *f.* 2. *Arct. zool.* 2. *p.* 427. D. *Alb. av.* 1. *t.* 47. *Will. orn. p.* 242. *t.* 43. *Hayes brit. birds t.* 38.**** *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 543. *n.* 10.

Blaumeiſe. *Friſch av. t.* 14.

Habitat in Europa *omni*, $4\frac{1}{2}$ *pollices longus*, *voce ingrata*, *inſecta quaeſiturus gemmas carpendo hortis et pomariis infeſtus*, *larvas et ova inſectorum devorando utiliſſimus*, *in murorum aut arborum cavis nidum ſtruens*, *et plumis ſternens*, *et ſemel quotannis ova* 14-22 *exilia alba pariens*, *pullos excluſos mordaciſſime defendens.*

Roſtrum *nigricans*; ſtria *ocularis*, linea *tempora alba circumſcribens et* cervix *nigra*; dorſum *ex flavicante virens*; tectrices *alarum caeruleae*; remiges *nigrae*, *margine atrae*; cauda *caerulea*, *rectricibus intermediis longioribus*; corpus *ſubtus ochroleucum*; pedes *cum* unguibus *nigri.*

saebyenſis. 17. P. corpore caudaque ſubtus, capillitio, interſcapulio, fascia transverſali alari remigumque aliquot albis, cauda ſuperne, macula transverſali nuchae, tectricum remigumque nonnullis caeruleis. *Sparrm. muſ. Carl. t.* 25.

Habitat in praedio Carlſoniano Saeby Sudermanniae.

Roſtrum pedes*que ex fuſco flavicant*; faſcia *ocularis nigra*; tectrices *alarum ſuperiores caeruleae*, *inferiores albae*; remiges 1-5 *fuſcae*, *margine exteriori albae*, *baſi caeruleae*, 6-13 *concolores*, *apice albae*, *reliquae margine exteriori caeruleae*, *interiori et apice albae*; rectrices 4 *ſuperiores cyaneae. apice albae*, *rachi nigra.*

atricapillus. 6. P. pileo gulaque nigris, corpore cinereo ſubtus albo.

Parus atricapillus canadenſis. *Briſſ. av.* 3. *p.* 553. *n.* 6. *t.* 29. *f.* 1.

Méſange à tête noire de Canada. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 408.

Canada Titmouſe. *Arct. zool.* 2. *p.* 424. *n.* 328. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 542. *n.* 9.

Habitat

Habitat in America *septentrionali, palustris magnitudine, 4½ pollices longus, vermibus et insectis victitans, frigoris patientissimus.*

Tectrices *caudae superiores exalbidae; alarum majores fuscae, margine griseae;* remiges *fuscae, margine exteriori griseae, interiori albidae;* rectrices *intermediae cinereae, laterales fuscae, margine griseae;* pedes *cum* unguibus *nigricantes.*

ater. 7. P. capite nigro, dorso cinereo, occipite pectoreque albo. *Fn. suec.* 268.* *Scop. ann.* 1. *p.* 163. *n.* 245. *Kram. el. p.* 379. *n.* 4. 1.
Parus atricapillus. *Briss. av.* 3. *p.* 551. *n.* 5.
Parus ater. *Gesn. av.* 641. *Aldr. orn.* 2. *p.* 723. *Raj. av. p.* 73. *n.* 2.
Petite charbonniere. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 400.
Colemouse. *Brit. zool.* 1. *n.* 164. *t.* 57. *f.* 3. *Arct. zool.* 2. *p.* 424. *n.* 327. *Will. orn. p.* 241. *t.* 43. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 540. *n.* 7.
Kohlmeise. *Frisch av.* 3. *t.* 13. *f.* 3. *Georg. it. p.* 175.
Habitat in Europae, Sibiriae *et septentrionalis* Americae *silvis, pomariis, hortis, caeruleo minor,* 4 *pollices longus.*
Rostrum *et* gula *nigra;* falcia *lata alba a rostro utrinque infra oculos ad collum ducta;* abdomen *et* crissum *ex rufo alba;* tectrices *alarum griseae, apice albae;* remiges rectrices*que ex fusce*scente *cinereae, margine griseae;* pedes *cum* unguibus *plumbei.*

paluſtris. 8. P. capite nigro, dorso cinereo, temporibus albis. *Fn. suec.* 269.* *Scop. ann.* 1. *p.* 164. *n.* 246. *Kram. el. p.* 379. *n.* 5. *Müll. zool. p.* 34. *n.* 286.
Parus paluſtris. *Gesn. av.* 642. *Aldr. orn.* 2. *p.* 722. *Raj. av. p.* 73. *n.* 3. *Briss. av.* 3. *p.* 555. *n.* 7. *Nozem. nederl. Vogel t.* 25.
Mésange de marais ou nonette cendrée. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 403. *Pl. enl. n.* 111. *f.* 3.
Marsh Titmoule or Black cap. *Brit. zool.* 1. *n.* 165. *t.* 57. *f.* 4. *Arct. zool.* 2. *p.* 427. E. *Will. orn. p.* 241. *t.* 43. *Alb. av.* 3. *t.* 58. *f.* 1. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 541. *n.* 8.
Sumpfmeise. *Frisch av. t.* 13. *Georg. it. p.* 175. *Günth. Nest. u. Eyer t.* 13. *f. sup.*
β) Parus fasciis alarum nullis.
Mésange à gorge noire. *Buff. pl. enl. n.* 502. *f.* 1.
γ) Parus lubrus totus albus.

Habitat

Habitat in Europa *et* Sibiria, β) *in* Louisiana, γ) *in* Japonia, *atro paulo major, cui valde affinis, seminum penum colligens, apes amans.*

Corpus *supra griseum, subtus album*; gulae *macula nigra*; alarum *fasciae duae albae.*

virginianus. 9. P. uropygio luteo, corpore cinereo.

Parus virginianus. *Briss. av.* 3. *p.* 575. *n.* 14.

Mésange à croupion jaune. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. *p.* 453.

Yellow Rump. *Catesb. Car.* 1. *t.* 57.

Virginian Titmouse. *Arct. zool.* 2. *p.* 423. *n.* 325. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 546. *n.* 13.

Habitat in Virginiae *et* Carolinae *arboribus, pici instar in his currens, insecta quaesiturus,* 5 *pollices longus.*

Rostrum *nigricans*; corpus *supra ex olivaceo fuscum, subtus griseum*; pedes *cum* unguibus *fusci.*

peregrinus. 10. P. uropygio coccineo, corpore cinereo subtus albo.

Crimson-rumped Titmouse. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 539. *n.* 4.

Magnitudo P. *majoris*; remiges *fuscae*; rectrices *omnes nigrae, exceptis* 4 *intermediis, posterius oblique luteis, ita tamen ut luteus color praevaleat in* 5, 5, *non vero in* 6, 6.

griseus. 18. P. griseus vertice rubro. *Müll. zool. p.* 34. *n.* 284.

Crimson-crowned Titmouse. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 539. *n.* 5.

Habitat in Groenlandia, *an vera pari species?*

afer. 19. P. ater, subtus niger, abdomine exalbido, temporibus, area oculorum, itria colli utrinque laterali, et occipitis macula albis, remigibus fuscis, cauda pedibusque nigris.

Blackbreasted Titmouse. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 539. *n.* 6.

Habitat ad caput bonae spei, *majoris magnitudine,* 6 *pollices longa.*

Rectricum *extima extus, huic utrinque proxima apice alba.*

caudatus. 11. P. vertice albo, cauda corpore longiore. *Fn. suec.* 83. *t.* 1. *f.* 83.* *Scop. ann.* 1. *p.* 164. *n.* 247. *Kram. el. p.* 379. *n.* 6.

Parus longicaudus. *Briss. av.* 3. *p.* 571. *n.* 13.

Parus caudatus. *Gesn. av.* 642. *fig. inf. Aldr. orn.* 2. *p.* 715. *t.* 716. *Raj. av. p.* 74. *n.* 8. *Nozem. nederl. Vogel t.* 26.

Mésange

Parorum *cum laniis picisque affinitatem docet rostrum validum, cultratum, basi setis tectum, alimenta frustulatim devorans; quodque picus major caveis inclusus cerebra passerum extrahit, quibus accedit vox garrula, modusque volandi. Kramer el. p.* 380.

Méſange à longue queue. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 436. *t.* 19. *Pl. enl. n.* 502. *f.* 3.
Longtailed Titmouſe. *Brit. zool.* 1. *n.* 166. *Arct. zool.* 2. *p.* 428. G. *Will. orn. p.* 242. *t.* 43. *Albin. av.* 2. *t.* 57. *f.* 1. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 550. *n.* 18. *Hayes brit. birds t.* 33.
Schwanzmeiſe. *Friſch av. t.* 14. *Günth. Neſt. u. Eyer t.* 21.
Habitat in Europae, Sibiriae, Jamaicae *hortis et pomariis, quibus gemmas arborum avellendo infeſtus, agilis, inquietus, quaquaverſum volans, et in arboribus pici inſtar currens; nidum ovalem introitu anguſto laterali ex muſcis, lichenibus, et lana extus contexens, intus molliſſimis plumis ſternens, et bifurcationi rami* 3-4*ve pedum a terra altitudine firmiter affigens, ova pariens* 10-17 *griſea, rubeſcente tincta,* $5\frac{1}{2}$ *pollices fere longus.*

Roſtrum *et* pedes *cum* unguibus *nigri*; vertex *vitta nigra cinctus ad* uropygium *usque producta*; tempora *et* corpus *ſubtus alba*; dorſi latera, uropygium, abdomen *et* criſſum *roſea*; tectrices *alarum minores nigrae; majores fuſcae, margine roſeae*; remiges *atrae*; cauda $3\frac{1}{2}$ *pollices longa, inaequalis*; rectrices 4 *mediae nigrae*; 4, 4 *margine griſeae, reliquae ex nigro et albo variae.*

capenſis. 20. P. ex cinereo dilute griſeus, remigibus nigris margine albis, cauda ſupra nigra ſubtus alba.
Méſange du cap de bonne eſpérance. *Sonner. it.* 2. *p.* 206. *t.* 115.
Petit Deuil. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 445.
Cape-Titmouſe. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 552. *n.* 19.
Habitat ad caput bonae ſpei, *in fruticibus ramoſiſſimis ex goſſypii ſpecie nidum ſtruens lagenae figura, collo brevi et anguſto inſtructae, affixo alio, in quo mas, pariente et incubante femina, habitat.*
Roſtrum pedes*que nigri.*

biarmicus. 12. P. vertice cano, cauda corpore longiore, capite barbato.
Fn. ſuec. 84.* *Scop. ann.* 1. *n.* 241. *Nozem. nederl. Vogel t.* 46.
Parus barbatus. *Briſſ. av.* 3. *p.* 567. *n.* 12.
Parus beardmanicus. *Albin. av.* 1. *p.* 40. *t.* 48.
Parus ruſſicus. *S. G. Gmelin* 2. *p.* 164. *t.* 10.
Pendulinus. *Kram. el. p.* 373.
Méſange barbue ou Mouſtache. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 418. *t.* 18. *Pl. enl. n.* 618.
Leaſt Butcherbird. *Edw. av. t.* 55.

Bearded Titmouſe. *Brit. zool.* I. *n.* 167. *Arct. zool.* 2. *p.* 428. H. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 452. *n.* 20.
Bartmeiſe. *Friſch av. t.* 8.
Habitat in Europa, *etiam circa mare* caſpium *paludemque* maeoticam, *potiſſimum in uliginoſis inter arundines, quarum feminibus veſcitur, nidum inter tres arundines ſuſpenſum ex typhae, populi pappis conficiens, caudati magnitudine,* $6\frac{1}{4}$ *pollices longus.*
Roſtrum *aurantium*; caput *dilute cinereum, vertice feminae ferrugineo nigro-maculato; infra oculos (mari) faſciculus plumarum nigrarum acuminatarum, barbam referens;* corpus *ſupra et* abdomen *ex aurantio badium aut rufum;* gula *alba;* pectus *incarnatum;* criſſum (*mari*) *nigrum;* cauda *cuneiformis* $2\frac{3}{4}$ *pollices longa;* rectrices *tres extimae baſi atrae, apice fere albae.*

alpinus. 21. P. niger, ſubtus rufeſcens nigro-maculatus, linea alba a baſi roſtri ad cervicem decurrente, ungue poſteriore longiſſimo. *Hablizl apud S. G. Gmelin it.* 4. *p.* 171. *et apud Pallas n. nord. Beytr.* 4. *p.* 49.
Habitat in alpibus Perſiae ſunamiſicis, *caudato aequalis et affinis, inſectis victitans.*
Pennae *corporis ſuperiores margine cinereae*; remiges 18, *earumque tectrices ſupra nigrae, ſubtus cinereae, hae apice albae*; cauda *bifurcata*; rectrices *extimae macula ad apicem alba cuneata.*

ſinenſis. 22. P. ex ferrugineo fuſcus, rectricibus longis remigibusque fuſcis margine nigris.
Chineſe Titmouſe. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 555. *n.* 21.
Habitat in Sina, $3\frac{3}{4}$ *pollices longus.*
Roſtrum *nigrum*; pedes *rubri.*

malabaricus. 23. P. griſeus, ſubtus ex rubro aureus, gula nigra, remigibus rectricibusque nigris, lateralibus et remigibus ſecundariis nonnullis a baſi ad medium rubeſcentibus.
Méſange de la Côte de Malabar. *Sonner. it.* 2. *p.* 204. *t.* 114. *f.* 1.
Malabar Titmouſe. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 555. *n.* 22.
Habitat in Malabar, $5\frac{2}{3}$ *pollices longus.*
Roſtrum pedes*que nigri*; irides *rubrae*; tectrices *alarum nigrae, inferiores nonnullae macula rubeſcente notatae*; tectrices *caudae inferiores rufeſcentes*; femina *ſubtus ex rufo flava.*

24. P.

fibiricus. 24. P. ſubtus niger, abdomine criſſoque ex rufo griſeis, capite ſupra ex grifeo fuſco, ſtria roſtro infra oculos per colli latera ad pectus decurrente alba dilatata, cauda alisque ex cinereo fuſcis.

Méſange à ceinture blanche. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 446.
Méſange de Siberie. *Buff. pl. enl. n.* 708. *f.* 3.
Sibirian Titmouſe. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 556. *n.* 23.

β) Parus abdomine criſſoque albis.

Habitat in Sibiria, 5 *pollices longus.*
Roſtrum pedes*que nigricantes*; remiges *margine ex rufo griſeae*; cauda *ſubcuneata*, *ultra* $1\frac{3}{4}$ *pollices longa*; rectrices *extimae margine ex rufo griſeae.*

Knjaeſcik. 25. P. albus, ſubtus macula continua, linea oculari et collari lividis. *Lepechin it.* I. *p.* 181.

Habitat in Sibiriae *quercetis.*

hudſoni- 26. P. capite ex ferrugineo fuſco, ſtria infra oculos alba, gula
us. nigra, corpore ſupra ex viresſcente cinereo, ſubtus albo, uropygio ex rufo albo, alis fuſcis, remigibus rectricibusque margine cinereis. *Forſter act. angl.* 62. *p.* 408. *Miller on var. ſubj. t.* 21. A.

Hudſon's-Bay Titmouſe. *Arct. zool.* 2. *p.* 425. *n.* 329. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 557. *n.* 24.

Habitat, gregarius hieme, circa ſinum Hudſonis, *potiſſimum inter juniperos, quarum gemmis veſcitur, frigoris patientiſſimus,* $5\frac{1}{2}$ *pollices longus, ova* 5 *pariens.*
Omnes pennae *longae laxae baſi*, roſtrum, pedes*que nigra*; hypochondria *ferruginea*; cauda $2\frac{1}{2}$ *pollices longa, ſubrotundata*; ungues *medius et poſterior reliquis duplo longiores.*

macroce- 27. P. niger, pectore aurantio, abdomine flaveſcente, capite
phalus. tumido, frontis macula, alarum area, et rectricibus duabus extimis albis.

Great-headed Titmouſe. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 557. *n.* 25. *t.* 55.

Habitat in nova Seelandia, $4\frac{1}{2}$ *pollices longus.*
Cauda *longa, rotundata*; rectrices 2 *utrinque extimae apice oblique nigrae*, 3, 3 *intus apice albae*; pedes *ex atro fuſci.*
Femina *ſupra fuſceſcens, ſubtus flava.*

novae 28. P. ex cinereo rubeſcens, fuſco-varius, ſubtus ex rufo di-
Seelandiae. lute griſeus, fronte rufa, ſuperciliis albis, genis cinereis, remigibus fuſceſcentibus, rectricibus intermediis nigris, lateralibus macula quadrata fuſca in medio notatis.

New-Zealand Titmouſe. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 558. *n.* 26.
Habitat in nova Seelandia, 5 *pollices longus.*
Roſtrum *fuſcum*, *apice atrum*; pedes *atri*, unguibus *nigris.*

pendulinus. 13. P. capite ſubferrugineo, faſcia oculari nigra, remigibus rectricibusque fuſcis, margine utroque ferrugineo. *Georg. it. p.* 175.
Parus polonicus ſ. pendulinus. *Briſſ. av.* 3. *p.* 565. *n.* 11. *t.* 29. *f.* 2.
Parus minimus Remiz. *Titius diſſ. Lipſ.* 1755.
Remiz. *Raczynſk. Pol.* 1. *p.* 294. *Günth. Neſt. u. Eyer t.* 4.
Pendulinus. *Act. bonon.* 2. 2. *p.* 57. *t.* 7.*
Méſange de Pologne ou Remiz. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 423. *Pl. enl. n.* 608. *f.* 3.
Mountain Titmouſe. *Albin. av.* 3. *t.* 57.
Penduline Titmouſe. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 547. *n.* 16.
Habitat in Europae *et* Sibiriae *aquaticis et uliginoſis, caerulei magnitudine, ultrà* $4\frac{1}{2}$ *pollices longus, nidum laterali foramine apertum ex ſalicum, populi, carduorum pappo artificioſiſſime contexens, molliſſimis plumis ſternens, et de extremo rami debilioris ſupra aquam penduli apice ſuſpendens, Bononienſibus ruſticis ſacer.*
Roſtrum *cinereum*; frons *albida*; occiput *et* collum *cinerea*; dorſum *ſuperius ex rufo griſeum: inferius cum* uropygio *griſeum*; guttur *pallidiſſime cinereum*; pectus *et* abdomen *rufeſcens*; tectrices *alarum minores ſuperiores fuſcae, apice rufae*; *majores nigricantes, margine badiae, apice rufeſcentes*; remiges rectrices*que fuſcae, margine albae*; pedes *ex rufeſcente griſei*, unguibus *nigricantibus.*
Biarmico multum affinis, uterque laniis.

narbonenſis. 29. P. ex rufo griſeus, vertice griſeo, rectricibus nigris margine rufis, tectricibus alarum minoribus remigibusque ſecundariis nigricantibus margine rufis, primoribus nigricantibus margine albidis.
Penduline. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 433.
Méſange du Languedoc. *Buff. pl. enl. n.* 708. *f.* 1.
Languedoc Titmouſe. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 549. *n.* 17.
Habitat in Gallia Narbonenſi, *moribus pendulini*, 4 *pollices longus, nidum ex populi praeſertim pappo ſtruens, foramine arcu ſuperſtructo contra aëris injurias defenſo ad latus apertum, ſtruthionis ovo ſimilem, et fere aequalem, cumque lana circumdatum populi ramo bifurco affigens.*

Roſtrum

Roſtrum *nigrum*, *ſuperioris mandibulae margine ex flavo fuſco*; pedes *plumbei*.

Cela. 14. P. niger, roſtro albo, macula alarum baſique caudae flavis.
Méſange Cela. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 458.
Gujana Titmouſe. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 546. *n.* 14.
Habitat in Gujana.

amatorius. 30. P. ardeſiae colore tinctus, alarum macula longitudinali media dimidiato flava et ruſa.
Méſange amoureuſe. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 5. *p.* 456.
Amorous Titmouſe. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 546. *n.* 15.
Habitat in ſeptentrionali Aſia, *ob mutuum utriusque ſexus amorem cognomine iſto inſignitus*, $5\frac{1}{4}$ *pollices longus*.
Roſtrum *baſi nigrum*, *apice aurantium*.

coccineus. 31. P. cinereus, pectore, maculo alarum, uropygio rectricibusque lateralibus poſterius coccineis.
Parus peregrinus. *Sparrm. muſ. Carlſ.* 2. *t.* 48. 49.
Habitat - - - - *roſtro pedibusque nigris*, *criſſo flavicante*.

indicus. 32. P. corpore ſupra cinereo, ſubtus ferrugineo, gula jugulo-que ſordide albis, artubus ex nigro fuſcis. *Sparrm. muſ. Carlſ.* 2. *t.* 50.
Habitat in India.

117. HIRUNDO.

Roſtrum minimum, incurvum, ſubulatum, baſi depreſſum, latum.
Rictus capite amplior.
Lingua brevis, lata, fiſſa.
Alae longae.
Cauda (*plurimis*) furcata.

ruſtica. 1. H. rectricibus, exceptis duabus intermediis, macula alba notatis. *Fn. ſuec.* 270. *Scop. ann.* 1. *p.* 165. *n.* 249. *Kram. el. p.* 380. *n.* 1. *Müll. zool. n.* 287. *Brünn. orn. p.* 73. *n.* 289.
Hirundo domeſtica. *Geſn. av.* 548. *Aldr. orn.* 2. *p.* 658. *t.* 662. *c.* 6. *Jonſt. av.* 115. *t.* 42. *Briſſ. av.* 2. *p.* 486. *n.* 1. *Nozem. nederl. Vogel t.* 17. *Raj. av. p.* 71. *n.* 1.

Hirondelle de Cheminée ou Hirondelle domeſtique. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 591. *t.* 25. *f.* 1. *Pl. enl. n.* 543. *f.* 1.
Common or Chimney Swallow. *Brit. zool.* 1. *n.* 168. *t.* 58. *Arct. zool.* 2. *p.* 429. *n.* 330. *Will. orn. t.* 212. *t.* 39. *Alb. av.* 1. *t.* 45. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 561. *n.* 1.
Rauchſchwalbe. *Friſch av. t.* 18. *Georg. it. p.* 175. *Günth. Neſt. u. Eyer t.* 15. *f. inf.*

β) Hirundo alba. *Briſſ. av.* 2. *p.* 489. A.
Habitat per omnem terrarum orbem, *praeſertim in domibus infra tectum, auctumno evaneſcens in regionibus frigidioribus* (*utrum aquis ſubmerſus, an* Africam *calidiorem petens, in qua cum reliquis migratoriis avibus hieme deprehendit* Adanſon?), *vere redux; dum volitat juxta terram aut aquam, pluviam praeſagiens, voce debili, et maris non penitus ingrata, in caminis ſaepius, ex luto ſtramini et pilis miſto nidum ſtruens, et plumis intus ſternens, bis quotannis* 4-6 *ova alba rubro maculata pariens, ultra* 6 *pollices longa.*
Roſtrum *nigrum*; frons *et* mentum *rubra, colore in badium vergente*; corpus *ſupra nigrum, nitore ex purpuraſcente caeruleo*; pectus *et* abdomen *alba*; pedes *perbreves nigricantes.*

tahitica. 13. H. ex fuſco nigra, caeruleſcente nitens, ſubtus ex fulvo purpurea, abdomine et criſſo fuliginoſis, cauda, roſtro pedibusque nigris.
Otaheitee Swallow. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 563. *n.* 2. *tab. in rubr.* II. 1.
Habitat in Tahiti, 5 *pollices longa.*
Irides *fuſcae*; cauda 2¾ *pollices longa.*

eſculenta. 2. H. rectricibus omnibus macula alba notatis. *Osb. it.* 2. *p.* 330.
Hirundo riparia cochinſinenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 510. *n.* 14. *t.* 46. *f.* 2. A.
Hirundo nidis edulibus. *Bont. jav.* 66. *Raj. av. p.* 72. *n.* 6. *Will. orn. p.* 215.
Apus marina. *Rumpf herb.* 6. *p.* 183. *t.* 75. *f.* 4. *Olear. muſ.* 25. *t.* 14. *f.* 2. 6.
Salangane. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 682.
Eſculent Swallow. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 578. *n.* 28.
Habitat in Sina, Cochinſina, *inſulisque* Oceani Indici *plurimis, troglodyta minor,* 2¾ *pollices longa, nidum in cavernis*

Hirundines in aëre piſcantur inſecta.

vernis rupium ex molluscis aliisve gelatinosis marinis struens ichthyocollae aemulum, citreo malo per mediam longitudinem dissecto figura similem, cibo et jusculis, et si sordidus sit ac niger, glutinis loco inservientem.

Rostrum *nigrum*; corpus *supra fuscum, subtus albidum*; cauda *apice alba*; pedes *fusci*.

borbonica. 14. H. ex nigricante fusca, subtus grisea, maculis longitudinalibus fuscis varia, cauda aequali, rostro pedibusque nigris.

Grande hirondelle brune à ventre tacheté ou Hirondelle des blés. *Buff. hist. nat. desois.* 6. *p.* 694.

Wheat Swallow. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 581. *n.* 29.

β) Hirundo dorso ex griseo fusco.

Hirondelle de l'isle de Bourbon. *Buff. pl. enl. n.* 544. *f.* 2.

Habitat in Franciae *insula, apodis magnitudine, frequens in campis tritico consitis, et interlucationibus, in locis altis, arboribus, noctu in fissuris rupium, muscarum ergo, quibus vescitur, greges pecorum ipsasque naves sequens, nidum ex stramine et plumis struens, et ova 2 grisea, fusco-maculata pariens.*

francica. 15. H. nigricans, uropygio subtusque albida vel grisea.

Petite hirondelle noire à croupion gris. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. *p.* 696.

Hirondelle de Bourbon. *Buff. pl. enl. n.* 544. *f.* 2.

Grey-rumped Swallow. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 582. *n.* 30.

Habitat in insula Franciae, *potissimum circa aquas dulces, noctu in silvis, velociter volans,* $4\frac{1}{4}$ *pollices longa.*

americana. 16. H. ex nigricante fusca, caeruleo et virescente nitens, subtus exalbida, uropygio crissoque rufis, remigibus intus albidis, cauda aequali.

Hirondelle à croupion roux et queue carrée. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. *p.* 698.

Rufous-rumped Swallow. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 582. *n.* 31.

β) Hirundo gula rufa.

Habitat ad fluvium Americae Plata, $6\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

urbica. 3. H. rectricibus immaculatis, dorso nigro-caerulescente, tota subtus alba. *Fn. suec.* 271.* *It. oel.* 41. *Scop. ann.* I. *p.* 165. *n.* 250. *Kram. el. p.* 380. *n.* 2. *Brünn. orn. n.* 290. *Müll. zool. n.* 288.

Hirundo minor s. rustica. *Briss. av.* 2. *p. p.* 490. *n.* 2.

Hirundo ruſtica ſ. agreſtis Plinii. *Raj. av. p.* 71. *n.* 2.
Hirundo agreſtis ſ. ruſtica. *Geſn. av.* 564. *Aldr. orn.* 2. *p.* 693. *Nozem. nederl. Vogel t.* 18.
Hirondelle à croupion blanc ou de fenêtre. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 614. *t.* 25. *n.* 2.
Petit martinet. *Buff. pl. enl. n.* 542. *f.* 2.
Martin, Martlet or Martinet. *Brit. zool.* 1. *n.* 169. *Arct. zool.* 2. *p.* 430. *n.* 331. *Will. orn. p.* 213. *t.* 39. *Alb. av. t.* 56. a. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 564. *n.* 3.
Hausſchwalbe. *Friſch av.* 3. *t.* 17. *f.* 2. *Georg. it. p.* 175. *Günth. Neſt. u. Eyer t.* 15. *f. ſup. t.* 28. *f. inf.*

β) Hirundo dorſo atro, remigibus rectricibusque apice albis.

Habitat in Europa, Sibiria, *et ſeptentrionali* America, *extra domus parietes ſub tecto, die* 1*mo frondeſcentiae redux: venit, venit Hirundo, pulchra tempora adducens et pulchros annos. Heſych. Nidificat mox, bis vel ter quotannis; ſaepe fringilla domeſtica occupat nidum confectum ex ſtramine et luto, ad latera apertum, et intus plumis ſtratum; at hirundo convocatis ſociis, dum aliae cuſtodiunt hoſtem captivum, aliae argillam adducunt, introitum arcte claudit, avolat relicto hoſte ſuffocato; ova parit alba verſus finem latiorem atra, prima vice* 5, *altera* 3-4, *tertia* 2 3.

Roſtrum *nigrum*; faux *flava*; uropygium *album*; pedes *ad ungues usque lanugine alba tecti.*

panayana. 17. H. nigra, ſubtus alba, frontis macula gulaque ex ferrugineo flavis, collari nigro.

Hirondelle d'Antigue. *Sonner. it. p.* 118. *t.* 76.
Hirondelle d'Antigue à gorge couleur de rouille. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 607.
Panayan Swallow. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 565. *n.* 4.

Habitat Antiguae *in inſula* Panay, *ripariae magnitudine.*

Tectrices *alarum minores ex variabili violaceo nigrae.*

rufa. 18. H. nitente-nigra, ſubtus rufa, fronte albida.

Hirondelle à ventre roux de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 607. *Pl. enl. n.* 724. *f.* 1.
Rufous-bellied Swallow. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 566. *n.* 15.

Habitat a Cayenna *ad* Noveboracum *usque, domeſtica minor,* $5\frac{1}{2}$ *pollices longa, in domibus nidum ex muſcis, plantis ſiccatis, bacillis et glutine firmiſſime compingens, interdum* $1\frac{1}{2}$ *pedem longum, ad latus prope fundum apertum, intus*

intus plumis ſternens, et trabibus, tignis, muris, ſtillicidiis affigens, 4-5 *ova pariens.*
Roſtrum *nigrum*; pedes *atri.*

capenſis. 19. H. vertice, genis nuchaque rufis nigro-variis, corpore ſupra ex caeruleo nigro, ſubtus ochroleuco, ſtriis perpendicularibus nigricantibus vario, gula fuſca albo-varia, rectricibus nigricantibus: lateralibus macula ovali alba.
Hirondelle au capuchon roux. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 608.
Hirondelle à tête rouſſe du cap de bonne eſpérance. *Buff. pl. enl. n.* 723. *f.* 2.
Cape-Swallow. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 566. *n.* 6.
Habitat ad caput bonae ſpei, 7 *pollices longa, in domibus ipſis nidum ſtruens extus ex limo, intus ex plumis rotundatum, introitu cylindrico apertum*, 4-5 *ova maculata pariens.*
Roſtrum *nigrum*; remiges *fuſcae, margine dilutiori*; pedes *atri.*

riparia. 4. H. cinerea, gula abdomineque albis. *Fn. ſuec.* 273.* *Kram. el. p.* 381. *n.* 4. *Brünn. orn. n.* 291. *Müll. zool. p.* 34. *n.* 289.
Hirundo riparia ſ. Drepanis. *Geſn. av.* 656. *Aldr. orn.* 2. *p.* 694. *t.* 695. *Raj. av. p.* 71. *n.* 3. *Briſſ. av.* 2. *p.* 506. *n.* 12. *Nozem. nederl. Vogel t.* 19.
Hirondelle de rivage. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 632. *Pl. enl. n.* 643. *f.* 2.
Sand-Martin or Shore-bird. *Brit zool.* 1. *n.* 170. *Arct. zool.* 2. *p.* 430. *n.* 332. *Will. orn. p.* 213. *t.* 39. *Alb. av.* 2. *p.* 56. b. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 568. *n.* 10.
Uferſchwalbe. *Friſch av. t.* 18. *Georg. it. p.* 175.
Habitat in Europa, Sibiria *et ſeptentrionali* America, *ad ripas et in collibus arenoſis abruptis, in quibus antra profunda horizontalia fodit nido terminata, ex paucis fibris ſiccis aut ſtramine et plumis compacto, auctumno aut diſcedens in oras calidiores, aut in aquis hybernans, junior facile pingueſcens, et carnem ſapidam exhibens, ova ſemel per annum pariens* 5-6 *alba et pellucida*; $4\frac{3}{4}$ *pollices longa.*
Roſtrum pedes*que poſterius plumoſi nigricantes*; corpus *ſupra et* pectoris *faſcia murina.*

rupeſtris. 20. H. murina, ſubtus albida, cauda ſubaequali, rectricibus intus macula alba notatis. *Scop. ann.* 1. *p.* 167. *n.* 253.

Rock Swallow. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 569. *n.* 11.
Habitat in Carniolia, *in cavis rupium ex luto nidum struens, urbicae magnitudine.*
Rostrum pedes*que nudi nigri.*

montana. 21. H. murina, subtus rufa, remigibus rectricibusque ex griseo fuscis margine rufis, his praeter medias et extimas intus macula alba notatis.
Hirondelle grise des rochers. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. *p.* 641.
Crag Swallow. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 570. *n.* 12.
Habitat aestate in Sabaudiae, Delphinatus, Auverniae, Andalusiae *rupibus*, $5\frac{1}{2}$ *pollices longa, rupestri affinis.*
Rostrum *et* ungues *nigri*; hypochondria *fusca*; pedes *lanugine grisea fusco-varia vestiti.*

purpurea. 5. H. violacea tota, cauda forficata. *Kalm it.* 3. *p.* 88.
Hirundo apus Carolinensis. *Briss. av.* 2. *p.* 515. *n.* 17.
Purple Martin. *Catesb. Car.* I. *t.* 51.
Purple Swift. *Arct. zool.* 2. *p.* 431. *n.* 333.
Purple Swallow. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 575. *n.* 23.
Habitat aestate in Carolina *et* Virginia, *ad domus, incolis grata, qui vasa, in quibus nidificat, parant et exponunt, vermes venans, appropinquante accipitre vociferans, quo audito gallinae earumque pulli asylum quaerunt, sed cornices quoque et accipitres magna violentia aggrediens, apode minor, $7\frac{3}{4}$ pollices longa, 4-5 ova pariens.*
Rostrum *nigrum*; pedes *cum* unguibus *nigricantes*; femina *fusca.*

Apus. 6. H. nigricans, gula alba, digitis omnibus quatuor anticis. *Fn. suec.* 272.* *Scop. ann.* I. *p.* 166. *n.* 251. *Kram. el. p.* 380. *n.* 3. *Brünn. orn. p.* 74. *n.* 292. *Müll. zool. n.* 290. *Georg. it. p.* 175.
Hirundo apus. *Bell. av.* 100. a. *Gesn. av.* 166. *Aldr. orn.* 2. *p.* 698. *t.* 699. *Jonst. av.* 119. *t.* 42. *Raj. av. p.* 72. *n.* 4. *Briss. av.* 2. *p.* 512. *n.* 15. *Nozem. nederl. Vogel t.* 20.
Martinet noir. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. *p.* 643.
Grand Martinet. *Buff. pl. enl. n.* 542. *f.* 1.
Black Martin or Swift. *Brit. zool.* I. *n.* 171. *Arct. zool.* 2. *p.* 432. *n.* 334. *Raj. av. p.* 72. *n.* 4. *Will. orn. p.* 214. *t.* 39. *Albin. av.* 2. *t.* 55. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 584. *n.* 34.
Mauerschwalbe. *Frisch av. t.* 17.
Habitat per omnem terrarum orbem, *in altis e. g. turribus templisque interdiu latens, mane praesertim et vespere circumvo-*

cumvolans, 8 *pollices longa*, *muscis aliisque insectis alatis victitans*, *in terram dum decidit*, *non evolans*, *hamo cicadae inserto capienda*. *Bell.* 16., *migrans*, *semel quotannis in turrium cavis nidificans*, *et ova* 5 *alba longiuscula pariens*.

Rostrum *nigrum*; alae *praelongae*; rectrices 10, *extimae pollice intermediis longiores*; pedes *perbreves cum* unguibus *nigricantes*. Feminae *color magis in fuscum vergens*; gula *minus alba*.

finensis. 22. H. fusca, subtus ex rufescente grisea, vertice rufescente, superciliis fuscis, gula alba, palpebris albis, digitis omnibus antrorsum versis.

Grand Martinet de la Chine. *Sonner. it.* 2. *p.* 199.

Chinese Swift. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 586. *n.* 35.

Habitat in Sina, $11\frac{1}{2}$ *pollices longa*.

Rostrum, irides, *brevesque* pedes *ex caeruleo grisei*; alae *longae*.

Subis. 7. H. nigro-caerulescens, ore subtusque cinereo-exalbida.

Hirundo freti Hudsonis. *Briss. av.* 6. *app. p.* 56. *n.* 18.

Hirondelle de la Baie d'Hudson. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. *p.* 677.

Great american Martin. *Edw. av.* 3. *t.* 120.

Canada Swallow. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 575. *n.* 24.

Habitat ad sinum Hudsonis, *apode paulo major*, *alis tamen brevioribus*.

Abdomen *album*, *fusco adumbratum*; remiges rectrices*que nigricantes margine fuscae*; pedes *cum* unguibus *atri*.

senegalensis. 8. H. nigra nitens, subtus rufa, uropygio rufo.

Hirundo senegalensis. *Briss. av.* 2. *p.* 496. *n.* 5. *t.* 45. *f.* 1.

Grande Hirondelle à ventre roux du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. *p.* 610. *Pl. enl. n.* 310.

Senegal Swallow. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 567. *n.* 7.

Habitat ad fluvium Senegal, $8\frac{1}{2}$ *pollices longa*.

Rostrum *atrum*; gula *pallidior*.

ambrosiaca. 23. H. ex griseo fusca, rostro nigricante, pedibus fuscis.

Hirundo riparia senegalensis. *Briss. av.* 2. *p.* 508. *n.* 13. *t.* 45. *f.* 4.

Hirondelle ambrée. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. *p.* 612.

Ambergris Swallow. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 568. *n.* 9.

Habitat

Habitat ad fluvium Senegal, *ambram fortiter olens, troglodytae magnitudine, 5½ pollices longa.*

fasciata. 24. H. nigra, fascia abdominis transversa, crurumque macula externa albis.
Hirondelle à ceinture blanche. *Buff. hist. nat. des oif.* 6. *p.* 611.
Hirondelle de Cayenne à bande blanche sur le ventre. *Buff. pl. enl. n.* 724. *f.* 2.
White-bellied Swallow. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 567. *n.* 8.
Habitat rarior in Cayenna *et* Gujana *ad fluvios, 6 pollices longa.*

Tapera. 9. H. rectricibus aequalibus, corpore nigricante subtus albo.
Hirundo americana. *Briss. av.* 2. *p.* 502. *n.* 10. *t.* 45. *f.* 3.
Hirundo americana, Brasilienfibus Tapera dicta. *Sloan. jam.* 2. *p.* 212. *t.* 51. *Will. orn. p.* 214. *n.* 6. *Raj. av. p.* 72. *n.* 5.
Tapera. *Marcgr. braf.* 205. *Raj. av. p.* 185. *n.* 32.
Tapere. *Buff. hist. nat. des oif.* 6. *p.* 678.
Brasilian Swallow. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 576. *n.* 25.
Habitat in Brasiliae, Cayennae, Jamaicae *planitiebus*, 5¾ *pollices longa.*
Rostrum *nigrum*; pedes *cum* unguibus *et* corpus *supra fusca*; guttur *et* pectus *ex griseo fusca*; remiges rectrices*que ex nigricante fuscae.*

torquata. 25. H. fusca, subtus alba, cauda aequali, fascia pectoris fusca, macula inter rostrum et oculos alba.
Hirondelle brune et blanche à ceinture brune. *Buff. hist. nat. des oif.* 6. *p.* 680.
Hirondelle brune à collier du cap de bonne espérance. *Buff. pl. enl. n.* 723. *f.* 1.
Brown-collared Swallow. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 577. *n.* 26.
Habitat ad caput bonae spei, 6 *pollices longa.*

leucoptera. 26. H. cinerea caeruleo- et viridi-nitens, subtus alba, uropygio, et tectricibus alarum majoribus nonnullis margine albis, remigibus secundariis nonnullis albo notatis.
Hirondelle à ventre blanc de Cayenne. *Buff. hist. nat. des oif.* 6. *p.* 681. *Pl. enl. n.* 546. *f.* 2.
White-winged Swallow. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 577. *n.* 27.
β) Hirundo fusca, subtus fusco-maculata.

Hiron-

Hirondelle à ventre tacheté de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 682. *Pl. enl. n.* 546. *f.* 1.

Habitat in Gujanae *planitiebus humidis, non raro in arborum ramis humilioribus aphyllis*, 4-5 *pollices longa.*

Roſtrum *nigrum*; alae *cauda multo longiores*; rectrices remigesque *fuſcae, nitore caeruleo et viridi*; pedes *pallidi.*

pelasgia. 10. H. rectricibus aequalibus apice nudo ſubulatis.

Hirundo cauda aculeata americana. *Kalm it. p.* 87.
Hirundo Carolinenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 501. *n.* 9.
Hirondelle de la Caroline. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 700.
American Swallow. *Catesb. Car. app. t.* 8.
Aculeated Swallow. *Arct. zool.* 2. *p.* 432. *n.* 335. *t.* 18. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 583. *n.* 32.

β) Hirundo gutture exalbido, fuſco-maculato.

Hirondelle brune acutipenne de la Louiſiane. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 699.
Hirondelle à queue pointue de la Louiſiane. *Buff. pl. enl. n.* 726. *f.* 2.

γ) Hirundo uropygio griſeo, gutture ex rufo griſeo.

Hirondelle acutipenne de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 701. *Pl. enl. n.* 726. *f.* 1.

Habitat aeſtate in Carolina *et* Virginia, *β*) *in* Louiſiana, *γ*) *in* Cayenna *et* Gujana, *ruſtica minor*, $4\frac{1}{4}$ *pollices longa, in caminis nidificans.*

Roſtrum *et* corpus *fuſcum*; gula *albida.*

acuta. 27. H. nigra, ſubtus fuſca, rectricibus apice nudo ſubulatis.

Hirondelle noire acutipenne de la Martinique. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 702. *Pl. enl. n.* 544. *f.* 1.
Sharp-tailed Swallow. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 584. *n.* 33.

β) Hirundo ſubtus ſpadicea.

Habitat in Martinica, *troglodytae magnitudine*, $3\frac{1}{4}$ *pollices longa.*

Roſtrum pedesque *fuſci.*

Melba. 11. H. fuſca, gula abdomineque albis, digitis omnibus antrorſum verſis.

Hirundo major hiſpanica. *Briſſ. av.* 2. *p.* 504. *n.* 11.
Hirundo riparia maxima. *Klein av.* 83.
Hirundo alpina. *Scop. ann.* 1. *p.* 166. *n.* 252.
Grand Martinet à ventre blanc. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 660.

Creatoſt

Greateſt Martin or Swift. *Edw. av.* 1. *t.* 27.
White-bellied Swift. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 586. *n.* 36.

Habitat rarior aeſtate in Hiſpaniae, Maltae, Sabaudiae, Helvetiae, Rhaetiae, Ferioli *montanis, in rupium cavernis nidificans, apode altius volans, 8½ pollices longa: Caro ſapida.*

Roſtrum *nigrum*; torques *ex griſeo fuſcus nigricante-varius*; alis caudaeque *nitor ruber et viridis*; pectus *album*; abdomen *inferius ex griſeo fuſcum*; pedes *incarnati, anterius et intus plumoſi.*

cayennenſis. 28. H. nigra violaceo-nitens, mento, gula, torque lorisque bifurcis albis, tectricibus alarum majoribus corpori proximis fuſcis margine albis, digitis omnibus antrorſum verſis.

Martinet à collier blanc. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 671.
Martinet à collier de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 725. *f.* 2.
White-collared Swallow. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 587. *n.* 37.

Habitat in Cayenna, *urbicae magnitudine, 5¼ pollices longa, aut longior, ex pappo apocyni nidum coni truncati forma, 9 pollices longum, 5-3 pollices amplum intus bipartitum texens.*

Pedes *ad* ungues *usque plumoſi.*

dauurica. 12. H. caerulea, ſubtus alba, temporibus uropygioque ferrugineis. *Mantiſſ. pl. alt. p.* 528. *Act. Stockh.* 1769.

Hirundo alpeſtris. *Pallas it.* 2. *p.* 709. *n.* 19.
Dauurian Swallow. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 570. *n.* 13.

Habitat in Sibiriae *alpibus, domeſtica major, in rupibus elatis et ſpeluncis montanis, rarius in aedificiis relictis nidum ſtruens maximum, hemiſphaericum, e tuberculis limoſis, nullo gramine admixto puriſſimum, canali ad aliquot pollices a nido extenſo pro aditu.*

Corpus *ſupra ex caeruleo chalybeum nitens, ſubtus canum*; tempora *ex ferrugineo rufa, colore poſterius coadunato ad nucham*; remiges *primores nigricantes apicibus obtuſis ſtria fuſca: remige prima longiore*; rectrix *utrinque extima reliquis duplo longior*; criſſum *cineraſcens, pennarum apicibus nigris.*

erythrocephala. 29. H. atra, pennarum margine albo, ſubtus alba, capite rubro.

Red-headed Swallow. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 571. *n.* 14.

Habitat

Habitat in India, *trochili minoris magnitudine.*
Tectrices *caudae fuscescentes.*

unalaschkensis. 30. H. nigra, subtus cinerea, uropygio exalbido, rectricibus margine rotundatis.
Aoonalashka Swallow. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 571. *n.* 15.
Habitat in Unalaschca, 4½ *pollices longa.*

indica. 31. H. fusca subtus exalbida, capitis maxima parte rufa.
Rufous-headed Swallow. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 571. *n.* 16. *t.* 56.
Habitat in India, 4 *pollices longa.*
Tectrices *alarum nonnullae margine albae;* remiges *caudae longiores;* pedes *atri.*

nigra. 32. H. tota nigra.
Hirundo apus dominicensis. *Briss. av.* 2. *p.* 514. *n.* 16. *t.* 46. *f.* 3.
Petit martinet noir. *Buff. hist. nat. desois.* 6. *p.* 668. *Bajon Cayenn.* 2. *p.* 276.
Black Swallow. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 572. *n.* 17.
β) Hirundo nigra, frontis taeniola alba.
γ) Hirundo tota ex nigricante grisea.
Habitat rarior in insulae S. Dominici *et* Cayennae *planitiebus a mari remotioribus siccis, saepius in arboribus emortuis, pro nido antrum in terra fodiens,* ½ *pedem longum, introitu angustissimo,* 6 *fere pollices longa.*

dominicensis. 33. H. nigra chalybeo-nitens, abdomine albo.
Hirundo dominicensis. *Briss. av.* 2. *p.* 493. *n.* 3.
Grand martinet noir à ventre blanc. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. *p.* 669.
Hirondelle d'Amérique. *Buff. pl. enl. n.* 545. *f.* 1.
St. Domingo Swallow. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 573. *n.* 18.
Habitat a Majo ad Julium in insula S. Dominici *et vicinis, domesticae magnitudine,* 7 *pollices longa, alaudae, ut fertur, cantu.*
Rostrum *et* pedes *cum* unguibus *fusci.*

peruviana. 34. H. nigra, subtus alba, fascia pectoris cinerea, capite colloque griseis, tectricibus alarum superioribus, remigibus rectricibusque dilute griseis, margine ex flavicante griseis.
Hirundo peruviana major. *Briss. av.* 2. *p.* 498. *n.* 7.
Martinet noir et blanc à ceinture grise. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. *p.* 670.

Peruvian

Peruvian Swallow. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 573. *n.* 19
Habitat in Peru.

cinerea. 35. H. nigra, subtus cinerea, remigibus rectricibusque cinereis margine ex flavicante griseis, orbitis fuscis.
Hirundo peruviana. *Briss. av.* 2. *p.* 498. *n.* 6.
Petite hirondelle noire à ventre cendré. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. *p.* 673.
Ash-bellied Swallow. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 573. *n.* 20.
Habitat in Peru *et* Tahiti, *domestica minor.*

violacea. 36. H. ex atro caerulea, violaceo tincta, remigibus majoribus intus, rostro pedibusque nigris.
Hirondelle bleue de la Louisiane. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. *p.* 674. *Pl. enl. n.* 722.
Violet Swallow. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 574. *n.* 25.
Habitat in Louisiana, $8\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

chalybea. 37. H. nigra chalybeo-nitens subtus alba, alis caudaque nigris, rostro pedibusque fuscis.
Hirundo cayanensis. *Briss. av.* 2. *p.* 495. *n.* 4. *t.* 46. *f.* 1.
Hirondelle de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. *p.* 675. *Pl. enl. n.* 545. *f.* 2.
Chalybeate Swallow. *Lath. syn.* II. 2. *p.* 574. *n.* 22.
Habitat in Cayenna, *per totum annum frequens, in arboribus caducis,* 6 *pollices longa, ova in cavis arborum deponens.*

Javanica. 38. rectricibus, exceptis duabus intermediis, macula alba notatis, cauda bifurcata. *Mus. Carls.* IV. n. 100.
Habitat in Java Sabam.

118. CAPRIMULGUS.

Roſtrum modice incurvum, minimum, ſubulatum, baſi depreſſum.

Vibriſſae ad os ſerie ciliari.

Rictus ampliſſimus.

Aures ampliſſimae.

Lingua acuta, integerrima.

Cauda non furcata: *rectricibus* 10.

Pedes breves, *unguis* medii margine lato ſerrato.

europaeus. 1. C. niger, cinereo, fuſco, ferrugineo et albo varius, narium tubis obſoletis. *Fn. ſuec.* 274.* *Scop. ann.* 1. *n.* 254. *Kram. el. p.* 281.* *Müller zool. p.* 34. *n.* 291.

Caprimulgus. *Bell. av.* 28. a. *Geſn. av.* 242. *Aldr. orn.* 1. *p.* 567. *t.* 569. *Jonſt. av.* 53. *t.* 20. *Raj. av. p.* 26. *n.* 1. *Briſſ. av.* 2. *p.* 470. *n.* 1. *t.* 44. *Nozem. nederl. Vogel t.* 21.

Hirundo cauda integra, ore ſetis ciliato. *Fn. ſuec.* 1. *n.* 248.

Engoulevent. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 512.

Dorr Hawk, Night Jarr, or Nigt Hawk. *Charlet. ex.* 71, *n.* 8.

Fern-owl, Churn-owl, or Goat-ſucker. *Raj. av.* 26. *n.* 21. *Will. orn. p.* 107. *t.* 14. *Albin. av.* 1. *p.* 10. *t.* 10. *Borl. Cornw. t.* 24. *f.* 13.

Nocturnal Goatſucker. *Brit. zool.* 1. *n.* 172. *t.* 172.

European Goatſucker. *Arct. zool.* 2. *p.* 437. A. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 593. *n.* 5.

Nachtſchwalbe. *Friſch av. t.* 101.

Habitat, rarior tamen, in Europae, Aſiae *et* Africae *potiſſimum ſilvis, inſectis, praeſertim ſcarabaeis et phalaenis victitans, quae diluculo et crepuſculo, quo tempore acutius videt, volans venatur, interdiu latens, voce duplici, altera vagiente, altera quaſi coli rotatae veſpertina, ova* 2 *exalbida maculis ex caeruleſcente fuſcis varia pariens, et in nuda terra, aut rupium fiſſuris deponens, olim carpere lactantia viſcera roſtris falſo accuſatus,* $10\frac{1}{2}$ *pollices longus.*

Myſtaces *ex ſetis* 8, *pectinatim utrinque mandibulae ſuperiori inſertis, roſtro longioribus.*

Pedes *infra genua plumoſi*; mari remiges *tres primae intus, et* rectrices *extimae ad apicem litura alba ovali notatae.*

virginianus. 3. C. fuſcus, transverſim griſeo-fuſco et hinc inde cinereo-varius, ſubtus ex rubeſcente albus transverſim ſtriatus, menti macula trigona alba, area oculorum et cervice aurantiis maculis varia.

Caprimulgus minor americanus. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 346. 1. *β. Kalm it.* 3. *p.* 93.
Caprimulgus virginianus. *Briſſ. av.* 2. *p.* 477. *n.* 3.
Whip-poor-will. *Catesb. Car.* 3. *t.* 16. *Edw. av.* 2. *t.* 63. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 534.
Longwinged Goatſucker. *Arct. zool.* 2. *p.* 436. *n.* 337. *t.* 18.
Virginia Goatſucker. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 595. *n.* 6.

Habitat aeſtate in America *ſeptentrionali, praeſertim* Virginia, *europaeo minor*, 8 *pollices longus, in montanis, veſpere prope domus frequens, eoque tempore ad ortum ſolis usque ſaepiſſime altiſſima voce wiperi-wip clamans, ova* 2 *viridia, maculis et ſtriis atris varia in campo aperto in nuda terra pariens. Caro ſapida.*

Genae *ex cinereo fuſcae*; remiges *atrae*, 5 *primae circa medium*, rectrices *extimae prope apicem macula alba notatae*; pedes *incarnati.*

carolinenſis. 4. C. ſupra lineis transverſis angulatis alternis atris et griſeis varius, ſubtus ex rufo griſeus lineis nigricantibus longitudinalibus, cauda griſeo atro-cancellata.

Caprimulgus carolinenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 475. *n.* 2.
Engoulevent de la Caroline. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 532.
Caroline Goatſucker. *Catesb. Car.* 1. *t.* 8. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 592. *n.* 4.
Rain Bird. *Brown jam. p.* 467.
Shortwinged Goatſucker. *Arct. zool.* 2. *p.* 434. *n.* 336.

Habitat

Caprimulgi, *praeter primam ſpeciem ſolius Americae incolae, differunt ab* hirundinibus, *uti* ſtrix *a* falcone, phalaena *a* papilione, *interdiu vix conſpicui, niſi turbati, aut nubilo caelo; diluculo, crepuſculo et nocte victum quaerunt, qui ſolis inſectis conſtat, eo etiam ſolum tempore ſonori; ova duo pariunt, quae nudae terrae ſine nido committunt; ſtrigi multum affines; Digitus lateralis membrana tenui medio annexus.*

Habitat in Virginia *et* Carolina, *europaei magnitudine*, 11¼ *pollices longus.*

Roſtrum *atrum*; vertex *maculis griſeis*; alae *maculis et longitudinalibus ſtriis flavicantibus et atris variae*; tempora *ex rufo griſea*; ſtria *ab angulo oris ad utrumque mandibulae latus ducta alba, infraque hanc paucae maculae flavicantes*; remiges *lineis atris et griſeis, extus maculis flavis, tres primae intus litura magna alba notatae*; pedes *fuſci*, unguibus *nigris.*

griſeus. 5. C. griſeus, alis nigris: lineis dilute griſeis, cauda ex fuſcescente griſea: lineis fuſcis.

Engoulevent gris. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 548.
Grey Goatſucker. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 592. *n.* 3.
Habitat in Cayenna, 13 *pollices longus.*
Roſtrum *ſupra fuſcum, ſubtus flavicans*; cauda *ultra* 5 *pollices longa.*

jamaicenſis. 6. C. ſtriis longitudinalibus ferrugineis et nigris varius, areis oculorum diſco plumarum veſtitis, alis fuſcis maculatis, cauda cinerea maculis nigris faſciisque ex nigro fuſcis varia.

Guira-querea. *Raj. av. p.* 180. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 536.
Wood-Owl. *Sloan. jam.* 2. *p.* 295.
Mountain Owl. *Brown jam. p.* 473.
Jamaica Goatſucker. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 591. *n.* 2. *t.* 57.
Habitat in Jamaicae *ſilvis, oti magnitudine*, 16 *pollices longus.*
Roſtrum *et* ungues *nigri*; nares *plumis tectae*; irides *ex rubeſcente flavae*; tectrices *alarum partim ex ferrugineo et fuſco variae, maculis nigricantibus*; remiges *margine exteriori maculis* 8-9 *albis notatae*; pedes *magni, ad digitos usque plumoſi, flavi.*

grandis. 7. C. nigricans, maculis minutis ſtriisque fuſcis varius, ungue intermedio non ſerrato.

Caprimulgus braſilienſis major naevius. *Briſſ. av.* 2. *p.* 485. *n.* 7.
Grand Ibijau. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 541.
Grand Crapaud-volant de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 325.
Ibijau, american Goatſucker. *Raj. av. p.* 27. *n.* 2. *Will. orn. p.* 108. *t.* 14.
Grand Goatſucker. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 590. *n.* 1.

Habitat in Cayenna, *falconis albidi magnitudine*, 23½ *pollices longus.*

Roſtrum *fere ad apicem usque plumis tectum*; interſcapuliis *candor adſperſus*; alae *apicem fere caudae attingentes, exteriori margine fuſcae*; remiges *ex atro fuſcae, rachi nigrae, utrinque albo-lineatae*; cauda 11 *pollices longa, apice rotundata fuſca, faſciis anguſtis* 7-8 *albo-maculatis varia*; pedes *fuſci, ad* digitos *fere plumoſi.*

albicollis. 8. C. ex rufo fuſcus maculis ſtriisque nigris varius, ſubtus fuſceſcens lineis atris, gulae macula trigona alba, pennarum margine atro, cauda ſubcuneata.

White-throated Goatſucker. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 596. *n.* 7.

Habitat in Cayenna, 10¼ *pollices longus.*

Roſtrum pedes*que fuſci; pennae* ſcapulares *et* tectrices *alarum exteriores plurimae prope apicem nigro-faſciatae, apice ipſo ex flavicante luteſcentes*; remiges *minores extus rufo-maculatae, majores nigrae, faſcia circa medium alba*; rectrices 3, 3 *albae*, 2, 2 *intus albae, extus nigrae, macula prope baſin alba*; *extimae nigrae, macula pariter prope baſin alba notatae*; digitus *medius praelongus.*

rufus. 9. C. rufus longitudinaliter nigro-ſtriatus, et nigro alboque varius, gula lineis transverſis, cauda faſciis nigris, remigibus taeniolis alternis rufis nigrisque notatis.

Engoulevent roux de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 550.

Crapaud-volant ou Tette-chevre de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 735.

Rufous Goatſucker. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 597. *n.* 8.

Habitat in Cayenna, 10½ *pollices longus.*

Roſtrum *fuſceſcens*; irides *flavae*; alae *faſciis transverſis nigris*, abdominis *pars ſuperior in nigrum, inferior in rufum colorem vergens*; pedes *incarnati.*

guianenſis. 10. C. fulvus, rufo-ſtriatus et maculatus, faſcia alba a rictu per mandibulas infra gulam producta, remigibus nigris, quinque vel ſex primis macula alba notatis.

Montvoyau de la Guyane. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 549.

Tette-chevre roux de la Guyane. *Buff. pl. enl. n.* 733.

Gujana Goatſucker. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 598. *n.* 9.

Habitat in Gujanae *fruticibus*, 9 *pollices longus.*

Vertex

Vertex *et* cervix *striis longitudinalibus*, dorsum *obliquis*, corpus *subtus transversis notatum*; cauda 3 *pollices longa*, *pollice alas superans.*

brasilianus. 11. C. nigricans maculis exiguis albis flavo-variis notatus, subtus ex nigro alboque varius, alis caudaque aequalibus.
Caprimulgus brasilienſis naevius. *Briſſ. av.* 2. *p.* 483. *n.* 6.
Ibijau. *Pet. gaz. t.* 59. *f.* 1. *Raj. av. p.* 27. *n.* 2. *Will. orn. p.* 108. *t.* 14. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 539.
Braſilian Goatſucker. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 598. *n.* 10.
Habitat in Braſilia, *hirundinis magnitudine*, *caudam flabelli inſtar expandere fertur.*
Orbitae *ochroleucae*; roſtrum *et* oculi *nigricantes*; pedes *albi.*

ſemitorquatus. 12. C. nigricans, rufo griſeoque varius, ſemitorque albo.
Petit engoulevent tacheté de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 540. *Pl. enl. n.* 734.
White-collared Goatſucker. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 599. *n.* 11.
Habitat in Cayenna, *hirundinis magnitudine*, 8 *pollices longus.*

cayennenſis. 13. C. griſeus nigro-varius, gutture alarumque faſcia albis, temporibus rufis: ſtriis quinque nigris, dorſo rufo nigro-ſtriato, remigibus nigris: primis quinque alba macula notatis.
Engoulevent de Cayenne. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 545.
Crapaud-volant de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 760.
White-necked Goatſucker. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 599. *n.* 12.
Habitat in Cayennae *cultis*, *frequens*, *non valde timidus*, $7\frac{1}{2}$ *pollices longus*, *duplicem ſonum edens*, *alterum teſtudinis*, *alterum latratui canis ſimilem.*
Roſtrum *nigrum*; caput *et* cervix *rufo-tincta*; abdomen *inferius albidum*, *nigro-maculatum*; rectrices 2 *intermediae griſeae*, *faſciis* 5-6 *nigricantibus*; *laterales nigrae*, *margine albae*; pedes *ex flavo fuſci.*

acutus. 14. C. capite colloque ſtriis transverſis rufis, fuſcis et nigris vario, corpore nigro-ſtriato, ſupra griſeo, ſubtus rufo, cauda rufeſcente, faſcia ad apicem maculisque nigris varia.
Engoulevent acutipenne de la Guyane. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 547. *Pl. enl. n.* 732.
Sharp-tailed Goatſucker. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 600. *n.* 13.
Habitat in Gujana, $7\frac{1}{2}$ *pollices longus.*

Roſtrum pedes*que nigri*; cauda *alis paulo longior*, *faſciae margine ſuperiori albo.*

americanus. 2. C. narium tubulis eminentibus.
Caprimulgus jamaicenſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 480. *n.* 4.
Engoulevent à lunettes ou Haleur. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 6. *p.* 543.
Small Wood-owl. *Raj. av. p.* 180. *n.* 4. *Sloan. jam.* 2. *p.* 296. *t.* 255. *f.* 1.
Screech-owl. *Brown jam. p.* 473.
American Goatſucker. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 600. *n.* 14.
Habitat in Jamaica, 7 *pollices longus.*
Roſtrum *nigrum*; corpus *ex griſeo*, *nigro*, *et folii marcidi colore varium*; pedes *cum* unguibus *griſei.*

torquatus. 15. C. ex cinereo fuſcus flavo maculatus, occipitis annulo aureo, torque albido-maculato, rectricibus duabus intermediis multo longioribus.
Caprimulgus braſilienſis. *Briſſ. av.* 2. *p.* 481. *n.* 5.
Guira-querea. *Raj. av. p.* 27. *n.* 3. *Will. orn. p.* 103. *t.* 14.
Gold-collared Goatſucker. *Lath. ſyn.* II. 2. *p.* 601. *n.* 15.
Habitat in Braſilia, *alaudae magnitudine*, *at alis caudaque longioribus.*
Caput *magnum*, *depreſſum*; oculi *nigri*; pedes *atri*; ungues *nigri.*